



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>



HISTOIRE
DES PLANTES

TOME XIII

HISTOIRE
DES PLANTES

TOME XIII

19083. — L.-Imprimeries réunies, rue Mignon, 2, Paris.

HISTOIRE DES PLANTES

PAR

H. BAILLON

PROFESSEUR D'HISTOIRE NATURELLE MÉDICALE A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS
DIRECTEUR DU JARDIN BOTANIQUE DE LA FACULTÉ
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE PARIS

TOME TREIZIÈME

AMARYLLIDACÉES, BROMÉLIACÉES, IRIDACÉES, TACCACÉES
BURMANNIACÉES, HYDROCHARIDACÉES
COMMELINACÉES, XYRIDACÉES, MAYACACÉES, PHYLIDRACÉES
RAPATÉACÉES, PALMIERS, PANDANACÉES
CYCLANTHACÉES, ARACÉES

Illustrée de 327 figures dans les textes

DESSINS DE FAGUET

PARIS

LIBRAIRIE HACHETTE & C^{ie}

BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79

LONDRES, 10, KING WILLIAM STREET, STRAND

—
1895

Droits de traduction et de reproduction réservés.

✓

CXXIII

AMARYLLIDACÉES

I. SÉRIE DES AMARYLLIS.

Autrefois, la plupart des plantes de ce groupe étaient considérées comme des *Amaryllis*; mais aujourd'hui on n'a plus conservé dans ce genre que l'*A. Belladonna* L., que nous n'étudierons pas tout d'abord, à cause de la légère irrégularité de ses fleurs déclinées. Il nous paraît préférable d'analyser avant tout un type à fleurs parfaitement régulières, type indigène et assez communément cultivé chez nous, l'*A. lutea* L., dont on a fait un genre *Sternbergia*¹ (fig. 1, 2).

Nous y remarquerons d'abord un réceptacle creux, en forme de sac à orifice étroit, réceptacle dans lequel est complètement inclus l'ovaire infère et adné, tandis que sur les bords de l'orifice s'insère un périanthe gamophylle et pétaloïde, qui a la forme d'un entonnoir. Son tube varie de longueur suivant les espèces, et son limbe est formé de deux verticilles de trois folioles imbriquées, dont trois extérieures représentent le calice, et trois intérieures, alternes, la corolle. Les étamines, insérées à la base de ces folioles et plus courtes qu'elles, leur sont superposées : trois plus longues aux pétales, et trois aux sépales. Chacune d'elles se compose d'un filet subulé et d'une anthère introrse, oblongue, dressée, attachée au filet par son dos, et à loges libres en bas, déhiscentes par deux fentes longitudinales¹. L'ovaire infère a trois loges superposées aux sépales, et est surmonté d'un style grêle, creux, dont le sommet stigmatifère est presque entier ou partagé en trois petits lobes finalement étalés. Dans l'angle interne de chaque loge ovarienne s'insèrent, en nombre indéfini, des ovules anatropes, horizontaux ou ascendants, disposés sur deux séries verticales. Le fruit est d'abord un peu charnu; puis il se dessèche et finit

1. WALDST. et KIT., *Pl. rar. hung.*, II (1805), 172, t. 159 (non ART.). — W., in *Berl. Mag.*, II, 26. — HERB., *App.*, 38; *Amar.*, 78. — NEES, *Gen. Fl. germ., Monoc.*, III, n. 5. — ENDL.,

Gen., n. 1270. — K., *Enum.*, V, 698. — BAK., in *Trim. Journ.* (1878), 166; *Handb. Amar.*, 28. — PAX, in *Engl. et Prantl Pflanzenfam.*, Lief. 10, H, 5, p. 107.

le plus souvent par s'ouvrir sur le dos des loges. Les graines sont nombreuses, presque sphériques, souvent pourvues d'un épaississement arilliforme, qui se détache en blanc sur le tégument crustacé et noirâtre. Elles renferment un albumen charnu et un petit embryon cylindroïde, voisin du hile.

Le *S. lutea* est une herbe vivace de l'Europe tempérée et de la

Sternbergia lutea.



Fig. 1. Port.

Fig. 2. Fleur, coupe longitudinale.

région Méditerranéenne africaine et asiatique. Elle a pour portion souterraine un bulbe tunique qui porte inférieurement des racines adventives. Les feuilles basilaires, en petit nombre, sont loriformes, rectinerves. Elles sont contemporaines des fleurs¹ qui, en automne,

1. Jaunes, peu ou point odorantes, moyennes ou grandes et belles.

sortent de terre, solitaires au sommet d'un pédoncule comprimé. Au-dessous de la fleur, il porte une spathe membraneuse et translucide, tubuleuse à sa base et s'ouvrant plus haut d'un côté¹ à l'époque de l'épanouissement.

Les caractères de la plante qui précède appartiennent à un sous-genre *Oporanthus*² qui avait été élevé au rang de genre et qui comprend deux espèces. Dans les *Sternbergia* proprement dits, qui sont aussi au nombre de deux, les fleurs sont portées par un pédoncule beaucoup plus court; elles s'épanouissent en automne, tandis que les feuilles ne se développent qu'au printemps suivant, et leur péricorolle a un tube bien plus allongé et cylindrique. Ce sont des plantes de l'Europe orientale et de l'Asie austro-occidentale. Le genre comprend donc en tout quatre espèces³ vivaces.

Très voisins des *Sternbergia* et rangés dans

Leucojum aestivum.



Fig. 5. Inflorescence.

Galanthus nivalis.



Fig. 3, 4. Fleurs.



Fig. 6. Fleur, coupe longitudinale.

une même sous-série (*Sternbergiées*), avec des fleurs solitaires au sommet d'une hampe plus ou moins allongée, sont les *Cooperia* et *Zephyranthes*, genres américains, et les *Apodolirion* et *Gethyllis*, genres de l'Afrique méridionale. Dans ces derniers, le nombre des étamines peut s'élever jusqu'à dix-huit, par suite de dédoublements.

Les Perce-neige ou *Galanthus* (fig. 3, 4) donnent leur nom à une

1. Elle est formée de deux bractées unies jusqu'à la fin par la base et dont l'extrême sommet est souvent distinct avant l'anthèse.

2. HEAV., *App.*, 38; *Amar.*, 73, 188.

3. L., *Spec.*, 420 (*Amaryllis*). — RED., *Lil.*, t. 148. — SIST., *Fl. grec.*, t. 310, 311. — BIER., *Fl. laur.-cauc.*, III, 255 (*Amaryllis*). —

RESCHE., *lc. Fl. germ.*, t. 372, 373. — REG., *Gartenfl.*, t. 576. — BOISS., *Diagn. or.*, II, 87; *Fl. or.*, V, 146. — TIN., in *Guss. Syn.*, II, 811. — KER., in *Schult. Syst.*, VII, 794. — GREY. et GODR., *Fl. de Fr.*, III, 252. — *Hortic. franç.* (1861), t. 22 (*Oporanthus*). — *Bot. Reg.*, t. 2008. — *Bot. Mag.*, t. 290 (*Amaryllis*).

sous-série (*Galanthées*). Ils ont des fleurs solitaires et pendantes au bout d'une hampe qui porte plus bas deux bractées involucrantes. Le périanthe supère est formé de folioles indépendantes : trois sépales pétaloïdes et trois pétales alternes, bien plus courts, dressés et échan-

Narcissus (Eunarcissus) poeticus.



Fig. 7. Port.

Fig. 8. Fleur, coupe longitudinale.

crés au sommet. Les étamines épigynes ont une anthère pyramidale et apiculée, qui s'insère par sa base sur un court et mince filet.

Les Nivéoles (fig. 5, 6), qui sont très voisines des Perce-neige, ont les pétales égaux ou à peu près aux sépales. Leurs anthères sont linéaires-obliques, et leur style se dilate en massue. Leurs fleurs sont tantôt solitaires et tantôt groupées en cyme unipare.

Le *Lapiedra*, plante rare d'Espagne et du Maroc, a des cymes pluriflores et des pétales égaux aux sépales. Mais ses anthères sont ovoïdes-globuleuses, petites, et leur base est bilobée, les loges étant indépendantes l'une de l'autre dans leur portion inférieure.

Narcissus (Ajax) *Pseudo-Narcissus*.

Fig. 10. Fleur.

Fig. 9. Port.

Fig. 11. Fleur, coupe longitudinale.

Les Narcisses (fig. 7-18) sont le type d'une sous-série (*Narcissées*) dans laquelle les fleurs ont, au-dessus de l'ovaire, un tube généralement allongé. Leurs étamines sont disposées sur deux séries : les alternipétales insérées plus haut que les autres. Elles ont des anthères qui s'insèrent au milieu de leur dos ou plus bas. En dehors de l'androcée, le tube se prolonge en un organe supplémentaire, nommé

couronne, collerette ou godet, et qui présente toutes les variations de taille, depuis un simple anneau, comme dans le *N. de Broussonet*, jusqu'à un grand sac pétaloïde et membraneux, comme dans notre vulgaire *Porillon* (fig. 9-11) et le *N. Bulbocode*. L'ovaire infère a les loges multiovulées, et il devient un fruit loculicide. La fleur est

Narcissus (Hermione) Tazetta.



Fig. 12. Inflorescence.

Fig. 13. Fleur, coupe longitudinale.

Fig. 14. Gynécée.



Fig. 15. Fruit.

Fig. 16. Fruit
déhiscent.

Fig. 17. Graine.

Fig. 18. Graine, coupe
longitudinale.

souvent solitaire au sommet de la hampe, avec une sorte d'involucre formé primitivement de deux bractées. Mais dans d'autres espèces, chacune de ces bractées a une fleur axillaire; et dans le *N. à bouquets* (fig. 12-18), l'inflorescence est formée de cymes unipares et pluriflores. Tout à côté des *Narcisses* se placent les deux genres *Cryptostephanus*, de l'Afrique tropicale occidentale, et *Tapeinanthus*, de l'ouest de la région Méditerranéenne. Le premier a un rhizome et

une inflorescence ombelliforme de cymes. Sa collerette est formée de douze étroites écailles insérées à la gorge du périanthe. Le dernier a un périanthe en entonnoir, avec une collerette de six petites écailles entières ou bifides, qui peuvent même faire défaut. C'est une petite herbe bulbeuse qui n'a normalement qu'une feuille à évolution tardive et une ou deux petites fleurs au sommet d'une hampe grêle.

Les *Crinum* (fig. 19-21), plantes souvent très belles, des régions les plus chaudes des deux mondes, servent de type à une sous-série (*Crinées*) et ont des fleurs en cymes ombelliformes, à grand périanthe en entonnoir ou hypocratérimorphe. Leurs étamines, insérées à la gorge, ont des filets libres ou à peine unis à la base, et des anthères allongées, dorsifixes et versatiles. Leurs loges ovariennes renferment de nombreux ovules, ou seulement deux. Leur fruit, sphérique ou hémisphérique, a un péricarpe mince ou coriace, qui finit par se rompre irrégulièrement et laisse échapper des graines subsphériques ou irrégulières, vertes et turgides, à épais albumen charnu.

Le genre *Amaryllis*, jadis si nombreux et aujourd'hui réduit au seul *A. Belladonna*, du Cap, se distingue à peine des *Crinum* par le tube court de son périanthe qui n'est pas de couleur blanche et qui a des lobes larges. Ses graines sont aussi turgescents et vertes.

Le *Vallota*, de l'Afrique australe, a les fleurs des *Amaryllis*, avec le tube presque aussi long que celui des *Crinum* et la gorge pulvinée. Son fruit capsulaire s'ouvre en trois valves; et ses graines, noires et comprimées, sont dilatées en aile à leur base.

Les *Brunsvigia*, également de l'Afrique australe, ont de grandes fleurs de *Crinum* ou d'*Amaryllis*, réunies en cymes ombelliformes. Leur fruit s'ouvre aussi en trois valves, mais il est turbiné, avec trois angles aigus ou aliformes. Leurs graines sont vertes, subsphériques, supportées par un funicule distinct.

Très analogues aux *Brunsvigia* par l'inflorescence, les *Ammocharis* ont un périanthe à tube épais et court, et à lobes du limbe étroits et rétrécis à la base. Leur ovaire en forme de gourde se rétrécit en un col distinct. On ne connaît pas le fruit de cette plante du Cap.

Le *Chlidanthus*, du Pérou, a aussi des fleurs de *Crinum*, jaunes et odorantes, à long tube, à limbe teinté de vert. Ses graines sont noires.

Les *Cyrtanthus*, de l'Afrique australe, ont des fleurs à tube deux ou trois fois plus long que le limbe, avec la gorge nue; des cymes ombelliformes, des ovules en nombre indéfini, et des fruits capsulaires à semences noires.

Les *Ungernia*, de l'Asie occidentale, ont la même inflorescence et la même fleur à gorge nue que les *Cyrtanthus*. Mais le tube de leur périanthe est plus court que son limbe; leur fruit est loculicide, et leurs graines sont ailées sur les bords.

Crinum asiaticum.

Fig. 19. Port.

Fig. 20. Fleur.

Fig. 21. Fruit.

Les *Anoiganthus*, de l'Afrique australe, ont un périanthe à tube plus court encore. Les étamines ont de longs filets grêles. Les fleurs sont disposées en cyme ombelliforme, et les étamines périgynes ont les anthères allongées.

Les *Imhofia* sont des plantes bulbeuses de l'Afrique australe, qui ont à peu près les fleurs des *Amaryllis*, groupées en cymes ombelliformes, avec un style grêle et une capsule sphérique à angles obtus. Cette capsule est loculicide, et les graines vertes sont sphériques.

On ne peut guère en éloigner les *Lycoris*, de l'extrême orient de l'Asie, qui ont des cymes ombelliformes, un périanthe à tube court,

Pancratium illyricum.

Fig. 22. Fleur.

des graines turgides et noires, en petit nombre, dans un fruit également loculicide.

Dans les *Pancratium* (fig. 22), dont le nom a été donné à une sous-série (*Pancratiées*), les fleurs blanches ressemblent beaucoup à celles des *Crinum*, avec un périanthe en entonnoir dont les divisions sont lancéolées ou linéaires. Mais les étamines ont leurs filets unis dans une grande portion de leur base par une collerette dont les lobes sont entiers ou bifides. Elle a été distinguée de la couronne des

Narcisses, parce qu'elle est plus intérieure qu'elle, étant située au niveau des filets dont elle représente comme des ailes. Mais son origine est au fond la même. L'ovaire infère contient de nombreux ovules; et le fruit loculicide renferme des graines noires et anguleuses-comprimées. Ce sont des plantes bulbeuses de l'ancien monde.

Les *Hyline*, du Brésil, sont des *Pancratium* à périanthe dépourvu de tube et à collerette très courte.

Les *Stenomesson*, des Andes de l'Amérique du Sud, ont aussi à peu près les fleurs des *Pancratium*, mais plus petites, colorées, avec une courte collerette staminale à lobes entiers ou bidentés.

Les *Placea* ont également à peu près des fleurs de *Pancratium*, mais à périanthe décliné, et à étamines unies par une courte collerette presque 6-partite, à lobes émarginés. Ils sont chiliens et ont des cymes de fleurs blanches ou striées de pourpre.

Les *Hippeastrum*, des deux Amériques, jadis confondus parmi les *Amaryllis*, ont un périanthe à tube généralement court, décliné comme l'androcée. À leur gorge se trouve une courte collerette d'écaillés plus ou moins distinctes, sur lesquelles s'insèrent en dedans les étamines déclinées. Leurs fleurs sont solitaires ou plus souvent en cymes ombelliformes, parfois très grandes et de coloris intense.

Dans les *Sprekelia*, du Mexique et du Guatemala, les fleurs solitaires sont analogues à celles des *Hippeastrum*, mais à périanthe irrégulier et largement bilabié.

Les *Vagaría*, herbes bulbeuses syriennes, ont des fleurs régulières, à tube plus ou moins long, avec des étamines dont les ailes ont la forme d'un triangle étroit et allongé; ce qui les rapproche beaucoup des vrais *Calliphuraria*. Leur fruit est membraneux, et leurs graines peu nombreuses sont ovoïdes ou anguleuses et noires.

Les *Calliphuraria*, type d'une sous-série assez distincte (*Calliphurariées*), ont des fleurs régulières, qui rappellent beaucoup celles des *Vagaría*. Leur périanthe en entonnoir a un tube plus ou moins long, et leurs étamines ont, de chaque côté du filet, un prolongement en forme de triangle allongé dans les *Eucalliphuraria*. Ces prolongements deviennent plus larges et plus longuement unis entre eux dans les espèces de la section *Eucharis* du même genre, espèces dans lesquelles le tube du périanthe est ordinairement aussi plus long et plus étroit. Ces mêmes ailes se trouvent réduites à des dents dans la section *Microdontocharis* du même genre. Celui-ci ne s'observe que dans les régions septentrionales de l'Amérique du Sud.

Le *Plagiolirion*, également américain, peut être considéré comme un *Calliphruria* dont le périclanthe aurait un limbe fort irrégulier.

Dans les *Hymenocallis* (fig. 23, 24), des régions chaudes des deux Amériques, le périclanthe est régulier, blanc, à long tube cylindrique, avec une collerette développée entre les filets staminaux. L'ovaire

Hymenocallis (Imene) calathina.



Fig. 23. Fleur.

Fig. 24. Fleur, coupe longitudinale.

a, dans chacune de ses trois loges, deux ovules ascendants, insérés à la base de l'angle interne. Le fruit, épais ou à paroi finalement membraneuse, finit par se déchirer et ne renferme ordinairement qu'une grosse graine, bulbiforme et verte.

Le *Liriopsis*, des Andes, est un *Hymenocallis* à tube du périclanthe irrégulier, blanc et court, avec une collerette défléchie.

Les *Eurycles* et les *Calostemma*, océaniens, ont, dans chaque loge,

deux ou trois ovules, insérés vers le milieu de l'angle interne, et non à la base. Les loges ovariennes fertiles sont au nombre de trois dans les premiers et d'une seule dans le dernier.

Les *Eustephia* (fig. 25), dont le nom peut s'appliquer à une sous-série (*Eustéphieés*), ont des fleurs dont le périanthe représente un entonnoir étroit, avec un tube court et des lobes longs et dressés. Les étamines, régulièrement insérées au tube, sont indépendantes;

Eustephia coccinea.




Fig. 25. Étamine.

mais leur filet porte à droite et à gauche, à partir du bas, une aile étroite qui, au sommet, se dilate le plus souvent en deux lames triangulaires longues et étroites, étalées, à tort décrites comme des soies. L'ovaire a ses trois loges pluriovulées. C'est une herbe bulbeuse des Andes du Pérou.

Les *Phædranassa*, des mêmes régions, ont une aile très étroite en bas et de chaque côté du filet, mais sans dilatation triangulaire en haut. Leurs feuilles sont larges et pétiolées.

Dans les *Leperiza*, plantes également des Andes de l'Amérique méridionale, les filets staminaux sont à peine marginés inférieurement, et le périanthe se dilate subitement au-dessus du tube cylindrique de sa base.

Dans les *Eucrosia* et les *Stricklandia*, des mêmes régions andines, les étamines sont décllinées : longuement exsertes dans les premiers ; courtes et à peine exsertes dans les derniers. Leur base cal-
leuse est libre ou légèrement monadelphie.

On a appliqué le nom des *Hæmanthus* (fig. 26, 27) à une sous-série un peu hétérogène (*Hæmanthées*). Ce sont des plantes de l'Afrique tropicale et australe et de l'Arabie, dont les petites fleurs régulières ont un périanthe dressé, à tube à peu près cylindrique et à lobes étroits. Les six étamines, libres et généralement exsertes, s'insèrent à la gorge du périanthe. L'ovaire infère est court, avec seulement un ou deux ovules, d'abord descendants, dans chaque loge. Le fruit est une baie, avec d'ordinaire une seule graine pâle. L'inflorescence involuquée représente aussi un faux capitule de cymes unipares.

Dans la même sous-série se rangent :

Les *Buphane*, de l'Afrique australe, qu'on peut définir des *Hæmanthus* à fruit capsulaire ;

Les *Clivia*, du Cap, qui ont le fruit charnu des *Hæmanthus*, mais des fleurs plus grandes, avec des loges ovariennes 5-8-ovulées, et un

Hæmanthus coccineus.

Fig. 26. Port.

rhizome à peine bulbiforme, portant des bases de feuilles et d'épaisses racines fasciculées ;

Les *Griffinia*, de l'Amérique tropicale, qui ont, comme les *Buphane*, des loges ovariennes biovulées et une capsule loculicide, mais avec un périanthe violet, de larges feuilles pétiolées et des graines pâles.

Les *Hessea*, de l'Afrique australe, constituent un petit groupe à part, à cause de leurs anthères courtes et dont le filet s'insère au

Hamanthus abyssinicus.

Fig. 27. Port.

fond du sinus qui sépare inférieurement leurs deux loges. Les pièces du périanthe y sont à peu près libres, tandis qu'elles sont supportées

par un tube distinct dans les *Carpolyza*, du Cap, qui ont les mêmes étamines, dans des fleurs également très petites.

Dans les *Strumaria*, de l'Afrique australe, les fleurs, un peu plus grandes, ont un style qui se dilate à sa base; un périanthe à divisions libres jusqu'à l'ovaire; des étamines dont les filets s'unissent irrégulièrement à leur base entre eux et avec le style. Leur fruit est petit, capsulaire, et leurs semences sont vertes et bulbiformes.

Les *Ixiolirion*, plantes d'Orient, constituent à eux seuls une sous-série (*Ixioliriées*) qui relie la présente série à celle des Alstrœmériées. Elles ont un bulbe tunique et des fleurs bleues, en cymes dont l'ensemble forme une fausse grappe terminale, irrégulière. Les branches aériennes sont grêles, dressées et portent des feuilles alternes, qui ne sont qu'un diminutif de celles de la base, linéaires et plus nombreuses.

II. SÉRIE DES AGAVE.

Les fleurs hermaphrodites des *Agave*¹ (fig. 28-30) sont régulières et hermaphrodites, avec un réceptacle creux, étroit et allongé, dont la cavité loge l'ovaire infère. Plus haut, il se prolonge en une coupe dont les bords portent le périanthe, c'est-à-dire trois sépales et trois pétales alternes, tous à peu près égaux, valvaires ou légèrement imbriqués dans le bouton. Avec chacune des folioles du périanthe s'insère une étamine superposée, qui est formée d'un filet subulé et d'une anthère exserte, introrse, dorsifixe, recevant le sommet du filet dans une fente ou un puits étroit au fond duquel il s'insère. Les loges de l'anthère versatile, souvent indépendantes en bas, s'ouvrent finalement par une fente longitudinale. L'ovaire a trois loges renfermant de nombreux ovules anatropes, insérés dans leur angle interne, et il est surmonté d'un long style dont l'extrémité stigmatifère est tronquée ou peu renflée, parfois trilobée. Inférieurement, le style se dilate souvent en un cône libre, autour de la base duquel s'ouvrent les orifices excréteurs des glandes nectarifères² très développées qui

1. L., *Amen.* (1754), III; *Gen.*, ed. VI, n. 431. — ADANS., *Fam. des pl.*, II, 57. — J., *Gen.*, 51 (*Bromeliaceæ*). — BATSCH, *Tab.*, t. 138 (*Alooidæ*). — K., *Syn.*, I, 299; *Enum.*, V, 818. — TURP., in *Dict. sc. nat.*, All., t. 184. — HERB., *Amar.*, 69. — ENDL., *Gen.*, n. 1297. — JACOBI, *Vers. Syst. Ordn. Agav.*, in *Hamb. Gartenz.* (1864-

1866); *Nachtr. Agav.*, in *Abh. Schles. Ges.* (1868, 1869). — BAK., in *Gardn. Chron.* (1877); *Handb. Amar.*, 163. — TERRAC., *Prim. contr. Mon. Agav.* (1885). — B. H., *Gen.*, III, 738, n. 60. — PAX, *Pflanzenfam.*, 117, fig. 79, A.
2. Ces glandes sécrètent un abondant produit, riche en matière sucrée.

occupent l'épaisseur des cloisons ovariennes. Le fruit, souvent d'abord un peu charnu, finit par devenir coriace ou sec, couronné du périanthe persistant, et s'ouvre à partir du sommet par trois

Agave americana.

Fig. 30. Fleur, coupe longitudinale.

Fig. 28. Port $\frac{1}{2}$.

fentes loculicides. Les graines sont nombreuses, superposées, comprimées-aplaties, plus ou moins anguleuses, noires, imbriquées, albuminées.

Il y a des *Agave* qui, par leur port, rappellent les Aloès : ils ont

un rhizome court, ou bien une tige ligneuse qui s'élève dans l'air. A la base de la plante ou au sommet de la tige s'insèrent de nombreuses feuilles pressées, coriaces et fibreuses ou charnues, aiguës, terminées en pointe rigide, à dents marginales épineuses; ou bien les bords sont filamenteux; ou encore le limbe moins rigide est entier. L'inflorescence est terminale. Elle consiste en une grande hampe dressée, simple ou ramifiée, portant des bractées. Les fleurs occupent elles-mêmes les bractées supérieures de l'axe ou de ses divisions. Dans l'aisselle de chacune d'elles, elles sont ou solitaires (*Manfreda*¹), ou en cymes sessiles ou à peu près, bi-pluriflores (*Bonapartea*²); ou encore en cymes stipitées et plus ou moins composées (*Euagave*). Le genre renferme de quarante à cinquante espèces³, souvent variables, qui croissent spontanément dans les régions chaudes et tempérées de l'Amérique du Sud et dans les régions les plus méridionales de l'Amérique du Nord.

Très voisins des *Agave* sont les *Furcraea*, de l'Amérique tropicale, ligneux et non ramifiés, à grandes feuilles aiguës et rigides; à fleurs généralement plus colorées que celles des *Agave*, groupées en grande grappe de cymes, avec un tube très court, des étamines courtes, à base épaissie et strumeuse, de même que la portion inférieure du style. Leur fruit est aussi une capsule loculicide.

Les *Doryanthes*, superbes végétaux ligneux australiens, à très longues feuilles cordiformes et rigides, ont une vaste inflorescence composée, racémiforme ou capituliforme, avec d'énormes fleurs rouges qu'accompagne une grande bractée colorée de même. Le périanthe a un tube épais et court et un limbe à grands lobes étalés ou réfléchis. Le fruit est aussi loculicide.

Les *Beschorneria*, du Mexique, ont à peu près les fleurs des *Agave*, mais étroites, avec un tube presque nul et des étamines qui ne dépassent pas le périanthe. Ce sont des plantes ligneuses, à tiges courtes

1. SALISB., *Gen. pl. Fragm.*, 78. — *Alibertia* MARION. — *Haplagave-singulifloræ* TERRACC.

2. W., *Enum. H. berol.*, Suppl., 18 (non R. et PAV.). — *Littæa* BRIGN., in *Bibl. ital.*, I, 100. — HECK.-DONNEM., in *Flora* (1820), 45. — *Agave geminifloræ* ENGELM. — *Aplagave geminifloræ* TERRACC. Le sous-genre *Cladagave* TERRACC. correspond aux *Chloropsis* HERB. Les fleurs peuvent y être transformées en bulbilles.

3. JACQ., *lc. rar.*, t. 378. — RED., *Lil.*, t. 328, 329, 485. — ZUCC., in *N. Act. nat. cur.*, XVI, 662, t. 49-51. — MART., *Ausw. Merkw. Pfl.*, t. 13 (*Polianthes*). — TOD., *H. bot. panorm.*,

t. 8, 15, 19, 24. — SAUND., *Ref. bot.*, t. 163, 165, 215, 306, 307, 326-328. — WIGHT, *lc.*, t. 2024. — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, t. 87, 88. — S.-WATS., *Bot. Calif.*, II, 142. — BRANDEG., in *Proc. Calif. Acad.*, ser. 2, II, 206. — PETERS., in *Bot. Tidsk.*, XVIII, 260. — T. DYER, in *Kew Bull.* (1892). — TRELEAS., in *Miss. Bot. Gard. Rep.*, III, 167, t. 55, 56. — WILLK. et LGE, *Prodr. Fl. hisp.*, I, 157. — *Bot. Reg.*, t. 1145; (1839), t. 55. — *Bot. Mag.*, t. 1157, 1522, 4334, 4950, 5006, 5097, 5122, 5213, 5333, 5422, 5493, 5641, 5660, 5716, 5893, 5940, 6248, 6292, 6589, 6655, 7027, 7207.

et renflées. Leurs fleurs sont réunies en grappes penchées, simples ou lâchement ramifiées.

Les Tubéreuses (*Polianthes*) sont aussi mexicaines, herbacées et vivaces. Leur rhizome est tubéreux, et leurs fleurs sont disposées en une longue grappe sur un axe simple, géminées dans l'aisselle des bractées. Le périanthe a un tube allongé, droit ou arqué, avec six lobes pétaloïdes, dressés-étalés. Le sommet de l'ovaire proémine sous forme de cône au delà du réceptacle.

Dans le *Prochnyanthes*, plante mexicaine à tige simple et épaisse, les fleurs, qui sont portées par un axe simple, solitaires ou au nombre de deux ou trois dans l'aisselle de chaque bractée, sont verdâtres, avec un tube cylindrique à sa base, puis subitement géniculé et dilaté. Le fruit est membraneux, loculicide.

Les *Bravoa*, mexicains aussi, ont pour tige un bulbe tunique, qui porte en bas de grosses racines adventives. Sur l'axe aérien simple, les fleurs sont géminées dans l'aisselle de chaque bractée, avec un périanthe pétaloïde, à tube étroit et long, arqué, non dilaté au sommet. Ses six lobes sont courts, et le sommet de l'ovaire proémine sous forme de voûte dans l'intérieur de la base du tube du périanthe.

III. SÉRIE DES ALSTRÊMÈRES.

Quoique leurs fleurs soient irrégulières, ce qui fait qu'ils sont ici les analogues des Daubéniées et des Pontédériées parmi les Liliacées, les *Alstræmeria*¹ (fig. 31-34) ont donné leur nom à cette série parce qu'ils l'ont seuls pendant longtemps représentée. Leur réceptacle floral est concave², logeant en totalité ou en très grande partie l'ovaire infère, que surmonte un style à branches stigmatifères étroites, et dont les loges renferment des ovules en nombre indéfini, souvent peu considérable, ascendants, anatropes, à micropyle inférieur, extérieur et latéral³. Le périanthe est inséré sur les bords du

1. L., *Spec.*, ed. II, 461; *Gen.*, ed. VI, n. 432. — J., *Gen.*, 56. — GÆRTN., *Fruct.*, t. 13. — K., *Syn.*, I, 288; *Enum.*, V, 758. — LINK, *Handb.*, I, 183 (*Tulipaceæ*). — AGH, *Aphor.*, 166 (*Hemerocallidæ*). — HERB., *Amar.*, 88. — ENDL., *Gen.*, n. 1295. — PAYER, *Organog.*, 656, t. 138.

— B. H., *Gen.*, III, 736, n. 54. — PAX, *Pflanzenfam.*, 119. — BAK., in *Trim. Journ.* (1877), 259; *Handb. Amar.*, 133. — LIGU ADANS., *Fam. des pl.*, II, 20.

2. Souvent anguleux et à côtes.

3. A double tégument.

réceptacle¹; il comprend trois sépales pétaloïdes, dissemblables comme forme et comme coloration, valvaires ou n'arrivant même pas au contact par leurs bords auxquels s'interpose une crête dorsale des pétales. Ceux-ci sont imbriqués; et deux d'entre eux, égaux, diffèrent par la taille et la couleur du troisième qui occupe la ligne médiane. Les étamines sont inégales. Toutes ont un filet libre, à sommet atténué qui va s'insérer au fond d'un puits dont est creusée la base de l'anthère, laquelle a deux loges, déhiscentes par des fentes introrses ou submarginales. Le fruit est sphérique ou obovoïde, entouré jusqu'à

Alstrœmeria psittacina.

Alstrœmeria versicolor



Fig. 32. Graine.



Fig. 33. Graine, coupe longitudinale.

Fig. 31. Fleur, coupe longitudinale.

Fig. 34. Fleur, coupe longitudinale.

une certaine hauteur du réceptacle adné dont le bord est indiqué par un anneau circulaire, surmonté souvent d'une saillie conique, déhiscent à partir de sa base suivant trois fentes qui répondent au dos des loges. Les graines, courtes et souvent rugueuses, ont un albumen charnu et un court embryon intraire.

Il y a une quarantaine d'espèces² de ce genre. Leur tige souterraine

1. Il y a souvent, en dehors de l'insertion du périanthe, un petit bourrelet circulaire qui persiste jusque sur le fruit.

2. JACQ., *H. schamb.*, t. 465; *H. vundob.*, t. 50. — RED., *Lil.*, t. 46. — R. et PAV., *Fl.*

per. et chil., t. 288, 289. — Hook., *Exot. Fl.*, t. 64, 65, 181. — SCHENK, in *Mart. Fl. bras.*, III, I, 171, t. 21, 22. — C. GAY, *Fl. chil.*, VI, 81. — PAUL., *Descr. nuev. pl.*, II, 70; *Sert. Mendoc.*, 43. — SWEET, *Brit. fl. Gard.*, t. 267;

est un rhizome chargé de racines adventives. Les branches aériennes sont dressées, simples et foliées, terminées par une inflorescence. Les feuilles sont alternes, souvent rapprochées, sessiles ou pétiolées, membraneuses ou rigides, parfois résupinées par torsion du pétiole. Les fleurs sont disposées en cymes unipares, à ensemble ombelliforme ou irrégulièrement racémiforme, accompagnées de bractées et de bractéoles qui peuvent être entraînées sur le pédicelle. Ce sont des plantes de l'Amérique méridionale chaude et extratropicale.

Très voisins des *Alstrœmères* auxquelles ils ont été parfois réunis, les *Bomarea*, des deux Amériques, ont des fleurs moins irrégulières ou même à peu près régulières. Leurs racines adventives sont souvent tubéreuses, et leurs branches aériennes herbacées sont ordinairement grimpantes.

Le *Leontochir*, du Chili, a les fleurs à peu près régulières des *Bomarea*, avec les folioles du périanthe longuement atténuées à la base. L'ovaire n'a qu'une loge à trois placentas pariétaux. Les branches aériennes sont dressées, comme celles des *Alstrœmères*.

IV. SÉRIE DES HYPOXIS.

Les *Hypoxis*¹ (fig. 35, 36) ont une fleur d'Amaryllidée, avec un périanthe de six folioles, surmontant un ovaire infère. Les extérieures sont vertes ou colorées, valvaires; et les intérieures, pétaloïdes, jaunes, sont imbriquées ou indupliquées. Il y a six étamines superposées aux folioles du périanthe, insérées comme celui-ci, formées d'un filet court et d'une anthère linéaire, ovoïde ou sagittée, basifixe, à deux loges parallèles ou divergentes en bas, déhiscentes en dedans ou vers les bords par des fentes longitudinales. L'ovaire infère est partagé en trois loges, complètes ou incomplètes, multiovulées, et surmonté d'un style à trois lobes stigmatifères allongés, divergents ou rapprochés en un corps commun allongé, conique. Le fruit est

ser. II, t. 15, 159, 205, 277. — *Bot. Reg.*, t. 731, 1008, 1410, 1540, 1843; (1839), t. 13; (1843), t. 58. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 1054, 1147, 1272, 1295, 1497. — *Bot. Mag.*, t. 139, 2353, 2421, 3033, 3040, 3105, 3350, 3944, 3958.

1. L., *Syst.*, ed. X, 986; *Gen.*, ed. VI, n. 417.

— ADANS., *Fam. des pl.*, II, 57 (*Narcisseæ*).


— J., *Gen.*, 85. — GÆRTN., *Fruct.*, t. 11, fig. 6.

— TURP., in *Dict. sc. nat.*, Atl., t. 185. — ENDL., *Gen.*, n. 1264. — K., *Syn.*, I, 291. — B. H., *Gen.*, III, 717, n. 3. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.* (1880), 93. — PAX, *Pflanzenfam.*, 121. — *Niobeæ* W., *Rel.*, ex SCHULT., *Syst.*, VII, 762. — *Spiloxene* SALISB., *Gen. pl. Fragm.*, 44. — *Ianthæ* SALISB., loc. cit. — *Franquevillea* ZOLL., *Cat.*, 71. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 586.

membraneux, couronné du périanthe desséché, et il s'ouvre circulairement près de son sommet pour laisser échapper des graines de couleur foncée, contenant un albumen charnu ou un peu farineux et un embryon intérieur. On connaît une cinquantaine d'*Hypoxis*¹, plantes de l'Afrique continentale et de ses îles orientales, de l'Asie tropicale, de l'Océanie et des régions chaudes des deux Amériques. Leur tige est un rhizome, parfois épais, ou un bulbe à tuniques fibreuses et réticulées². Leurs feuilles sont alternes, basilaires; et leurs fleurs³ sont solitaires ou disposées en cymes unipares, ombelliformes, au sommet d'une hampe commune.

Les *Curculigo*, des régions tropicales des deux mondes, ont la fleur des *Hypoxis*, avec un ovaire souvent rostré au sommet, et un style à branches stigmatifères apprimées. Leur fruit est charnu, indéhiscent; et leurs inflorescences, sessiles ou pédonculées, sont spiciformes ou capituliformes.

Les *Pauridia*, de l'Afrique australe, sont des plantes naines, à trois étamines fertiles seulement, plus rarement hexandres; le style pourvu à sa base d'appendices particuliers, à petit renflement apical, avec une, deux ou trois branches stigmatifères.

Hypoxis erecta.Fig. 35.
Inflorescence.Fig. 36. Fleur, coupe
longitudinale.

1. JACO., *Fragm.*, t. 7; *Ic. rar.*, t. 368-372.
— LABILL., *Pl. N. Holl.*, t. 108. — SM., *Spicil.*,
t. 16. — RED., *Lil.*, t. 169, 170, 350. — ANDR.,
Bot. Rep., t. 101, 171, 195, 236. — ROYLE, *Ill.*
himal., t. 91. — SEUR., in *Mart. Fl. bras.*, III,
I, t. 7. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 710, 802, 970,
1074. — LEME, *Jard. fl.*, t. 303. — HOOK. F.,
Fl. tasm., t. 130. — BAK., in *Trans. Linn. Soc.*,
ser. 2, I, 245. — F. LUDW., in *Flora* (1889),
55. — BOLUS, in *Hook. Icon.*, t. 2259. — HEMSL.,

Bot. centr.-amer., III, 331. — MAXIM., in *Engl.*
Jahresb. (1885), 75. — THW., *En. pl. Zeyl.*, 323.
— HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 277. — ENGL.,
Hochgebirgsfl. trop. Afr., 170. — *Bot. Reg.*,
t. 159, 663. — *Bot. Mag.*, t. 662, 709-711, 917,
1010, 1223, 3696, 4817, 5690, 6035, 4817, 5690,
6035. — WALP., *Ann.*, VI, 98.

2. Sur leurs réservoirs à mucilage, PIROTT.,
in *Ann. Ist. Rom.* (1853), 83.

3. Jaunes ou blanches, souvent petites.

V. SÉRIE DES BARBACENIA.

Chez les *Barbacenia*¹ (fig. 37-44), les fleurs sont régulières, avec un réceptacle profond, tubuleux, obconique ou obovoïde, logeant l'ovaire enchâssé dans sa concavité. Au-dessus de lui, le tube floral représente un simple anneau, ou un tube plus long, ou même parfois très long, cylindrique ou en entonnoir. Les sépales colorés sont égaux ou un peu inégaux, dressés-étalés, larges ou atténués à la base, finalement valvaires. Les pétales, semblables ou plus membraneux, sont plus souvent imbriqués ou tordus. Il y a souvent six étamines

Barbacenia purpurea.

Fig. 37. Fleur.

Fig. 38. Fleur, coupe longitudinale.

épigynes, superposées aux folioles du périanthe. Mais plusieurs d'entre elles peuvent être le siège de dédoublements, de façon qu'il y ait en tout jusqu'à douze et même dix-huit pièces à l'androcée. Celui-ci est souvent alors hexadelphe. Les anthères sont introrsées, déhiscentes souvent près des bords. Leurs loges sont adnées au connectif qui fréquemment est attaché par sa base et qui peut aussi se dilater en une lame dorsale plus ou moins pétaloïde et entière ou bilobée à son sommet. L'ovaire infère, à trois loges complètes ou incomplètes, est

1. VANDELL, *Dicc. term.* (1788), fig. 9; *Fl. B. H., Gen.*, III, 740, n. 64. — PAX, *Pflanzen-
lus. et bras. Spec.*, 21, t. 1, fig. 2. — ENDL., *fam.*, 127. — H. BN, in *Bull. Soc. Linn. Par.*,
Gen., n. 1261. — HERB., *Amar*, 64, 82. — n. 144. — *Visnea* STEUD. (ex ENDL.).

surmonté d'un style à trois lobes stigmatifères de forme et de dimensions très variables. Les placentas multiovulés sont axiles, sessiles, peltés ou stipités, plus ou moins profondément bilobés. Le fruit est une capsule que surmonte le périanthe desséché ou sa cicatrice circulaire. Le réceptacle qui l'enserme est le plus souvent chargé de poils

Barbacenia (Vellozia) gracilis.



Fig. 39. Graine.

Fig. 40. Fruit
déhiscent.



Fig. 41. Graine, coupe
longitudinale.

ou d'aiguillons plus ou moins développés; il finit par s'ouvrir longitudinalement, ou vers son sommet, ou à partir de sa base. Les graines sont comprimées, ou anguleuses, ou parfois dilatées en aile d'un côté ;

Barbacenia (Schnitzleinia) amica.



Fig. 42. Fruit.

Fig. 43. Graine.

Fig. 44. Graine, coupe
longitudinale.

elles ont, sous une enveloppe noirâtre, un albumen charnu, ou dur, ou granuleux, avec un embryon très petit situé vers le sommet de l'albumen qui l'entoure.

Dans les *Barbacenia* proprement dits (*Eubarbacenia*), le tube floral est plus ou moins allongé au-dessus de l'ovaire, assez rarement très court, et l'androcée est hexandre.

Dans les *Radia*¹, de l'Amérique tropicale, la fleur a un très long tube, et le nombre des étamines peut, par dédoublement, s'élever jusqu'à dix-huit.

Dans les *Vellozia*², de l'Amérique tropicale, le plus souvent distingués comme genre, le tube est court ou très court, et il y a de six à dix-huit étamines.

Dans les *Xerophyta*³, brésiliens ou surtout africains et malgaches, il y a six étamines, un tube floral court ou très court, avec souvent des feuilles ténues et rigides, des pédoncules grêles et des fruits qui s'ouvrent quelquefois de bas en haut.

Ainsi compris, le genre se compose d'environ soixante-dix espèces⁴, parfois frutescentes et humbles, plus souvent arborescentes, trapues, dichotomiquement ramifiées, à branches chargées de nombreuses gaines foliaires persistantes, durcies, imbriquées. Les feuilles⁵, courtes ou allongées, rigides ou membraneuses, dans quelques cas étroites, sont assez souvent piquantes au sommet. Les fleurs⁶ sont pédonculées et se dégagent de l'intervalle des feuilles, solitaires ou rapprochées en cymes lâches, jusqu'au nombre de sept à huit.

VI. SÉRIE DES DIOSCORÉES.

Les Dioscorées sont ici, à notre sens, les analogues des Smilacées parmi les Liliacées. Elles n'existent presque pas dans nos régions; mais le groupe auquel elles se rapportent est largement représenté chez

1. A. RICH., in *K. Syn. pl. æquin.*, I, 300 (*Bromeliaceæ*). — *Campderia* A. RICH., in *Bull. Soc. philom.* (1822), 79 (non BENTH.).

2. *Dicc. term.*, fig. 12; *Fl. lus. et bras. Spec.*, 32, t. 2, fig. 12. — A. S.-H., in *Mém. Mus.*, IX, 313 (*Vellozia*). — HERB., *Amar.*, 64, 81. — ENDL., *Gen.*, n. 1262. — B. H., *Gen.*, III, 739, n. 63. — PAX, *Pflanzenfam.*, 125, 127, fig. 87, 88.

3. COMMERS. — J., *Gen.*, 50 (*Bromeliaceæ*). — SPRENG., *Syst.*, II, 99 (*Sarmentaceæ*). — ENDL., *Gen.*, n. 1262 a. — *Talbotia* BALF., in *Trans. Bot. Soc. Edinb.*, IX, 192. — *Schnittleinia* STEUD., in *exs. abyss. Schimp.*, n. 1365.

4. MART., *Nov. gen. et spec.*, I, 13, t. 6-9 (*Vellozia*); 17, t. 10-14. — SEUB., in *Mart. Fl. bras.*, III, I, 67, t. 8; 73 (*Vellozia*). — POHL, *lc. et descr. pl. bras.*, t. 93-100. — PAXT., *Mag.*,

XI, 75. — MIK., *Del.*, t. 7 (*Vellozia*). — H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, VII, 155 (*Vellozia*). — LEME, *Jard. fleur.*, t. 82, 198, 390. — BAK., in *Trans. Linn. Soc., Bot.*, I, 264, t. 36, fig. 1 (*Xerophyta*); in *Journ. Linn. Soc.* (1875), 235; (1882), 86 (*Xerophyta*). — ENGL., *Hochgebischfl. trop. Afr.*, 171. — MAUR., in *Journ. Morot* (1889), 268. — *Bot. Mag.*, t. 2777, 4136; 5514, 5803 (*Vellozia*). — *Rev. hort.* (1877), 53, fig. 9 (*Xerophyta*). — *Fl. des serres*, t. 348. — HCHST., in *Flora* (1844), 31 (*Hypoxis*).

5. Sur leur biologie et leur anatomie, WARM., in *Bull. Ac. sc. Copenh.* (1893), c. xyl. 15.

6. Blanches, jaunes, violacées ou pourprées, souvent grandes et belles. Ces fleurs comptent parmi celles dont les glandes septales ovariennes sont le plus largement développées; leur cavité pouvant égaler en diamètre celles des loges.

nous par le *Tamus*¹ (fig. 45-49), dont les fleurs sont dioïques. Dans les mâles, le réceptacle étroit porte un périanthe subrotacé ou courtement urcéolé-campanulé, dont les six² lobes représentent trois sépales et trois pétales alternes, souvent un peu plus grands, imbriqués d'abord dans le jeune bouton. Les étamines sont au nombre de six, superposées aux divisions du périanthe et à insertion subhypogynique. Elles ont des filets libres, plus courts que le périanthe, et des anthères courtes, biloculaires, déhiscentes en dedans ou vers les bords par des fentes longitudinales³. Le gynécée central est rudimentaire et stérile,

Tamus communis.



Fig. 45.
Inflorescence
mâle.

Fig. 46. Inflorescence femelle
et feuille.

Fig. 47. Fleur
femelle.

Fig. 48. Fleur
femelle, coupe
longitudinale.

déprimé et entier, ou à trois lobes superposés aux sépales. Dans la fleur femelle, le réceptacle est creux, en forme de sac ovoïde qui renferme l'ovaire adné et infère. Sur les bords de ce sac s'insèrent les six folioles du périanthe supère, libres et plus étroites que dans la fleur

1. L., *Gen.*, ed. I, n. 750; ed. VI, n. 1119. — ENOL., *Gen.*, n. 1202. — K., in *Abh. Berl. Akad.* (1848), 50; *Enum.*, V, 453. — NRES., *Gen. Fl. germ.*, Monoc., III, n. 1. — B. H., *Gen.*, III, 144, n. 4. — PAX, *Pflanzensam.*, 136. — *Tamus* T., *Inst.*, 102, t. 28. — J., *Gen.*, 43 (*Asparagées*). — J. S.-H., *Expos.*, I, 106 (*Smilacées*).

2. Ça et là huit, de même que les étamines. Les fleurs sont parfois aussi polygames.

3. Le pollen est ovoïde, avec deux sillons longitudinaux. La membrane externe est ponctuée, à bandes unies. Il y a des *Dioscorées* dont le pollen n'a qu'un sillon (H. MOHL, in *Ann. sc. nat.*, sér. 2, III, 310).

mâle. Les étamines sont représentées par des languettes stériles, ou font totalement ou en partie défaut. Il y a dans l'ovaire trois loges alternipétales, dont l'angle interne présente un placenta à deux ovules anatropes, finalement superposés et descendants; le micropyle d'abord supérieur et extérieur. Le style est dressé, court, bientôt partagé en

Dioscorea sativa.

trois branches stigmatifères récurvées, émarginées ou bilobées. Le fruit est une baie, surmontée d'une cicatrice, et contenant une ou quelques graines, ovoïdes ou sphériques, dont l'albumen dur renferme un petit embryon excentrique et voisin de l'ombilic¹.

On distingue deux *Tamus*². Ce sont des herbes vivaces, à souche épaisse et tubéreuse³. Il en naît des branches annuelles et herbacées, longues, grêles et volubiles, chargées de feuilles alternes, pétiolées, entières ou trilobées, digitinerves à la base et veinées-réticulées. Les fleurs sont disposées en grappes grêles

Fig. 50. Fruit.

et lâches, simples ou ramifiées, portant des bractées alternes dans l'aisselle desquelles s'insèrent des cymes unipares, pauciflores, surtout dans les pieds femelles. Le *T. communis* habite l'Europe et l'Asie tempérées, le nord de l'Afrique et l'Amérique septentrionale. L'autre espèce du genre est originaire des îles Canaries.

Rajania hastata.

Tout à côté des *Tamus* se rangent, dans une même sous-série (*Eudioscorées*), les *Dioscorea* (fig. 50), *Testudinaria* et *Rajania* (fig. 51), qui ont des fruits secs et non charnus. Celui des *Dioscorea* et des *Testudinaria* est régulier, à trois lobes aplatis et aliformes, verticaux. Celui des *Rajania* est réduit à un seul carpelle bien développé, comprimé, à aile supérieure et unilatérale. Les Dioscorées sont de toutes les régions du globe, surtout des pays chauds; les *Testudinaria*, du sud de l'Afrique; les *Rajania*, des Antilles.

Fig. 51. Fruit.

On place dans un petit groupe hétérogène (*Sténoméridentes*) les *Stenomeris*, ? *Oncus* et *Petermannia*, asiatiques et océaniques, qui sont des lianes, et les *Trichopus*, de l'Inde, qui ont des

1. Sur la dissémination des graines, H. BN, in *Bull. Soc. Linn. Par.*, 334.

2. LAMK, III, t. 817. — SIEBH., *Fl. grac.*, t. 958. — WEBB, *Phyt. canar.*, t. 223. — BOISS., *Fl. or.*, V, 314. — REICHB., *lc. Fl. germ.*, t. 439.

— BRANDZ., *Prodr. Fl. rom.*, 447. — GRÉN. et GODET., *Fl. de Fr.*, III, 235. — H. BN, *Iconogr. Fl. fr.*, n. 206; *Herbor. par.*, 435.

3. Sur le tubercule, QUEVA, in *C. rend. Ass. fr.* (1893), 240.

branches aériennes courtes et dressées, portant une seule feuille. Tous sont plus parfaits que les *Tamus* et *Dioscorea* en ce sens qu'ils ont des fleurs normalement hermaphrodites. Leur ovaire est triloculaire, sauf dans le *Petermannia* qui a des placentas pariétaux. Le fruit est sec dans les *Stenomeris* et *Trichopus*, et charnu, dit-on, dans les *Oncus* et les *Petermannia*.

VII. SÉRIE DES CONOSTYLIS.

Analogues à celles des *Hypoxis*, les fleurs des *Conostylis*¹ (fig. 52-54) sont régulières et hermaphrodites, avec un réceptacle concave au fond duquel l'ovaire est en partie adné, et qui se prolonge au-dessus de lui en un large tube dont la longueur est très variable et peut même

Conostylis serratifolia.

Fig. 53. Fleur.

Fig. 52. Inflorescences.

Fig. 54. Fleur, coupe longitudinale.

être presque nulle. Ses bords portent trois sépales triangulaires, épais, valvaires-indupliqués ou n'arrivant pas au contact les uns des autres, et autant de pétales semblables, ou plus petits, ou plus minces. Une étamine est superposée à chacun des lobes du périanthe. Elle s'insère en dedans de sa base et est formée d'un filet court ou allongé, continu avec le connectif d'une anthère introrse, souvent sagittée, dont les loges adnées et distinctes s'ouvrent en dedans par des fentes longitudinales. L'ovaire, libre dans une étendue variable de sa portion supérieure, se continue en cône avec un style dont l'extrémité stigmatifère est presque entière ou partagée en trois dents, lobes ou branches plus ou moins longues. Dans l'angle interne de chaque loge se voit un

1. R. Br., *Prodr.*, 300. — HBK., *Amar.*, 66. — Gen., III, 676, n. 12. — Pax, *Pflanzenfam.*, 124. 87 (*Lamarkea*). — ENGL., *Gen.*, n. 1258. — B. H., — *Androstemma* LINDL., *Swan Riv. App.*, 46.

placenta pelté ou stipité, qui supporte un nombre indéfini d'ovules anatropes. Le fruit capsulaire s'ouvre dans sa portion libre par trois fentes qui répondent au dos des loges. Il s'en échappe des graines en nombre infini, ordinairement un peu rugueuses, à albumen charnu dans lequel s'enfonce en partie un petit embryon voisin de l'ombilic.

On connaît une trentaine d'espèces¹ de ce genre. Ce sont des herbes vivaces d'Australie, à rhizome court, portant souvent des stolons, et dont les axes aériens, parfois fasciculés dès la base, sont chargés, à la base ou plus haut, de feuilles rapprochées, souvent distiques, arrondies, linéaires ou comprimées latéralement. Les inflorescences se dégagent d'entre les feuilles, avec un axe court et pauciflore, simple ou ramifié, portant sur ses divisions des cymes ou des glomérules unipares. L'inflorescence et ses fleurs peu volumineuses sont souvent velues, à duvet fréquemment épais, tomenteux ou plumeux.

Les *Styloconus*, australiens aussi, sont fort voisins des *Conostylis*, avec des fleurs plus grandes, penchées, disposées en cymes racémi-formes. Leur réceptacle est laineux-plumeux, de même que le périanthe, régulier, à tube droit et cylindrique. L'ovaire est adné au réceptacle, mais seulement au niveau de ses angles, avec des puits interposés là où l'adhérence disparaît.

Les *Tribonanthes*, australiens également, ont des fleurs organisées à peu près comme celles des *Conostylis*, laineuses, avec les divisions

Phlebocarya flifolia.

du périanthe étalées; un ovaire à peu près libre ou en partie infère; des étamines insérées à la gorge, avec un connectif plus ou moins dilaté en haut, et des loges prolongées en bas en une portion vide de pollen et de forme variable.

Les *Phlebocarya* (fig. 55, 56), herbes vivaces australiennes, ont les folioles du périanthe libres à partir

Fig. 55. Fleur.

Fig. 56. Fleur, coupe longitudinale.

du point où l'ovaire en partie adné devient supère. Leurs loges ovariennes, de bonne heure incomplètes, sont uniovulées.

Les *Anigozanthos* (fig. 57-60), également australiens et vivaces, ont, au contraire, un long tube cylindrique au-dessus de l'ovaire. Ce tube

1. HOOK., *Icon.*, t. 853. — LINDL., *loc. cit.*, t. 6. — FIELD, *Sert. pl.*, t. 33 (*Androstemma*). — A. RICH., *Sert. Astrol.*, t. 28. — F. MUELL.,

Fragm. phyt. Austral., IX, 50. — BENTH., *Fl. austral.*, VI, 428. — *Fl. des serres*, t. 259. — *Bot. Mag.*, t. 2989.

est plus ou moins arqué, parfois fendu en dessous. L'insertion du péricarpe est oblique, et les loges ovariennes sont multiovulées. Les divisions de l'inflorescence, plus ou moins ramifiées, portent des fleurs ordinairement nombreuses et disposées unilatéralement.

Le *Macropidia*, de l'Australie austro-occidentale, a de grandes fleurs analogues à celles des *Anigozanthos*, avec le limbe du péricarpe oblique. Mais leur ovaire infère n'a plus qu'un ovule dans chacune de ses loges.

Les *Lanaria*, de l'Afrique australe, ont un péricarpe à lobes plus longs que le tube et égaux. Leur ovaire est libre seulement au som-

Anigozanthos flavida.



Fig. 57. Fleur.

Fig. 59. Graine.

Fig. 60. Graine, coupe longitudinale.



Fig. 58. Fleur, coupe longitudinale.

met, et ses loges incomplètes renferment chacune deux ovules qui, dans le fruit, indéhiscents ou à peine déhiscents, avortent, sauf un seul qui devient une graine à peu près sphérique.

Dans les *Lophiola*, de l'Amérique du Nord, le réceptacle floral étant beaucoup moins concave, l'ovaire est en majeure partie libre. Les loges sont pluriovulées, et le fruit, inclus dans le péricarpe, n'est adhérent qu'à la base. L'inflorescence composée est chargée d'un épais duvet blanchâtre. Ce genre relie les *Conostylis* aux *Aletris*.

Les *Conanthera*, du Chili, appartiennent à une petite sous-série particulière (*Conanthérées*) dans laquelle l'ovaire tend à devenir de moins en moins infère. Le péricarpe coloré a un tube court ou très court, au-dessus de l'ovaire à moitié infère; et ce tube porte six étamines à courts filets adnés et à anthères conniventes autour du style, à la façon de l'androcée de certains *Solanum*, avec un acumen simple ou double au sommet de chaque connectif. Les loges ovariennes sont

enveloppées par la base des pétales. Les loges ovariennes sont multiovulées, et le fruit est loculicide dans sa portion libre. Ce sont des herbes vivaces, à bulbe tunique.

Près des *Conanthera* se rangent quelques types à fleur irrégulière, soit par le périanthe, soit par l'androcée qui n'a d'étamines fertiles que d'un côté de la fleur. Tels sont les *Tecophilæa* et les *Zephyra*, d'Amérique; les *Cyanella* et *Cyanastrum*, d'Afrique.

Les *Aletris*, de l'Amérique du Nord, de l'Asie et l'Océanie tropicales, forment une petite sous-série (*Alétrinées*) rapportée parfois aux Liliacées, parce que le plus souvent le réceptacle a une cavité peu profonde; si bien que l'ovaire n'est infère que dans sa portion tout à fait basilaire. Le périanthe gamophylle est tubuleux ou subcampanulé à sa base. Les ovules sont nombreux sur un placenta axile, ellipsoïde et pelté, et le fruit est loculicide. Ce sont des herbes vivaces, à rhizome court, à feuilles basilaires étroites et à inflorescence terminale en épi.

Les *Odontostomum*, de Californie, ont aussi été attribués aux Liliacées. Dans la petite sous-série (*Odontostomées*) qu'ils constituent à eux seuls, le réceptacle représente un petit plateau à peine creux; si bien que l'ovaire est libre, sauf à sa base adnée. Les six folioles du périanthe gamophylle répondent à autant d'étamines connées à la base, et il y a six écailles subulées alternes, insérées, comme les étamines, à la gorge. Les loges ovariennes sont biovulées, et le fruit est loculicide. Ce genre nous ramène de la sorte aux Liliacées, de même que parmi celles-ci il a fallu placer des genres à ovaire en partie infère, comme celui de tant de Conostylées.

VIII. SÉRIE DES HÆMODORUM.

Dans les fleurs hermaphrodites et régulières des *Hæmodorum*¹ (fig. 61-63), le réceptacle concave a la forme d'une cupule dans laquelle est enchâssé l'ovaire adné, et dont les bords portent un double périanthe trimère et pétaloïde, imbriqué, persistant. Les sépales y sont parfois plus courts que les pétales. A ces derniers sont superposées trois étamines libres, égales ou inégales, dont les anthères

1. SM., in *Trans. Linn. Soc.*, IV, 213. — *Iconogr.*, t. 98. — B. H., *Gen.*, III, 673, n. 1. SPRENG., *Syst.*, I, 158. — ENDL., *Gen.*, n. 1258; — PAX, *Pflanzenfam.*, 95, fig. 65.

sont basifixes, ovoïdes, oblongues ou linéaires, à deux loges déhiscentes par des fentes longitudinales. L'ovaire infère a son sommet aplati ou bombé, tridyme, surmonté d'un style dont le sommet stigmatifère s'épaissit à peine. Dans l'angle interne de chaque loge se voit un placenta épais et pelté sur lequel s'insèrent deux ou trois ovules incomplètement anatropes, à micropyle inférieur et extérieur. Dans le fruit, le plafond loculicide s'élève plus ou moins au-dessus du bord réceptaculaire; si bien que ce fruit devient en grande partie libre. Les graines sont aplaties, orbiculaires ou ellipsoïdes, plus ou moins largement marginées; elles renferment, dans un albumen charnu, un petit embryon intrus, plus ou moins éloigné du hile.

On distingue au moins quinze espèces¹ de ce genre. Ce sont des herbes australiennes, vivaces, dont le rhizome porte des racines fasciculées, souvent épaissies et charnues. Les axes aériens sont parfois

Hæmodorum leretifolium.



Fig. 61. Fleur.

Fig. 63. Fruit.

Fig. 62. Fleur, coupe longitudinale.

renflés à leur base qui peut porter des restes fibreux de feuilles, et s'élèvent verticalement. Les feuilles alternes, équitantes, arrondies ou aplaties latéralement, sont inférieurement engainantes. Plus haut, elles passent graduellement à l'état de bractées alternes. L'inflorescence² est une grappe composée de cymes unipares, plus ou moins contractée en capitules ou en épis mixtes.

Les genres qui se rangent à côté des *Hæmodorum* ont l'ovaire plus nettement infère dès le début. Ce sont les *Dilatris* et *Barberetta*, de l'Afrique australe, et les *Gyrotheca*, de l'Amérique du Nord.

1. R. BR., *Prodr.*, 299. — ENGL., in *Lehm.* 484. — HOOK., *Icon.*, t. 866. — BENTH., *Fl. austr.*, VI, 418.
Pl. Preiss., II, 14. — SPACH, *Suit. à Buff.*,
 III, 109. — RICH. et SCHULT., *Syst.*, I 343, 2. Glabre et noircissant en séchant.

Les *Wachendorfia* (fig. 64-66) donnent leur nom à une sous-série (*Wachendorfiées*) dans laquelle, au contraire, le réceptacle n'étant pas concave, le gynécée demeure libre ou à peu près, quoique la fleur soit d'ailleurs construite comme celle des *Hæmodorum*. L'androcée

Wachendorfia thyrsiflora.

est triandre, et les trois loges de l'ovaire supère sont uniovulées dans les *Wachendorfia*, herbes vivaces de l'Afrique australe, tandis que dans les *Xiphidium*, des deux Amériques, il y a trois étamines et des ovules en nombre indéfini; et que dans les *Schieckia* et *Hagenbachia*,

Fig. 65. Graine. Fig. 64. Fruit. Fig. 66. Graine, coupe longitudinale.

de l'Amérique du Sud, à androcée plus ou moins irrégulier, avec une étamine souvent bien plus développée que les autres, il y a, dans les loges de l'ovaire tridyme, deux ou un plus grand nombre d'ovules.

Cette famille est celle des Narcisses d'ADANSON¹ et des JUSSIEU². Elle a reçu en 1805 le nom d'Amaryllidées³, et en 1836 celui d'Amaryllidacées⁴. Au premier abord, elle se distingue, semble-t-il, très nettement des Liliacées par son ovaire infère : il n'en est rien au fond, comme nous l'avons déjà montré plusieurs fois⁵. Il y a des types à ovaire infère qu'on ne peut, pour ne pas rompre des affinités étroitement naturelles, séparer des Liliacées supérovariées; et il y a, parmi les anciennes Hæmodoracées des auteurs, des genres supérovariés et des genres inférovariés, absolument inséparables les uns des autres. La distinction des Liliacées vraies, à gynécée libre, et des Amaryllidacées, à ovaire infère, est purement artificielle; et les deux groupes, ne constituant en réalité qu'une seule famille naturelle,

1. *Fam. des pl.*, II, 55 (*Liliacearum* Sect. 7).

2. B. JUSS., in *H. Trian.* (1759), Ord. 11. —

A.-L. JUSS., *Gen.*, 54, Ord. 7. Ces auteurs ont d'ailleurs, aussi bien que le précédent, laissé dans ce groupe des genres à gynécée supère, tels que les *Bulbocodium*, *Tulbaghia*, *Hemerocallis*, *Pontederia*, etc.

3. J. S.-H., *Exp. fam.*, I, 134, t. 21. — ENGL

Gen., 174, Ord. 64. — K., *Enum.*, V, 467. — B. H., *Gen.*, III, 714, Ord. 174. — BAK., *Handb. Amar.* (1888).

4. LINDL., *Nat. Syst.*, ed. II, 328; *Veg. Kingd.*, 155, 155, Ord. 46. — PAX, in *Engl. et Prantl Pflanzenfam.*, II, 5, p. 97. — HERB., *Append.* (1831); *Amaryllidaceæ* (1837).

5. In *Bull. Soc. Linn. Par.*, 1108.

ainsi que le pensaient les anciens, ne peuvent subsister que par le fait d'une convention qui facilite l'étude. Il y a entre les deux un parallélisme absolu : les *Agave* et *Barbacenia* sont ici les analogues des Aloès, *Yucca* et *Dracena* parmi les Liliacées vraies; les *Dioscorea*, les analogues des Smilacées; les Alstrœmères, les analogues des *Lapageria*, et ainsi de suite¹. L'ensemble de la famille comprend quatre-vingt-treize genres et environ neuf cents espèces, réparties dans les six séries suivantes :

I. AMARYLLIDÉES². — Plantes pourvues d'un bulbe tunique, rarement imparfait, rudimentaire, ou d'un rhizome variable, à hampe portant à son sommet, au-dessus d'une ou plusieurs bractées involu-crantes (spathe), une ou plusieurs fleurs disposées en cymes ombelli-formes, avec le plus souvent des bractéoles intérieures étroites. — 48 genres.

II. AGAVÉES³. — Plantes herbacées ou souvent ligneuses, à rhizome ou à tige aérienne, arborescente ou frutescente, portant de nombreuses feuilles rapprochées en rosette; celles des axes, allongées, petites, bractéiformes ou 0. Axe principal de l'inflorescence terminale simple ou plus ou moins ramifié; les fleurs solitaires, géménées ou groupées en cymes dans l'aisselle des bractées. — 7 genres.

III. ALSTRŒMÉRIÉES⁴. — Plantes vivaces, à rhizome tubéreux ou fibreux, à racines parfois tuberculifères. Axes aériens herbacés, dressés ou volubiles. Inflorescence terminale en cymes ombellées. — 3 genres.

IV. HYPOXIDÉES⁵. — Plantes vivaces, à rhizome peu développé,

1. Les formes exceptionnelles des organes végétatifs entraînent des particularités nombreuses, notamment dans les tiges, de structure anatomique. Voy. p. 24, 26, not. 3, et PAX, *Pflanzenfam.*, 92, 98, 126, 131. — LUIGI RE, *Anat. comp. d. fogl. n. Amar.*, in *Ann. Ist. bot. Rom.*, V, 155, t. 9, 10. — WARM., *Anat. Vellosiacées*, in *Bull. Ac. sc. Copenh.* (1893). — QUEV., *Anat. tige Dioscoréac.*, in *C. rend. Ac. sc.* (31 juill. 1893); *Anat. des bulbilles*, in *C. rend. Ac. sc.* (7 août 1893); *Anat. des feuilles*, in *C. rend. Assoc. fr. av. sc.* (1893), 235. — G. DE CORDEN., *Obs. struct. tige Dioscoréac.*, in *C. rend. Assoc. fr. av. sc.* (1893), 244. — BUCHER., *Beitr. Morph. u. Anat. Dioscoreac.*, in-4 et 5 pl. (1889). — JUNGIN., *Anat. Dioscor.*, in *Bot. Centralbl.* (1889), Bd 38.

2. *Amaryllidæ* J.-S.-H., *Exp. fam.*, I, 134 (1805). — BAK., *Amar.* (1888), Subord. 1. — *Amaryllidiformes* HERB. — *Pancratifformes* HERB. — *Hippeatriformes* HERB. — *Cyrtanthiformes* HERB., in *Bot. Mag.*, App. (1825). —

Amaryllæ B. H., *Gen.*, III, 712, Trib. 2. — *Coronatæ* BAK., *loc. cit.*, Trib. 1. — *Pancratieæ* BAK., *loc. cit.*, Trib. 3. — *Amaryllidoideæ* PAX, *Pflanzenfam.*, 102.

3. *Agaveæ* SALISB., in *Hort. Trans.*, I (1815), 42 (Ord.). — HERB., *Amar.*, 67, 121 (Subord.). — B. H., *Gen.*, III, 715, Trib. 3. — BAK., *Amar.*, XII, Subord. 2. — *Agavoideæ* PAX, *Pflanzenfam.*, 115, II.

4. SALISB., in *Hort. Trans.*, I, 332 (Ord.). — HERB., *Amar.*, 87 (*Hypoxidearum* Div.). — B. H., *Gen.*, III, 715, Trib. 3. — BAK., *Amar.*, XII, Subord. 2. — *Hypoxydoideæ-Alstrœmerieæ* DUMORT. — PAX, *Pflanzenfam.*, 119. — *Alstrœmeriaceæ*, *loc. cit.* (Ord.).

5. R. BR., in *Flind. Voy.*, II (1814), App. 3, 576 (Ord.). — DUMORT., *An. fam.*, 57 (*Iridariarum* Fam.). — B. H., *Gen.*, III, 712, Trib. 1. — BAK., in *Trim. Journ.* (Trib.). — *Hypoxydoideæ-Hypoxideæ* PAX, *Pflanzenfam.*, 121. — *Hypoxidaceæ* LINDL., *Veg. Kingd.* (1846), 154, Ord. 45.

parfois bulbiforme, ou rarement allongé, épais, chargé de racines adventives. Feuilles basilaires; celles des axes aériens réduites, bractéiformes ou 0. Fleurs solitaires au sommet d'une hampe, ou en cymes capituliformes ou ombelliformes. Folioles du périanthe ordinairement libres. Style souvent épais, pyramidal, à trois sillons. Embryon plus ou moins éloigné du hile. — 3 genres.

V. BARBACÉNIÉES¹. — Plantes vivaces ou ligneuses, à tige souvent épaisse, élevée et rameuse. Feuilles rapprochées vers le sommet des axes, ordinairement nombreuses, imbriquées, rigides. Fleurs pédonculées, solitaires ou peu nombreuses, se dégageant du milieu des feuilles. Étamines parfois plus nombreuses que 6. Placentas souvent ramifiés, ∞ -ovulés. — 1 genre.

VI. DIOSCORÉES². — Plantes vivaces, à rhizome ou tubercule souterrain, à branches aériennes ordinairement grêles et volubiles, rarement courtes et dressées. Feuilles ordinairement cordées et digitinerves. Fleurs petites et nombreuses, en grappes ou épis simples ou plus ou moins composés, très souvent unisexuées. — 8 genres.

VII. CONOSTYLÉES³. — Plantes vivaces, à rhizome ou bulbe plus ou moins développé, à branches aériennes herbacées, courtes et dressées. Feuilles alternes, ensiformes ou rarement cordées, digitinerves. Fleurs solitaires ou en grappes de cymes, à réceptacle profondément ou souvent peu concave. Ovaire infère, semi-infère ou parfois presque totalement libre. Androcée régulier ou irrégulier, quelquefois unilatéral. — 15 genres.

VIII. HÆMODORÉES⁴. — Plantes vivaces, à rhizome; les branches aériennes dressées, portant des feuilles alternes, étroites. Fleurs régulières ou irrégulières, en grappes ou épis de cymes, à réceptacle concave ou (Wachendorfiées) convexe. Ovaire infère ou libre. Ovules solitaires ou en petit nombre, ou en nombre indéfini, incomplètement

1. *Velloziæ* REICHB., *Handb.* (1837), 151 (*Hæmodorearum* Subdiv.). — B. H., *Gen.*, 716, Trib. 5. — *Velloziæ* ENDL., *Gen.*, 172 (*Hæmodorearum* Sect.). — *Velloziaceæ* PAX, *Pflanzenfam.*, 125 (Fam.).

2. *Dioscoreæ* R. BR., *Prodr.*, I (1810), 294 (Ord.). — LINDL., *Nix. pl.*, 35 (*Smilacium* Ord.). — ENDL., *Gen.*, 157 (*Artorizarum* Ord.). — *Dioscorineæ* H. B. K. (Ord.). — *Dioscoreaceæ* LINDL., *Nat. Syst.*, ed. II, 359; *Veg. Kingd.*, 214, Ord. 68. — B. H., *Gen.*, III, 741, Ord. 176. — PAX, *Pflanzenfam.*, 137 (Fam.). — *Tamideæ* DUMORT. — SPACH, *Suit. à Buff.*, XII, 200 (Trib.).

3. LINDL., *Veg. Kingd.*, 153 (Trib.). — B. H.,

Gen., III, 672 (*Hæmodorearum* Trib. 2). — *Hypoxidoideæ-Conostylideæ* PAX, *Pflanzenfam.*, 122. — *Conanthereæ* D. DON, in *Edinb. N. Phil. Journ.*, XIII, 256 (*Asphodelearum* Trib.). — B. H., *Gen.*, III, 673 (*Hæmodorearum* Trib. 4). — *Hypoxidoideæ-Conanthereæ* PAX, *Pflanzenfam.*, 122.

4. *Hæmodoreæ* SALISB., in *Trans. Hort. Soc. lond.*, I (1812), 326 (Ord.). — SPRENG., *Anleit.*, II, 1, 240 (*Liliacearum* Div.). — *Hæmodoreaceæ* R. BR., *Prodr.*, I (1810), 299 (Ord.). — ENDL., *Gen.*, 170, Ord. 62. — PAX, *Pflanzenfam.*, 92 (Fam.). — *Hæmodoreaceæ-Euhæmodoreæ* B. H., *Gen.*, III, 671, 673, Trib. 1.

anatropes, insérés sur un placenta axile et pelté. Fruit sec, indéhiscent ou déhiscent, supère ou infère. — 8 genres.

Les Amaryllidacées sont des plantes des régions tropicales et tempérées des deux mondes; elles habitent souvent, surtout en Amérique, les montagnes arides de l'Ouest. Ce sont assez fréquemment des plantes arénicoles des côtes et des dunes. En Europe, on observe des espèces des genres *Tamus*, *Narcissus*, *Galanthus*, *Leucoium*, *Lapiedra*, *Sternbergia*, *Pancratium*. Ce dernier genre et les *Crinum* sont communs aussi aux régions tropicales des deux mondes. A l'Asie sont propres les *Ungernia*, *Vagaria*, *Lycoris*. Mais la plus grande partie de la série des Amaryllidées appartient à l'Amérique du Sud et à l'Afrique australe. Les Dioscorées, plantes des pays chauds, ne sont plus représentées que par une petite herbe dans le sud-ouest de l'Europe. La plupart des Barbacéniées et toutes les Alstroëmériées sont américaines. Les Hæmodorées et Conostylées sont en majeure partie de l'Australie et de l'Afrique méridionale. Quelques-unes cependant croissent dans les régions tempérées des deux Amériques. Les Hypoxidées sont des pays chauds et tempérés des deux mondes; mais les *Curculigo* et *Pauridia* n'ont été observés que dans l'ancien.

USAGES¹. — Il y a plusieurs Amaryllidacées dangereuses : le suc des bulbes est souvent vénéneux dans les *Hippeastrum*, *Hæmanthus*, *Buphane* et *Amaryllis*. L'A. *Belladonna*² sert, dit-on, à empoisonner les flèches des Hottentots; mais ils préfèrent, paraît-il, employer à cet usage les bulbes du *Buphane disticha*³, espèce commune dans les régions orientales de la colonie du Cap, retrouvée à Angola et jusque sur les bords des lacs Nyassa et Tanganika. Au Brésil, les bulbes de plusieurs *Hippeastrum*⁴ sont réputés purgatifs, vomitifs, toxiques même, tandis que d'autres, ainsi que ceux de plusieurs *Crinum*, passent pour être astringents. Les *Pancratium maritimum*⁵, *illyricum*⁶

1. LINDL., *Veg. Kingd.*, 156, 156. — ENDL., *Enchirid.*, 92, 101, 104. — ROSENTH., *Syn. pl. diaphor.*, 105, 112, 113, 1081.

2. Voy. p. 47, not. 2.

3. HERB., in *Bot. Mag.*, sub t. 2578. — BAK., *Amar.*, 73. — *B. toxicaria* HERB. — *Hæmanthus toxicarius* THUNB. — JACQ., *Fragm.*, t. 39, 40. — KER, in *Bot. Mag.*, t. 1217. — *Amaryllis disticha* L. f. — *Brunsvigia toxicaria* KER, in *Bot. Reg.*, t. 567.

4. Notamment des *H. reginæ* HERB. et *purpureum* O. K. (*H. equestre* HERB.).

5. L., *Spec.*, 418. — RED., *Lil.*, t. 8. — *Bot. Reg.*, t. 161. — GREN. et GODR., *Fl. de Fr.*, III, 262 (*Lis Mathiote*, *Scille blanche*, *Petite Scille*).

6. L., *Spec.*, 418. — MILL., *lc.*, t. 197. — RED., *Lil.*, t. 153. — *Bot. Mag.*, t. 718. — *P. stellaris* SALISB. — *Halmyra stellaris* PARLAT. (*Pancrace d'Illyrie*).

(fig. 22) et quelques autres¹ ont à peu près les mêmes propriétés que la Scille maritime, et l'on retrouve ces propriétés chez plusieurs *Hymenocallis*² de l'Amérique tropicale. Nos Narcisses sont tous vénéneux ou suspects. Un excellent vomitif pour les enfants est le Porion³ (fig. 9-11). Le N. des poètes⁴ (fig. 7, 8) n'est guère moins actif. Ses fleurs sont riches en essence odorante et cosmétique, à parfum intense et parfois dangereux; de même que celles du N. à bouquets⁵ (fig. 12-18), de la Jonquille⁶ et de toutes les espèces dont la fleur n'est pas inodore⁷. Le suc des bulbes des *Crinum* est également vomitif. Celui du *C. asiaticum*⁸ (fig. 19-21) sert à traiter les otalgies, les engelures, même les plaies venimeuses⁹. Le *Sternbergia lutea*¹⁰ (fig. 1, 2) a aussi un bulbe âcre, vénéneux, de même que celui de l'*Imhofia sarniensis*¹¹ et que ceux des *Leucoium vernum*¹² et *æstivum*¹³ (fig. 5, 6) et de notre vulgaire Perce-neige¹⁴ (fig. 3, 4) qui a aussi

1. Dans l'Inde, le *P. verecundum* AIT. (*P. biflorum* ROXB.). Le *P. amboinense* L. est l'*Euryclis amboinensis* SALISB. — *Cepa amboinensis* O. K., cultivé dans nos serres et qui passe dans son pays natal pour avoir les mêmes vertus que nos Scilles.

2. Surtout l'*H. caribæa* HERB., App., 14. — BAK., Amar., 125. — *Pancratium caribæum* L. — LODD., Bot. Cab., t. 558. — KER, in Bot. Mag., t. 826. — *P. amænum* SALISB.; l'*H. patens* HERB.; l'*H. Amancaes* NICHLS. — BAK., Amar., 129. — *Narcissus Amancaes* R. et PAV. — *Ismene Amancaes* HERB. — *Pancratium Amancaes* KER, in Bot. Mag., t. 1224.

3. *Narcissus Pseudonarcissus* L., Spec., 414. — GREN. et GODR., Fl. de Fr., III, 254. — REICHB., Ic. Fl. germ., t. 816. — H. BN, Tr. Bot. méd. phanér., 1405, fig. 497, 3455; Iconogr. Fr. fr., n. 132. — *N. festalis* SALISB. — *Oileus abscissus* HAW. — *Ajax Pseudonarcissus* HAW. (Aiaul, Jeannette, Marleau, Chaudron, Fleur de coucou, Ponfrit).

4. *N. poeticus* L., Spec., 414. — RED., Lil., t. 160. — GREN. et GODR., Fl. de Fr., III, 256. — H. BN, Iconogr. Fl. fr., n. 1. — *N. stellaris* HAW. — *N. spathulatus* HAW. — *N. patellaris* HAW. (Genette, Jeannette, Cou de chameau).

5. *N. Tazetta* L., Spec., 416. — SIBTH., Fl. græc., t. 358. — H. BN, Iconogr. Fl. fr., n. 141. — *Hermione Tazetta* HAW. (*N. de Constantinople*).

6. *N. Jonquilla* L., Spec., 417 (part.). — RED., Lil., t. 159. — REICHB., Ic. Fl. germ., t. 811. — Bot. Mag., t. 15. — BAK., Amar., 10, n. 10.

7. Les *N. Bulbocodium* L., *triandrus* L., *incomparabilis* MILL., *juncifolius* L., *odorus* L., *serotinus* L., *biflorus* CURT. sont plus ou moins âcres, évacuants, parfois même dangereux.

8. L., Spec., 419 (part.). — KER, in Bot. Mag., t. 1073. — BAK., Amar., 75. — *C. procerum* CAR. — Bot. Mag., t. 2684. — *C. plicatum* LIV. — Bot. Mag., t. 2908.

9. Le *C. zeylanicum* L., Syst., 263. — *C. Wallichianum* ROEM. — *Amaryllis zeylanica* L. — *A. ornata* Bot. Mag., t. 1171, cultivé en Chine et en Cochinchine, est évacuant, vénéneux à trop haute dose. Le *C. latifolium* L. — Bot. Reg., t. 1297, s'emploie dans l'Inde au traitement des abcès, varices, hémorroïdes. Le *C. americanum* L. — Bot. Mag., t. 1034, est âcre, vénéneux. Le *C. distichum* HERB. — *Amaryllis ornata* KER, in Bot. Mag., t. 1253, de Sierra-Leone, passe pour astringent.

10. ROEM. et SCH., Syst., VII, 795. — REICHB., Ic. Fl. germ., t. 373. — GREN. et GODR., Fl. de Fr., III, 252. — *Amaryllis lutea* L. — RED., Lil., t. 418. — Bot. Mag., t. 290. — *Oporanthus luteus* HERB. (*Amaryllis* jaune, Faux-Safran, Narcisse d'automne, Vendangeuse).

11. *Amaryllis sarniensis* L. (part.). — RED., Lil., t. 45. — JACQ., H. schænbr., t. 66. — Bot. Mag., t. 294. — *A. dubia* HOUTT. — *A. Jacquini* TRATT. — *Hemanthus sarniensis* THUNB. — *Nerine sarniensis* HERB., App., 19. — BAK., Amar., 99 (Guernesienne).

12. L., Spec., 414. — JACQ., Fl. austr., t. 312. — GREN. et GODR., Fl. de Fr., III, 251. — H. BN, Iconogr. Fl. fr., n. 387. — Bot. Mag., t. 46. — *Erinosma vernum* HERB. (Nivéole du printemps, Grelot blanc).

13. L., Spec., 414. — RED., Lil., t. 135. — GREN. et GODR., Fl. de Fr., III, 251. — H. BN, Iconogr. Fl. fr., n. 344. — *Nivaria æstivalis* MÖENCH (Nivéole d'été).

14. *Galanthus nivalis* L., Spec., 413. — RED., Lil., t. 200. — GREN. et GODR., Fl. de Fr., III, 250. — H. BN, Iconogr. Fl. fr., n. 70; Herbor.

passé pour fébrifuge, émollient, résolutif. Dans l'Afrique tropicale et australe, les *Hæmanthus coccineus* (fig. 26) et *abyssinicus* (fig. 27) sont aussi réputés vénéneux, mais, à faible dose, utiles dans le traitement de l'asthme, des hydropisies. Le *Gethyllis spiralis*¹ sert, au Cap, à traiter les affections de l'intestin, des reins, et l'on dit qu'on mange le fruit du *G. afra*². Les *Alstræmeria peregrina*³, *Ligtu*⁴, *tomentosa*⁵, et bien d'autres⁶ sont regardés comme dépuratifs, au Pérou et au Chili. On mange le rhizome de plusieurs espèces, notamment de l'*A. edulis*⁷. Le *Bomarea Salsilla*⁸ est bien plus estimé encore comme substitutif des Salsepareilles. Les *Agave* sont les plus utiles des Amaryllidacées de l'Amérique centrale, surtout l'*A. americana*⁹ (fig. 28-30) et quelques espèces voisines¹⁰, dont les feuilles épineuses constituent de puissantes clôtures, en même temps que leurs fibres, qui dépendent de leurs nervures longitudinales profondes, servent à préparer les fils textiles dits de Pitte, d'ananas, d'aloès, etc. Quant au parenchyme de la tige et des feuilles, il est, à une certaine époque, riche en une sève sucrée, qui se consomme fraîche et sert surtout à préparer les boissons alcooliques des Mexicains, telles que les *Maguey* et *Pulque*¹¹. La Tubéreuse¹² est la plus célèbre des Agavées quant au parfum intense de ses fleurs¹³. Les *Furcraea* ont à peu près les mêmes

par., 3, c. xyl. — BAK., *Amar.*, 16. — *G. reflexus* HERB. — *G. plicatus* TEN. — *G. Clusii* FISCH. — *G. Imperati* BERTOL. — *G. caucasicus* BAK. (*Galant d'hiver*, *Cloche blanche*, *Violette de la Chandeleur*, *Violier d'hiver*, *V. bulbeux*, *Bague-naudier d'hiver*, *Galantine Nivéole*).

1. L. F., *Suppl.*, 198. — *Bot. Mag.*, t. 1088. — BAK., *Amar.*, 24. — *Papiria spiralis* THUNB.

2. L., *Spec.*, 633. — *Bot. Reg.*, t. 1016.

3. L., *Spec.*, 461. — RED., *Lil.*, t. 46. — JACQ., *H. vindob.*, I, t. 50; III, t. 73. — BAK., *Amar.*, 140, n. 35. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 1205. — *Bot. Mag.*, t. 139.

4. L., *Spec.*, 462. — *Bot. Reg.* (1839), t. 3. — *A. bicolor* HOOK., *Exot. Fl.*, t. 65. — *A. Flos-Martini* KER, in *Bot. Reg.*, t. 731 (*Lis des Incas*).

5. R. et PAV., *Fl. per. et chil.*, III, 62, t. 293 B. — *A. selacea* R. et PAV. C'est un véritable *Bomarea*.

6. Les *A. pulchella* L., *caryophylla* JACQ., *pulchra* SIMS, *Hookeriana* SCHULT., *Curtisiana* MEY., etc.

7. TUSS., *Fl. Ant.*, I, t. 14. — *Bot. Rep.*, t. 649. C'est le *Bomarea edulis* HERB.

8. HERB., *Amar.*, 110. — BAK., *Amar.*, 153. — *Alstræmeria Salsilla* L. (non KER). — *A. oculata* LODD., *Bot. Cab.*, t. 1851. — *Bot. Mag.*, t. 3341 (*Salsilla*).

9. L., *Spec.*, 461. — ANDR., *Bot. Rep.*, t. 438. — *Bot. Mag.*, t. 3654. — BAK., *Amar.*, 180, n. 60. — H. BN, in *Dict. enc. sc. méd.*, sér. 1, II, 134; *Tr. Bot. méd. phanér.*, 1416. — A. MILLER HAW. (*Abécédaire*).

10. Principalement l'*A. mexicana* LAMK., *Dict.*, I, 52. — RICAS., in *Gardn. Chron.* (1883), I, fig. 22. — BAK., *loc. cit.*, n. 59; l'*A. vivipara* L. — *A. Cantula* ROXB. (*Bois caratas*); l'*A. brachystachys* CAV. — *A. saponaria* LINDL., dont la racine est substituée au savon chez les Mexicains; l'*A. potatorum* ZUCC.; l'*A. lurida* AIT. — *A. Vera-cruz* MILL. (*Vigne du Mexique*).

11. Le suc des feuilles passe pour diurétique, emménagogue, lithontriptique, antispasmodique, cicatrisant, etc. Il se fait au Mexique, d'après HUMBOLDT, un grand commerce de miel de *Maguey*. C'est le nectar des glandes sépales de l'ovaire, extrêmement abondant.

12. *Polianthes tuberosa* L., *Spec.*, 453. — RED., *Lil.*, t. 147. — BAK., *Amar.*, 159. — *Bot. Reg.*, t. 63 (*Jacinthe des Indes*).

13. Son essence est recherchée comme cosmétique, antispasmodique, etc. Mais son odeur peut devenir dangereuse : on croyait jadis qu'elle était mortelle aux parturiantes. La portion souterraine de la plante est âcre et vomitive. On l'a employée comme résolutive.

GENERA

I. AMARYLLIDÆ.

1. **Sternbergia** W. et KIT. — Flores hermaphroditi regulares; receptaculo sacciformi germen intus adnatum fovente. Perianthii infundibularis, receptaculi margini inserti, tubus brevis v. longiusculus; limbi lobis æqualibus, linearibus v. lanceolatis (petaloideis) erecto-patentibus imbricatis. Stamina 6, perianthii fauci v. basi loborum æqualiter affixa; oppositipetala majora; filamentis filiformi-subulatis liberis; antheris erectis oblongis, ad basin dorsifixis; loculis introrsum rimosis. Germen inferum, 3-loculare; stylo gracili, apice stigmatoso parvo subintegro v. varie 3-lobo. Ovula in loculo quoque ∞ , 2-seriata. Fructus ovoideus v. oblongus, cicatrice coronatus, carnosulus, demum subsiccus ægreque dehiscens. Semina ∞ , subsphærica, aut nuda, aut carnosio-arillata; integumento cæterum crustaceo (nigro). — Herbæ perennes; bulbo tunicato; foliis basilaribus coetaneis v. serotinis linearibus; floribus in summo scapo nunc brevissimo solido terminalibus solitariis; bracteis sub flore 2, membranaceis hyalinis, in spatham basi tubulosam connatis germenque involventibus; cyma rarius terminali-2-flora. (*Reg. Medit., Europa or.*) — *Vid. p. 1.*

2. **Cooperia** HERB.¹ — Flores fere *Sternbergiæ*; perianthii infundibularis v. hypocraterimorphi tubo longo, nunc superne ampliato; limbi lobis ovatis patentibus. Stamina 6, fauci affixa; filamentis brevissimis, v. oppositipetalis longioribus; antheris linearibus conniventibus, ad basin dorsifixis. Germen 3-loculare; stylo brevi v. vix exserto, apice

1. In *Bol. Reg.*, t. 1835; *Amar.*, 178, t. 24, 42. — ENDL., *Gen.*, n. 1272. — K., *Enum.*, V, 478. — BAK., in *Trim. Journ.* (1878), 166;

Amar., 27. — B. H., *Gen.*, III, 727, n. 18. — PAX, *Pflanzenfam.*, 107. — *Sceptranthus* GRAH., in *Edinb. N. Phil. Journ.*, XX, 413.

stigmatoso 3-dymo v. 3-lobo. Ovula ∞ , 2-seriata. Fructus 3-dymus v. 3-lobus, loculicidus. Semina (nigra) ∞ , superposita horizontalia, compressa v. cuneata. — Herbæ perennes; bulbo tunicato; foliis paucis basilaribus, linearibus v. loriformibus; floribus¹ in summo scapo basi spatha hyalina stipato solitariis; spatha sub flore simplici v. nunc 2-fida. (*Reg. mexicano-texana*².)

3. **Zephyranthes** HERB.³ — Flores⁴ fere *Cooperiæ*; perianthii infundibularis recti v. nonnihil declinati tubo longiusculo v. brevi, ad faucem plus minus ampliato et circa stamina squamulis parum prominulis (v. 0) aucto; limbi foliolis æqualibus v. parum inæqualibus, basi angustatis ibique nunc longe solvendis. Stamina 6, fauci affixa, erecta v. subdeclinata; oppositipetala longiora; filamentis subulatis; antheris dorsifixis brevibus v. elongatis. Germen 3-loculare; ovulis ∞ , 2-seriatis; stylo nunc elongato, apice stigmatoso sæpe declinato, dilatato-3-lobo v. 3-fido. Fructus subglobosus v. depressus, 3-dymus v. 3-lobus, loculicidus; seminibus (nigris) angulato-compressis, albuminosis; embryone cylindraceo. — Herbæ perennes; bulbo tunicato; foliis paucis coetaneis v. serotinis lineari-elongatis; scapo 1-floro elongato v. nunc brevior v. brevissimo (*Haylockia*⁵); bractea spathiiformi, apice nunc 2-fida. (*America calid. utraque*⁶.)

4. **Apodolirion** BAK.⁷ — Flores⁸ fere *Zephyranthis*; perianthii longe infundibularis tubo tenui elongato; fauce sensim ampliata; lobis 6, oblongo-lanceolatis erecto-patentibus, apice nunc minute hamulatis. Stamina 6, 2-seriatim sub fauce affixa; oppositipetalorum filamentis

1. Albis v. roseis.

2. Spec. 2. SWEET, *Brit. fl. Gard.*, ser. II, t. 328 (*Zephyranthes*). — HEMSLEY, *Bot. centr.-amer.*, III, 332. — *Bot. Mag.*, t. 3482, 3727.

3. App., 36; Amar., 170, t. 24, 29, 35. — ENDL., *Gen.*, n. 1273. — K., *Enum.*, V, 480. — BAK., in *Trim. Journ.* (1878), 166; Amar., 30. — B. H., *Gen.*, III, 723, n. 21. — PAX, *Pflanzenfam.*, 107, fig. 71. — ARVIELA SALISB., *Gen. pl. Fragm.*, 135. — ARGYROPOIS ROEM., *Ensat.*, 125. — *Pyrolirion* HERB., App., 37; Amar., 183, t. 23, 29. — *Ilabranthus* HERB., in *Bot. Reg.*, t. 1345 (part.).

4. Albi, rosei, purpurascens v. flavescens, nunc versicolores, sæpius mediocres.

5. HERB., in *Bot. Reg.*, t. 1371. — K., *Enum.*, V, 480. — ENDL., *Gen.*, n. 1271. — B. H., *Gen.*, III, 723, n. 20. — PAX, *Pflanzenfam.*, 107. — BAK., *Amar.*, 29.

6. Spec. ad 35. R. et PAV., *Fl. per. et chil.*, III, 56, t. 286 (*Amaryllis*). — RED., *Lil.*, t. 31, 454 (*Amaryllis*). — SWEET, *Brit. Fl. Gard.*, ser. II, t. 14, 70. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 1419, 1677, 1761, 1771, 1899 (plur. sub *Amaryllide*). — SAUND., *Ref. bot.*, t. 356. — PHIL., in *Linnaea*, XXIX, 65. — S.-WATS., in *Proc. Amer. Acad.*, XIV, 300; XVIII, 161. — C. GAY, *Fl. chil.*, VI, 66; 67 (*Pyrolirion*). — MAXIM., in *Engl. Jahrb.* (1885), 81. — HEMSLEY, *Bot. centr.-amer.*, III, 332. — BURY, *Hexandr.*, t. 25. — BAK., in *Gardn. Chron.*, n. ser., XVI, 70. — *Bot. Reg.*, t. 724, 821, 902, 1345, 1361, 1746, 1967; (1845), t. 54. — *Bot. Mag.*, t. 239, 1586, 2464, 2485, 2537, 2583, 2593, 2594, 2607, 3596, 6605.

7. In *Trim. Journ.* (1878), 74; in *Hook. Icon.*, t. 1388; Amar., 25. — B. H., *Gen.*, III, 722, n. 17. — PAX, *Pflanzenfam.*, 108.

8. Albi v. rubentes.

longioribus; antheris linearibus erectis v. demum recurvis, basi inter lobos affixis, introrsum rimosis. Germen 3-loculare; ovulis ∞ , 2-seriatis; stylo gracili, apice stigmatoso capitato obtuse 3-lobo. Fructus anguste oblongus (siccus?). — Herbæ perennes; bulbo tunicato; foliis linearibus v. loriformibus, coetaneis v. serotinis; scapis 1-floris in bulbo brevibus 1, 2; bractea angusta hyalina. (*Africa austr.*¹⁾)

5. *Gethyllis* L.² — Flores fere *Apodolirii*; perianthii hypocraterimorphi tubo elongato gracili cylindraceo; lobis linearibus v. lanceolatis patentibus. Stamina 6-18, fauci affixa; filamentis erectis brevibus; antheris lineari-elongatis basifixis, demum arcuatis, recurvis, revolutis v. tortis; loculis adnatis, basi nunc liberis. Germen sessile; styli elongati ramis apicalibus recurvis, apice stigmatoso capitellatis v. obtusis. Ovula ∞ , 2-seriata. Fructus oblongus, cylindraceus v. clavatus, carnosus; « seminibus sphæricis in pulpa nidulantibus albuminosis ». — Herbæ perennes; bulbo tunicato; foliis serotinis linearibus, nunc spiraliter involutis v. crispis; floribus³ scapum solidum terminantibus solitariis; bractea hyalino-membranacea, nunc 2-fida. (*Africa austr.*⁴⁾)

6. *Galanthus* L.⁵ — Flores regulares; receptaculo usque ad apicem germen intus adnatum fovente. Sepala 3, supera libera, imbricata, demum patentia. Petala libera, breviora, apice emarginata v. 2-loba, imbricata v. torta. Stamina 6⁶, summo receptaculo disciformi inserta; filamentis erectis brevibus tenuibus; antheris ad basin dorsifixis erectis apiculatis; loculis introrsum rimosis; valva interiore sæpius minore. Germen 3-loculare; stylo subulato, apice stigmatoso minuto truncato. Ovula ∞ , 2-seriatim adscendentia; micropyle extrorsum infera; chalaza demum in cornu producta. Fructus carnosulus, cicatrice coronatus, demum æqui-loculicidus. Semina⁷ ellipsoidea

1. Spec. 5 (BAK.).

2. *Gen.*, ed. II, n. 460; ed. VI, n. 590. — J., *Gen.*, 54. — ENDL., *Gen.*, n. 1290. — K., *Enum.*, V, 694. — BAK., in *Trim. Journ.* (1878), 166; (1885), 225, t. 259, 260; *Amar.*, 23. — B. H., *Gen.*, III, 722, n. 16. — PAX, *Pflanzenfam.*, 108. — ABAPUS ADANS., *Fam. des pl.*, II, 57. — PAPIRIA THUNB., in *Act. lund.*, I, 111; *Nov. gen.*, I, 14 (part.).

3. Majusculis speciosis.

4. Spec. ad 5. JACQ., *H. schænbr.*, t. 79. — BRITT., in *Journ. Bot.* (1884), 148. — HARV.,

Thes. cap., t. 139 (*Cyrtanthus*). — R. BR., *Prodr.*, 290. — BOLUS, in *Journ. Linn. Soc.*, XVIII, 396. — HERR., *Amar.*, 185, t. 25. — *Bot. Reg.*, t. 1016. — *Bot. Mag.*, t. 1088.

5. *Gen.*, ed. I, n. 288; ed. VI, n. 401. — J., *Gen.*, 55. — ENDL., *Gen.*, n. 1265. — NEES, *Gen. Fl. germ.*, *Monoc.*, III, n. 7. — K., *Enum.*, V, 469. — BAK., in *Trim. Journ.* (1878), 313; *Amar.*, 16. — B. H., *Gen.*, III, 719, n. 8. — PAX, *Pflanzenfam.*, 105.

6. Oppositipetala primum paulo longiora.

7. Sæpius pallida.

arillata. — Herbæ perennes; bulbo tunicato; foliis basilaribus paucis linearibus v. angustis canaliculatis; marginibus nunc reduplicatis; floribus¹ in summo scapo erecto solitariis cernuis; bracteis 2, sub flore in spatham connatis; spatha apice 2-dentata demumque hinc fissa. (*Europa, Oriens*².)

7. *Leucoium* L.³ — Flores fere *Galanthi*; sepalis petalisque conformibus liberis et in perianthium late campanulatum dispositis; præfloratione imbricata. Stamina 6; filamentis brevibus tenuibus; antheris basifixis longioribus haud apiculatis sub-4-gonis, ab apice plus minus longe 2-rimosis. Germen inferum; disco epigyno 6-lobo (*Rumina*)⁴ v. (*Acis*)⁵ haud lobato. Stylus tenuis v. clavatus, basi et nunc sub apice stigmatoso attenuatus. Ovula adscendentia v. subtransversa ∞ . Fructus loculicidus v. tarde irregulari-dehiscens. Semina ∞ , subsphærica (nigra) v. nunc (*Erinosma*)⁶ conspicue arillata (pallida). — Herbæ perennes; bulbo tunicato; foliis sæpius paucis, tenuibus v. loratis; floribus⁷ in spatha 2-folia solitariis v. umbelliformi-cymosis; cymis 1-paris. (*Europa austr., Africa bor.*⁸)

8. *Lapiedra* LAG.⁹ — Flores fere *Leucoii*; perianthii foliolis liberis v. vix ima basi in annulum connatis. Stamina imo perianthio affixa eoque breviora; filamentis subulatis, apice gracillimis; antheris elongatis erectis usque ad medium sagittato-2-lobis, ibi affixis, introrsum rimosis. Germen ∞ -ovulatum; stylo gracili, apice stigmatoso minuto. Fructus depresso-globosus, sub-3-dymus, apice loculicidus. Semina pauca ovoidea glabra; albumine duro; embryone cylindraco. —

1. Albis v. ex parte viridibus.

2. Spec. 5, 6. RED., *Lil.*, t. 200. — JACQ., *Fl. austr.*, t. 313. — REICHB., *lc. Fl. germ.*, t. 363. — RUPR., in *Gartenfl.* (1868), t. 578, fig. 1. — BIEB., *Fl. taur.-cauc.*, III, 255. — BOISS., *Fl. or.*, V, 144. — WILLK. et LGE, *Prodr. Fl. hisp.*, I, 149. — GREN. et GODR., *Fl. de Fr.*, III, 250. — H. BN, *Iconogr. Fl. fr.*, n. 70; *Herbor. par.*, 3, c. xyl. — *Bot. Reg.*, t. 545. — *Bot. Mag.*, t. 2162, 6166.

3. *Gen.*, ed. I, n. 290; ed. VI, n. 402 (non T.). — J., *Gen.*, 55. — ENDL., *Gen.*, n. 1266. — BAK., in *Trim. Journ.* (1878), 166; *Amar.*, 18. — B. H., *Gen.*, III, 720, n. 9. — PAX, *Pflanzenfam.*, 105, fig. 66, D. — *Nivaria* MOENCH, *Meth.*, 279.

4. PARLAT., *Due nuov. gen. Monoc.*, 3; *Fl. ital.*, III, 84.

5. SALISB., *Par. lond.*, sub t. 74. — K., *Enum.*, V, 475.

6. HERB., *Amar.*, 330. — K., *Enum.*, V, 474.

7. Albis, pulchellis.

8. Spec. 9. JACQ., *Fl. austr.*, t. 203, 312. — MART., in *Bibl. phys.* (1804), 344. — RED., *Lil.*, t. 135, 150. — LOIS., *Fl. gall.*, t. 8. — REICHB., *Icon. eur.*, t. 703, 704; *lc. Fl. germ.*, t. 362. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 1478. — SWEET, *Brit. fl. Gard.*, t. 297. — JORD. et FOURR., *lc. pl. eur.*, t. 64, 65. — MOGGR., *Fl. Ment.*, t. 21. — GREN. et GODR., *Fl. de Fr.*, III, 250. — H. BN, *Iconogr. Fl. fr.*, n. 344, 387. — SCHOUBE, *Marok.*, 154. — BOISS., *Fl. or.*, V, 143. — WILLK. et LGE, *Prodr. Fl. hisp.*, I, 148. — *Bot. Reg.*, t. 544. — *Bot. Mag.*, t. 46, 960, 1210, 1993, 6711.

9. *Nov. gen. et spec.*, in *Elench. H. matrit.*, 14. — ENDL., *Gen.*, n. 1267. — K., *Enum.*, V, 694. — B. H., *Gen.*, III, 720, n. 10. — PAX, *Pflanzenfam.*, 105. — BAK., *Amar.*, 21.

Herba perennis; bulbo tunicato; foliis loriformibus serotinis; floribus in summo scapo pluribus umbelliformi-cymosis; bracteis involucrentibus membranaceo-scariosis 2. (*Hispania austr.*, « *Mauritania* »¹.)

9. *Narcissus* T.² — Flores regulares; perianthii hypocrateri-morphi tubo cylindraceo v. nunc vix ad faucem ampliato, rarius anguste campanulato; limbi lobis 2-seriatis subæqualibus, ovatis v. oblongis, imbricatis v. tortis, patentibus v. reflexis. Corona³ cum fauce continua erecta, aut cupularis carnosula brevis, nunc ad lineam vix prominentem reducta (*Aurelia*⁴), aut autem limbo æqualis v. major, petaloidea, tubulosa v. campanulata (*Ajax*⁵, *Corbularia*⁶), margine integra, sinuata, denticulata v. fimbriata. Stamina 6, coronæ interiora, quarum oppositipetala 3, sæpius quoad insertionem demissiora inclusa; filamentis tubo insertis, aut brevibus, aut elongato-subulatis; antheris ovatis, oblongis v. linearibus, ad medium v. sub medio dorsifixis; loculis sæpe ima basi liberis, linearibus et introrsum rimosis. Germen inferum, sæpe 3-gonum; stylo tenui recto, sæpius angustissime conico, apice stigmatoso minute 3-lobo. Ovula in loculis ∞ , 2-seriata. Fructus membranaceus, apice v. usque ad basin loculicidus. Semina⁷ ovoidea, subsphærica v. angulata, albuminosa; integumento exteriori nunc arilliformi. — Herbæ perennes; bulbo tunicato; foliis basilaribus, loriformibus v. linearibus, coetaneis v. serotinis; floribus⁸ in summo scapo fistuloso solitariis, 2-nis v. umbelliformi-cymosis; bracteis involucrentibus 2, in spatham hinc fissam membranaceam, basi plus minus tubulosam, connatis; brac-

1. Spec. 1. *L. Martinezii* LAG. — BOISS., *Voy.*, t. 171. — WILLK. et LGE, *Prodr. Fl. hisp.*, I, 147. — *L. Placiana* HERB. — *Crinum Martinezii* SPRENG.

2. *Inst.*, 353, t. 185. — L., *Gen.*, ed. I, n. 286; ed. VI, n. 403. — J., *Gen.*, 55. — ENDL., *Gen.*, n. 1289. — K., *Enum.*, V, 704. — HERB., *Amar.*, 292. — NEES, *Gen. Fl. germ.*, *Monoc.*, III, n. 4. — SALISB., in *Trans. Hort. Soc. lond.*, I, 343; *Gen. pl. Fragm.*, 99. — BURBIDGE, *Narciss.* (1875), c. tab. 48. — HAW., *Mon. Narciss.*, in *Sweet Brit. fl. Gard.*, ser. II, 1. — SPACH, *Suit. à Buff.*, XII, 430. — J. GAY, in *Ann. sc. nat.*, sér. 4, X, 75. — B. H., *Gen.*, III, 718, n. 6. — PAX, *Pflanzenfam.*, 111. — BAK., *Amar.*, 1. — *Ganymedes* SALISB. — *Hermione* SALISB. — *Quellia* SALISB. — *Philogyne* SALISB. — *Chione* SALISB. — *Cydenis* SALISB. — *Argenope* SALISB. — *Panza*

SALISB. — *Patrocles* SALISB. — *Plateana* SALISB. — *Tityrus* SALISB. — *Prasiteles* SALISB. — *Veniera* SALISB. — *Oileus* HAW. — *Assaracus* HAW. — *Illus* HAW. — *Tros* HAW. — *Schizanthus* HAW. — *Chloraster* HAW. — *Jonquilla* HAW. — *Helena* HAW.

3. De cujus origine discaria, H. BN, in *Adansonia*, I, 92; quod tamen haud admittunt EICHLER, PAX aliique. Corona a nonnullis pro stipulis, prophyllis v. glumis habetur. Atæ sic dictæ staminum eodem omnino modo oriuntur.

4. J. GAY, *loc. cit.*, 95.

5. SALISB., in *Trans. Hort. Soc. lond.*, I, 343.

6. SALISB., in *Trans. Hort. Soc. lond.*, I, 349.

7. Nigra, albo-arillata.

8. Albis v. flavis, sæpe suaveolentibus, speciosis.

teolis interioribus angustis v. 0. (*Europa med.*, *Reg. Medit.*, *Asia temp.*¹⁾)

10. *Cryptostephanus* WELW.² — Flores arcuati; perianthio tubuloso, superne leviter ampliato; lobis 6, brevibus subpatentibus; fauce corona e squamis 12 angustis erectis æqualibus instructa. Stamina 6, ad medium tubum affixa; filamentis brevissimis; antheris inclusis erectis, ad basin dorsifixis, circa stylum in tubum conniventibus. Germen 3-loculare; stylo columnari, apice stigmatoso leviter incrassato. Ovula in loculis ∞ , 2-seriatim superposita. « Fructus³ baccatus sphæricus; seminibus in loculis 1, 2, turgidis. » — Herba perennis; rhizomate brevi; caule basi subbulboso, vaginarum basibus tunicato; foliis basilaribus coetaneis loriformibus; floribus⁴ umbelliformi-cymosis; bracteis involucrantibus paucis; bracteolis interioribus angustis. (*Angola*⁵.)

11. *Tapeinanthus* HERB.⁶ — Flores fere *Narcissi* (v. *Leucoii*); perianthii infundibularis tubo brevi; lobis 6, angustis erecto-patentibus. Squamellæ ad os tubi minimæ, integræ, 2-fidæ v. 0. Stamina 6, tubo intra squamellas affixa, mox libera, quorum paulo demissiora 3; antheris oblongis introrsis, ad medium dorsifixis, rectis v. demum arcuatis. Germen 3-loculare; ovulis ∞ , 2-seriatis; stylo longe subulato, apice stigmatoso minuto. Fructus oblongus loculicidus. Semina⁷ pauca ellipsoideo-ovoidea. — Herba perennis humilis; bulbo parvo tunicato; folio sæpius 1, serotino, filiformi, basi breviter vaginato; floribus⁸ in scapo tenui 1, 2, intra spatham involucrantem pedicellatis; bracteola lineari. (*Hispania*, *Mauritania*⁹.)

1. Spec. ad 25-30, valde variabiles, hybridantes. SIBTH., *Fl. græc.*, t. 308. — DESF., *Fl. atl.*, t. 82. — TEN., *Fl. nap.*, t. 26, 27. — GUSS., *Pl. inarim.*, t. 15. — LOIS., *Fl. gall.*, t. 7. — GRAEELS, *Ramill. Esp.* t. 5-8. — SCHOUSB., *Jagt. Vestr. Marok.*, t. 2. — DUR., *Expt. Algér.*, t. 47. — MOGGER., *Fl. Ment.*, t. 22, 23, 41, 70, 71, 90. — BAK., in *Gardn. Chron.* (1869). — GREK. et GODR., *Fl. de Fr.*, III, 253. — JARD. et FOURR., *lc. pl. eur.*, t. 176-195 (*Hermione*). — BOISS., *Fl. or.*, V, 151. — REICHB., *lc. Fl. germ.*, t. 364-370. — BRANDZ., *Prodr. Fl. rom.*, 451. — WILLK. et LGE., *Prodr. Fl. hisp.*, I, 150. — H. BN., *Iconogr. Fl. fr.*, n. 1, 132, 141, 275. — *Bot. Mag.*, t. 6, 15, 48, 51, 78, 88, 121, 193, 197, 379, 924, 932, 934, 940, 945, 947, 948, 1011, 1026, 1186-

1188, 1262, 1298, 1299, 1300, 1301, 2588, 3831, 5861, 6473, 6825, 6950, 7012, 7016.

2. BAK., in *Trim. Journ.* (1878), 193, t. 197; *Amar.*, 1. — B. H., *Gen.*, III, 718, n. 5. — PAX, *Pflanzenfam.*, 111.

3. « Coccineus ».

4. « Purpurascens » parvulis.

5. Spec. 1. *C. densiflorus* BAK.

6. *Amar.*, 100 (1837). — B. H., *Gen.*, III, 719, n. 7. — BAK., *Amar.*, 15. — PAX, *Pflanzenfam.*, 111 (non BOISS., qui *Tuspeinanta* DUR.). — *Tapeinægyle* HERB., in *Bot. Reg.* (1847), t. 22, fig. 4. — *Carregnoa* BOISS., *Voy. Hisp.*, 605. — J. GAY, in *Ann. sc. nat.*, sér. 4, X, 98.

7. *Nigra lucida*.

8. *Flavis parvis*.

9. Spec. 1. *T. humilis* HERB. — K., *Enum.*,

12. *Crinum* L.⁴ — Flores regulares v. leviter irregulares; perianthii infundibularis v. subhypocraterimorphi tubo longo v. longiusculo, recto v. arcuato, æqui-cylindræco v. ad faucem ampliato; limbi lobis 6, oblongis, lanceolatis v. linearibus, conniventibus, patentibus v. recurvis. Stamina 6, fauci affixa; filamentis elongatis v. breviusculis, basi liberis v. vix connatis, declinatis v. divergentibus, apice attenuatis; antheris oblongis v. linearibus, dorsifixis, versatilibus, nunc demum curvatis; loculis introrsum rimosis. Germen breve; stylo gracili, apice stigmatoso truncato parvo v. capitato. Ovula 2-∞, angulo interno placentæ crassæ affixa, 2-seriatim sessilia. Fructus subsphæricus v. inæqui-hemisphæricus, subtus nunc concavus; pericarpio coriaceo v. tenui, demum inæqui-rupto. Semina sæpius pauca crassa subsphærica et inæqui-compressa; albumine crasso carnosio; embryone subtereti. — Herbæ³ perennes, nunc elatæ; bulbo (amplo) tunicato, sæpe in collum cylindræcum producto; foliis basilaribus elongatis, latiusculis v. angustis; floribus³ in summo scapo solido umbelliformi-cymosis, nunc paucis, sessilibus v. breviter pedicellatis; bracteis involucrantibus latioribus 2; bracteolis linearibus. (*Orbis utriusque reg. calid.*⁴)

13. *Amaryllis* L.⁵ — Flores fere *Crini*; perianthii infundibularis breviter arcuati declinati tubo brevi; lobis oblongo-lanceolatis fere ad medium conniventibus. Stamina breviora, fauci affixa declinata;

V, 703. — *Pancratium humile* CAV., *lc.*, t. 207. — *Carregnoa humilis* J. GAY. — WILLK. et LGÉ, *Prodr. Fl. hisp.*, I, 149. — *C. lutea* BOISS. — *Tapeinægle humilis* HERB. — *Amaryllis exigua* SCHOUSB. — *Oporanthus exiguus* HERB. — *Sternbergia exigua* KER.

1. *Gen.*, ed. I, n. 245; ed VI, n. 405. — J., *Gen.*, 54. — LAMK., *Ill.*, t. 234. — ENDL., *Gen.*, n. 1276. — K., *Enum.*, V, 547. — BAK., in *Trim. Journ.* (1878), 168, 195; in *Gardn. Chron.* (1881), I, II; *Amar.*, 74. — B. H., *Gen.*, III, 726, n. 26. — PAX, *Pflanzenfam.*, 108, fig. 72. — *Tænais* SALISB. — *Trigone* SALISB., *Gen. pl. Fragm.*, 115.

2. De quorum cellulis spiralibus, TRÉC., in *C. rend. Ac. sc. Par.* (14 fév. 1881).

3. Albis v. roseis, speciosis, sæpe magnis, nunc suaveolentibus.

4. Spec. ad 75. LOUR., *Fl. cochinch.*, 197. — PERS., *Syn.*, I, 352. — JACQ., *H. schænbr.*, t. 202, 429, 494, 495; *lc. rar.*, t. 362. — RED., *Lil.*, t. 27, 62, 181, 347, 408. — HOOK., *Exot. Fl.*, t. 200. — SALISB., *Par. lond.*, t. 52.

— ANDR., *Bot. Rep.*, t. 169, 390, 478. — LOUD., *Bot. Cab.*, t. 31, 346, 362, 650, 669. — WALL., *Pl. as. rar.*, t. 145. — KOTSCH., *Pl. Tinn.*, t. 21. — WIGHT, *lc.*, t. 2019, 2020. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 280. — TAW., *En. pl. Zeyl.*, 324. — ENGL., *Hochgebirgsfl. trop. Afr.*, 170. — BENTH., *Fl. hongk.*, 366. — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 334. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XX, 270; XXII, 528. — MAXIM., in *Engl. Jahrb.* (1885), 77. — *Bot. Reg.*, t. 52, 171, 179, 303, 426, 546, 579, 615, 623, 679, 1049, 1297; (1844), t. 9. — *Bot. Mag.*, t. 661, 915, 923, 1034, 1073, 1171, 1178, 1232, 1253, 1605, 2121, 2133, 2180, 2208, 2217, 2231, 2292, 2301, 2355, 2397, 2463, 2466, 2522, 2531, 2684, 2908, 6113, 6381, 6483, 6512, 6545, 6570, 6709, 6783.

5. *Gen.*, ed. I, n. 289; ed. VI, n. 406 (part.). — J., *Gen.*, 55 (part.). — ENDL., *Gen.*, n. 1273 (part.). — K., *Enum.*, V, 600. — B. H., *Gen.*, III, 727, n. 27. — PAX, *Pflanzenfam.*, 106. — BAK., *Amar.*, 95. — *Callicore* LINK, *Handb.*, I, 193 (part.). — *Belladonna* SWEET, *Fl. brit. Gard.*, ed. II, 506 (non T.).

antheris dorsifixis linearibus, demum curvis. Germinen ∞ -ovulatum; stylo gracili, apice stigmatoso capitellato. Ovula placentæ crassiusculæ adnata. Fructus inæqui-sphæricus, demum inæqui-ruptus. Semina pauca inæqui-compresso-sphærica carnosæ. — Herba perennis; bulbo tunicato; foliis serotinis v. coetaneis, loriformibus; floribus¹ in summo scapo solido umbelliformi-cymosis; bracteis involu-erantibus magnis membranaceis 2; bracteolis linearibus. (*Africa austr.*²)

14. *Vallota* HERB.³ — Flores fere *Amaryllidis*; perianthii late infundibularis recti tubo brevi, fauce ampliato; lobis 6, oblongo-ovatis; sinibus minute callosis. Stamina 6, lobis breviora eorumque basi affixa, æqualia; filamentis subulatis decurrentibus; antheris oblongis rectis dorsifixis. Germinen subsessile; ovulis ∞ , 2-seriatis; stylo gracili subdeclinato, apice stigmatoso parvo. Fructus « oblongo-ovoideus, a basi dehiscens; seminibus magnis, basi in alam foliaceam longam contractis; inferioribus in loculo quoque minoribus rectoribus⁴ ». — Herba perennis; bulbo tunicato; foliis loriformibus; floribus⁵ in summo scapo robusto umbelliformi-cymosis; bracteis involu-erantibus latiusculis membranaceis 2; bracteolis interioribus linearibus. (*Africa austr.*⁶)

15. *Brunsvigia* HEIST.⁷ — Flores fere *Amaryllidis*; perianthii recti v. arcuati foliolis 6, lanceolatis, basi in annulum brevissimum connatis, cæterum liberis, patentibus v. recurvis. Stamina 6, annulo basilari affixa, recta v. declinata; filamentis nunc basi leviter incrassatis; antheris oblongis nunc 2-morphis rectis, ad medium dorsifixis; oppositipetalis plerumque majoribus. Germinen complete v. incomplete 3-loculare; ovulis ∞ , 2-seriatis; stylo gracili, apice stigmatoso minuto v. patenter 3-lobo. Fructus turbinatus v. obovoideus, costato-

1. Roscis, magnis speciosis.

2. Spec. 1. *A. Belladonna* L., *Spec.*, 421. — RED., *Lil.*, t. 180. — Bot. Mag., t. 733. — *A. pudica* KER, *Revis.*, 6. — *A. pallida* RED., *Lil.*, t. 479. — *Coburgia Belladonna* HERB., in *Bot. Reg.*, t. 2113. — *C. pallida* HERB. — *Callicore rosea* LINK.

3. *App.*, 29; *Amar.*, 133, 414. — K., *Enum.*, V, 531. — B. H., *Gen.*, III, 729, n. 33. — PAX, *Pflanzenfam.*, 106. — BAK., *Amar.*, 53.

4. Ex HERBERT.

5. Purpureis v. raro ad faucem albidis, magnis speciosis.

6. Spec. 1. *V. speciosa*. — *V. purpurea* HERB., *App.*, 29. — *V. elata* ROEM. — *Crinum speciosum* L. F., *Suppl.* (1781), 195. — *Amaryllis purpurea* AIT., *H. kew.*, I, 417 (1789). — KER, in *Bot. Mag.*, t. 1430. — *A. speciosa* LHER. — *A. elata* JACQ., *Hort. schænbr.*, I, t. 62. — *Cyrtanthus purpureus* HERB. — Var. *minor* KER, in *Bot. Reg.*, t. 552.

7. *Descr. nov. gen. pl. rar.*..... *Brunsvig.* (1753), c. tab. 3. — HERB., *Amar.*, 280, t. 22, 32. — ENDL., *Gen.*, n. 1274. — K., *Enum.*, V, 605. — B. H., *Gen.*, III, 728, n. 30. — PAX, *Pflanzenfam.*, 106. — BAK., *Amar.*, 96.

3-quetèr, basi angustatus v. contractus, loculicidus. Semina ∞ , oblonga; funiculis elongatis. — Herbæ perennes, nunc amplæ; bulbo tunicato magno; foliis basilaribus latis serotinis, nunc scabris, sæpius humi appressis; floribus¹ in summo scapo solido umbelliformi-cymosis; pedicellis validis; bracteis involucrantibus magnis 2; bracteolis interioribus lineari-filiformibus. (*Africa austr.*²)

16. **Ammocharis** HERB.³ — Flores *Brunsvigiæ*; perianthii infundibularis tubo cylindræo recto; lobis erecto-patentibus angustis, apice demum sæpe revolutis. Stamina 6, fauci affixa, perianthio subæqualia; filamentis rectis subulatis; antheris oblongis dorsifixis versatilibus, nunc demum recurvis. Germen oblongum; ovulis ∞ , placentæ axili 2-seriatim affixis; stylo gracili elongato, basi conica rostrato, apice leviter dilatato obtuse 3-lobato. Fructus « turbinatus angustus, apice abrupte contractus; seminibus paucis carnosus inæqui-tuberoso-lanatis ». — Herba perennis; bulbo tunicato; foliis falcato-ligulatis; floribus⁴ in summo scapo umbelliformi-cymosis ∞ ; pedicellis elongatis; bracteis involucrantibus late membranaceis 2; bracteolis lineari-setaceis. (*Africa austr.*⁵)

17. **Chlidanthus** HERB.⁶ — Flores fere *Crini*; perianthii infundibularis tubo cylindræo longo, ad faucem vix ampliato; limbi lobis 6, apice recurvo patentibus. Stamina 6, fauci affixa, limbo breviora; filamentis subulatis, basi leviter dilatatis; antheris oblongis introrsis, dorso ad basin affixis. Germen sessile; stylo gracili elongato, apice cavo in ramos stigmatosos recurvos diviso. Ovula ∞ , 2-seriata. Fructus oblongus loculicidus; seminibus⁷ dense superpositis compressis. — Herba perennis; bulbo tunicato; foliis basilaribus longis lineari-loriformibus; floribus⁸ in summo scapo solido umbelliformi-

1. Speciosis, sæpe roseis.

2. Spec. ad 10. l., *Spec.*, 422. — RED., *Lil.*, t. 370-372. — JACQ., *H. schænbr.*, t. 68, 70, 74. — ALT., *H. kew.*, ed. 2, II, 230. — SAUND., *Ref. bot.*, t. 330. — *Bot. Reg.*, t. 192, 193, 954, 1335; (1842), t. 11. — *Bot. Mag.*, t. 1619, 2758 (pleraq. sub *Amaryllide*).

3. *App.*, 17; *Amar.*, 241, t. 33. — K., *Enum.*, V, 611. — B. H., *Gen.*, III, 727, n. 28. — PAX, *Pflanzenfam.*, 108. — BAK., *Amar.*, 96. — PALINETES SALISB., *Gen. pl. Fragm.*, 116.

4. Purpureis v. roseis, fragrantibus.

5. Spec. 1. *A. falcata* HERR. — *A. coranica*

HERB. — *Amaryllis falcata* LHER., *Sert. angl.*, 13. — *A. coranica* BURCH., in *Bot. Reg.*, t. 189, 1219. — *Crinum falcatum* JACQ., *H. vindob.*, III, 34, t. 60. — *Brunsvigia falcata* KER., in *Bot. Mag.*, t. 1443. — *Hæmanthus falcatus* THUNB., *Prodr. Fl. cap.*, 58.

6. *App.*, 46; *Amar.*, 190, t. 27. — ENDL., *Gen.*, n. 1281. — K., *Enum.*, V, 653. — B. H., *Gen.*, III, 723, n. 19. — PAX, *Pflanzenfam.*, 108. — BAK., *Amar.*, 28. — *Coleophyllum* KL., in *Allg. Gartenzeit.* (1840), 185.

7. Nigris.

8. Flavus, longis speciosis, odoratis.

cymosis 2-paucis; bracteis involucrantibus lanceolato-acuminatis. (Peruvia¹.)

18. *Cyrtanthus* AIT.² — Flores fere *Vallotæ* (v. *Chlidanthi*); perianthio anguste infundibulari, varie arcuato; tubo abbreviato v. elongato; fauce longa; lobis erecto-patentibus brevioribus. Stamina ad faucem 2-seriatim inserta, perianthio breviora, recta v. declinata; antheris oblongis ad medium dorsifixis rectis. Germen 3-loculare, ∞-ovulatum; stylo gracili, apice stigmatoso raro integro, plerumque in ramos 3, nunc longiusculos, diviso. Fructus a latere v. basi varioruptus, nunc regulariter loculicidus et 3-valvis. Semina ∞, compressa basiue in alam producta. — Herbæ perennes; bulbo tunicato; foliis angustis elongatis nunc flexuosis; floribus in cymas 1-∞-floras, umbelliformes dispositis, sessilibus v. pedicellatis, sæpe recurvo-declinatis; bracteis involucrantibus 2-paucis; bracteolis angustioribus. (Africa trop. et austr.³)

19. *Ungernia* BGE⁴. — Flores fere *Cyrtanthi*; perianthii infundibularis tubo superne sensim ampliato; lobis erecto-patentibus. Stamina tubo affixa libera, perianthio breviora; filamentis linearibus tubo inæqui- v. subæqui-affixis; antheris erectis dorsifixis oblongis, introrsum rimosis. Germen 3-loculare; ovulis adscendentibus ∞; stylo apice tubuloso capitellato-3-lobo. Fructus subgloboso-3-dymus membranaceus, loculicide 3-valvis. Semina⁵ suborbicularia compressa, in alam tenuem expansa. — Herba perennis; bulbo magno tunicato; foliis...?; floribus⁶ in summo scapo solido umbelliformi-cymosis; bracteis involucrantibus 2; bracteolis minoribus paucis linearibus. (Persia, Turkestan⁷.)

1. Spec. 1. *C. fragrans* BERT. — HERB., App., 46. — LINDL., Coll., t. 34. — Bot. Mag., t. 640. — Fl. serres, t. 326. — *Pancratium luteum* BERTER. (STEUD.).

2. *H. kew.*, ed. 1, I, 414. — HERB., Amar., 128. — ENDL., Gen., n. 1279. — K., Enum., V, 533. — B. H., Gen., III, 729, n. 34. — PAX, *Pflanzenfam.*, 109, fig. 73. — BAK., Amar., 54. — *Timonia* GNEI., Syst., I, 538. — *Gastronema* HERB., App., 30; in Bot. Mag., t. 2291. — *Cyphonema* HERB., in Bot. Mag., sub t. 3710, 3747. — *Monella* HERB., App., 20. — *Eusipho* SALISB., Gen. pl. Fragm., 139.

3. Spec. ad 15, Jacq., *H. schænbr.*, t. 75, 76. — LAM., Serf. angl., t. 16. — RED., Lil., t. 182, 381, 388. — ANDR., Bot. Rep., t. 255. — LODD.,

Bot. Cab., t. 368, 947, 1945. — REG., *Gartenfl.*, t. 960. — SAUND., Ref. bot., t. 355. — HERN., in Trim. Journ. (1878), 197. — HOOK. F., in Gardn. Chron. (1869), 3641; XIV (1893), 69, fig. 16. — Bot. Reg., t. 162, 167, 168, 503, 1462. — Bot. Mag., t. 271, 1133, 2291, 2471, 5218, 5374.

4. In Bull. Soc. imp. nat. Mosc. (1875), II, 271. — B. H., Gen., III, 721, n. 14. — PAX, *Pflanzenfam.*, 106. — BAK., Amar., 39.

5. « Atra ».

6. « Pallide miniatis » v. flavis, mediocribus.

7. Spec. 4. BOISS., Fl. or., V, 149. — REG., *Gartenfl.* (1877), 259, t. 914 (*Lycoris*). — MAXIM., in Engl. Jahresb. (1885), 76. — BOISS., Fl. or., V, 149.

20. **Anoiganthus** BAK.⁴ — Flores fere *Cyrtanthi*; perianthii infundibularis tubo brevi; limbi lobis 6, tubo longioribus lanceolatis erecto-patentibus. Stamina 6, fauci 2-seriatim affixa; alternipetala altius sita; filamentis brevibus; anthera erecta elliptica, basi profunde sagittato-2-loba, inter lobos affixa, introrsum rimosa. Germen obovoidum; stylo gracili; ramis stigmatosis tenuibus falcatis membranaceo-dilatatis, apice intus papilloso. Ovula ∞ , 2-seriata. Fructus oblongus v. subsphærico-3-queter membranaceus loculicidus; seminibus² oblongis ∞ . — Herba perennis; bulbo tunicato; foliis angustis serotinis v. coetaneis; floribus³ in summo scapo umbelliformi-cymosis ∞ , nunc 1, 2; bracteis involucrantibus lanceolatis 2; bracteolis minoribus setaceis. (*Africa austr.*⁴)

21. **Imhofia** HEIST.⁵ — Flores fere *Cyrtanthi*; perianthii foliolis angustis lanceolatis, patentibus v. revolutis, aut liberis, aut ima basi in annulum connatis. Stamina 6⁶, imis foliolis affixa iisque subæquilonga, nunc declinata; filamentis subulatis; antheris oblongis rectis, ad medium dorsifixis versatilibus, introrsum rimosis. Germen sessile; stylo gracili, apice stigmatoso subintegro, 3-dymo v. breviter 3-ramoso. Ovula in loculis ∞ , nunc pauca, 2-seriata. Fructus brevis, subsphæricus v. depressus, nunc sub-3-lobus, loculicidus. Semina pauca v. 1, angulata⁷. — Herbæ perennes; bulbo tunicato; foliis serotinis v. coetaneis, loriformibus v. latiusculis; floribus⁸ in summo scapo solido nudo umbelliformi-cymosis, erectis v. declinatis; bracteis involucrantibus membranaceis v. scariosis. (*Africa austr.*⁹)

22. **Lycoris** HERB.¹⁰ — Flores fere *Imhofæ*; perianthii infundibularis tubo brevi v. varie elongato; lobis angustis elongatis. Stamina 6,

1. In *Trim. Journ.* (1878), 76; *Amar.*, 27. — B. H., *Gen.*, III, 722, n. 15. — PAX, *Pflanzenfam.*, 106.

2. Nigris.

3. Flavus, mediocribus.

4. Spec. 1. *A. brevifolius* BAK. — *A. luteus* BAK. — *A. parviflorus* BAK., in *Bot. Mag.*, t. 7072. — *Cyrtanthus brevifolius* HARV., t. 139.

5. *Beschr. Brunsvig.*, XIX, XX. — O. K., *Revis.*, 704. — H. BN, in *Bull. Soc. Linn. Par.*, 1132. — *Nerine* HERB., in *Bot. Mag.*, t. 2124; *App.*, 18. — ENDL., *Gen.*, 176. — K., *Enum.*, V, 615. — B. H., *Gen.*, III, 728, n. 31. — PAX, *Pflanzenfam.*, 106. — BAK., *Amar.*, 99. — *Loxanthus* SALISB., *Fragm.*, 117. — *Galatea* HERR., in *Bot. Mag.*, sub t. 2113.

6. Nunc plus minus inæqualia.

7. Nunc carnosula, viridula.

8. Albus, rubris v. roseo-striatis, parvis v. majusculis speciosis.

9. Spec. ad 11. RED., *Lil.*, t. 33, 115, 274, 450. — JACQ., *H. schænbr.*, t. 64-67, 69; *H. vindob.*, III, t. 13. — ANDR., *Bot. Rep.*, t. 163. — SAUND., *Ref. bot.*, t. 329. — LEICHTL., in *Gardn. Chron.*, n. ser., XXVI, 681. — MOORE, in *Florist* (1882), t. 567. — *Bot. Reg.*, t. 172, 497. — *Bot. Mag.*, t. 294 (*Amaryllis*), 369, 497, 726, 1089, 1090, 2124, 2407, 5901, 6547 (pleraq. sub *Nerine*).

10. *App.*, 20; *Amar.*, 229. — ENDL., *Gen.*, 176. — K., *Enum.*, V, 544. — B. H., *Gen.*, III, 727, n. 23. — PAX, *Pflanzenfam.*, 113. — *Orexis* SALISB., *Gen. pl. Fragm.*, 117.

fauci affixa; filamentis subulatis breviusculis v. longe exsertis, rectiusculis v. declinatis; antheris oblongis ad medium dorsifixis, nunc versatilibus. Germen 3-loculare; ovulis in loculo 2- ∞ , 2-seriatis; stylo gracili, apice stigmatoso exserto haud v. vix incrassato. Fructus subsphæricus v. ovoideus, basi obtusus, apice nunc contractus, loculicidus. — Herbæ perennes; bulbo tunicato; foliis serotinis linearibus v. loriformibus; floribus in summo scapo solido ∞ , umbelliformi-cymosis; bracteis involucrantibus 2. (*Asia med. et or.*¹)

23. *Pancratium* L.² — Flores fere *Crini*; perianthii infundibularis tubo elongato v. rarius brevior, ad faucem ampliato; limbi lobis 6, sæpe angustis, erecto-patentibus, valvatis v. vix imbricatis. Stamina 6, limbo breviora, fauci æqualiter affixa, basi cyatho membraniformi connata; marginibus cyathi inter stamina in lobum 2-dentatum v. 2-lobulatum productis. Staminum filamenta superne subulata; antheris lineari-oblongis dorsifixis arcuatis, introrsum 2-rimosis. Germen 3-loculare; stylo gracili, apice stigmatoso capitato. Ovula in loculis ∞ , 2-seriata. Fructus subsphærico-3-queter, loculicidus; seminibus³ ∞ , inæqui-angulatis; integumento exteriori laxo crassiusculo. — Herbæ perennes, nunc magnæ; bulbo tunicato; foliis basilaribus linearibus v. loriformibus; floribus⁴ in summo scapo umbelliformi-cymosis, nunc raro paucissimis v. 1; bracteis involucrantibus 2, membranaceo-scariosis; bracteolis brevibus linearibus. (*Reg. Medit., Africa bor.-occid. insul., Asia austro-occid.*⁵)

24. *Hyline* HERB.⁶ — Flores fere *Pancrati*; α perianthii tubo vix

1. Spec. 3. JACQ., *H. schænbr.*, t. 73 (*Amaryllis*). — RED., *Lil.*, t. 61 (*Amaryllis*). — LHER., *Sert. angl.*, t. 15 bis. — ANDR., *Bot. Rep.*, t. 95 (pler. sub *Amaryllide*). — REG., *Gartenfl.* (1877), t. 914. — MIQ., in *Ann. Mus. lugd.-bat.*, II, 139 (*Nerine*). — MAXIM., in *Engl. Jahrb.* (1884), 77. — FR. et SAV., *Enum. pl. jap.*, I, 299. — Bot. Reg., t. 596, 611. — Bot. Mag., t. 409.

2. Gen., ed. I, n. 287; ed. VI, n. 404. — J., Gen., 55. — ENDL., Gen., n. 1288 (part.). — K., Enum., V, 657. — NEES, Gen. Fl. germ., Monoc., III, n. 3. — H. BN., in *Adansonia*, I, 97. — B. H., Gen., III, 733, n. 47. — PAX, *Pflanzenfam.*, 112. — BAK., Amar., 117. — *Tiaranthus* HERB., Amar., 202, 206. — *Almyra* SALISB., in *Trans. Hort. Soc. lond.*, I, 336. — *Hulmyra* PARLAT., *N. gen. Monoc.*, 23; *Fl. ital.*, III, 102. — *Bollæa* PARLAT., in *Bull. Soc. bot. Fr.*, V, 509.

3. Nigris.

4. Albis, magnis speciosis.

5. Spec. 10-12. CAV., *lc.*, t. 56. — RED., *Lil.*, t. 8, 153, 156. — SIBTH., *Fl. græc.*, t. 309. — SALISB., in *Trans. Linn. Soc.*, II, t. 9; *Par. lond.*, t. 86. — WIGHT, *lc.*, t. 2023. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 285. — MAXIM., in *Engl. Jahrb.* (1885), 81. — THW., *En. pl. Zeyl.*, 324. — BENTH., *Fl. hongk.*, 366. — ASCH. et SCHW., in *Berl. Gartenz.* (1883), 345, c. fig. — DALZ., in *Hook. Journ.*, II, 144. — BOISS., *Fl. or.*, V, 152. — WILLK. et LGE, *Prodr. Fl. hisp.*, I, 149. — REICHB., *lc. Fl. germ.*, t. 371. — GREN. et GODR., *Fl. de Fr.*, III, 262. — Bot. Reg., t. 161, 174, 413, 479, 927. — Bot. Mag., t. 718, 2538.

6. In Bot. Mag., sub t. 3779. — B. H., Gen., III, 730, n. 38. — PAX, *Pflanzenfam.*, 113. — BAK., Amar., 117.

ullo; foliolis 6, linearibus longissimis. Stamina 6, imis foliolis affixa; filamentis longissimis, basi membrana brevissima in cupulam con-natis; antheris linearibus dorsifixis versatilibus. Germen oblongo-clavatum; stylo gracili, apice stigmatoso punctiformi. Ovula ∞ , 2-seriatim adscendentia. Fructus immaturus turbinatus; seminibus...? — Herba perennis¹; foliis coetaneis loriformibus subacutis carnosis; floribus umbelliformi-cymosis; bracteis involucrentibus scariosis 2, liberis latiusculis; bracteolis linearibus. (*Brasilia*².) »

25. **Stenomesson** HERB.³ — Flores fere *Pancratii*; perianthii tubo longe cylindrico, recto v. arcuato; lobis erectis v. patentibus brevibus. Stamina 6, faucibus æqualiter affixa; filamentis subulatis, inferne in membranas dilatatis; membranulis in cyathum petaloideum connexis; cyatho inter filamenta truncato, sinuato v. 1, 2-dentato; antheris ad medium v. paulo supra basin affixis versatilibus oblongis. Stylus apice dilatato subinteger v. 3-lobulatus. Ovula ∞ . Fructus loculicidus, subsphæricus v. 3-dymus; seminibus (nigris) plano-compressis. — Herbae perennes; bulbo tunicato; foliis coetaneis linearibus v. latiusculis; floribus⁴ in summo scapo pleno v. nunc rarius fistuloso umbelliformi-cymosis, nuncve 1, 2; pedicellis recurvis; bracteis involucrentibus variis 2; bracteolis interioribus minoribus v. latiore 1. (*America trop.*⁵)

26. **Placea** MIERS⁶. — Flores fere *Pancratii*; perianthii subdeclinati tubo brevi v. brevissimo. Corona ad filamentorum basin, iis 2, 3-plo brevior, membranacea, sub-6-partita; segmentis emarginatis. Stamina declinata, coronæ interiora; antheris rectis dorsifixis versatilibus. Germinis loculi 2-seriatim ∞ -ovulati; stylo declinato, apice stigmatoso obtuso. — Herbae perennes; bulbo tunicato; foliis linea-

1. *Hymenocallidis* habitu.

2. Spec. 1. *H. Gardneriana* HERB.

3. App., 40; Amar., 198. — ENDL., Gen., n. 1284. — B. H., Gen., III, 733, n. 46. — PAX, Pflanzenfam., 113. — BAK., in Trim. Journ. (1878), 169; Amar., 113. — Coburgia SWEET, Brit. fl. Gard., ser. II, t. 17. — Clinanthus HERB., Amar., 192. — Clitanthus HERB., in Bot. Reg. (1839), Misc., 87. — Callithauma HERB., Amar., 225; in Bot. Mag., t. 3866. — Chrysiphiala KER, in Bot. Reg., t. 778 (part.). — Nezera SALISB., Gen. pl. Fragm., 109. — Sphaerothera PREST., Rel. Hænk., 119, t. 16, fig. 2.

4. Fulvis, viridulis, aureis v. rubris, sæpius speciosus.

5. Spec. 11. R. et PAV., Fl. per. et chil., t. 284, fig. a; 285, b (*Pancratium*). — RED., Lil., t. 187 (*Pancratium*). — H. B. K., Nov. gen. et spec., I, 286 (*Pancratium*). — HOOK., Exot. Fl., t. 132 (*Chrysiphiala*). — SAUND., Ref. bot., t. 22, 308; 309 (*Coburgia*). — Bot. Reg., t. 978, 1497; (1842), t. 46, 52; (1843), t. 2; (1844), t. 2. — Bot. Mag., t. 2640, 2641, 3321, 3803, 3865-3867; 5686 (*Coburgia*).

6. In Bot. Reg. (1841), t. 50. — K., Enum., V, 502. — BAK., in Trim. Journ. (1878), 199; Amar., 15. — PAX, Pflanzenfam., 113.

ribus carinatis; floribus¹ in summo scapo fistuloso umbelliformi-
cymosis; bracteis involucrentibus lanceolatis 2; bracteolis lineari-
bus ∞ . (*Chili*².)

27. *Hippeastrum* HERB.³ — Flores *Amaryllidis*; perianthio infun-
dibulari recto v. nunc plus minus declinato; tubo brevi v. varie
elongato; limbi lobis æqualibus v. parum inæqualibus, nunc alte
solubilibus. Stamina fauci sæpius inæqui-affixa; antheris dorsifixis
oblongis v. lineari-oblongis versatilibus. Squamellæ⁴ ad staminum
basin parvæ ∞ , minimæ v. 0. Styli elongati gracilis rami stigmatosi
lineares recurvo-patentes v. breviores obtusiores. Ovula ∞ , 2-seriata.
Fructus 3-sulcus v. 3-dymus, loculicidus. Semina ∞ (nigra), plano-
compressa. — Herbæ perennes; bulbo tunicato; foliis loriformibus
v. linearibus; floribus⁵ in summo scapo⁶ cymosis 2- ∞ ; bracteis invo-
lucrentibus 2; bracteolis linearibus 1- ∞ , v. nunc 0. (*America trop. et
austr. extratrop.*⁷)

28. *Sprekella* HEIST.⁸ — Flores (fere *Hippeastri*) valde irregulares;
perianthii valde declinati, 2-labii, foliolis 6, 2-seriatis liberis, basi
subcontractis; labio infimo concavo genitalia recipiente. Stamina 6,
imis foliolis affixa declinata; squamellis interpositis parvis; antheris
dorsifixis versatilibus oblongis, introrsum rimosis, demum recurvis.
Germen 3-loculare; stylo perianthio longiore, apice in ramos stigma-

1. Albis v. purpureo-lineatis, speciosis.

2. Spec. 2, 3. RÖEM., *Amar.*, 153. — PHIL., in
Linnaea, XXIX, 67; XXXII, 259; *Descr. nuev.
pl.*, II (1873), 65. — *Fl. serres*, t. 787, 2047.
— MIEBS, in *Bot. Reg.*, XXVII, t. 50. — LEME,
in *Ill. hort.*, t. 574.

3. *App.*, 31; *Amar.*, 135. — K., *Enum.*, V,
514. — BAK., in *Trim. Journ.* (1878), 79 (part.);
Amar., 41. — B. H., *Gen.*, III, 724, n. 23. —
PAX, *Pflanzenfam.*, 113. — *Habranthus* HERB.,
Amar., 156 (part.). — *Myoslemma* SALISB.,
Gen. pl. Fragm., 135. — *Chonais* SALISB. —
Buphalissa SALISB. — *Aschamia* SALISB., *loc.
cit.*, 134. — *Leopoldia* HERB., in *Bot. Mag.*,
sub t. 2113; in *Trans. Hort. Soc. lond.*, IV, 181.
— *Rhodophiala* PRESL, *Bot. Bem.*, 115. — *Phy-
cella* LINDL., *Bot. Reg.*, sub t. 928, 1341. —
Rhodolirion PHIL., in *Linnaea*, XXIX, 65.

4. De quib. H. BN, in *Bull. Soc. Linn.*, n. 144.

5. Magnis, speciosis, rubris, violaceis v. albis,
nunc raro parvis inconspicuis.

6. Fistuloso.

7. Spec. ad 40 (cum hybrid. mult.). JACQ.,

H. schænbr., t. 63. — LHER., *Serl. angl.*, t. 14,
15. — RED., *Lil.*, t. 9, 10, 32, 424. — LODD.,
Bot. Cab., t. 484, 864, 1082, 1200, 1204, 1449,
1746, 1760. — LINDL., *Coll.*, t. 11, 12. — SWEET,
Brit. fl. Gard., ser. II, t. 107, 213. — REG.,
Gartenfl., t. 809. — SAUND., *Ref. bot.*, t. 338
(*Phycella*), 358. — ANDR., *Bot. Rep.*, t. 179,
358. — PHIL., in *Linnaea*, XXIX, 66; *Descr. n.
pl.* (1873), 66. — KARST., *Fl. columb.*, t. 102.
— C. GAY, *Fl. chil.*, 68 (*Habranthus*, part.), 71
(*Rhodophiala*), 76 (*Phycella*). — HEMSL., *Bot.
centr.-amer.*, III, 334. — BURY, *Hexandr.*,
t. 19, 23. — DOMBR., in *Fl. Mag.*, t. 344, 475,
476. — *Bot. Reg.*, t. 23, 38, 169, 199, 226, 234,
444, 534, 719, 809, 849, 876, 988, 1038, 1148,
1188, 1396, 1943. — *Bot. Mag.*, t. 123, 305, 453,
657, 1125, 1193, 2113, 2273, 2278, 2399, 2475,
2573, 2597, 2639, 2983, 3311, 3528, 3542, 3549,
3872, 3961, 5645, 5883 (plur. sub *Amaryllide*).

8. *Beschr. Brunsvig.*, 19. — ENDL., *Gen.*,
n. 1273 d. — K., *Enum.*, V, 507. — B. H., *Gen.*,
III, 724, n. 22. — PAX, *Pflanzenfam.*, 113. —
BAK., *Amar.*, 38.

tiferos breves recurvos diviso. Ovula in loculis ∞ , subhorizontalia, 2-seriata. Fructus globoso-3-queter loculicidus. Semina ∞ , suborbicularia compressa (nigra). — Herba perennis; bulbo tunicato; foliis serotinis lineari-loriformibus; flore¹ in summo spatho fistuloso solitario; spatha apice membranacea, 2-fida. (*Mexicum*².)

29. **Vagaria** HERB.³ — Flores fere *Pancratii* (minores); perianthii infundibularis tubo obconico v. longius angustiore; fauce ampliata; limbi lobis oblongis v. angustis erecto-patentibus. Stamina 6, fauci æqualiter affixa perianthioque breviora; filamentis utrinque dente longe 3-angulari auctis; antheris oblongis medio dorsifixis. Germen breve; loculis 2-pauciovulatis; stylo gracili, apice stigmatoso parvo. Fructus membranaceus subsphæricus v. sub-3-lobus; seminibus⁴ paucis ovoideis v. angulatis. — Herbæ perennes; bulbo amplo tunicato; radicibus fasciculatis crassiusculis; foliis loriformibus, serotinis v. coetaneis; floribus⁵ in summo scapo umbelliformi-cymosis; pedicellis brevibus v. gracilibus; bracteis involucrantibus 2-paucis; bracteolis paucis linearibus. (*Syria*⁶.)

30. **Calliphruria** HERB.⁷ — Flores (fere *Vagaria*) regulares; perianthii tubo recto v. arcuato, aut cylindraceo, aut apice infundibulari- v. hypocraterimorpho-dilatato; limbi lobis ovatis v. lanceolatis, patentibus v. erecto-patentibus. Stamina fauci æqui-affixa; filamentis subulatis, lateraliter in membranas margine liberas v. plus minus alte in cyathum connatas dilatatis; singulis aut elongato-3-angularibus acutis (*Eucalliphruria*), aut breviter dentiformibus nuncque subnullis (*Microdontocharis*⁸), rarius latioribus obtusis (*Eucharis*⁹); cyatho inter stamina ovato-2-dentato v. obtusius crenato. Antheræ oblongæ v. lineares, plus minus alte dorsifixæ, versatiles; loculis introrsum rimosis. Germen breve v. longius; stylo apice stigmatoso

1. Purpureo v. flavo-vittato, specioso.

2. Spec. 1. *S. formosissima* HERB., App., 35. — SWEET, Brit. fl. Gard., ser. II, t. 1448. — *S. Heisteri* TREW. — *Amaryllis formosissima* L. — RED., Lil., t. 6. — BURY, Hexandr., t. 6. — Bot. Mag., t. 47.

3. Amar., 228. — B. H., Gen., III, 735, n. 50. — PAX, Pflanzenfam., 113. — BAK., Amar., 130. — H. BN, in Bull. Soc. Linn. Par., 1136. — *Vaginaris* K., Enum., V, 893.

4. Nigris.

5. Albis, mediocribus.

6. Spec. 2. *V. parviflora* (*Pancratium parviflorum* DESF. — RED., Lil., t. 471) et *V. affinis* (*Pancratium parviflorum* DCNE, in Ann. sc. nat., sér. 2, IV, 346).

7. In Bot. Reg. (1844), Misc., 87. — K., Enum., V, 692. — B. H., Gen., III, 731, n. 42. — PAX, Pflanzenfam., 110. — BAK., Amar., 112. — H. BN, in Bull. Soc. Linn. Par., 1133.

8. H. BN, loc. cit., 1134.

9. PL. et LIND., Fl. serres, t. 788, 957, 1216. — B. H., Gen., III, 731, n. 41. — PAX, Pflanzenfam., 111. — BAK., Amar., 109.

obtuse lobato v. in ramos breves recurvos diviso. Ovula in loculis¹ 1-∞, 2-seriata. Fructus subsphæricus, depressus v. sub-3-lobus; pericarpio tenui demum rupto. Semina 1-pauca crassiuscula. — Herbæ perennes; bulbo tunicato; foliis² basilaribus latis petiolatis; limbo dissite venoso et transverse venuloso; floribus³ in summo scapo umbelliformi-cymosis; bracteis involucrantibus 2, 3, membranaceis latioribus; bracteolis interioribus angustis ∞. (*Columbia andina*, *Brasilia bor.*⁴)

31. Plagiolirion BAK.⁵ — Flores (fere *Calliphruriæ*) irregulares; perianthii tubo cylindræco brevi; limbi obliqui foliolis oblanceolatis tuboque 2-plo longioribus; infimis 2 horizontaliter patentibus. Stamina fauci affixa, limbo breviora; filamentis basi in cupulam inter ea 1-dentatam connatis, apice anguste alatis; antheris oblongis versatilibus. Germinis sphærici loculi superposite 2, 3-ovulati; stylo gracili, apice capitato. Fructus sphæricus, demum dehiscens; seminibus sphæricis solitariis. — Herba perennis; bulbo tunicato; foliis serotinis oblongo-acutis; petiolo breviora; floribus⁶ umbelliformi-cymosis; bracteis involucrantibus lanceolatis. (*Columbia*⁷.) »

32. Hymenocallis SALISB.⁸ — Flores fere *Calliphruriæ*; perianthii longe subhypocraterimorphi tubo anguste cylindræco v. ad apicem leviter ampliato; limbi lobis lineari-elongatis, demum patentibus v. recurvis. Stamina summo tubo æqui-affixa; filamentis subulatis, nunc parte libera brevi recurvis (*Ismene*⁹), inferne autem membrana petaloidea cyathiformi v. patente¹⁰ connexis. Antheræ lineares dorsifixæ versatiles, sæpe demum arcuatæ; introrsum rimosæ. Germen 3-loculare; loculis vacuis 2; stylo gracili elongato, apice stigmatoso parvo. Ovula in loculo fertili 2, suberecto-adscendentia; micropyle extrorsum infera. Fructus subsphæricus v. ovoideus, carnosulus, demum membranaceus atque hinc fissus ruptusve. Semina 1, 2,

1. Quorum nunc steriles 1, 2.

2. Coetaneis v. rariis serotinis.

3. Parvis, mediocribus v. majusculis speciosis, albis, nunc suaveolentibus.

4. Spec. ad T. K., *Enum.*, V, 666 (*Hymenocallis*). — REG., *Gartenfl.*, t. 254 (*Eucharis*). — *Bot. Reg.* (1844), *Misc.*, 87. — *Bot. Mag.*, t. 4659, 4971 (*Eucharis*), 6259, 6289; 6676, 6831, 6876 (*Eucharis*).

5. In *Gardn. Chron.* (1883), II, 38; *Amar.*, 111.

6. Albis; tubo viridi.

7. Spec. 1. *P. Horsmanni* BAK.

8. In *Trans. Roy. Hort. Soc. lond.*, I, 338; II, t. 10-13. — ENDL., *Gen.*, n. 1288 a. — K., *Enum.*, V, 664. — KER, in *Journ. sc. and art. Roy. Inst.*, III, t. 3. — SPACH, *Suit. à Buff.*, XII, 430. — B. H., *Gen.*, III, 734, n. 48. — PAX, *Pflanzenfam.*, 110, fig. 74. — BAK., *Amar.*, 120. — CHORETIS HERB., *Amar.*, 219, t. 32-36 (part.). — K., *Enum.*, V, 680.

9. SALISB., *loc. cit.*, I, 342. — K., *Enum.*, V, 681.

10. Marginibus inter filamenta membranæco-dilatatis; membranis secundum margines plus minus altè connatis.

nudata; perfectum sæpius 1, inæqui-ovoideum glabrum carnosum (viride), late umbilicatum; integumento crassissimo spongioso; embryone tereti vario¹. — Herbæ perennes, nunc elatæ; bulbo tunicato; foliis basilaribus loriformibus v. basi in petiolum contractis; limbo latiore; floribus² ad summum scapum solidum umbelliformi-cymosis ∞ , rarius 1, 2, sessilibus v. breviter pedicellatis; bracteis involucentibus 2, subscarioso-membranaceis; bracteolis interioribus linearibus. (*America calid. utraque*³.)

33. **Liriopsis** REICH. ⁴ — Flores fere *Hymenocallidis*; perianthii tubo brevissimo; limbi lobis patentibus lineari-elongatis. Stamina fauci affixa, perianthio æqualia v. longiora; filamentis basi in laminas petaloideas dilatatis; laminis in cyathum late tubuloso-campanulatum cum staminibus declinatum v. recurvum connexis; antheris linearibus versatilibus. Cætera *Hymenocallidis*. — Herbæ perennes; bulbo tunicato; foliis basilaribus loratis; floribus⁵ in summo scapo spurie umbellatis cymosis paucis. (*Peruvia andina*⁶.)

34. **Eurycles** SALISB. ⁷ — Flores fere *Liriopseos*; perianthii longe infundibularis tubo recto tenui, nunc longo; limbi lobis subæqualibus erecto-patentibus. Stamina 6, fauci inserta limboque breviora; filamentis utrinque ad latera lobo brevi auctis; lobis fere usque ad basin liberis conniventibus « v. connatis ». Antheræ oblongæ v. sagittatæ infra medium dorsifixæ versatiles. Germen breve, 3-loculare

1. De seminibus carnosus et germinatione singulari, A. RICH., in *Ann. sc. nat.*, sér. 1, II, 12. — A. BRAUN, in *Ann. sc. nat.*, sér. 4, XIV, 10. — H. BN, in *Bull. Soc. bot. Fr.*, IV, 1020; in *C. rend. Ass. fr.* (1873), 447, t. 3, fig. 1-8.

2. Albis, speciosis.

3. Spec. ad 30. W., *H. berol.*, t. 73. — JACQ., *H. vindob.*, III, t. 11, 75; *Fragm.*, t. 138. — RED., *Lil.*, t. 154, 155, 353, 358, 412-414. — R. et PAV., *Fl. per. et chil.*, t. 283 a. — ANDR., *Bot. Rep.*, t. 556. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 19, 274, 286, 510, 558, 809, 834, 1266. — KN. et WESTC., *Fl. Cab.*, II, 51, 101, c. io. — RÖEM., *Amar.*, 173, 169. — NICHOLS., *Dict.*, II, 164. — BAK., in *Gardn. Chron.* (1879), I, 430; (1884), I, 700; XIV, 150. — TH. MOR., in *Bull. Torr. Club* (1893), 467. — SOND., *Ref. bot.*, t. 357. — *Bot. Reg.*, t. 43, 215, 221, 265, 600, 940, 1641, 1665; (1841), t. 12. — *Bot. Mag.*, t. 825-827, 1082, 1224, 1453, 1467, 1561, 1879, 1941, 2521, 2685, 3675, 6397, 6436, 6562 (plur. sub *Pancratio*).

4. *Consp.* (1828), 62 (non SPACH). — *Elisena* HERB., *Amar.*, 201 (1837); in *Bot. Reg.* (1838), *Misc.*, 45. — K., *Enum.*, V, 656. — B. H., *Gen.*, III, 734, n. 49. — PAX, *Pflanzenfam.*, 111. — *Liriope* HERB., *App.*, 41 (non LOUR.).

5. Albis, magnis speciosis.

6. Spec. 3 : a. *L. ringens* REICH. (*Pancratium ringens* R. et PAV., *Fl. per. et chil.*, III, 53, t. 283. — *Liriope ringens* HERB. — *Elisena ringens* HERB. — KER., in *Journ. sc.*, III, 323); — b. *L. sublimis* H. BN (*Elisena sublimis* HERB., in *Bot. Mag.*, sub t. 3873); — c. *L. longipetala* H. BN (*Elisena longipetala* HERB., in *Bot. Reg.*, XXIV; in *Bot. Mag.*, t. 3873. — BAK., in *Saund. Ref. Bot.*, t. 264).

7. In *Trans. Roy. Hort. Soc. lond.*, I, 337. — HERB., *Amar.*, 227. — ENDL., *Gen.*, n. 1286. — K., *Enum.*, V, 689. — B. H., *Gen.*, III, 735, n. 51. — PAX, *Pflanzenfam.*, 111. — BAK., *Amar.*, 130. — *Cepa* RUMPH., *Herb. amboin.*, VI (1747), 160, t. 70 (haud gener.). — O. K., *Revis.*, 703. — *Proiphys* HERB., *App.*, 42.

stylo gracili, apice stigmatoso parvo, nunc basi subannulari-dilatato. Ovula in loculis 2, descendencia, ad medium angulum internum subcollateralia. Fructus sphaericus, primum carnosulus; seminibus sæpius in loculo solitariis. — Herbæ perennes; bulbo tunicato; foliis petiolatis, late orbicularibus, cordatis v. ovatis; venis distantibus, venulis transversis connexis; floribus¹ in summo scapo umbelliformi-cymosis; bracteis involucrentibus plerumque 2, 3; bracteolis interioribus linearibus. (*Malaisia, Oceania bor.*²)

35. *Calostemma* R. BR.³ — Flores *Eurycelis*; peranthii infundibularis lobis suberectis v. patentibus. Stamina faucis affixa; filamentis inferne membrana cyathiformi connexis; cyathi marginibus inter stamina 2-lobis v. varie denticulatis; antheris oblongis dorsifixis exsertis. Germen abortu 1-loculare; stylo gracili, apice stigmatoso parvo. Ovula in loculo 2, 3. Fructus carnosus, obliquus. Semina 1, 2, subsphaerica carnosula⁴. — Herbæ perennes; bulbo tunicato; foliis basilaribus, aut loriformibus, aut petiolatis; limbo lato venoso; floribus⁵ in summo pedunculo umbelliformi-cymosis; bracteis involucrentibus lanceolatis 2, 3; bracteolis interioribus linearibus paucis. (*Australia*⁶.)

36. *Eustephia* CAV.⁷ — Flores⁸ fere *Calliphuræ*; perianthio anguste infundibulari subcylindræo; tubo brevi; limbi lobis erectis longis. Stamina tubo æqualiter affixa, perianthio subæquilonga, ad tertias 2 utrinque angustissime alatis; alis superne in laminas longe 3-angulares divaricatas productis; filamento ultra eas filiformi; antheris oblongis, medio dorsifixis. Germen 3-loculare; stylo gracili, apice stigmatoso capitato parvo; ovulis ∞, 2-seriatis. Fructus...? — Herba perennis; bulbo tunicato; scapo compressiusculo; cyma umbelliformi pluriflora; pedicellis demum recurvis; bracteis involucrentibus lanceolatis 2; bracteolis lineari-setaceis. (*Peruvia*⁹.)

1. *Albis*, majusculis speciosis.

2. Spec. 2. RED., *Lil.*, t. 384. — SALISB., *Par. lond.*, t. 84. — *Bot. Reg.*, t. 745, 1506. — *Bot. Mag.*, t. 1419, 3399 (nonnull. sub *Pancratio*).

3. *Prodr.*, 297. — ENDL., *Gen.*, n. 1287. — K., *Enum.*, V, 686. — B. H., *Gen.*, III, 735, n. 52. — PAX, *Pflanzenfam.*, 111. — BAK., *Amar.*, 131.

4. De seminibus in bulbillum mutatis v. in pericarpio cito germinantibus; embryo nunc bulbiformi, H. BN, in *C. rend. Ass. fr.* (1873), 447, t. 3, fig. 9-14.

5. *Albis* v. *navis*.

6. Spec. 3. BENTH., *Fl. austral.*, VI, 456. — *Bot. Reg.*, t. 421, 422; (1840), t. 19, 26. — *Fl. serres*, t. 1135. — *Bot. Mag.*, t. 2100, 2101.

7. *lc.*, III, 20, t. 238. — ENDL., *Gen.*, n. 1282. — K., *Enum.*, V, 514. — BAK., in *Trim. Journ.* (1878), 41; *Amar.*, 112. — B. H., *Gen.*, III, 732, n. 43. — PAX, *Pflanzenfam.*, 115.

8. *Coccinei*, apice virescentes.

9. Spec. 1. *E. coccinea* CAV. — HERR., *Amar.*, 71 (*Phycella*). — E. *Macleanica* HERR. — *Phædranassa rubro-viridis* BAK.

37. **Phædranassa** HERB.¹ — Flores *Eustephiæ*; perianthio subcylindraceo v. anguste infundibulari; tubo sæpius brevi. Stamina faucii affixa; filamentis versus basin plus minus (nunc vix) membranaceo-dilatatis, ima basi sæpius annulo prominulo connexis. Stylus apice attenuatus v. brevissime 3-fidus. Ovula in loculis ∞ , 2-seriata. Capsula subsphærica v. 3-dyma, loculicida. Semina (nigra) ∞ , angulato-compressa. — Herbæ perennes; bulbo tunicato; foliis oblongis v. angustis, petiolatis; floribus² in summo scapo umbelliformi-cymosis reflexis; bracteis involucrantibus 2, 3; bracteolis linearibus. (*America austr. andina*³.)

38. **Leperiza** HERB.⁴ — Flores fere *Eustephiæ*; peranthii recti tubo supra germen plus minus contracto, altius in urceolum v. saccum ovoideum dilatato; limbi lobis 6, brevibus, conniventibus v. connatis apiceque solo breviter reflexis. Stamina 6, faucii æquali-affixa; filamentis inferne plus minus membranaceo-dilatatis; nunc in anulum basi connatis; antheris oblongis sub medio dorsifixis rectis. Germen obovoideum; stylo gracili, apice stigmatoso parvo; ovulis ∞ , 2-seriatis. Fructus obovoideus v. subpyramidatus, 3-gonus, 3-dymus v. sub-3-lobus, loculicidus; seminibus ∞ , parvis subsphæricis v. oblongis. — Herbæ perennes; bulbo tunicato; foliis basilaribus angustis v. ovato-oblongis, in petiolum contractis; floribus⁵ in summo scapo solido umbelliformi-cymosis; pedicellis recurvis v. pendulis; bracteis involucrantibus scariosis 2; bracteolis minoribus linearibus ∞ . (*America austr. andina*⁶.)

39. **Eucrosia** KER.⁷ — Flores irregulares; perianthii tubo brevi, obliquo v. arcuato; lobis 6, oblongis, conniventibus v. demum patulis.

1. In *Bot. Reg.* (1845), *Misc.*, 16, t. 17. — K., *Enum.*, V, 500. — BAK., in *Trim. Journ.* (1878), 167; *Amar.*, 107. — B. H., *Gen.*, III, 732, n. 45. — PAX, *Pflanzenfam.*, 115.

2. Rubris v. viridulis, sæpe speciosis.

3. Spec. 5. BAK., in *Gartenfl.*, XXXII, t. 1138; in *Gardn. Chron.* (1877), II, 134; (1880), II, 556; in *Saund. Ref. bot.*, t. 46. — REG., *Gartenfl.*, t. 413. — *Bot. Mag.*, t. 5361.

4. *App.*, 41 (1821); *Amar.*, 195. — K., *Enum.*, V, 643. — O. K., *Revis.*, 704. — *Urceolina* REICHB., *Consp.*, 61. — LINDL., *Veg. Kingd.*, 158. — ENDL., *Gen.*, n. 1277. — B. H., *Gen.*, III, 732, n. 44. — PAX, *Pflanzenfam.*, 115, fig. 75, 76. — BAK., *Amar.*, 108. — *Urceolaria* HERB., *App.*, 28; *Amar.*, 193 (non BONORD.). —

Collania SCH., *Syst.*, VII, 53, 893 (non HERB.). — *Pentlandia* HERB., in *Bot. Reg.* (1839), t. 68. — K., *Enum.*, V, 635. — *Sphærotele* LINK, KL. et OTT., *lc. pl. sel.*, t. 38 (non PRESL).

5. Aurantiacis, miniatis v. flavis et viridimaculatis.

6. Spec. 3. R. et PAV., *Fl. per. et chil.*, t. 284, fig. 6 (*Pancratium*), t. 287 B (*Crinum*). — KER, in *Journ. sc.*, III, 334 (*Pancratium*). — K., *Enum.*, V, 644 (*Collania*). — HERB., *Amar.*, 55 (*Urceolina*). — *Bot. Reg.* (1839), t. 68 (*Pentlandia*). — *Bot. Mag.*, t. 4952, 5464 (*Urceolina*).

7. In *Bot. Reg.*, t. 207 (1817). — K., *Enum.*, V, 504. — B. H., *Gen.*, III, 730, n. 39. — BAK., *Amar.*, 105. — PAX, *Pflanzenfam.*, 115.

Stamina ad apicem tubi affixa, declinata longissime subulata; filamentis basi vix (*Callipsyche*¹) v. nunc plus minus alte connatis ibique callo plus minus prominulo auctis; antheris oblongis ad medium dorsifixis versatilibus, introrsum rimosis. Germen sessile, apice stigmatoso truncato v. capitellato. Ovula ∞ , 2-seriata. Fructus 3-quetor, sub-3-lobus v. 3-dymus, loculicidus. Semina ∞ , oblonga et angulato-compressa. — Herbæ perennes; bulbo tunicato; foliis 2-paucis basilaribus petiolatis; floribus² in summo scapo umbelliformi-cymosis; pedicellis declinatis; bracteis involucrentibus 2-paucis; bracteolis minoribus. (*Ecuador et Peruvia andin.*³)

40? *Stricklandia* BAK.⁴ — « Flores fere *Eucrosiæ*; staminibus haud declinatis fauci tubi brevis affixis, limbo sublongioribus; filamentis rectis, basi callosis, ad medium in cupulam connatis; dente intermedio 0; antheris lineari-oblongis versatilibus. Germen sphaericum, 3-lobum; stylo exserto filiformi, apice stigmatoso punctiformi; ovulis superpositis ∞ . Fructus brevis profunde 3-lobus, loculicidus; seminibus parvis ∞ . — Herba perennis; foliis serotinis 2, oblongis tenuibus; floribus 3, 4, umbelliformi-cymosis, horizontalibus v. cernuis; involucri bracteis linearibus. (*Ecuadoria*⁵). »

41. *Hæmanthus* T.⁶ — Flores parvi; receptaculo ovoideo v. tubuloso, nunc brevi. Perianthium basi gamophyllum; foliolis subæqualibus; petalis imbricatis. Stamina 6, tubo adnata; oppositipetala majora; filamentis superne liberis, sæpe exsertis; antheris oblongis dorsifixis, introrsum rimosis. Germen 3-loculare; dissepimentis nunc incompletis; stylo e basi dilatata⁷ gracili, apice stigmatoso parvo v. 3-fido. Ovulum in loculo quoque solitarium⁸, aut adscendens hemitropum, aut suborthotropum descendens; micropyle extrorsum infera. Fructus baccatus sphaericus v. oblongus⁹, sæpius 1-spermus. —

1. HERB., in *Bot. Reg.* (1842), *Misc.*, 49; (1845), t. 45. — K., *Enum.*, V, 506. — BAK., *Amar.*, 106.

2. Flavis v. albidis, speciosus.

3. Spec. 3, 4. Hook., *Exot. Fl.*, t. 209. — BAK., in *Saund. Ref. bot.*, t. 167, 168 (*Callipsyche*). — *Bot. Mag.*, t. 2490; 6841 (*Callipsyche*).

4. *Amar.*, 105.

5. Spec. 1. *S. eucrosioides* BAK. — *Leperiza eucrosioides* BAK., in *Gardn. Chron.* (1878), I, 170. — *Slenomesson Stricklandi* BAK., in *Gardn. Chron.* (1882), II, 102.

6. *Inst.*, 657, t. 433. — L., *Gen.*, ed. I, n. 276; ed. VI, n. 400. — J., *Gen.*, 55. — GERTN., *Fruct.*, t. 11. — MOENCH, *Meth.*, 530. — SPRENG., *Anl.*, II, 1, 249; *Syst.*, II, 56; *Gen.*, I, 276. — ENDL., *Gen.*, n. 1278. — K., *Enum.*, V, 586. — HERB., *Amar.*, 77, 232. — B. H., *Gen.*, III, 730, n. 36. — PAX, *Pflanzenfam.*, 104, fig. 69. — BAK., *Amar.*, 62. — *Gyazis* SALISB. — *Nerissa* SALISB. — *Diacles* SALISB. — *Melicho* SALISB., *Gen. pl. Fragm.*, 130.

7. Ibi neclarifluo.

8. V. rarius 2; integumento duplici.

9. Røber.

Herbæ perennes; bulbo tunicato; foliis 2-paucis, nunc distincte seriatis, nunc latis brevibus; floribus¹ in summo scapo, sæpe compresso, nunc brevissimo, spurie umbellatis v. subcapitatis et in cymas plures 1-paras nunc contractas dispositis; foliis nunc haud coetaneis; bracteis involucrentibus 2-∞, sæpe coloratis v. punctatis; bracteolis interioribus angustioribus. (*Africa trop. et austr., Arabia*².)

42. **Buphane** HERB.³ — Flores fere *Hæmanthi*; peranthio infundibulari v. hypocraterimorpho recto; tubo brevi v. brevissimo; lobis linearibus patentibus v. reflexis. Stamina 6, fauci affixa, lobis subæqualia v. longiora; filamentis subulatis; antheris dorsifixis ellipsoideo-oblongis versatilibus. Germen breve; stylo gracili, apice stigmatoso minuto. Ovula in loculis 2, collateralia v. sæpe 3, nunc 4. Fructus subsphæricus v. obovoideo-3-queter membranaceus, loculicidus. Semina subglobosa lævia pauca v. 1, « matura bulbiformia⁴ ». — Herbæ perennes; bulbo tunicato; foliis serotinis loriformibus, nunc crispis; floribus⁵ in summo scapo dense umbelliformi-cymosis; bracteis involucrentibus latis 2; bracteolis interioribus setaceis paucis. (*Africa trop. et austr.*⁶)

43. **Clivia** LINDL.⁷ — Flores fere *Vallotæ*; perianthio supero ultra germen intus adnatum in tubum brevem obconicum intusque staminibus decurrentibus prominulis auctum producto. Calycis corollæque lobi conformes imbricati, omnes petaloidei⁸. Stamina 6, cum lobis inserta; filamentis inferne decurrentibus, apice subulatis; opposipetalis longioribus; antheris dorsifixis oblongis versatilibus, introrsum 2-rimosis. Germen inferum, 3-loculare, apice leviter

1. Rubris v. albis, crebris.

2. Spec. ad 40. MARTYN, *Monogr.*, c. ic. — JACQ., *H. schænbr.*, t. 56-61, 407-413. — RED., *Lil.*, t. 39, 204, 320, 398. — ANDR., *Bot. Rep.*, t. 318. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 240, 602, 702, 912, 1948. — BAK., in *Gardn. Chron.* (1877), in *Trim. Journ.* (1878), 166. — ENGL., *Hochgebirgsfl. trop. Afr.*, 169. — DEFL., *Voy. Yem.*, 210. — *Bot. Reg.*, t. 382, 503, 984. — *Bot. Mag.*, t. 961, 1075, 1239, 1315, 1523, 1618, 1705, 1995, 3373, 3870, 4745, 5314, 5378, 5532, 5881, 5903, 6364, 6875.

3. *App.*, 18 (*Boophane*); *Amar.*, 239, t. 22, 36, fig. 7, 8. — ENDL., *Gen.*, n. 1274 c. — K., *Enum.*, V, 602 (part.). — B. H., *Gen.*, III, 730, n. 37. — PAX, *Pflanzenfam.*, 104. — BAK., in *Trim. Journ.* (1878), 167; *Amar.*, 73. — *Crossyne* SALISB., *Gen. pl. Fragm.*, 116.

4. Ex KUNTH.

5. Rubris, mediocribus.

6. Spec. 2. L., *Spec.*, 413 (*Hæmanthus*), 422 (*Amaryllis*). — THUNB., *Fl. cap.* (ed. SCHULT.), 299 (*Hæmanthus*). — JACQ., *Fragm.*, t. 39, 40 (*Hæmanthus*). — KER., in *Bot. Mag.*, t. 1217 (*Hæmanthus*). — HERB., in *Bot. Mag.*, sub t. 2573. — LINDL., in *Bot. Reg.*, t. 1153 (*Brunsvigia*).

7. *Bot. Reg.*, t. 1182. — SPRENG., *Gen.*, I, 274. — SCHULT., *Syst.*, VII, 892. — MEISSN., *Gen.*, 393 (296). — K., *Enum.*, V, 584. — ENDL., *Gen.*, n. 1291. — B. H., *Gen.*, III, 729, n. 35. — PAX, *Pflanzenfam.*, 104. — BAK., *Amar.*, 61. — *Imantophyllum* HOOK., *Bot. Mag.*, t. 2856 (*Imantophyllum*). — *Himantophyllum* SPRENG., *Gen.*, 276.

8. Sæpe apice intus callosa.

glanduloso subplanum. Stylus tenuis, apice breviter v. longiuscule 3-lobus¹; lobis obtusis v. acutiusculis. Ovula in loculis 3-8, sæpius 6, 2-seriata, oblique adscendentia, hemitropa; micropyle extrorsum infera lateraliue. Fructus sphaericus baccatus²; seminibus paucis sub-3-quetris, extus carnosulis, albuminosis. — Herbæ perennes; rhizomate bulbiformi foliorum basibus squamato; radicibus adventivis crassis; foliis basilaribus distichis linearibus persistentibus; floribus³ in summo scapo spurie umbellatis; cymis-1-paris; pedicellis gracilibus; bracteis involucrentibus paucis inæqualibus. (*Africa austr.*⁴)

44. *Griffonia* KER.⁵ — Flores fere *Imhofiæ*; perianthii infundibularis plus minus declinati tubo brevi v. subnullo; foliolis æqualibus v. parum inæqualibus, basi longe angustatis, varie demum patentibus. Stamina foliolis æquilonga v. breviora eorumque basi affixa; filamentis gracilibus declinatis 5; sexto assurgente v. nunc 0; antheris oblongis ad medium dorsifixis, sæpe demum arcuatis. Germen sessile; loculis completis v. incompletis; stylo declinato elongato, apice stigmatoso plus minus v. vix dilatato-3-lobo. Ovula in loculis 2, 3, collateraliter adscendentia subhemitropa; micropyle extrorsum infera. Fructus subsphaericus v. ovoideus loculicidus. Semen⁶ sæpius in loculis 1, adscendens ovoideum crassum. — Herbæ perennes; bulbo tunicato; foliis basilaribus latis et in petiolum contractis, raro angustis sessilibus; venis crebris venulisque transversis; floribus⁷ in summo scapo solido umbelliformi-cymosis; bracteis involucrentibus scariosis 2; bracteolis linearibus ∞. (*Brasilia*⁸.)

45. *Messica* HERB.⁹ — Flores fere *Imhofiæ*; peranthii tubo brevissimo v. 0; foliolis 6, subæqualibus stellato-patentibus. Stamina imis

1. Nunc declinatus.

2. Nitide ruber.

3. Coccineis v. rubris, speciosis.

4. Spec. 3. Lodd., *Bot. Cab.*, t. 434. — REG., *Gartenfl.*, t. 434. — *Fl. serres*, t. 949, 950, 1877, 2373, 2374 (*Imantophyllum*). — *Bot. Mag.*, t. 2856, 4783 (*Imantophyllum*), 4895.

5. In *Bot. Reg.*, sub t. 444, 511. — ENDL., *Gen.*, n. 1275. — K., *Enum.*, V, 542. — BAK., in *Trim. Journ.* (1878), 167; *Amar.*, 59. — B. H., *Gen.*, III, 726, n. 25. — PAX, *Pflanzenfam.*, 104.

6. Pallidum v. nigrum nitidum.

7. Sæpe lilacinis pulchellis.

8. Spec. ad 8. VELL., *Fl. flum.*, Atl., III, t. 117

(*Amaryllis*). — HERB., *App.*, 21. — BURY, *Hexandr.*, t. 14. — CARR., in *Rev. hort.* (1867), 32. — MORR., in *Ann. Soc. agr. Gand* (1845), t. 13. — ROEM., *Amar.*, 32. — LEME, *Jard. fleur.*, t. 290. — *Fl. serres*, t. 1667. — MOORE, in *Gardn. Chron.* (1876), I, 266, fig. 47, 48. — *Bot. Reg.*, 163 (*Amaryllis*), 511, 990. — *Bot. Mag.*, t. 5666, 5786, 6367.

9. *Amar.*, 289, t. 29 (non BERG). — K., *Enum.*, V, 630. — B. H., *Gen.*, III, 720, n. 11. — PAX, *Pflanzenfam.*, 103, fig. 68. — BAK., *Amar.*, 91. — *Imhofia* HERB., *App.*, 18; *Amar.*, 290, t. 29. — K., *Enum.*, V, 625 (non HEIST.). — *Periophanes* SALISB., *Gen. pl. Fragm.*, 118. — *Gemmaria* SALISB., *loc. cit.*, 127.

foliolis v. tubo affixa; filamentis subulatis; alternipetalis brevioribus, basi nunc incrassatis v. subconnatis; antheris imo loculorum sinu basifixis breviter ovatis, ad margines rimosis. Germen breve; stylo basi v. infra medium incrassato, apice stigmatoso breviter 3-lobo. Ovula in loculis pauca v. 1. Fructus globoso-sub-3-dymus loculicidus; seminibus globosis in loculis paucis v. 1. — Herbæ pereunnes; bulbo tunicato; foliis coetaneis v. serotinis, subulatis v. linearibus; floribus in summo scapo solido umbelliformi-cymosis crebris; bracteis involu-
crantibus 2¹. (*Africa austr.*²)

46. **Carpolyza** SALISB.³ — Flores fere *Hesseæ*; perianthii tubo brevi; limbi lobis subæqualibus patentibus. Stamina 6, loborum basi affixa eisque breviora; filamentis subulatis liberis; antheris parvis orbiculari-ovatis basifixis erectis; loculis parallelis et ad margines rimosis. Germen breve, 3-loculare; stylo columnari obtuse 3-sulco, apice capitato-3-lobo; ovulis in loculo paucis v. 1. Fructus depresso-globosus, 3-dymus, loculicidus; seminibus⁴ 1-3, angulato-globosis. — Herba perennis; bulbo parvo tunicato; foliis paucis filiformibus, coetaneis v. serotinis; floribus⁵ in summo scapo gracili basique sæpius spiraliter torti umbelliformi-cymosis paucis v. nunc 1; bracteis involu-
crantibus linearibus 2. (*Africa austr.*⁶)

47. **Strumaria** JACQ.⁷ — Flores fere *Hesseæ*; perianthii foliolis subæqualibus subliberis. Stamina imis foliolis affixa iisque sublongiora; filamentis longe subulatis, infra medium plus minus membranaceo-dilatatis et sæpius cum styli angulis plus minus alte connatis; antheris oblongis rectis ad medium dorsifixis versatilibus, introrsum rimosis. Stylus inferne plus minus dilatatus, 3-angulatus v. sub-3-alatus, apice stigmatoso obtusus v. breviter 3-lobus. Ovula in loculis ∞, sæpe pauca, 2-seriatim obliqua. Fructus subsphærico-3-dymus,

1. Genus a *Strumaria* imprimis differt antheris brevibus basifixis.

2. Spec. 4, 5. JACQ., *H. schænbr.*, t. 71, 72 (*Amaryllis*); *lc. rar.*, t. 361. — AIT., *H. kew.*, ed. I, t. 5. — LHER., *Sert. angl.*, t. 18 (*Amaryllis*). — *Bot. Reg.*, t. 440; 1383 (*Strumaria*). — *Bot. Mag.*, t. 1363 (*Strumaria*).

3. *Parad. lond.*, t. 63. — ENDL., *Gen.*, n. 1268. — K., *Enum.*, V, 629. — B. H., *Gen.*, III, 721, n. 12. — PAX, *Pflanzenfam.*, 104 (*Hesseæ* sect.). — BAK., *Amar.*, 23.

4. Viridibus.

5. Albis, parvis.

6. Spec. 1. *C. spiralis* SALISB. — *Strumaria spiralis* AIT. — *Bot. Mag.*, t. 1383. — *Crinum tenellum* JACQ., *lc. rar.*, t. 363. — *C. spirale* ANDR., *Bot. Rep.*, 1, 92. — *Hæmanthus spiralis* TRUMB., *Prodr. Fl. cap.*, 58.

7. *lc. rar.*, t. 356-360. — HERB., *Amar.*, 287, t. 29, 39. — K., *Enum.*, V, 622. — B. H., *Gen.*, III, 728, n. 32. — PAX, *Pflanzenfam.*, 105. — BAK., *Amar.*, 103. — *Eudolon* SALISB., *Fragm.*, 127. — *Stylago* SALISB. — *Pugionella* SALISB. — *Hymenotron* SALISB., *loc. cit.*

loculicidus. Semina in loculis pauca v. 1, sphærica v. angulata. — Herbæ perennes; bulbo tunicato; tunica intima in limbum apice varie dilatatum et emarginato-2-lobum producta; foliis cæteris loriformibus; floribus¹ in summo scapo nudo umbelliformi-cymosis; bracteis involucrentibus lanceolatis 2; bracteolis minoribus. (*Africa austr.*²)

48. *Ixiolirion* HERB.³ — Flores (fere *Griffiniæ*) subregulares; perianthii foliolis vix inæqualibus ad basin liberis; petalis imbricatis v. tortis. Stamina basi foliolorum perianthii affixa iisque (interiora altius) adnata; oppositipetala longiora; antheris oblongis introrsis, 2-rimosis; connectivo basi foveolato ibique summo filamento affixo. Germen 3-loculare⁴; styli apice 3-fidi ramis stigmatosis recurvis conduplicatis, extus subcarinatis. Ovula in loculis ∞ (12-16), 2-seriatim adscendentia; micropyle lateraliter infera. — Herbæ perennes; bulbo tunicato; caule aërio simplici v. parce ramoso foliato; foliis linearibus alternis; floribus⁵ in cymas laxas bracteatas umbelliformes sæpe paucifloras dispositis. (*Asia med. et occid.*⁶)

II. AGAVEÆ.

49. *Agave* L. — Flores regulares; perianthio ultra germen inferum adnatum subinfundibulari; tubo brevi v. elongato; limbi lobis ovatis v. linearibus, 2-seriatis, erectis v. superne demum patentibus. Stamina 6, sub lobis affixa; filamentis subulatis, nunc ima basi membranaceo-dilatatis; antheris exsertis linearibus ad medium dorsifixis versatilibus, introrsum rimosis. Germen elongatum v. breve, 3-loculare, apice plus minus rostratum; stylo columnari, nunc basi conico, apice stigmatoso capitato v. breviter 3-lobo. Ovula in loculis ∞ , 2-seriata. Fructus forma varius perianthio diu coronatus; pericarpio coriaceo v. subcarnoso, demum ab apice loculicido. Semina (nigra) ∞ ,

1. Albis v. roseis, parvis.

2. Spec. 4. THUNB., *Fl. cap.*, ed. SCHULT., 297 (*Hæmanthus*). — ROEM., *Amar.*, 27. — SCHULT., *Syst.*, VII, 852 (*Brunsvigia*?). — DIETR., *Syn.*, II, 1181 (*Amaryllis*).

3. *App.*, 37; *Amar.*, 125, t. 19, 20. — ENDL., *Gen.*, n. 1293. — K., *Enum.*, V, 816. — B. H., *Gen.*, III, 735, n. 53. — PAX, *Pflanzenfam.*, 110. — BAK., *Amar.*, 132. — *Kolpakowskia* REG., *Gartenfl.*, XXVII, 294, t. 973.

4. Glandulæ septales evolutæ luteæ.

5. Cæruleis, mediocribus pulchellis.

6. Spec. 2. LABILL., *Pl. syr. Dec.*, II, t. 1 (*Amaryllis*). — RED., *Lil.*, t. 241 (*Amaryllis*). — GRIFF., *lc.*, t. 273 (*Alstræmeria*). — SPACH, *Suit. à Buff.*, XII, 406. — LEDEB., *Fl. ross.*, IV, 116. — ROEM., *Fam.*, IV, 19, 246. — BOISS., *Fl. or.*, V, 153. — REG., *Gartenfl.*, XXIX, 193, t. 775, 910, 1014; *Descr.*, XII, 208. — *Fl. serres*, t. 2273. — *Bol. Reg.* (1844), t. 66.

dense superposita compressa v. oblique cuneata, albuminosa. — Herbæ (sæpe elatæ) perennes v. suffrutescentes, plerumque 2-carpicæ; rhizomate brevi crasso v. in caudicem carnosum v. lignosum erectum producto; foliis basilaribus v. in summo caudice confertis, aut crassis rigidis fibroso-carnosis, aut tenuioribus coriaceis, margine integris v. sæpius spinoso-serratis filamentosisve; floribus laxè spicatis ad bractæas singulas solitariis v. 2-nis, nunc cymosis v. glomeratis pluribus, rarius in ramis racemi terminalis ampli compositi cymosis; fructibus erectis. (*America utraque extratrop.*) — *Vid. p. 15.*

50. **Furcraea** VENT.¹ — Flores fere *Agaves*; receptaculo oblongo v. longe lageniformi germen inferum fovente. Sepala petalæque similia ovato-oblonga patentia, vix ima basi connata v. libera. Stamina breviora; filamentis imo perianthio affixis late petaloideo-dilatatis, apice abrupte subulatis; antheris oblongis dorsifixis; loculis inferne liberis, introrsum v. ad margines rimosis. Germen 3-loculare, apice libero rostratum; stylo simplici, apice tubuloso stigmatoso, nunc 3-lobo, basi incrassato-3-angulari v. 3-alato; alis nunc duplicibus. Ovula in loculis ∞ , 2-seriata. Fructus siccus, 3-queter, loculicide 3-valvis; seminibus ∞ , compressis. — Plantæ excelsæ, nunc giganteæ; caule erecto simplici, nunc foliis delapsis cicatrisato; foliis ad apicem dense confertis elongatis, nunc deflexis, margine integris v. spinoso-dentatis; floribus² in racemum amplum pyramidatum compositum dispositis, secundum ramulos cymosis paucis bracteolatis. (*America calid. utraque*³.)

51. **Doryanthes** CORR.⁴ — Flores fere *Furcraeæ*⁵; perianthii tubo breviter infundibulari; limbi lobis 6, subæqualibus patentibus reflexis; petalis dorso costatis. Stamina imis lobis affixa; filamentis subulatis; antheris linearibus v. elongatis introrsis basi intrusa affixis⁶. Germen

1. In *Bull. Soc. philom. Par.*, I, 65. — SCHULT., *Syst.*, VII, 42, 730 (*Fourcroya*). — ENDL., *Gen.*, n. 1298. — K., *Enum.*, V, 839. — B. H., *Gen.*, III, 739, n. 61. — PAX, *Pflanzenfam.*, 119, fig. 77, 80, 81. — BAK., *Amar.*, 198. — *Ræslia* Hort. (non REG.). — *Funium* WILLEM., *Herb. maurit.*, 26.

2. Albis, speciosis.

3. Spet. ad 16. JACQ., *Ic. rar.*, t. 379 (*Agave*). — DC., *Pl. grass.*, t. 126. — ZUCC., in *N. Act. nat. cur.*, XVI, 664, t. 48. — WIGHT, *Icon.*, t. 2025. — JACOBI, in *Hamb. Bot. Zeit.* (1866), 1867. — BAK., in *Gardn. Chron.* (1879), I, 623,

656. — TODAR., *H. bot. panorm.*, t. 4. — HENSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 352, t. 89-92. — K. KOCH, *Woch.* (1863), 233; in *Belg. hort.* (1863), 327. — *Rev. hort.* (1887), fig. 71. — *Bot. Mag.*, t. 2250, 5163, 5519, 6148, 6160, 6543, 7170, 7250.

4. In *Trans. Linn. Soc.*, VI, 211, t. 23, 24. — ENDL., *Gen.*, n. 1293. — K., *Enum.*, V, 850. — B. H., *Gen.*, III, 739, n. 62. — PAX, *Pflanzenfam.*, 53. — BAK., *Amar.*, 162.

5. Multo majores, speciosi, cum inflorescentia tota colorata punicea.

6. Polline nunc olivaceo.

crassum, 3-loculare; ovulis ∞ , 2-seriatis. Fructus oblongus v. clavatus, coriaceus v. sublignosus, loculicidus; seminibus ∞ , compressis crassiusculis, nunc hinc alatis. — Herbæ elatæ frutescentes; radicibus fasciculatis crassis; caule excelso¹ erecto crasso; foliis basilaribus crebris ensiformibus longissimis; caulinis minoribus alternis, superne in bracteas abeuntibus; floribus in racemum v. capitulum magnum compositum dispositis; ramis elongatis v. contractis confertim cymigeris; bracteis amplis cymas involventibus. (*Australia*².)

52. *Beschorneria* K.³ — Flores fere *Agaves*; perianthii foliolis 6, subliberis; petalis imbricatis. Stamina epigyna 6; antheris introrsis versatilibus perianthium haud excedentibus. Germen inferum; loculis 2-seriatim ∞ -ovulatis; stylo inferne dilatato ibique 3-loculari, superne cavo, apicisque excavati marginibus fimbriato-papillosis. Capsula loculicida cæteraque *Agaves*. — Caudex v. rhizoma crassum brevissimum; foliis basilaribus confertis, integris v. dentatis; floribus⁴ secus scapum simplicem v. laxe ramosum cymosis pendulis; bracteis membranaceo-scariosis sæpe coloratis. (*Mexicum*⁵.)

53. *Pollanthes* L.⁶ — Flores fere *Agaves*; perianthio supra receptaculum coloratum infundibulari; tubo longiusculo, recto v. arcuato, ad faucem ampliato; limbi lobis erecto-patentibus; petalis paulo brevioribus. Stamina 6, fauci affixa limboque breviora; filamentis liberis; antheris lineari-oblongis, ad medium dorsifixis, introrsum rimosis. Germen nisi vertice conico inferum; styli gracilis ramis stigmatosis ovatis v. oblongis; loculis ∞ -ovulatis. Fructus ovoideus membranaceus perianthio coronatus. Semina compressiuscula lata ∞ . — Herba perennis; rhizomate tuberoso brevi; caule aereo simplici erecto; foliis basilaribus alternis; caulinis late linearibus, superne in bracteas abeuntibus; floribus⁷ in racemo terminali simplici ad axillas bractearum membranacearum 2-nis. (*Mexicum*⁸.)

1. Nunc 10-metrali.

2. Spec. 3. BAUER, *Ill. pl. N. Holl.*, t. 12-14. — BENTH., *Fl. austral.*, VI, 452. — REG., *Gartenfl.*, t. 421. — *Fl. serres*, t. 1912, 2097, 2098. — *Rev. hort.* (1891), 548, fig. 144, c. tab. — *Gardn. Chron.* (1874), t. 44, 45. — *Bot. Mag.*, t. 1685, 6665.

3. *Enum.*, V, 844. — B. H., *Gen.*, III, 738, n. 59. — PAX, *Pflanzenfam.*, 119, fig. 78, 82. — BAK., *Amar.*, 161.

4. Viridibus v. rubescentibus, magnis.

5. Spec. 3, 4. REG., *Gartenfl.*, t. 851. — HENSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 338. — JACOBI, *Ind.*, 11. — *Bot. Mag.*, t. 4642, 5203, 6091, 6641, 6768.

6. *Gen.*, ed. I, n. 274; ed. VI, 426; *H. Cliff.*, 126 (*Polyanthes*). — J., *Gen.*, 56. — ENDL., *Gen.*, n. 1103. — K., *Enum.*, V, 845. — B. H., *Gen.*, III, 737, n. 57. — PAX, *Pflanzenfam.*, 117. — BAK., *Amar.*, 159.

7. Albis speciosis, odoratissimis.

8. Spec. 1, sæpe culta. *P. tuberosa* L., *Spec.*, XIII. — 5

54? *Prochnyanthes* S.-WATS.¹ — Flores fere *Agaves*; ϵ perianthii persistentis tubo basi subcylindrico, abrupte geniculato dilatatoque; lobis erectis æqualibus. Stamina faucis basi affixa, lobis subæqualia; antheris dorsifixis linearibus. Ovula in loculis germinis inferi ∞ ; stylo gracili, apice stigmatoso oblongo. Fructus subglobosus membranaceus loculicidus. — Planta erecta; caudice simplici brevi crasso erecto bracteigero; foliis basilaribus lineari-lanceolatis petiolatis subcoriaceis inermibus multinervibus; floribus² racemosis, ad axillas singulas fasciculatis 1-3³. (*Mexicum*⁴.) »

55. *Bravea* LLAV. et LEX.⁵ — Flores fere *Polianthis*; receptaculo germen inferum fovente cumque perianthio supero persistente tubuloso-cylindræo plus minus arcuato; limbi lobis brevibus subæqualibus ovatis, 2-seriatis. Stamina paulo infra tubi basin affixa; filamentis filiformi-subulatis; antheris lineari-elongatis, ad medium dorsifixis versatilibus introrsis, vix v. parum exsertis, 2-rimosis. Germen vertice libero convexum; stylo gracili tubuloso, apice subdilatato stigmatoso obtuse 3-lobulato. Ovula in loculis ∞ , 2-seriata. Fructus globoso-3-quetæ, demum loculicidus; seminibus ∞ (nigrescentibus) oblongis compressis. — Herba perennis; caule basi in bulbum tunicatum dilatato; radicibus fasciculatis basilaribus sæpe tuberosis; foliis basilaribus paucis, linearibus v. longe lanceolatis ligulatis; caulinis minoribus paucis; floribus⁶ secus ramum elongatum dissite cymosis; cymis 2-floris⁷ in axilla bractæ sessilibus; bracteolis paucis. (*Mexicum*⁸.)

III. ALSTRÆMERIEÆ.

56. *Alstræmeria* L. — Flores plus minus irregulares; receptaculo extus angulato v. subalato germen fere omnino intus adnatum fovente. Perianthii annulo receptaculi marginali inserti infundibu-

453. — RED., *Lil.*, t. 147. — *Bot. Reg.*, t. 63. — *Bot. Mag.*, t. 1817. — *P. gracilis* LINK et OTT., *lc.*, t. 24. — *Amica nocturna* RUMPH.

1. In *Proc. Amer. Acad.*, XXII, 457.

2. Viridi-luteis fusco-tinctis.

3. Genus dicitur *Polianthi* proximum, habitu, foliis perianthioque distinctum.

4. Spec. 1. *P. viridescens* S.-WATS.

5. *Descr. pl. nov.*, I, 6. — ENDL., *Gen.*, n. 1292.

— K., *Enum.*, V, 848. — B. H., *Gen.*, III, 737, n. 58. — PAX, *Pflanzenfam.*, 117, fig. 79 B. — *Chelocapnia* LINK et OTT., *lc. pl. rar.*, 35, t. 18.

6. Aurantiacis, pulchellis.

7. Flore altero juniore, licet subæquali.

8. Spec. 2, 3. HERB., *Amar.*, t. 12. — HEMSL., *Diagn. pl. mex.*, 54; *Bot. centr.-amer.*, III, 337, t. 80. — *Dot. Mag.*, t. 520, 4741.

laris decidui foliola dissimilia; sepalorum petalorumque uno cæteris plus minus dissimili. Stamina 6, inæqualia ad basin perianthii epigyna; filamentis subulatis; antheris ovato-oblongis, basi intrusa affixis; rimis loculorum introrsis v. submarginalibus. Germen 3-loculare; loculis ∞ -ovulatis; stylo gracili, basi dilatato; ramis tenuibus, introrsum stigmatosis. Fructus subsphæricus v. obovoideus receptaculi margine coronatus, apice libero pyramidato-acuminatus, a basi loculicidus. Semina sphærica v. inæqui-ovoidea, sæpe rugosa, albuminosa. — Herbæ perennes; rhizomate haud tuberoso; radicibus fibrosis fasciculatis; ramis aeriis erectis simplicibus foliatis, nunc brevissimis; foliis alternis, nunc confertis v. subverticillatis, angustis v. latoribus, sessilibus v. petiolatis; limbo membranaceo v. rigido, nunc resupinato; floribus in cymas terminales umbelliformes laxas v. varie compositas dispositis; bracteis sæpe foliaceis. (*America austr. trop. et extratrop.*) — *Vid. p. 18.*

57. *Bomarea* MIRB.¹ — Flores² (fere *Alstræmeriæ*) subregulares v. regulares; perianthio infundibulari v. clavato-tubuloso; foliolis conniventibus v. superne patulis; sepalis variis, nunc in stipitem contractis crassioribus v. rigidioribus; petalis quoad formam magnitudinemque a sepalis sæpius diversis, nunc unguiculatis. Stamina, gynæceum cæteraque *Alstræmeriæ*. Fructus obovoideus, subsphæricus v. turbinatus, nunc 3-6-costatus, apice truncatus; seminibus sphæricis, nunc extus pulposis. — Herbæ perennes; rhizomate vario; radicibus sæpe tuberosis v. tuberiferis; ramis aeriis erectis herbaceis v. plerumque scandentibus v. volubilibus; foliis alternis, nunc confertis; inflorescentia terminali cymosa umbelliformi. (*America austr. andin., Mexicum*³.)

1. In *Novv. Dict. Hist. nat.*, éd. 1, I, 18; éd. 2, IV, 118. — ENDL., *Gen.*, n. 1295 a. — K., *Enum.*, V, 787. — HERB., *Amer.*, 109. — BAK., in *Trim. Journ.* (1882), 201; (1883), 373; in *Engl. Jahrb.* (1887), 212; *Amar.*, 142. — B. H., *Gen.*, III, 736, n. 55. — PAX, *Pflansensam.*, 120, fig. 83, 84. — *Collania* HERB., *Amar.*, 103, t. 8-11. — *Wichurva* ROEM., *Syn. Amar.*, 277. — K., *loc. cit.*, 781. — *Sphærine* HERB., *Amar.*, 106, t. 12, 13, 16, 18. — K., *loc. cit.*, 784. — *Vandesia* SALISB., in *Trans. Hort. Soc. lond.*, I, 322. — *Danbya* SALISB., *Gen. pl. Fragm.*, 57.

2. Speciosi, purpurei, lutescentes v. varie discolorés.

3. Spec. ad 75. R. et PAV., *Fl. per. et chil.*,

t. 287 a; 290, 291 a, 292-296. — CAV., *lc.*, t. 76. — POEPP. et ENDL., *Nov. gen. et spec.*, t. 160. — HOOK., *Bot. Misc.*, II, t. 95. — C. GAY, *Fl. chil.*, VI, 95. — LINK et OTT., *lc. pl. rar.*, t. 29. — WAWRA, in *Maxim. Reis. Bot.*, t. 29. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 1851. — SWEET, *Brit. fl. Gard.*, 228; ser. II, t. 77, 269. — HENSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 336. — S.-WATS., in *Proc. Amer. Acad.*, XXII, 457. — REG., *Gartenfl.*, t. 83. — BENTH., *Pl. Hartweg.*, 156. — MAST., in *Gardn. Chron.* (1876), I, fig. 143; (1882), t. 151; n. ser., XVII, fig. 102. — *Fl. serres*, t. 2176, 2316. — *Bot. Reg.* (1847), t. 34 (*Collania*). — *Bot. Mag.*, t. 1613, 2848, 3050, 3344, 3863, 3871, 4247 (*Collania*), 5442, 5531, 5927, 6444 6692, 7217.

58? **Leontochir** PHIL.¹ — Flores (fere *Bomarea*) subregulares; perianthii foliolis spathulatis, basi in unguem contractis, apice subemarginatis; petalis vix angustioribus. Stamina 6, subæqualia perianthioque breviora, glandulæ epigynæ segmentorum basali affixa; filamentis subulatis liberis; antheris erectis oblongis, basi intrusa affixis. Germen inferum, 3-quetrum; placeptis oppositipetalis parietalibus, 2-seriatim ∞ -ovulatis; stylo columnari, apice stigmatoso-3-lobo. Fructus siccus, 3-quetter, apice 3-valvis ibique glandulis persistentibus auctus; valvis medio placentiferis. Semina breviter ovoidea v. sphærica; albumine duro; embryone ad hilum parvo intrario. — Herba foliosa²; « radicibus tuberosis »; foliis alternis lanceolatis crebris; floribus in cymam terminalem condensato-capituliformem dispositis; bracteis parvis. (*Chili*³.)

IV. HYPOXIDEÆ.

59. **Hypoxis** L. — Flores hermaphroditi; receptaculo concavo germen intus adnatum fovente. Sepala epigyna foliacea v. colorata petalaeque totidem conformia v. tenuiora patentia, imbricata v. induplicata. Stamina 6, imo perianthio affixa eoque breviora; filamentis brevibus erectis; antheris ovatis v. linearibus, inter lobos basifixis; loculis parallelis v. basi sagittata divergentibus, inferne plus minus profunde liberis, introrsum rimosis. Germen nisi nunc apice inferum, breve v. longiuscule cylindraceum; stylo columnari erecto, sæpius brevi, nunc basi conico; ramis stigmatosis 3, elongatis, liberis v. in massam oblongam conicamve coalitis. Loculi 3, completi v. incompleti alternipetali; ovulis in quoque ∞ , 2-seriatis. Fructus sphæricus oblongus v. cylindraceus, membranaceus v. herbaceus, perianthio diu coronatus, subapice circumcissus. Semina ∞ , parva subsphærica; integumento (nigro v. fusco) crustaceo, lævi v. verruculoso, nunc varie arillato; albumine carnoso plus minus farinaceo; embryone intrario vario. — Herbæ perennes; caule subterraneo bulbiformi, tuberoso v. rhizomateo, tunicis v. fibris earum vestito; foliis basilaribus, lineari-subulatis v. brevioribus latioribus prominule nervosis; floribus

1. *Descr. nov. pl.*, II (1873), 68. — B. H., *Gen.*, III, 737, n. 56. — PAX, *Pflansenfam.*, 131. — BAK., *Amar.*, 150.

2. *Astræmeria* habitu.

3. Spec. 1. *L. Ovallei* PHIL. — BENTH., in *Hook. Icon.*, t. 1383.

in summo scapo gracili brevi v. elato spurie umbellatis v. racemosis, 1-pari-cymosis, nunc solitariis; bracteis angustis, nunc plus minus dense vestitis. (*Africa trop., austr. et ins. or., Oceania, Asia calid., America calid. utraque.*) — *Vid. p. 20.*

60. *Curculigo* GÆRTN.⁴ — Flores fere *Hypoxidis*; perianthio supra germen (*Molineria*) v. sæpius germinis rostrum tubiforme inserto, 6-partito; sepalis valvatis; petalis imbricatis v. tortis. Stamina 6, epigyna; antheris nunc in tubum coadunatis. Germen complete v. incomplete 3-loculare; stylo brevi v. longiusculo, apice stigmatoso varie dilatato-3-lobo. Ovula in loculis 2-∞. Fructus carnosus v. subsiccus indehiscens. Semina ∞, nunc pauca, varie arillata. Cætera *Hypoxidis*. — Herbæ³ perennes v. frutescentes; rhizomate crasso, tuberoso v. cormiformi; foliis basilaribus elongatis, integris v. nunc 2-fidis plicato-venosis; floribus³ in spicas v. racemos inter folia subsessiles v. longe stipitatos, nunc recurvos, densos, dispositis; bracteis imbricatis v. laxis, sæpius 1-floris. (*Asia, Africa, Oceania et America trop.*⁴)

61. *Pauridia* HARV.⁵ — Flores fere *Hypoxidis*; perianthii tubo infundibulari; lobis 6, oblongis, tubo longioribus membranaceis subæqualibus. Stamina fauci affixa 6, v. sæpius oppositipetala 3; filamentis tenuibus subulatis; antheris sagittatis inter lobos basifixis; loculis linearibus apice quoque liberis, subextrorsum v. ad margines rimosis. Germen inferum obconicum; loculis 3, ∞-ovulatis; stylo erecto, mox in ramos subulatos undique papillosos sæpeque valde inæquales 2, 3 diviso; glandulis (?) 2, 3, inæqui-capitatis longeque stipitatis supra styli basin insertis divaricatis. Fructus oblongus

1. *Fruct.*, I, 63, t. 16. — ENDL., *Gen.*, n. 1263. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVII, 122; in *Trans. Linn. Soc.*, I, 266. — B. H., *Gen.*, III, 717, n. 4. — PAX, *Pflanzenfam.*, 121, fig. 85. — *Fabricia* THUNB., in *Fabric. It. norv.*, 29 (ex ENDL.). — *Empodium* SALISB., *Gen. pl. Fragm.*, 43. — *Forbesia* ECKL., *Verz. Pfl. Samml.*, 4. — *Molineria* COLL., *Hort. ripul.*, App. II.

2. Glabræ v. varie indutæ.

3. Flavæ, parvis.

4. Spec. ad 12. JACQ., *H. schænbr.*, t. 80 (*Gethyllis*); *lc.*, t. 367 (*Hypoxis*). — RED., *Lil.*, t. 260 (*Hypoxis*). — ROXB., *Pl. corom.*, t. 13. — LABILL., *Sert. austro-caled.*, t. 24. — WIGHT, *lc.*, t. 2042-2046. — KOTSCH., *Pl. Tinn.*, t. 22.

— LODD., *Bot. Cab.*, t. 443. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 585. — R. BR., *Prodr.*, 290. — REG., *Gartenß.*, t. 771. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVII, 119 (*Molineria*). — MAXIM., in *Engl. Jahrb.* (1885), 75. — THW., *En. pl. Zeyl.*, 324. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 278. — BENTH., *Fl. austral.*, VI, 447; *Fl. hongk.*, 366. — *Bot. Reg.*, t. 345, 754, 770. — *Bot. Mag.*, t. 770, 1076, 2034. De folliculis in genere muciparis, PIROTTA, in *Ann. Ist. bot. Rom.* (1892), 1.

5. *Gen. pl. Fl. cap.*, ed. I, 341. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVII, 125. — B. H., *Gen.*, III, 716, n. 2. — R. BN., in *Bull. Soc. Linn. Par.*, 1137.

membranaceus, rectus v. arcuatus, 1-3-ocularis; seminibus parvis sphaericis ∞ . — Herbæ glabræ graciles¹; bulbi parvi tunicis paucis fibroso-reticulatis; foliis basilaribus anguste lineari-subulatis, basi latiore vaginantibus; floribus in axi aërio brevi erecto paucis; pedunculo gracili. (*Africa austr.*²)

V. BARBACENIÆ.

62. **Barbacenia** VANDELL. — Flores hermaphroditi regulares; receptaculo concavo vario germen intus adnatum fovente. Perianthii regularis tubus brevis v. supra germen plus minus evolutus; limbi lobis 6, subæqualibus erecto-patentibus (coloratis); petalis nunc tenuioribus. Stamina 6- ∞ , quorum oppositipetala 3, alternaque 3 subæqualia, v. in phalanges 2-6-andras connata; filamentis superne gracilibus subulatis, basi extus v. ultra antheras appendicula squamiformi v. petaloidea, integra, 2-loba v. lacera, stipatis; antheris basifixis linearibus, introrsum v. ad margines rimosis. Germen inferum, extus læve v. varie rugosum echinatumve; loculis nunc apice incompletis; stylo gracili, apice stigmatoso varie dilatato, capitato-3-dymo v. obtuse 3-lobo. Ovula in loculis ∞ ; placentis axilibus peltatis v. stipitatis, plus minus alte 2-lobis v. lobulato-subramosis. Fructus receptaculo varie induto v. verrucoso cinctus, apice planus, cupulatus v. prominulus annuloque marginali disciformi coronatus, ab apice v. nunc a basi plus minus alte regulariterque loculicidus. Semina ∞ , compressa, angulata v. plus minus late alata; albumine carnoso v. duro granuloso; embryo ad hilum parvo incluso. — Herbæ perennes v. frutices, nunc arborescentes; caule tenui v. lignoso, nunc crasso, varie ramoso; ramis inferne foliorum delapsorum vaginis persistentibus rigidis v. squarrosis imbricatisque dense obtectis. Folia alterna conferta, anguste v. late linearia, rigida, nunc elongata, apice nunc pungentia; pedunculis inter folia terminalibus solitariis v. pluribus, nunc valde elongatis. (*Brasilia, Guiana, Venezuela, Africa trop., Madagascaria.*) — *Vid. p. 22.*

1. *Hypoxidis minuti* THUNB. adspectu.

— ZEYH., *Pl. cap. exs.* n. 217 (*Ixia*). — SPACH,

2. Spec. 1, 2. THUNB., *Diss. Ixia*, n. 2, t. 1.

Suit. à Buff., XIII, 115.

VI. DIOSCOREÆ.

63. *Tamus* L. — Flores diœci v. nunc polygami; receptaculo masculorum brevi; perianthii urceolato-campanulati v. demum subrotati foliolis 6-8, 2-seriatim subæqualibus (viridulis), primum imbricatis; petalis sæpe paulo majoribus. Stamina 6-8, subhypogyna; filamentis brevibus liberis; antheris brevibus subovatis; loculis introrsum v. ad margines rimosis. Gynæcæum rudimentarium centrale depressum, integrum v. breviter 3, 4-lobum. Floris fœminei receptaculum ovoideum sacciforme germen intus omnino adnatum fovens; perianthii superi foliolis quam in flore masculo sæpius angustioribus. Staminodia 6-8, minuta, forma varia v. 0. Germen inferum, 3-loculare; stylo brevi erecto; ramis stigmatosis recurvis 3, emarginatis v. 2-lobulatis. Ovula in loculis 2, demum descendencia superposita; micropyle primum extrorsum supra. Fructus baccatus, cicatrice apicali perianthii notatus. Semina pauca v. 1, sphærica v. ovoidea; albumine continuo duro; embryone parvo juxta hilum incluso oblongo. — Herbæ perennes; rhizomate tuberoso crasso carnoso; ramis annuis herbaceis gracilibus volubilibus; foliis alternis petiolatis integris v. 3-lobis, basi cordata digitinerviis reticulato-venosis; floribus in racemos axillares dispositis; racemis cymigeris; cymis contractis 1-paris ad bracteas alternas axillaribus; inflorescentiis fœmineis brevioribus paucifloris. (*Europa et Asia temp., Africa bor. et ins. occid.*) — *Vid. p. 25.*

64. *Dioscorea* PLUM.¹ — Flores (*Tami*) monœci, diœci v. rarius (*Borderea*²) polygami. Stamina 6, centralia v. sub gynœcei rudimento vario inserta, nunc ima basi in columnam brevem connata, aut fertilia omnia, aut sterilia 3, ad staminodia reducta. Staminodia in flore fœmineo 3-6, v. 0. Germen inferum, 3-loculare, 3-quetrum; styli ramis liberis v. basi connatis, apice stigmatoso simplicibus v. 2-fidis reflexis. Ovula in loculorum angulo interno superposita;

1. L., *Gen.*, ed. I, n. 754; ed. VI, n. 1122.
— J., *Gen.*, 42. — GÆRTN., *Fruct.*, t. 17, fig. 4.
— K., *Enum.*, V, 325. — ENDL., *Gen.*, n. 1201.
— B. H., *Gen.*, III, 742, n. 1. — PAX, *Pflanzenfam.*, 133. — *Helmia* K., *Enum.*, V, 414. — *Hamatris* SALISB., *Gen. pl. Fragm.*, 11. — *Merione* SALISB. — *Polynome* SALISB. — *Strophis*

SALISB. — *Elephantodon* SALISB., *loc. cit.*, 12.
— ? *Sismondea* DELP., in *Mem. Ac. Tor.*, ser. 3, XIV, t. 1.

2. MIEGEV., in *Bull. Soc. bot. Fr.*, XIII, 374.
— GREN., in *Bull. Soc. bot. Fr.*, XIII, 380, t. 1.
— PAX, *loc. cit.*, n. 1. — *Epipetrum* PHIL., in *Linnæa*, XXXIII, 253.

micropyle extrorsum supera. Fructus siccus; angulis plus minus nunc valde prominentibus aliformibus; loculis dorso solutis v. nunc a costa dorsali sejunctis. Semina in loculo 1, 2, valde compressa, circumcirca, deorsum v. apice alata, nunc exalata; albumine in nucleo valde compresso suborbiculari v. irregulari carnosio v. duro, in laminas 2 solubili; embryone⁴ inter laminas parvo ad hilum propinquo; cotyledone subterminali sæpius dilatata. — Herbæ perennes; tubere epigæo v. hypogæo vario, nunc magno; ramis herbaceis alte scandentibus volubilibus, raro humilibus procumbentibus (*Borderea*); foliis alternis v. oppositis, sæpe cordatis, nunc digitatis; inflorescentia (sæpe *Tamī*) variabili; floribus⁵ ad axillas bractearum cymosis v. solitariis; bracteola ad florem solitarium sæpe laterali 1. (*Orbis utriusque reg. calid., America extratrop., Reg. Medit.*³)

65? *Testudinaria* SALISB.⁴ — Flores (*Dioscoreæ*⁵) diœci v. polygami; perianthio masculo 6-fido. Sepala petalaeque fœminea libera. Staminodia fructusque *Dioscoreæ*; seminibus sursum alatis. — Plantæ longævæ; caudice epigæo magno hemisphærico solido carnosio-lignoso, dense tessellato-lobato; ramis tenuibus alte scandentibus; foliis alternis deltoideis v. caudatis; inflorescentiis axillaribus cæterisque *Dioscoreæ*. (*Africa austr.*⁶)

66. *Bajania* L.⁷ — Flores (*Dioscoreæ*) diœci; perianthio masculo nunc profunde 6-fido. Stamina plus minus alte affixa. Germen rudimentarium depressum breviter pulvinato-3-lobum. Perianthii fœminei foliola libera. Staminodia minuta v. 0. Germen 3-loculare; loculis 2

1. BECC., in *N. Giorn. bot. ital.*, II, 149. — SOLMS., in *Bot. Zeit.* (1878), t. 4.

2. Parvis inconspicuis, viridulis, luteolis, albidis v. purpurascentibus.

3. Spec. ad 120. L., *H. Cliff.*, t. 28. — JACQ., *Ic. rar.*, t. 626, 627. — SALISB., *Par.*, t. 17. — GRISEB., in *Mart. Fl. bras.*, III, 1, 25, t. 6. — WIGHT, *Ic.*, t. 810-815, 879, 2060. — COLL., *Pl. chil. rar.*, in *Mem. Ac. Tor.*, XXIX, 12, t. 51, fig. 2. — C. GAY, *Fl. chil.*, VI, 50. — HOOK., *Icon.*, t. 678. — HOCHST., in *Flora* (1844), Beil., 3 (*Botriosycios*). — VELL., *Fl. flum.*, Atl., X, t. 121. — WAWR., in *Pr. Max. Reis.*, t. 88. — PHIL., in *Linnaea*, XXIX, 64; XXXIII, 254. — HEMSLE., *Bot. centr.-amer.*, III, 353; in *Journ. Linn. Soc.*, XX, 333. — S.-WATS., in *Proc. Amer. Acad.*, XXII, 458. — MAUR., in *Journ. Mor.* (1889), 267, fig. 11. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XX, 271; XXII, 85, 528. — FRANCH. et SAV., *En. pl. jap.*, II, 46. — FRANCH., *Pl.*

David., I, 300. — HOOK. f., *Fl. brit. Ind.*, VI, 288. — ENGL., *Hochgebirgsfl. trop. Afr.*, 171. — BENTH., *Fl. hongk.*, 367. — BOISS., in *Rev. hort.* (1893), 15. — ALB., in *Bull. Herb. Boiss.*, I, 263. — HOOK. *Icon.*, t. 1398, 1868. — *Bot. Mag.*, t. 2825, 6409.

4. In *Burch. Trav.*, II, 147. — SPRENG., *Gen.*, II, 708 (*Sarmentaceæ*). — HERB., *Amar.*, 67, 122 (*Agaveæ*). — K., in *Abh. Berl. Akad.* (1848), 55; *Enum.*, V, 440. — B. H., *Gen.*, III, 744, n. 2. — PAX, *Pflanzenfam.*, 135, fig. 92.

5. Cujus potius sectio?

6. Spec. 2. *Bot. Reg.*, t. 921. — *Bot. Mag.*, t. 1347 (*Tamus*).

7. *Gen.*, ed. I, n. 753; ed. VI, n. 1121. — J., *Gen.*, 43 (*Asparagææ*). — GÆRTN., *Fruct.*, I, t. 14. — ENDL., *Gen.*, n. 1200. — K., *Enum.*, V, 415. — HERB., *Amar.*, 68, 123 (*Agaveæ*). — B. H., *Gen.*, III, 744, n. 3. — PAX, *Pflanzenfam.*, 136.

sterilibus plus minus evolutis; tertio 2-ovulato. Fructus ad carpellum alatum 1 reductus, ala membranacea erecta oblongo-trapezoidea v. subfalcata coronatus; alis carpellorum sterilium plus minus evolutis ad basin lateralibus summoque receptaculo arcuato et perianthii reliquias siccitas superatis. Semen compressum exalatum cæteraque *Dioscoreæ*. — Plantæ perennes volubiles; foliis cordato-hastatis v. linearibus inflorescentiisque *Dioscoreæ*. (*Antillæ*¹.)

67. *Stenomeris* PL.² — « Flores hermaphroditi; perianthii tubo supra germen urceolato; fauce nunc constricta et intus annulo prominulo aucta; limbi lobis linearibus v. setaceo-acuminatis subcirrhiformibus. Stamina 6, sub apice tubi 1-seriatim affixa deflexa; filamentis brevibus; antherarum connectivo ultra loculos in appendicem filiformem cum stigmate adhærentem (*Nematanthera*³) v. (*Mystranthera*⁴) in appendicem filiformem apice abrupte cochleatam producto. Germen inferum, 3-loculare; stylo brevi crasso obpyramidato, 3-ptero; lobis lateralibus longitudinaliter sulcatis. Ovula in loculis ∞ , 2-seriatim superposita. Fructus breviter stipitatus, valde elongatus, primum perianthio marcescente coronatus, longitudinaliter 3-alatus. Semina⁵ ∞ , ala membranacea semipellucida instructa, circuitu securiformia, compressa, ad embryonem utrinque lineari-oblongo-impressa; impressione longitudinaliter 3, 4-sulca. — Herbæ perennes volubiles glabræ (siccitate nigrescentes); foliis alternis petiolatis cordato-acuminatis, dissite ∞ -nervibus; venis transversis ∞ ; inflorescentiis axillaribus laxis composite racemosis. (*Ins. Philippin.*⁶) »

68? *Oncus* LOUR.⁷ — « Flores hermaphroditi; perianthii subcampanulati pilosi tubo oblongo, 6-gono; fauce ampliata; limbi parvi reflexi lobis subulatis 6. Stamina 6, imis lobis affixa; filamentis brevissimis; antheris minimis subrotundis. Germen⁸ oblongum, 6-sulcum; styli brevis ramis oblongis reflexis, apice 2-fidis. Fructus⁹ baccatus, 6-gonus; seminibus subrotundis ∞ . — Frutex scandens ramosus

1. Spec. 5, 6. PLUM., *Amer.*, ed. BURM., t. 155. — GRISEB., *Fl. brit. W.-Ind.*, 588. — BENTH., in *Hook. Icon.*, t. 1392.

2. In *Ann. sc. nat.*, sér. 3, XVIII, 319. — B. H., *Gen.*, III, 745, n. 5. — PAX, *Pflanzenfam.*, 136. — TAUB., in *Engl. Jahrb.* (1893), n. 38. — *Halloschulzia* O. K., *Revis.*, 705.

3. TAUB., *loc. cit.*

4. TAUB., *loc. cit.*

5. « *Brunnea*, reticulato-venosa. »

6. Spec. 2. BECC., in *N. Giorn. bot. ital.*, II, 8, t. 2. — WALP., *Ann.*, VI, 41.

7. *Fl. cochinch.*, 194. — ENDL., *Gen.*, n. 1203. — K., *Enum.*, V, 456. — B. H., *Gen.*, III, 745, n. 7. — PAX, *Pflanzenfam.*, 136. — *Oncorhiza* PERS., *Syn.*, I, 374.

8. « Media parte tubo perianthii coalitum. »

9. « *Corallinus*. »

ecirrhosus; tubere maximo ovoideo inæquali farinoso; foliis alternis subrotundis cordato-acuminatis; spicis subterminalibus tenuibus laxis; bracteis 2 parvis basin perianthii amplexantibus. (*Cochinchina*¹.) »

69. *Petermannia* F. MUELL.² — Flores hermaphroditi; perianthio supra germen subpartito; foliolis 6, æqualibus, v. inferioribus angustioribus, oblongis patenti-reflexis. Stamina 6, imis foliolis affixa; filamentis brevibus; antheris erectis oblongis extrorsis. Germen inferum ovoideum, 1-loculare; placentis parietalibus 3, ∞-ovulatis; stylo columnari erecto, apice stigmatoso capitato. Fructus baccatus. — Frutex ramosus scandens; caule sæpe minute aculeato; foliis alternis petiolatis oblongo-lanceolatis acuminatis rigidis; nervis pennatis v. parallelis ∞, reticulato-venosis; floribus in racemulos laxè cymulolos laterales v. oppositifolios dispositis; rhachi flexuosa, nunc in cirrhum ramosum mutata. (*Australia*³.)

70. *Trichopus* GÆRTN.⁴ — Flores hermaphroditi regulares; receptaculo lageniformi germen inferum concavitate omnino adnatum fovente; collo brevi apice perianthium campanulatum alteque 6-fidum gerente. Stamina 6, imo perianthio affixa; filamentis brevissimis; antheris latis brevibus; connectivo ultra loculos in appendicem rectam producto. Ovula in loculis 2, superposita descendencia. Fructus ovoideo-3-queter perianthio emarcido coronatus, submembranaceus indehiscens. Semina oblonga crassa rugoso-subruminata, hinc profunde involuto-sulcata fissura media transversa notata; albumine cartilagineo; embryone prope ad hilum incluso. — Herba perennis; rhizomate horizontali brevi; ramis aeriis brevibus erectis simplicibus et apice nunc radicante flores pedicellatos cymosos gerente cum folio 1 petiolato, cordato-ovato v. lineari-lanceolato, nunc 3-angulari, 3-7-nervato reticulato-venoso⁵. (*India or., Zeylanica*⁶.)

1. Spec. 1. *O. esculentus* LOUR. (An congen. *Stenomeris*?).

2. In *Benth. Fl. austral.*, VI, 462; *Fragm. phyt. Austral.*, II, 176. — B. H., *Gen.*, III, 746, n. 8. — PAX, *Pflanzenfam.*, 136.

3. Spec. 1. *Smilacearum* habitu. *P. cirrhosa* F. MUELL. — Hook. *Icon.*, t. 1391.

4. *Fruct.*, I, 44, t. 14. — B. H., *Gen.*, III, 745, n. 6. — BECC., in *N. Giorn. bot. ital.*, II, 13. — PAX, *Pflanzenfam.*, 136. — *Trichopodium* LINDL., *Bot. Reg.*, sub t. 1543. — ENDL., *Gen.*,

n. 2165. — *Podianthus* SCHNITZL., in *Bot. Zeit.* (1843), 739.

5. Genus sæpe ad *Aristolochieas*, ob habitum ramosque sere *Asari*, relatum.

6. Spec. 1. *T. zeylanicum* GÆRTN. — BEDD., *lc. pl. ind. or.*, t. 290. — Hook. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 297. — *Trichopodium zeylanicum* THW., *En. pl. Zeyl.*, 291, 443. — *T. cordatum* LINDL. — *T. intermedium* LINDL. — *T. angustifolium* LINDL. — *Podianthus arifolius* SCHNITZL.

VII. CONOSTYLEÆ.

71. *Conostylis* R. BR. — Flores hermaphroditi regulares; receptaculo subcampanulato germen totum v. ex parte concavitate fovente; tubo ultra germen breviter cylindraceo, nunc raro brevissimo; limbi lobis 2-seriatis, haud contiguis v. induplicatis; petalis sæpe angustioribus, margine tenuioribus. Stamina 6, tubo affixa; filamentis brevibus cum connectivo continuis; antheris lineari-oblongis; loculis adnatis distinctis, introrsum rimosis. Germen apice conico v. altius liberum, 3-loculare; stylo tubuloso, apice stigmatoso 3-dentato v. breviter 3-fido. Ovula in loculis ∞ , placentæ stipitatæ v. peltatæ affixa. Fructus apice libero loculicidus. Semina oblonga rugulosa; embryo prope hilum parvo, albumine carnosio vix intruso. — Herbæ perennes; rhizomate stolonifero v. prolifero; ramis aeriis variis; foliis ad basin confertis, sæpe distichis, linearibus subteretibus, v. a latere complanatis rigidulis; scapo inter folia brevi, 1, 2-floro, v. elongato ramoso squamato; floribus in cymas densas v. glomerulos spurie capitatos dispositis, cum inflorescentia varie tomentosis v. plumosovillosis. (*Australia.*) — *Vid. p. 27.*

72. *Styloconus* H. BN¹. — Flores fere *Conostylidis*; perianthii cylindracei receptaculum obconicum superantis tubo longo crasso subcoriaceo, extus stellato-tomentoso, intus lamina tenui adnata disciformi induto. Lobi 6, cum tubo continui dentiformi-3-angulares, valvati v. subinduplicati. Stamina 6, ad imos dentes affixa²; filamentis brevissimis ovato-acuminatis; antheris ovato-oblongis, inter lobos basifixis; loculis basi liberis, introrsum rimosis. Germen nisi apice conico perianthio intus adnatum semi-inferum, ast inter angulos liberum³; stylo tenui erecto tubuloso, apice stigmatoso exserto vix incrassato obtuseque 3-lobulato. Ovula in loculis ∞ , placentæ axili adnatæ affixa descendente. Fructus perianthio persistente inclusus apiceque conico loculicidus; seminibus paucis oblongis striatis. — Herba perennis; rhizomate longe radicante; ramis aeriis brevibus simplicibus v. basi ramulosis; foliis basilaribus distichis equitantibus.

1. *Blancoa* LINDL., *Swan Riv. App.*, 45 (non BL., non WENDL.). — ENDL., *Gen.*, n. 1258¹. — B. H., *Gen.*, III, 676, n. 13. — PAX, *Flaensensfam.*, 124.

2. In tubo decurrenti-adnata.

3. Foveolæ unde inter germen receptaculumque profundæ 3, superne plus minus late hiantes, dorso sæpius compressæ.

confertis lineari-subulatis integris rigidulis, a latere complanatis; floribus¹ subpendulis in racemum spurium brevem simplicem v. parce ramosum dispositis. (*Australia austro-occid.*²)

73. Tribonanthes ENDL.³ — Flores fere *Conostylidis*; perianthii foliolis 6, basi in tubum brevem connatis; limbis brevibus patulis v. longioribus reflexis. Stamina 6, brevia erecta, in tubum decurrenti-adnata; antheris sagittatis erectis introrsis, lamina dorsali subintegra v. dentata, tenui vel crassa, auctis. Germen ex parte inferum, apice conico liberum cumque stylo sæpius brevi tubuloso productum. Ovula ∞ , placentæ axili prominulæ affixa. Fructus perianthio inclusus loculicidus; seminibus ∞ , compressis obovatis. — Herbæ perennes; rhizomate brevi tubera plura gerente; ramis aeriis simplicibus erectis; foliis linearibus paucis; floribus in summo ramo terminalibus, solitariis v. capituliformi-cymosis; bracteis variis cum floribus et inflorescentia dense varieque vestitis⁴. (*Australia austro-occid.*⁵)

74. Phlebocarya R. BR.⁶ — Flores fere *Conostylidis*; perianthii foliolis 6, oblongis subæqualibus receptaculi margini supra germen affixis. Stamina 6, imis foliolis interiora; filamentis brevibus acuminatis; antheris lineari-oblongis basifixis erectis; loculis margine v. subintrorsum rimosis. Germen inferum, apice conico tantum liberum et in stylum subulatum apice stigmatoso vix incrassatum productum. Septa inter loculos 3, cito ex parte evanida; placenta unde spurie centralis. Ovula in loculis solitaria, columnæ centrali ex parte adnata. Fructus indehiscens perianthio coronatus. Semen sæpius fertile 1, albuminosum; cæteris rudimentariis abortivis. — Herbæ perennes, sæpius pilosæ; rhizomate brevi; foliis basilaribus fasciculatis lineari-subulatis rigidulis, sæpe ciliatis; ramis aeriis folio brevioribus tenuibus ramulosis; floribus eorum ad apices laxè v. dense composito-cymosis. (*Australia austro-occid.*⁷)

1. Majusculis, dense vestitis.

2. Spec. 1. *S. canescens*. — *Blancoa canescens* LINDL. — ENDL., in *Lehm. Pl. Preiss.*, II, 24. — BENTH., *Fl. austral.*, VI, 441. — *Conostylis canescens* F. MUELL., *Fragm.*, VIII, 19.

3. *Nov. stirp. Dec.*, 27; *Gen.*, n. 1259; *Iconogr.*, t. 109. — B. H., *Gen.*, III, 675, n. 11. — PAX, *Pflanzenfam.*, 124.

4. Sæpius albidis.

5. Spec. 5. LINDL., *Swan Riv. App.*, 44. — ENDL., in *Lehm. Pl. Preiss.*, II, 27. — BENTH., *Fl. austral.*, VI, 426.

6. *Prodr.*, 301. — ENDL., *Gen.*, n. 1260. — B. H., *Gen.*, III, 675, n. 10. — PAX, *Pflanzenfam.*, 123.

7. Spec. 3. ENDL., in *Lehm. Pl. Preiss.*, II, 29. — BENTH., *Fl. austral.*, VI, 424; in *Hook. Icom.*, t. 1175, 1176.

75. *Anigozanthos* LABILL.¹ — Flores plus minus zygomorphi v. subregulares; perianthii tubo cylindraceo plus minus incurvo, extus tomentoso², hinc nunc profunde fisso³, lamina subglandulosa intus vestito⁴; lobis 6, æqualibus v. inæqualibus, demum 1-seriatis⁵, valvatis. Stamina 6, e summo tubo emergentia; filamentis brevibus; antheris ovatis v. oblongis subbasifixis; connectivo dorso incrassato, apice varie appendiculato; loculis introrsis, longitudinaliter rimosis⁶. Germen inferum, apice plano v. convexo radiatim 3-sulcum⁷; stylo gracili elongato, apice stigmatoso leviter incrassato obscureque 3-lobo. Ovula ∞, loculorum angulo interno inserta, incomplete anatropa; micropyle extrorsum infera; chalaza incrassata. Capsula intra perianthium persistens, ad apicem loculicida. Semina ∞, perfecta pauca, extus striata v. rugosa; albumine copioso. — Herbæ perennes; rhizomate crasso; foliis plerumque basilaribus linearibus, nunc teretibus, alternis; floribus⁸ ad summum pedunculum ramosum in cymas uniparas dispositis. (*Australia austro-occid.*⁹)

76. *Macropidia* DRUMM.¹⁰ — Flores fere *Anigozanthi*; perianthii tubulosi limbo valde obliquo; lobis 6, angustis demumque patentibus, subvalvatis. Stamina 6, fauci affixa; filamentis longe subulatis; antheris lineari-oblongis. Germen inferum, 3-loculare, vertice truncatum; stylo gracili elongato, ad apicem stigmatosum clavato. Ovula in loculis solitaria ventrifixa. « Fructus siccus, demum a basi 3-valvis; septis crassis duplicatis induratis et in axi post semina delapsa persistentibus. Semina 3-quetra cum valvis adnatis sigillatim decidua; albumine carnoso; embryone ad basin minuto. » — Herbæ perennes; rhizomate, ramis aeriis cæterisque *Anigozanthi*; foliis longis ensiformibus striatis; floribus¹¹ in cymas 1-laterales secus ramos dichotomos

1. *Voy.*, 409, t. 22. — ENDL., *Gen.*, n. 1257. — B. H., *Gen.*, III, 676, n. 14. — H. BR., in *Bull. Soc. Linn. Par.*, 595. — PAX, *Pflanzenfam.*, 124, fig. 67, 86. — *Anigosia* SALISB., in *Trans. Hort. Soc. Lond.*, 1, 327. — *Schwægrichenia* SPRENG., *Syst.*, II, 26.

2. Indumento piloso-lanato.

3. Fissura inter stamina 2 concavitati tubi respondente loculumque germinis medium superante.

4. Androcæi forte basi adnata.

5. Petalis nihilominus post calycem ortis.

6. Antheris nunc tarde apiculatis.

7. Glandula septali evoluta sulco cuique respondente.

8. Viridulis, flavescentibus, rubris v. purpurascanti-fuscatis, nunc speciosis.

9. Spec. 6. RED., *Lil.*, t. 176. — SALISB., *Par. lond.*, t. 97. — LINDL., *Swan Riv. App.*, t. 6. — SWEET, *Brit. fl. Gard.*, ser. II, t. 265. — LEME, *Jard. fleur.*, t. 40. — MAUND, *Bot.*, t. 67. — PAXT., *Mag.*, V, 271, c. ic. — R. BR., *Prodr.*, 301. — ENDL., in *Lehm. Pl. Preiss.*, II, 25. — *Bot. Reg.*, t. 2102; (1838), t. 37. — *Bot. Mag.*, t. 1151, 3875, 4180, 4507.

10. In *Hook. Kew Journ.*, VII, 57. — B. H., *Gen.*, III, 677, n. 15. — PAX, *Pflanzenfam.*, 124.

11. Speciosis, indumento plumoso-lanato plus minus atrato, uti inflorescentia plerumque fere tota, obtectis.

inflorescentiæ valde composito-ramosæ dispositis. (*Australia austro-occid.*¹⁾)

77. **Lanaria** AIT.² — Flores fere *Conostylidis*; perianthio ultra germen tubuloso; lobis longioribus 6; petalis paulo longioribus. Stamina 6; filamentis subulatis lobis adnatis; antheris dorsifixis oblongis versatilibus, introrsum rimosis. Germen receptaculi concavitati nisi summo apice adnatum; loculis incompletis 3; stylo subulato, apice stigmatoso breviter 3-lobo. Ovula in loculis 2, collateraliter adscendentia; micropyle extrorsum infera. Fructus perianthio coronatus, indehiscens v. vix dehiscens. Semen 1, sphaericum; testa³ coriaceo-subcrustacea; albumine carnosio; embryone minuto. — Herbæ perennes; rhizomate brevi lignoso; ramis aeriis simplicibus basi foliorum reliquiis obtectis. Folia subbasilaria linearia plana rigida venosa; inflorescentia⁴ terminali valde composite racemosa; ramis cymigeris racemuliformibus. (*Africa austr.*⁵⁾)

78. **Lophiola** KER.⁶ — Flores fere *Conostylidis*; perianthii campanulati lobis 6, longiuscule acutatis, valvatis. Stamina 6, imis lobis affixa iisque breviora; filamentis longiusculis subulatis; antheris oblongis, basi inter lobos breves affixis oblongis introrsis, demum plus minus recurvis. Germen ex parte inferum, apice conico liberum; stylo gracili tubuloso, apice stigmatoso vix incrassato. Ovula ∞ , placentæ axili adnatæ 2-seriatim affixa adscendentia. Fructus perianthio inclusus, ab apice loculicidus; seminibus adscendentibus ∞ , rectis v. arcuatis⁷; albumine carnosio; embryone ad basin leviter intruso. — Herba perennis; rhizomate stolonifero; foliis basilaribus paucis distichis equitantibus linearibus; floribus in racemum terminalem compositum subcorymbosum dispositis; ramis cymigeris; cymis ex parte 1-paris; inflorescentia tota dense albido-lanata. (*America bor.*⁸⁾)

1. Spec. 1. *M. fumosa* DRUMM. — BENTH., *Fl. austral.*, VI, 447. — *Anigozanthos fuliginosus* HOOK., *Bot. Mag.*, t. 4291.

2. *H. kew.*, I, 462. — RÖEM. et SCH., *Syst.*, VII, 294. — ENDL., *Gen.*, n. 1256. — SCHNITZL., *Iconogr.*, I, t. 62. — B. H., *Gen.*, III, 675, n. 9. — PAX, *Pflanzenfam.*, 123. — *Argolasia* J., *Gen.*, 60. — *Augea* RETZ., *Obs.*, V, 3 (nom.).

3. Nigra nitida.

4. Dense lanata; pilis plumosis nunc cum membrana florum exteriori solutis.

5. Spec. 1. *L. plumosa* AIT. — *Argolasia lanata* LAMK., *Ill.*, t. 34.

6. In *Bot. Mag.*, t. 1596 (1814). — ENDL., *Gen.*, n. 1252. — HERB., *Amar.*, 65, 86. — SPRENG., *Syst.*, II, 27. — RÖEM. et SCHULT., *Syst.*, VII, 282. — B. H., *Gen.*, III, 677, n. 16. — PAX, *Pflanzenfam.*, 124.

7. Extus albidis.

8. Spec. 1. *L. americana*. — *L. aurea* KER. — A. GRAY, *Man.*, ed. V, 514. — *Conostylis americana* PURSH., *Fl. bor.-amer.*, t. 6.

79. *Conanthera* R. et PAV.¹ — Flores² regulares; receptaculo obconico-infundibulari, germen intus ad dimidium concavitati adnatum fovente. Perianthii receptaculi margini inserti tubus brevis v. brevissimus; lobi 6, subæquales, imbricati, demum patentes v. reflexi. Stamina 6; filamentis brevibus perianthii tubo adnatis; antheris lineari-lanceolatis in tubum conniventibus; connectivo ultra loculos in acumen integrum v. 2-fidum producto; loculis longitudinaliter rimosis conniventibus. Germen semi-inferum; stylo subulato, apice stigmatoso parvo. Ovula in loculis ∞ , 2-seriata, subhorizontalia v. obliqua. Fructus magna ex parte liber, ovoideo-3-queter, apice loculicidus. Semina pauca ovoidea; albumine carnoso; embryo longiuscule intruso. — Herbæ perennes; bulbo tunicato; tunicis fibroso-reticulatis; foliis paucis basilaribus linearibus; inflorescentia terminali laxè ramosa; cymis ad ramulos laxis racemiformibus bracteatis. (*Chili*³.)

80. *Tecophilæa* BERT.⁴ — Flores⁵ subregulares; receptaculo obovoideo concavo, germen concavitati adnatum fovente. Perianthii tubus receptaculi margini insertus cylindræus; limbi demum patentes lobis 6, 2-seriatis subæqualibus imbricatis; sepalis nunc apiculatis. Stamina 6, fauci affixa, quorum perfecta 3, 1-lateralia; filamentis brevissimis; antherarum hinc basi calcaratarum loculis confluentibus, utrinque ab apice breviter rimosis. Staminodia 3, altero latere affixa erecta oblonga apiculata. Germen fere omnino inferum, apice conico solo liberum; stylo tenui, apice parum inæquincrassato stigmatoso. Ovula in loculis 3 completis v. incompletis ∞ , 2-seriata. Fructus vertice loculicidus; seminibus ∞ , carnoso-albuminosis; embryo longiuscule intruso. — Herbæ perennes; bulbo fibroso-tunicato; foliis basilaribus paucis v. 1, lineari-lanceolatis, basi longe vaginantibus; scapo inter folia parvo aphylo, 1- v. paucifloro. (*Chili*⁶.)

1. *Fl. per. et chil.*, III, 68, t. 301. — ENDL., *Gen.*, n. 1156. — B. H., *Gen.*, III, 679, n. 22. — PAX, *Pflanzenfam.*, 122. — H. BN, in *Bull. Soc. Linn. Par.*, 1096 h. — *Cumingia* DON, in *Sweet Brit. fl. Gard.*, t. 257; ser. II, t. 88.

2. Cærulei, elegantes.

3. Spec. ad 3. MIERS, in *Trans. Linn. Soc.*, XXIV, 506, 507, t. 51. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVII, 493. — HOOK., *Exot. Fl.*, t. 214. — C. GAY, *Fl. chil.*, 129; 130 (*Cummingia*). — Lodd., *Bot. Cab.*, t. 904. — *Bot. Reg.*, t. 1193. — *Bot. Mag.*, t. 2496.

4. COLL., in *Mem. Acad. sc. torin.*, XXXIX, 19, t. 55. — ENDL., *Gen.*, n. 1248¹. — B. H., *Gen.*, III, 680, n. 25. — PAX, *Pflanzenfam.*, 122. — *Distrepta* MIERS, *Trav. chil.*, II, 529; in *Trans. Linn. Soc.*, XXIV, 504. — *Phyganthus* PÆPP. et ENDL., *Nov. gen. et spec.*, II, 71, t. 200. — *Pæppigia* KZE, in *Reichb. Cons.*, 212^a (non alior.).

5. Cærulei, suaveolentes.

6. Spec. 2. C. GAY, *Fl. chil.*, VI, 35. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVII, 495. — REG., *Gartenfl.*, t. 718. — *Boll. Soc. ort. ital.*, IX, t. 6.

81. *Zephyra* DON.¹ — Flores² fere *Conantheræ*; receptacul obconico concavo angulato; perianthii basi anguste tubulosi limbo dilatato; lobis 6, oblongis, 2-seriatim subæqualibus. Stamina 6, fauci affixa, 2-morpha, scilicet 2, 3 ad staminodia reducta linearia apiculata; perfecta autem 3, 4, quorum sæpe collateralia 3; filamentis brevibus; antheris suberectis, sub medio dorsifixis, ovoideis, basi intus calcaratis; loculis confluentibus, ab apice breviter v. longiuscule rimosis. Germen basi inferum et receptaculi concavitati ibi adnatum, cæterum liberum, 3-loculare; stylo subulato, apice stigmatoso tenui; ovulis in loculo ∞ , 2-seriatis. Fructus ovoideo-3-queter, basi turbinate receptaculo adnatus, loculicidus. Semina ovoidea ∞ ; albumine carnoso; embryone longiuscule intruso. — Herba perennis; ϵ rhizomate profunde hypogæo; caule aërio erecto, superne ramoso; foliis paucis linearibus, v. infimis lanceolatis, basi longe vaginatis; cymis laxis corymbiformibus compositis. » (*Chili*³.)

82. *Cyanella* L.⁴ — Flores irregulares v. subregulares; receptaculo hemisphærico-cupulari germinis basin adnatam intus fovente. Perianthium margini insertum, basi annulari gamophyllum; foliolis membranaceis cæterum subæqualibus patentibus. Stamina 6, perianthii annulo adnata, aut æqualia, aut sæpius inæqualia dimorpha; uno plerumque majore; filamentis brevibus erectis; antheris subbasifixis lineari-elongatis, apice obtuso (v. in stamine maximo 2-apiculato) breviter 2-valvatim dehiscentibus⁵; loculis parallelis introrsum longitudinaliter 1-sulcatis. Germen semi-inferum; stylo erecto, apice stigmatoso parvo. Ovula in loculis ∞ ⁶, 2-seriatim adscendentia. Fructus ovoideo-3-queter, loculicidus. Semina ovoidea; albumine carnoso; embryone intruso. — Herbæ perennes; bulbo fibroso-tunicato; foliis basilaribus, v. superioribus paucis, lineari-lanceolatis; ramis aëriis simplicibus v. parce ramosis; floribus laxè spurieque racemosis cymosis; bracteis parvis v. 0. (*Africa austr.*⁷)

1. In *Edinb. N. Phil. Journ.*, XIII, 236. — MIRS, in *Trans. Linn. Soc.*, XXIV, 503, t. 53. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVII, 495. — B. H., *Gen.*, III, 680, n. 24. — PAX, *Pflanzenfam.*, 122. — Dicolus PHIL., *Descr. pl. nuev.*, II (1873), 74.

2. Cærulei, pulchelli.

3. Spec. 1. *Z. elegans* DON.

4. *Syst.*, ed. X, 985 (1759); *Gen.*, ed. VI, n. 420. — GÆRTN., *Fruct.*, t. 17. — ENDL., *Gen.*, n. 1144. — K., *Enum.*, IV, 635. — BAK., in *Journ.*

Linn. Soc., XVII, 496. — B. H., *Gen.*, III, 679, n. 23. — PAX, *Pflanzenfam.*, 122. — *Trigella* SALISB., *Gen. pl. Fragm.*, 46. — *Pharettella* SALISB., *loc. cit.*, 47.

5. Sic dictis poricidis.

6. Albis, roseis, violaceis v. flavis.

7. Spec. 4, 5. JACQ., *lc. rar.*, t. 447; *H. vindob.*, II, t. 35. — RED., *Lil.*, t. 373. — ANDR., *Bot. Rep.*, t. 141. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 732. — SAUND., *Ref. bot.*, t. 259. — *Bot. Reg.*, t. 1111. — *Bot. Mag.*, t. 568, 1252.

83. *Cyanastrum* OLIV.¹ — Flores fere *Conantheræ*; receptaculo breviter cupulari²; perianthii foliolis 6, æqualibus ovato-oblongis patentibus. Stamina 6, fertilia, imis foliolis affixa; filamentis subulatis; antheris basifixis linearibus, basi 2-dentatis, apice 2-poricidis. Germen receptaculi cupulæ semi-adnatum, superne liberum, 3-lobum; stylo inter lobos centrali gracili, apice stigmatoso 3-dentulato. Ovula in loculis 2, collateraliter adscendentia anatropa; micropyle extrorsum infera. Fructus...? — Herba perennis; bulbis solidis in rhizomate superpositis subsphæricis nudis; folio in ramis aeriis singulis 1, longe petiolato, ovato-cordato; nervis arcuatis; venulis transversis; foliis incompletis paucis v. 1 in ramo inferioribus ad vaginam reductis; floribus³ in summo ramo racemosis paucis v. 1, 1-bracteatis; pedicello bracteæ nunc adnato. (*Africa trop. occid.*⁴)

84. *Aletris* L.⁵ — Flores fere *Conostylidis*; receptaculo obconico germen ex parte (nunc minima) concavitate fovente. Perianthium margini receptaculi insertum gamophyllum, tubulosum v. subcampanulatum; lobis 6, brevibus erectis; exterioribus sæpe crassioribus apiceque glandula auctis. Stamina 6, ad loborum basin affixa; filamentis brevissimis; antheris dorsifixis introrsis, 2-rimosis. Germen basi v. ad medium inferum; stylo brevi v. elongato, apice stigmatoso obtuso, crassiusculo v. 3-lobulato. Ovula ∞ , placentæ ellipsoideo-oblongæ subpeltatæ affixa. Fructus inclusus, basi inferus, loculicidus; seminibus ∞ , parvis oblongis albuminosis. — Herbæ perennes; rhizomate brevi; radicibus fasciculatis; foliis basilaribus linearibus v. lanceolatis; caudice aereo simplici, cæterum aphylo; floribus⁶ in spicam terminalem dispositis crebris, breviter pedicellatis, 1-bracteatis et lateraliter 1-bracteolatis. (*America bor., Asia austro-or., Borneo*⁷.)

85. *Odontostomum* TORR.⁸ — Flores fere *Aletridis*; receptaculo vix concavo imumque germen fovente. Perianthii tubus longe cylin-

1. In *Hook. Icon.*, t. 1965 (non CASS.).

2. Sub cupula hemisphærico carnosulo.

3. Cæruleis, pulchellis.

4. Spec. 1. *C. cordifolium* OLIV.

5. *Amæn.* (1751); *Gen.*, ed. VI, n. 428. — J., *Gen.*, 51 (*Asphodeleæ*). — GÆRTN., *Fruct.*, t. 15. — ENDL., *Gen.*, n. 1259. — B. H., *Gen.*, III, 677, n. 17. — ENGL., *Pflanzenfam.*, 85 (*Liliacæ*). — *Stachyopogon* KL., in *Pr. Waldem. Reis. Bot.*, 49, t. 94.

6. Parvis, dense farinoso-lepidotis.

7. Spec. ad 8. W., *H. berol.*, t. 8 (*Wurmbea*). — ROEM. et SCH., *Syst.*, VII, 626. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 264. — FR. et SAV., *En. pl. jap.*, II, 46. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 1161. — *Bot. Mag.*, t. 1418.

8. *Bot. Whipple Exped.*, 94 (150), t. 24. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XI, 436 (*Odontostemum*). — B. H., *Gen.*, III, 680, n. 28. — ENGL., *Pflanzenfam.*, 36 (*Liliacæ*).

draceus; limbi subcampanulati lobis 6, 2-seriatis, demum patentireflexis. Squamellæ 6, cum lobis alternantes subulatæ et cum staminibus fauci affixis. Stamina 6: oppositipetala breviora; filamentis brevibus, basi in annulum connatis; antheris erectis basifixis brevibus crassis ovoideo-subdidymis, apice valvulis brevibus dorsali ventralique 2 dehiscentibus¹. Germen nisi ima basi adnata liberum; stylo gracili, apice stigmatoso parvo. Ovula in loculis 2, collateraliter adscendentia hemitropa; micropyle extrorsum infera. Capsula, basi excepta, supera, 3-dyma loculicida; seminibus in loculo quoque 1, 2, adscendentibus; albumine carnoso; embryone longiusculo intruso. — Herba perennis; bulbo fibroso-tunicato; caule erecto ramoso; foliis infra medium in caule confertis linearibus, longe vaginantibus; floribus² secus ramulos racemosis, 1-bracteatis; pedicello postice bracteolam linearem elevatam gerente. (*California*³.)

VIII. HÆMODOREÆ.

86. **Hæmódorum** Sm. — Flores regulares; receptaculo cupulari intus imum germen adnatum fovante margineque perianthium imbricatum persistens gerente. Sepala petalis breviora stamina basi involventia. Stamina 3, oppositipetala, æqualia v. inæqualia; filamentis liberis; antheris basifixis ovatis, oblongis v. linearibus, 2-rimosis. Germen ex parte v. primum omnino inferum, vertice planum v. prominulo-3-dymum; stylo simplici, apice stigmatoso vix incrassato. Ovula 2, 3, placentæ axili crassæ peltatæ inserta, quorum lateralia 2, adscendentia incomplete anatropa; micropyle extrorsum infera; chalaza nunc incrassata. Fructus superne ultra receptaculum accretus germineque magis liber, capsulari-3-dymus, ab apice loculicidus. Semina in loculis pauca v. 1, ovata v. orbicularia, margine attenuata v. subalata, placentæ plus minus immersa; albumine carnoso; embryone parvo infero ab hilo distante, plus minus intruso. — Herbæ perennes (nigrescentes) erectæ glabræ; rhizomate vario; radicibus adventivis fasciculatis nunc crasso-carnosis; ramis aeriis nunc basi incrassatis ibique foliorum reliquiis obtectis; foliis basilaribus distichis equitantibus, basi vaginantibus, cæterum teretibus v. com-

1. Poricidis sic dictis.

2. Albidis v. flavidis, parvulis.

3. Spec. 1. *O. Hartwegi* Torr. — S.-WATS., *Bot. Calif.*, II, 160 (*Liliaceæ*).

planatis; superioribus remotis minoribus et in bracteas abeuntibus; floribus in spicas v. racemos compositos dispositis; ramulis cymigeris v. glomeruligeris. (*Australia.*) — *Vid. p. 30.*

87. *Dilatris* BERG.¹ — Flores *Hæmodori*; perianthii foliolis receptaculi concavi margini insertis ibique liberis, parum inæqualibus. Stamina 3, imis petalis affixa, quorum longiora 2^a; antheris ovato-oblongis versatilibus. Germen concavitati receptaculi adnatum. Ovula in loculis solitaria, placentæ peltatæ affixa et plus minus immersa. Fructus inferus loculicidus; semine suborbiculari, plano v. concaviusculo. — Herbæ perennes; rhizomate crasso; ramis aeriis erectis simplicibus; foliis basilaribus distichis equitantibus; inflorescentia³ terminali racemosa; floribus secus ramulos 1-pari-cymosis. (*Africa austr.*⁴)

88? *Barberetta* HARV.⁵ — « Flores⁶ fere *Hæmodori*; perianthii foliolis 6, subæqualibus tenuibus glabris patentibus. Stamina 3, petalorum basi affixa; antheris (parvis) ovatis, supra basin dorsifixis. Germen liberum obliquum glabrum; stylo gracili, ob loculos vacuos parvosque 2 excentrico; loculo perfecto 1-ovulato; ovulo placentæ crassiusculæ lateraliter affixo. Fructus...? — Herba perennis; caule basi tuberoso; foliis paucis laxiusculis planis flaccidis; nervis validioribus 5; inflorescentia terminali gracili elongata simplici; bracteis linearibus pedicellum filiformem 1-florum amplexantibus. (*Africa austr.*⁷) »

89. *Gyrotheca* SALISB.⁸ — Flores fere *Hæmodori*; receptaculo cavo germen inferum intus adnatum fovente. Sepala 3, margini inserta angusta acuta. Petala totidem alterna, longiora latioraque, magis membranacea, imbricata. Stamina 3, epigyna, basi imis petalis adnata; filamentis subulatis, sub apice demum annulari-incrassatis; antheris basifixis versatilibus exsertis, introrsum 2-rimosis. Germen

1. *Fl. cap.*, 9, t. 3, fig. 5. — GÆRTN. F., *Fruct.*, III, t. 182. — LAMK, *Ill.*, t. 34. — ENDL., *Gen.*, n. 1254. — B. H., *Gen.*, III, 674, n. 5. — PAX, *Pflanzenfam.*, 95.

2. Antheris nunc (?) vacuis.

3. Floccoso v. viscoso-tomentosa.

4. Spec. 2. RÖEM. et SCH., *Syst.*, I, 483 (part.). — SM., *Exot. Bot.*, t. 16.

5. *Gen. s.-afr. pl.*, ed. II, 377. — B. H., *Gen.*, III, 674, n. 7. — PAX, *Pflanzenfam.*, 95.

6. « Aurei, tenuiter petaloidei. »

7. Spec. 1.

8. In *Trans. Hort. Soc. lond.*, I (1815), 327. — TH. MOR., in *Bull. Torr. Bot. Club* (1893), 471. — *Lachnanthes* ELL., *Bot. S.-Carol. and Georg.*, I, 47. — RAFIN., in *Journ. Phys.*, LXXXIX, 262. — ENDL., *Gen.*, n. 1255. — B. H., *Gen.*, III, 674, n. 6. — PAX, *Pflanzenfam.*, 95. — *Heritiera* GMEL., *Syst.* (1791), II, 113. — MICHX., *Fl. bor.-amer.*, t. 4.

vertice planum; stylo elongato, apice stigmatoso minuto. Ovula in loculis pauca (3-6) placentæ stipitatae peltatae margine affixa. Fructus subsphaericus, demum (?) 3-valvis; seminibus paucis *Hæmodori*. — Herba perennis; rhizomate brevi, nunc stolonifero; ramis aeriis simplicibus; foliis paucis distichis angustis, basi equitantibus; floribus⁴ in racemum terminalem compositum dispositis; ramis cymigeris². (*America bor.*³)

90. *Wachendorfia* BURM.⁴ — Flores (fere *Hæmodori*) leviter irregulares⁵; perianthio (petaloideo) obliquo; sepalis posticis altius connatis et in pedicellum magis decurrentibus. Petala parum dissimilia, imbricata. Stamina 3, petalis opposita iisque inæqui-alte affixa; filamentis subulatis, nunc declinatis; antheris oblongo-sagittatis subversatilibus, introrsum rimosis⁶. Germen basi lata receptaculo vix cupulari impositum, cæterum liberum; stylo gracili arcuato, apice stigmatoso vix incrassato. Ovulum in loculo quoque 1, placentæ axili crassæ lateraliter affixum sessile hemitropum; micropyle extrorsum infera. Fructus subliber, 3-dymus, perianthio plus minus longe stipatus, loculicidus; lobis compressis v. subulatis. Semen in loculo quoque 1, ventre affixum, inæqui-obovoideum compressum, aut læve, aut rarius varie echinatum; albumine carnoso duriusculo; embryone inferiore immerso parvo oblongo v. conoideo. — Herbæ perennes; rhizomate brevi, varie tuberoso; ramis aeriis erectis, nunc basi incrassatis; foliis basilaribus paucis lineari-ensatis, sæpe plicato-nervosis; floribus⁷ in racemum compositum latum v. angustato-elongatum dispositis; cymulis 1-paris secus ramulos insertis, nunc crebris. (*Africa austr.*⁸)

91. *Xiphidium* LÆFL.⁹ — Flores fere *Hæmodori*; receptaculo brevi; perianthii hypogyni foliolis liberis parum inæqualibus.

1. Extus tomentoso-lanatis.

2. *Heritiera* AIT. (1789) prioritate gaudet, nam *Amygdalus* BURM. et *Alunus* RUMPH. jure generico legitimo, sensu nostro, haud fruuntur.

3. Spec. 1. *G. tinctoria* ELL. — RED., *Lil.*, t. 247 (*Heritiera*).

4. *Wachend.* (1757), Amsterd. — L., *Syst.*, ed. X, 864; *Gen.*, ed. VI, n. 61. — J., *Gen.*, 59 (*Iridibus* affn.). — GÆRTN., *Fruct.*, t. 15. — TURP., in *Dict. sc. nat.*, Atl., t. 59. — ENDL., *Gen.*, n. 1251. — RÖEM. et SCH., *Syst.*, I, 485. — K., *Syn.*, I, 312. — B. H., *Gen.*, III, 673, n. 2. — PAX, *Pflanzenfam.*, 96, fig. 65, B-D.

— *Pedilonia* PRESL, *Nov. pl. gen.* (1829), c. ic.

— TAUSCH, in *Flora* (1830), 556.

5. De *W. paniculatæ* dimorphismo, J. WILS., in *Trans. Bot. Soc. Edinb.* (1888), 73, t. 1.

6. Connectivi dorso nunc papilloso.

7. Flavis, nunc pulchellis.

8. Spec. 3, 4. RED., *Lil.*, t. 93. — SM., *lc. pict.*, t. 5. — ANDR., *Bot. Rep.*, 398. — *Bot. Mag.*, t. 614, 816, 1060, 1166, 2610.

9. *lc.* (1758), 179. — AUBL., *Guian.*, 33, t. 11. — J., *Gen.*, 59. — LAMK., *Ill.*, t. 36. — ENDL., *Gen.*, n. 1250. — B. H., *Gen.*, III, 675, n. 8. — PAX, *Pflanzenfam.*, 96.

Stamina 3; uno sæpe majore; antheris erectis oblongis. Germen liberum; loculis ∞ -ovulatis. Fructus sphaericus loculicidus. Semina ∞ , sphaerica v. subangulata verruculosa; albumine duro; embryone ad marginem leviter intruso. Cætera *Hæmodori*. — Herba perennis; rhizomate brevi; foliis distichis equitantibus, longe lanceolatis v. late linearibus; floribus¹ secus inflorescentiæ terminalis composito-racemosæ ramos 1-lateraliter cymosis. (*America trop.*²)

92. *Schieckia* MEISSN.³ — Flores fere *Xiphidii*⁴; perianthii leviter obliqui foliolis in labia 2 inæqualia dispositis; sepalo antico cum petalis anticis 2 plus minus connato. Stamina oppositipetala 3, aut fertilia omnia, aut perfectum tantum 1, petalo postico antepositum. Staminodia alternipetala nunc 2, varia minuta. Germen sessile liberum; loculis fertilibus 3, pauciovulatis; stylo apice obtuso v. capitato; ovulis placentæ peltatæ affixis. Fructus loculicidus, 3-dymus cæteraque *Xiphidii*. — Herbæ perennes; rhizomate brevi, nunc tuberoso; foliis basilaribus distichis confertis; inflorescentia composita, expansa v. nunc angustato-elongata; floribus nutantibus secus ramulos 1-pari-cymosis. (*America trop.*⁵)

93? *Hagenbachia* NEES et MART.⁶ — Flores fere *Xiphidii* (v. *Schieckia*); perianthii foliolis parum inæqualibus patentibus. Stamina oppositipetala 3; filamentis petalo adnatis; anthera inde subsessili brevi cordata. Germen liberum; loculis perfectis 3; stylo gracili, apice stigmatoso vix incrassato. Ovula in loculis collateralia 2. Fructus liber, 3-dymus, loculicidus; seminibus paucis compressis. — Herba perennis; rhizomate parvo; radicibus adventivis fasciculatis; foliis basilaribus confertis ensiformibus striatis; floribus in summo scapo tenui subaphyllo ramosoque cymosis; pedicellis brevibus per paria dissitis. (*Brasilia*⁷.)

1. Albidis v. lutescentibus, crebris.

2. Spec. ad 2. LÆFL., *It.*, 179 (*Ixia*). — SW., *Prodr.*, 17; *Fl.*, t. 2. — RÖEM. et SCH., *Syst.*, I, 487; *Mant.*, 320. — GRISEB., *Cat. pl. cub.*, 252. — D. DON, in *Edinb. N. Phil. Journ.*, XIII, 235. — HEMSLE., *Bot. centr.-amer.*, III, 325. — *Bot. Mag.*, t. 5055. — WALP., *Ann.*, I, 842.

3. *Gen.*, 397; *Comm.*, 300. — B. H., *Gen.*, III, 674, n. 3. — PAX, *Pflanzenfam.*, 96. — *Troschelia* KL., in *R. Schomb. Reis.*, 1096.

4. Cujus forte potius sectio.

5. Spec. 2, 3. H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, t. 698 (*Wachendorfia*). — MAUR., in *Journ. Morot* (1889), 269, fig. 12.

6. In *Nov. Act. nat. cur.*, XI, 18, t. 2. — ENDL., *Gen.*, II, 1249. — B. H., *Gen.*, III, 674, n. 4. — PAX, *Pflanzenfam.*, 95.

7. Spec. 1. *H. brasiliensis* NEES. — RÖEM. et SCH., *Syst.*, I, *Mantiss.*, 353. — SEUB., in *Mart. Fl. bras.*, fasc. VIII, 61.

CXXIV

BROMÉLIACÉES

I. SÉRIE DES ANANAS.

L'Ananas commun était jadis rapporté au genre *Bromelia*, qui a donné son nom à cette série (*Broméliées*). Mais c'est un type

Billbergia speciosa.

Fig. 67. Port.

Fig. 70. Fleur, coupe longitudinale.

exceptionnel; de sorte que nous préférons commencer cette étude par les *Billbergia* (fig. 67-70¹), qui ont des fleurs hermaphrodites, régu-

¹ THUNB., *Dec. pl. bras.*, III (1823), 30. — GEN., n. 1302. — BEER, *Brom.*, 21, 106. — ROEM. et SCHULT., *Syst.*, VII, 1254. — ENDL., WITTEN., in *Engl. et Prantl Pflanzenfam.*, II,

gulières ou à peu près, avec un réceptacle en forme de bourse profonde¹, dont la cavité renferme l'ovaire, et dont les bords portent un double périanthe. Le calice est formé de trois sépales obtus, dont un antérieur, tordus dans le bouton²; et la corolle, de trois pétales bien plus longs, tordus aussi, mais en sens inverse, et qui peuvent, l'un d'eux s'étalant davantage lors de l'épanouissement, former comme deux lèvres inégales. Sur les bords de la cupule qui surmonte l'ovaire s'insèrent, en face de chaque pétale, deux écailles qui ont souvent la forme d'une vasque à concavité supérieure

Billbergia speciosa.



Fig. 68. Fleur.




Fig. 69. Diagramme.

et dont les bords sont laciniés-frangés. Au-dessus de chaque écaille, le pétale porte souvent une lame verticale, qui lui est parallèle, lui adhère dans une grande étendue de sa face externe et n'est libre que vers ses bords, droits ou sinueux, et vers son sommet, obtus, entier ou inégalement lobé. Parfois cette lame se fond à son sommet avec le pétale lui-même, ou bien elle disparaît totalement. L'androcée est formé de six étamines, superposées trois aux sépales, et trois aux

4, p. 46, fig. 16, D-G; 21, A-C. — BAK., *Handb. Brom.*, 70. — B. H., *Gen.*, III, 664, n. 14. — *Heliconia* LEME, *Ill. hort.*, XI, t. 421. — *Libonia* LEME, *loc. cit.*, II, t. 18. — *Jonghea* LEME, *Jard. fleur.*, II, t. 180.

1. A surface extérieure lisse, ou parcourue de côtes longitudinales saillantes, parfois plus ou moins verruqueuse ou chargée d'un enduit farineux.

2. Le bord gauche toujours recouvrant.

pétales. Celles qui sont superposées aux sépales s'insèrent, comme eux, sur les bords du réceptacle et sont indépendantes. Celles qui répondent aux pétales peuvent aussi être libres ou n'adhérer au pétale que par leur extrême base. Mais l'adhérence peut se produire beaucoup plus haut et jusque vers le milieu de la hauteur du filet qui se dresse entre les deux lames verticales et qui est plus ou moins aplati et élargi¹. Son sommet se continue avec le connectif dorsal d'une anthère allongée et dressée, dont les deux loges parallèles sont libres dans leur portion inférieure et s'ouvrent en dedans par une fente longitudinale². L'ovaire infère a trois loges superposées aux sépales³ et dans l'angle interne desquelles s'insère un placenta axile, orbiculaire ou elliptique, à deux lobes multiovulés. Les ovules sont anatropes⁴. Le style est une colonne dressée qui, dans sa partie supérieure, se partage en trois branches stigmatifères. Ces branches, assez larges et aplaties, se replient sur elles-mêmes suivant leur ligne médiane et rapprochent ainsi l'un de l'autre leurs bords chargés de papilles. Puis elles se tordent plus ou moins longuement les unes sur les autres dans le même sens que les pétales. Le fruit est plus ou moins charnu, couronné longtemps des restes du périanthe, indéhiscent et polysperme. Ses graines ont un abondant albumen farineux et un embryon relégué vers leur portion inférieure⁵.

Les *Billbergia* sont des plantes vivaces de l'Amérique méridionale tropicale, qui, comme les Broméliacées en général, vivent sur les roches ou sur l'écorce des arbres, sans être parasites. Leurs tiges, courtes, simples ou peu ramifiées, sont sympodiques. Elles portent à leur base, souvent subligneuse, une rosette de feuilles caractéristiques,

1. Ce qui arrive surtout dans le *B. Quesneliana* AD. BR., in *Ann. sc. nat.*, sér. 2, XV, 372, et dans quelques espèces voisines dont on a fait un genre *Quesnelia* GAUDICH., *Voy. Bon., Bot.*, t. 51. — B. H., *Gen.*, III, 665, n. 15. — WITTM., *Pflanzenfam.*, 47. — BAK., *Brom.*, 84. — *Lievana* REIC., *Gartenfl.* (1880), 289, t. 1024. Les divisions de la corolle y sont obtuses et à peu près égales, longtemps dressées. Il y a des *Billbergia* proprement dits dans lesquels le filet oppositiflépétale présente une adhérence étendue.

2. Le pollen est, dans cette famille, ellipsoïde ou ovoïde, avec un sillon longitudinal; souvent ponctué, avec une bande d'apparence variable. Les deux pôles peuvent être ombiliqués. M. MEZ divise, d'après le pollen, les Broméliées en *Poratæ*, *Sulcatæ* et *Archæobromeliæ*.

3. Leur cloison de séparation est occupée par une glande septale très développée, surtout en bas et un peu au-dessous des loges où elle se partage plus ou moins en feuillettes. Son orifice déverse le nectar dans la cupule réceptaculaire qui surmonte l'ovaire.

4. A double tégument; la région chalazique souvent proéminente en un petit cône droit ou arqué.

5. Mieux connu dans les *Echmea* et les genres voisins, cet embryon a parfois une forme singulière, claviforme, rectiligne ou arquée, avec une extrémité cotylédonaire longuement atténuée et une base renflée, plus ou moins oblique. On lui a, dans quelques genres, décrit un scutellum d'un côté et au-dessus de la gemmule (PAX, *Pflanzenfam.*, fig. 19, E-G).

rapprochées, allongées, concaves en dedans, rigides, non charnues, rectinerves, ordinairement zébrées de blanc en dehors et en travers; les bords découpés en dents de scie épineuses; la base souvent dilatée en courte gaine. Les inflorescences sont terminales¹, en épis simples ou composés, à axe principal grêle, flexible, pendant, avec des fleurs² distiques, solitaires dans l'aisselle des bractées; ou à axe épais dressé; les fleurs groupées tout autour de son sommet en épi dense (*Jonghea*³) ou strobiliforme (*Quesnelia*), disposées suivant une ligne spirale continue. Les bractées inférieures de l'inflorescence, souvent distantes des autres, plus grandes et fréquemment stériles, peuvent devenir membraneuses, pétaloïdes et d'une couleur vive, ordinairement pourprée. Le genre comprend une cinquantaine de belles espèces⁴.

Bromelia Pinguin.

Les *Æchmea*, des régions tropicales de l'Amérique, sont très voisins des *Billbergia*. Ils en ont l'inflorescence variable, strobiliforme, spiciforme ou plus ou moins lâchement ramifiée et cymigère. Mais leurs bractées florales et leurs sépales sont ordinairement coriaces et mucronés. Les pétales sont plus courts et obtus, ne dépassant souvent que peu le calice. Leur base porte une double écaille. Le fruit est charnu; son réceptacle devenant parfois même pulpeux.

Fig. 71. Fruit.

Dans les *Streptocalyx*, de la Guyane et du Brésil, l'inflorescence est ramifiée, et les sépales fortement tordus sont largement insymétriques, pourvus d'un mucron apical. Les

1. Quand un axe a fleuri, son existence est terminée, et c'est un axe secondaire qui, développé vers sa base, lui succédera et aura de même son évolution terminée. Si cette ramification sympodique ne se produisait pas, la plante mourrait après avoir fructifié.

2. Souvent grandes et belles; le calice souvent pâle; les pétales pourpres et fréquemment d'un bleu plus ou moins intense au sommet.

3. LAMÉ, in *Jard. fleur.*, II, t. 180.

4. SCHULTZ., *Syst.*, VII, 1254 (part.). — COLL., in *Mem. Acad. Turin.*, XXVI, t. 19 (*Pourretia*). — Hook., *Exot. Fl.*, t. 41, 42. — LINDL., *Bot. Cab.*, t. 76 (*Tillandsia*), 1912 (*Heliconia*). — LOIS., in *Herb. amat.*, t. 345 (*Pitcairnia*). — POMPEL. et ENDL., *Nov. gen. et spec.*, t. 157. — E. MONN., in *Belg. hort.* (1866), t. 2; (1871), t. 1, 14; (1872), t. 1, 4; (1873), t. 1, 16, 17;

(1874), t. 1, 8; (1875), t. 1, 13; (1876), t. 1, 15, 20, 22; (1877), t. 3; (1878), t. 1; (1880), t. 8 (1881), t. 4-6 (*Quesnelia*), 5, 18. — AD. BR., in *Ann. sc. nat.*, sér. 2, XV, 372; in *Portaf. hort.*, II, 97, c. fig. — WAWR., in *Est. Bot. Zeitschr.* (1880), 115; 149 (*Quesnelia*); *It. Pr. Cob.*, t. 25, 28, 35 B (*Quesnelia*); *Reis. Pr. Max. Bot.* (1866), 164. — GRAY. et WITT., in *Gartenfl.* (1888), t. 41-43 (*Quesnelia*). — FR. MUELL., in *Ber. deutsch. Bot. Ges.*, XI, 368. — LINDL., in *Kon. Svensk. Vet. Ak. Handb.* (1891), 23, t. 3, 4 (*Quesnelia*). — HENSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 315. — MEZ, in *Mart. Fl. bras.*, fasc. CXII, 377, t. 74, 75 (*Quesnelia*); 388, t. 76-79. — WITZ., *Cat. Brom. Jard. Leid.*, 8; 51 (*Quesnelia*). — *Bot. Reg.*, t. 1068, 1181. — *Bot. Mag.*, t. 1732; 2686 (*Bromelia*), 4756, 4835, 5090, 5114, 6342, 6432, 6632, 6670, 6937.

pétales, tordus en sens inverse, sont bien plus longs que le calice et sans écailles à leur base.

Avec la même organisation générale des fleurs, les *Bromelia* (fig. 74) ont des sépales libres ou à peu près et un style dont les branches stigmatifères sont trop courtes pour se tordre les unes sur les autres d'une façon accentuée. Le fruit est une grosse baie, de forme variable. Les feuilles épineuses sont nombreuses, ensiformes; et l'inflorescence, qui occupe le sommet de la tige et l'aisselle des

Bromelia (Rhodostachys) longifolia

Fig. 73. Fleur.

Fig. 72. Port.

Fig. 74. Fleur,
coupe
longitudinale.

feuilles ou des bractées supérieures, est fortement ramifiée et composée de cymes souvent contractées.

Dans les espèces de *Bromelia* dont on a fait un genre *Rhodostachys* (fig. 72-74), cette inflorescence, au fond exactement située et construite de même, est contractée dans toutes ses parties; de sorte qu'elle a pu être décrite comme un capitule terminal, malgré sa grande complication, et qu'elle demeure en partie cachée entre les bases des feuilles ensiformes et spinescentes. Ces dernières plantes appartiennent à l'Amérique méridionale extratropicale, tandis que les vrais *Bromelia* sont généralement originaires des régions plus chaudes, depuis le Brésil méridional jusqu'au sud du Mexique.

Dans les vrais Ananas (fig. 75), l'inflorescence très contractée, ovoïde, surmontée souvent d'un bouquet de grandes feuilles vertes ou de bractées colorées et plus courtes, est formée de fleurs, puis de fruits charnus plus ou moins connés par leur réceptacle avec leur bractée axillante.

Ananas sativa.

Dans les *Acanthostachys* (fig. 76-81), du Brésil central, l'inflorescence est aussi une sorte de cône, analogue à celui des Ananas. Mais, si rapprochés qu'ils soient, les fruits ne sont pas unis. Ils sont latéraux sur un axe étroit et allongé. Les fleurs ont de courts sépales triangulaires et de courts pétales, rappelant ceux des *Æchmea*. Les courtes branches du style ne sont pas tordues, et chaque loge ovarienne est 2, 3-ovulée.

L'*Aræococcus micranthus*, de la Guyane et de la vallée de l'Amazone,

Fig. 75. Fruit composé.

Acanthostachys strobilacea.



Fig. 80.
Graine.



Fig. 76. Inflorescence.

Fig. 77. Fleur.

Fig. 79. Fruit
simple.

Fig. 78. Fleur,
coupe
longitudinale.

Fig. 81. Graine,
coupe
longitudinale.

diffère des types précédents par les grappes lâchement composées

et chargées de cymes de ses petites fleurs indépendantes. Ses feuilles loriformes sont peu nombreuses, et il a un petit fruit charnu et pisiforme. Ce genre renferme encore une ou deux espèces.

Le genre *Karatas* (fig. 82), dont les organes végétatifs se rapprochent beaucoup de ceux des *Bromelia*, en a aussi l'organisation

Karatas (Nidularium) tristis.




Fig. 82. Fleur; les sépales enlevés.

florale; mais ses pétales sont unis en un tube plus ou moins long. Les fruits sont charnus et indéhiscent. L'inflorescence, décrite à tort comme un capitule, est très composée, organisée, en somme, comme celle des *Rhodostachys*. Ce sont de grandes ou petites plantes de l'Amérique tropicale. Tout à côté d'eux se rangent les *Greigia*, du Chili, qui ont aussi les fleurs pressées en capitules; mais ceux-ci sont latéraux, et leurs branches stylaires, courtes et assez épaisses, ne sont pas tordues. De même, les *Distiakanthus*, de la Nouvelle-Grenade et de la vallée de l'Amazone, ont pour inflorescence un faux-capitule de *Karatas*. Mais leurs branches stylaires sont linéaires, à peine tordues; et leurs feuilles, au lieu d'être sessiles comme celles des genres

précédents, ont un pétiole et un limbe élargi.

Les *Cryptanthus* ont aussi des fleurs groupées en un faux-capitule central, de même que les deux genres voisins *Ochagavia* (?) et *Disteganthus*. Tous ont un calice tubuleux et gamosépale à sa base. Leurs pétales, au contraire, sont libres ou à peu près. Mais dans les *Cryptanthus*, qui ont une corolle blanche, étalée en haut, l'inflorescence est centrale, et les feuilles sont sessiles; et, dans les *Disteganthus*, la corolle est jaune; les feuilles sont pétiolées, et l'inflorescence est latérale; tandis que l'*Ochagavia*, genre peu connu, de l'île Juan Fernandez, a, avec un faux-capitule central, des pétales à limbe court et un petit fruit comprimé, des feuilles lancéolées et rigides. On dit le péricarpe charnu. Les étamines ont des filets dilatés à leur base et des anthères dorsifixes. Le style est grêle, dilaté et tronqué à son sommet stigmatifère obscurément lobé.

L'inflorescence redevient une grappe centrale, composée et cymifère, dans les *Portea*, du Brésil, dont la fleur rappelle celle des *Bill-*

bergia, avec un calice tubuleux à sa base, mais à lobes mucronés et dilatés fortement d'un côté. Leurs feuilles sont serrées-épineuses, sessiles et loriformes; leurs pétales bien plus longs que le calice; les branches de leur style fortement tordues. Comme dans certains *Billbergia* aussi, les pétales sont accompagnés de deux sortes d'écailles géminées. On peut donc considérer les *Portea* comme des *Billbergia* gamosépales, à calice non inerme.

Dans les deux genres très analogues *Fernseea* et *Ronnbergia*, l'inflorescence est également ramifiée. Les premiers, du Brésil, ont des feuilles et des styles de *Portea*. Mais leurs pétales, sans écailles, dépassent à peine le calice. Les derniers, de Colombie, ont des feuilles oblongues, pétiolées et spinescentes. Leurs pétales sont bien plus longs que le calice, et c'est seulement le sommet de leur limbe qui s'étale lors de l'épanouissement des fleurs. A part la gamosépalie, c'est donc un genre qui nous ramène manifestement à certaines formes du genre *Billbergia* par lequel débutait cette série. Mais les étamines, bien plus courtes que les pétales, s'insèrent ici au niveau de la gorge du calice.

II. SÉRIE DES TILLANDSIA.

Les fleurs des *Tillandsia*¹ (fig. 83-85), régulières ou à peu près, et hermaphrodites, ont un réceptacle à surface supérieure plane ou légèrement concave au centre. Sur ses bords s'insèrent trois sépales rigides, tordus², dont deux postérieurs. Avec eux alternent trois pétales plus longs, plus membraneux et plus colorés d'ordinaire, tordus en sens inverse dans le bouton. Leurs onglets sont connivents, et leur limbe plus ou moins étalé³. Les six étamines, insérées en dedans du périanthe, souvent unies à sa base, ont un filet d'ailleurs libre et une anthère dorsifix ou basifix, incluse ou rarement exserte, linéaire-oblongue, à loges parfois libres en bas, déhiscentes en dedans

1. L., *Gen.*, ed. I, n. 283; ed. VI, n. 369 (part.). — J., *Gen.*, 50. — ENDL., *Gen.*, n. 1306. — B. H., *Gen.*, III, 669, n. 26. — WITTM., *Pflanzenfam.*, 55, fig. 27, 28 A. — BAK., in *Trim. Journ.* (1887), 211; *Brom.*, 89. — *Reuealmia PLUM.*, ex L., *Gen.*, ed. I, n. 853 (non HOUTT., non L. F., non FEUILL., non R. BR.).

2. Le bord gauche recouvrant. C'est à tort qu'on les dit imbriqués et, vu la forme du

réceptacle, hypogynes. La base des loges et des glandes sépales est plus ou moins infère.

3. Il est doublé en dedans, de chaque côté de l'étamine superposée, d'une écaille de forme un peu variable. La portion du limbe de la corolle qui s'étale lors de l'anthèse, est variable de dimensions: ici très large et là très courte. Le tube que forment les pétales connivents est droit ou arqué, presque inclus ou exsert.

par des fentes longitudinales. L'ovaire sessile, à peu près libre ou plus ou moins adné par sa base au réceptacle, est surmonté d'un style dont le sommet, généralement exsert, est partagé en trois lobes entiers ou

Tillandsia (Vriesea) tessellata.

Tillandsia (Vriesea) corallina.

Fig. 83. Fleur ($\frac{2}{3}$). Fig. 84. Fleur, coupe longitudinale.

Fig. 85. Graine.

bilobulés, courts et larges, étalés, chargés de papilles stigmatiques¹. Dans l'angle interne de chaque loge² se voit un placenta axile, chargé

1. Le plus souvent, ils sont étalés, presque horizontaux, et leur ensemble représente comme une tête aplatie. En réalité, ils sont comprimés, obtus et plus ou moins nettement bilobulés. Les papilles abondent vers leurs bords. On observe parfois chez eux un commencement de torsion. Plus bas, le corps du style est souvent creux.

2. Dans l'épaisseur de la cloison s'observe,

tout en bas, une fente appartenant à la glande septale très développée. Au-dessous même de l'ovaire, cette glande prend une grande expansion dans une cavité infère du réceptacle, avec de nombreux replis ou sinuosités cérébriformes. La production de nectar est abondante. Le périgone est parfois aussi enduit d'une assez riche couche visqueuse ou cirreuse extérieure.

d'ovules plurisériés, anatropes et ascendants; le micropyle extérieur¹. Le fruit est capsulaire, septicide; l'exocarpe souvent séparé de l'endocarpe, dont les bords s'infléchissent autour des semences. Celles-ci sont ascendantes, longuement linéaires. Elles ont un corps oblong qui s'atténue inférieurement en une longue baguette. Elle appartient au tégument extérieur qui, finalement, se scinde plus ou moins complètement en longs filaments qu'abandonne aussi la portion intérieure de la graine, et qui simule ainsi une aigrette². L'albumen abondant est farineux, et l'embryon, inférieur, est parfois plus long que lui.

Les *Tillandsia* sont originaires des régions chaudes des deux Amériques, vivant sur les arbres, les rochers, rarement sur terre. Leur surface est glabre ou furfuracée. Leurs tiges portent des feuilles à bords entiers, non spinescents. Leur inflorescence est une grappe ou un épi, simple ou composé. Une fleur³ occupe l'aisselle de chaque bractée, dont la taille et la coloration sont très variables.

Dans les espèces dont on a fait le genre *Vriesea*⁴, les feuilles sont disposées en rosette, et l'inflorescence comprimée à les bractées distiques, de même que les fleurs. Les pétales portent de chaque côté de l'étamine superposée une écaille, souvent insymétrique.

On a proposé un genre *Wallisia*⁵ pour des espèces à feuilles disposées en rosette, minces et larges, glabres, et à inflorescence aplatie, comme celle des *Vriesea*.

Dans les *Allardtia*⁶, les fleurs sont de même distiques; les feuilles larges et en rosette; le limbe des pétales obovale; les étamines et le style courts.

Les *Cyathophora*⁷ ont les caractères des *Allardtia*; mais leurs inflorescences n'ont pas les bractées et les fleurs distiques.

Dans les *Conostachys*⁸, tous les caractères floraux sont ceux des *Vriesea*; mais les fleurs ne sont pas distiques.

On a génériquement distingué, sous le nom d'*Anoplophytum*⁹, des

1. Ils ont deux enveloppes, et leur chalaze se prolonge souvent plus ou moins en une corne rectiligne ou arquée.

2. WITTM., *Pflanzenfam.*, 37, fig. 20. Il y a de vrais poils à la base.

3. Blanche, rose, jaune, bleue ou violacée, souvent grande et belle.

4. LINDL., *Bot. Reg.* (1843), t. 10; *Veg. Kingd.*, 148 (*Vriesea*). — BEER, *Brom.*, 21, 91. — WITTM., *Pflanzenfam.*, 57.

5. REG., *Gartenfl.*, XVIII, 193, t. 619. — AMALIS ENDL. — *Phytarrhiza* Vis., in *Mem. Ist. venet.*, V, 340, c. tab. (part.). Le nom vient

de ce que beaucoup de ces plantes, dépourvues de racines, vivent, dans nos serres, sur une tablette ou suspendues dans l'air par un fil. Mais elles végètent souvent mieux dans la terre.

6. DIETR., in *Allg. Gartens.* (1852), 241. — ANT., in *Est. Bot. Zeitschr.* (1878), 56, c. ic. — BONAPARTEA R. et PAV., *Fl. per. et chil.*, III, 38 (part.), t. 263. — *Acanthospora* SPRENG., *Syst.*, II, 25.

7. K. KOCH. — BAK., *Amar.*, 158, 228.

8. GRISEB. — BAK., *Amar.*, 158, 230.

9. BEER, *Brom.*, 39. — BAK., *Amar.*, 157, 196.

Tillandsia dont les fleurs ne sont pas distiques, mais rapprochées en épi simple ou composé, et dont les feuilles, parsemées de poils écailleux, sont coriaces, acuminées, disposées en rosette.

Avec les mêmes caractères que les *Anoplophytum*, les *Pityrophyllum*¹ ont des fleurs rapprochées en un capitule qui occupe le centre des rosettes de feuilles.

Les *Platystachys*² sont des *Tillandsia* à feuilles en rosette, acuminées, coriaces, écailleuses, mais à inflorescences simples ou composées, distiques. Leurs étamines et leur style sont d'ordinaire plus longs que les pétales oblongs ou lingulés, ordinairement de couleur lilacée.

Les *Pseudo-Catopsis*³ forment une section qui a les caractères des *Platystachys*, mais avec des fleurs petites, à sépales obtus, et un fruit trois ou quatre fois plus long qu'eux.

Chez les vrais *Phytarhiza*⁴, les feuilles et les inflorescences sont celles de la section précédente, avec des pétales à limbe obovale, un style et des étamines courts.

Les *Diaphoranthema*⁵ sont des espèces à tiges feuillées courtes, à fleurs peu nombreuses ou même solitaires, avec des étamines et un style courts.

On a fait un genre *Strepsia*⁶ pour des *Tillandsia* dont les tiges sont grêles, pendantes, allongées, portant des feuilles alternes, subulées, sur toute leur longueur, avec des fleurs solitaires, sessiles, à la base dilatée des feuilles. Cette section ne comprend que le *T. usneoides* L.⁷, espèce à port tout particulier, rappelant celui de certains Lichens.

On connaît déjà plus de trois cents espèces⁸ dans ce grand genre.

1. BEER, *Brom.*, 79. — BAK., *Brom.*, 200.

2. BEER, *Brom.*, 80 (part.), 264 (nec K. Koch). — BAK., *Amar.*, 158, 168.

3. BAK., *Amar.*, 157, 192. — *Tussacia* KL. — BEER, *Brom.*, 9, 20 (part.).

4. Vis., in *Mem. Ist. venet.*, V, 340, c. tab. (part.). — BAK., *Amar.*, 157, 163 (part.).

5. BEER, *Brom.*, 153. — BAK., in *Trim. Journ.* (1878), 236; *Brom.*, 157, 160.

6. NUTT., *Gen.*, I, 208. — BAK., *Amar.*, 159.

7. L., *Spec.*, 411. — *Bot. Mag.*, t. 6309. Le port est tellement particulier que les anciens auteurs ont fait de ce petit *Tillandsia* un *Fucus* et même un *Rhizomorpha*.

8. ROEM. et SCH., *Syst.*, VII, 1193. — JACQ., *St. amer.*, t. 63. — HOOK., *Ex. Fl.*, t. 154, 173, 205. — GAUDICH., *Voy. Bon. Bot.*, t. 65-70. — GRISED., in *Nach. K. Ges. Wiss. Gœtt.* (1864), 14; *Cat. pl. cub.*, 254; *Fl. brit. W.* — *Ind.*, 594; *Symb. Fl. argent.*, 332. — WAWR., in *Est. Bot. Zeitschr.*, 182, 218 (*Vriesia*), 221; *Reis. Max.*

(1866), 163; *Pr. Cob. Reis.*, I, 70, t. 32, 34 B. — K. KOCH, *App. 4 Ind. Sem. H. berol.* (1873). — C. GAY, *Fl. chil.*, VI, 13. — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 319. — VELL., *Fl. flum.*, Atl., III, t. 129, 142. — PRESL, *Rel. Hænk.*, II, t. 24. — H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, I, 291. — SW., *Prodr.*, 57; *Fl. ind. occ.*, I, 593. — MART. et GAL., *Enum.*, II, 9. — MIQ., in *Linnaea*, XVIII, 376. — A. RICH., *Fl. cub.*, III, 367. — Vis., *Ill.*, I, 29. — CHAM. et SCHLCHTL., in *Linnaea*, VI, 53; XVIII, 423. — AD. BR., *Bot. Coq.*, 186. — WENDL., in *Hamb. Gartens.* (1863), 31. — SAUV., *Fl. cub.*, 167. — BENTH., *Sulph.*, 173. — ROSS., *Cat. Mod.*, t. 1. — S.-WATS., in *Proc. Amer. Acad.*, XXII, 456. — MAUR., in *Journ. Mor.* (1889), 270, fig. 13. — BRITT., in *Trim. Journ.* (1888), 170. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 771. — WITTM., in *Engl. Jahrb.*, XI, 63. — ANDRÉ, *Enum.*, 6. — E. MORR., in *Belg. hort.* (1869), t. 18; (1870), t. 5, 12, 85; (1871), t. 12, 20; (1872), t. 23; (1874), t. 14; (1875), t. 23; (1876),

A côté des *Tillandsia* se rangent :

Les *Catopsis* (fig. 86), de l'Amérique tropicale, qui ont aussi les pétales libres, mais dont la graine, au-dessus d'une base épaisse et courte, a un long appendice chalazique, replié sur lui-même et terminé par un large pinceau papiforme. Toutefois, ce caractère si remarquable, se retrouvant à différents degrés d'évolution dans certains *Tillandsia* proprement dits, ne pourrait servir à séparer d'une façon absolue les deux genres; si bien qu'il a fallu recourir à cet autre caractère différentiel, qu'outre l'aigrette, le corps de la graine mûre des *Tillandsia* se trouve complètement nu, tandis que celui des *Catopsis* est chargé d'un épais duvet;

Catopsis nitida.

Les *Caraguata*, des Antilles, des Andes de l'Amérique du Sud et de la Guyane, qui sont des *Tillandsia* gamopétales, avec un calice à tube court, des étamines libres et des feuilles réunies en rosette basilaire;

Les *Guzmania*, de l'Amérique tropicale, qu'on peut définir des *Caraguata* à androcée syngénèse;

Les *Sodiroa*, de la Nouvelle-Grenade et de l'Équateur, qui ont des fleurs de *Caraguata*, à tube calicinal allongé et scarieux, et dont les tiges allongées et flexibles portent des feuilles linéaires alternes et assez espacées.

Fig. 86. Graine.

III. SÉRIE DES PITCAIRNIA.

Les fleurs des *Pitcairnia*¹ (fig. 87) ont un réceptacle plus ou moins concave, obpyramidal et logeant dans sa concavité une portion plus

t. 14, 16; (1877), t. 15, 18; (1878), t. 11, 13, 14, 18; (1879), t. 6, 10; (1880), t. 1, 11, 15; (1881), t. 11. — Mez, in *Mart. Fl. bras.*, 511, t. 97-106 (*Vriesea*), 577, t. 108-114. — *Bot. Reg.*, t. 105, 749; (1843), t. 10. — *Bot. Mag.*,

t. 2841, 3275, 4238, 4382, 4415, 5106, 5229, 5246, 5287, 5562, 5892, 6014, 6309, 6435, 6495, 7320. — WALP., *Ann.*, VI, 94.

1. LHER., *Sert. angl.* (1788), VII, t. 11 (non *Fonst.*). — ENDL., *Gen.*, n. 1305. — BEER,

ou moins étendue de la base de l'ovaire. Sur ses bords, le réceptacle porte trois sépales pétaloïdes, allongés, disposés dans le bouton en préfloraison tordue¹. L'un d'eux est antérieur. Avec eux alternent trois pétales, bien plus longs, insérés de même, atténués aux deux extrémités et tordus aussi dans la préfloraison, mais en sens inverse.

Pitcairnia corallina.

Deux verticilles staminaux trimères ont la même insertion; et les pièces en sont libres, formées ordinairement d'un filet subulé et d'une anthère linéaire, basifixes ou à peu près, à deux loges adnées et introrsées, déhiscentes par des fentes longitudinales². L'ovaire, libre supérieurement dans une grande portion de sa hauteur, est surmonté d'un long style trigone, dont le sommet se partage en trois branches stigmatifères. Elles sont ordinairement tordues³, condupliquées, et leurs bords portent les papilles. Dans les trois loges alternipétales de l'ovaire se trouve un placenta axile chargé d'un grand nombre d'ovules anatropes, superposés⁴. Le réceptacle porte souvent encore des écailles analogues à celles des *Billbergia*, mais bien plus courtes.

Fig. 87. Fleur, coupe longitudinale.

Le fruit est une capsule septicide. Les graines sont petites et nombreuses. Elles se terminent souvent aux deux extrémités par une pointe plus ou moins allongée, et renferment sous leurs téguments un abondant albumen farineux et, du côté du hile, un petit embryon en partie intrus.

Il y a des *Pitcairnia* dont les semences ont les prolongements des deux extrémités très allongés : ce sont les *Neumannia*⁵ et les *Phlo-mostachys*⁶, d'ailleurs distingués comme sections par des particularités notables de leurs organes végétatifs. Dans les *Melinonia*⁷, les

Brom., 17, 50. — B. H., *Gen.*, III, 665, n. 17. — BAK, *Brom.*, 89. — *Hepetia* Sw., *Prodr. Fl. ind. occid.* (1788), 66.

1. Le bord gauche enveloppant.

2. De chaque côté de l'étamine oppositiflore se trouve ordinairement une écaille de forme et d'épaisseur très variables.

3. Dans le même sens que les pétales.

4. A double tégument; la chalaze obtuse ou acuminée.

5. AD. BR., in *Ann. sc. nat.*, sér. 2, XV, 369. — *Lamproconus* LEME, *Jard. fleur.*, II, sub t. 127.

6. BEER, *Brom.*, 45.

7. AD. BR. in *Morr. Cat. Brom. Jard. Lieg.* (1873).

*Schweideleria*¹ et les *Pepinia*², il n'y a pas de prolongements aux graines dont le tégument porte une bordure cornée. Ainsi constitué, ce genre compte, dans l'Amérique tropicale, environ cent trente espèces³, saxicoles, épiphytes ou terrestres. Elles ont un port, un feuillage et un mode d'inflorescence très variables. Ainsi, dans le *P. integrifolia* et les espèces voisines, les feuilles sont linéaires, entières et furfuracées en dessous, de même que dans le *P. suaveolens* et les types analogues, dont la feuille est dépourvue de duvet. Dans le *P. australis* et ses alliés, la feuille est plus large, ensiforme, mais toujours entière; tandis que dans les espèces groupées autour du *P. bromeliæflora*, les feuilles, furfuracées en dessous, ont les dents épineuses des Ananas. Ces mêmes dents existent dans les feuilles ensiformes des *Puyopsis*⁴, dont la tige est élevée et ligneuse. La feuille est entière dans les sections *Neumannia* et *Phlomostachys*. Les fleurs sont souvent belles, ordinairement rouges, plus rarement jaunes, blanches ou bleues. Elles sont disposées en grappes ou en épis, lesquels sont capituliformes dans la section *Cephalopitcairnia*⁵. Dans les *Phlomostachys*, la grappe est simple, spiciforme, avec des bractées florales de la longueur du calice. Dans les *Neumannia*, il y a un épi plus serré et de larges bractées florales colorées. Les *Schweideleria*, dont les feuilles oblongues ou oblancéolées sont pétiolées, ont de longues grappes lâches, à bractées lancéolées.

Les *Puya*, des Andes chiliennes, péruviennes et colombiennes, ont, avec le port des *Puyopsis* et une taille souvent élevée, un fruit libre, loculicide, et un long style entier ou à peu près.

Les *Dyckia*, du Brésil, de l'Uruguay et de la République Argentine, ont le style court, des feuilles épaisses, rigides et bordées de vigoureuses épines arquées. Leur fruit est septicide. Avec les mêmes caractères, les *Cottendorfia*, du Brésil et de la République Argentine, ont des feuilles minces, longues et entières; tandis que les *Hechtia*,

1. E. MORR., ex BAK., *Brom.*, 90, 114.

2. AD. BR., in *Ill. hort.*, XVII, 32, t. 5. — BAK., *Brom.*, 91, 115.

3. R. et PAV., *Fl. per. et chil.*, t. 258-260. — JACO. F., *Ecl. amer.*, t. 79. — RED., *Lil.*, t. 73-76. — PRESL., *Rel. Hænk.*, t. 23 (*Pourretia*). — ANDR., *Bot. Rep.*, t. 249, 322. — LINDL., in *Pact. Fl. Gard.*, III, t. 86 (*Puya*). — LINK, KL. et OTT., *lc. pl. rar.*, t. 25. — LEME, *Jard. fleur.*, t. 127, 407. — REG., *Gartenfl.*, t. 53, 113, 114, 557, 781. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 722. — POEPP. et ENDL., *Nov. gen. et spec.*, t. 158. — GRISEB., *Fl. brit. W.-Ind.*, 594; *Symb. Fl.*

argent., 329. — HEMS., *Bot. centr.-amer.*, III, 315, t. 85. — WAWR., *Reis. Pr. Max. Bot.*, 160, t. 27; *Reis. Pr. Cob. Bot.*, I, 174. — MART., in *Rœm. et Sch. Syst.*, VII, 1240. — MEY., in *Rel. Hænk.*, II, t. 23. — DON.-SM., in *Amer. Bot. Gaz.* (1888), t. 24. — S.-WATS., in *Proc. Amer. Acad.*, XXII, 456. — MEZ., in *Mart. Fl. bras.*, fasc. CX, 431, t. 81-86. — *Bot. Mag.*, t. 824, 856, 1416, 1547, 2657, 2813, 4241, 4309, 4540, 4696, 4709, 4770, 4775, 5225, 5234, 5356, 6318, 6480, 6535, 6600, 6606, 7175.

4. BAK., *Brom.*, 91, 117.

5. BAK., *Brom.*, 90, 109.

de l'Amérique du Nord, à feuilles de *Dyckia*, ont les fleurs polygames-dioïques.

Dans les *Bakeria* (?) et les *Brocchinia*, les uns du Brésil et de la Guyane, les autres de la Nouvelle-Grenade, le fruit est en majeure partie infère. Les premiers ont des feuilles ensiformes, entières, acuminées, écailleuses, avec, dit-on, des pétales bien plus longs que le calice. Les derniers ont des feuilles loriformes, entières et glabres, avec des pétales à peu près égaux en longueur au calice.

Cette famille est par la structure de ses fleurs tout à fait analogue à celle des Amaryllidacées. Elle n'en diffère que par ses sépales souvent plus courts et moins pétaloïdes que les pièces de la corolle, l'albumen de ses graines plus constamment farineux, et surtout par son port tout particulier et son feuillage¹. Quant à la situation de son embryon, elle varie beaucoup, de même que sa forme souvent singulière. Toutes ces plantes sont américaines, beaucoup plus rarement des régions tempérées que de la zone tropicale. C'est A.-L. DE JUSSIEU² qui, en 1789, établit un ordre des Ananas (*Bromeliæ*), assemblage assez malheureux des *Burmanna* et des *Agave* avec de vraies Broméliacées. Ce dernier nom ne fut adopté par lui qu'en 1804³, avec le même cadre, mais aussi avec les *Burmanna*, plus les *Fourcroya* et des *Barbacenia* (les *Xerophyta*). KUNTH⁴ circonscrivit mieux, en 1815, la famille, à laquelle LINDLEY⁵ rapportait encore les *Dasy-lirion* et (?) *Nolina*, et qui, richement représentée dans les serres des jardins modernes, y fut étudiée avec le plus grand soin par des spécialistes tels que BEER⁶, ANTOINE⁷, E. MORREN, MM. BAKER⁸ et MEZ⁹. Aujourd'hui, nous y conservons vingt-six genres, avec environ quatre cents espèces, partagées en trois séries peu distinctes¹⁰:

1. Entraînant des caractères histologiques spéciaux (PRITZ., in *Pringsh. Jahrb.*, VIII, 16. — WESTERM., loc. cit., XIV, 43. — CEDERV., in *Gæsteb. Handl.*, XIX. — SCHIMP., in *Bot. Centralbl.*, XVII (1884), c. fig. — A. DE WEVRE, in *C. rend. Soc. bot. Belg.* (1887), 110. — WITTM., *Pflanzenfam.*, 33, fig. 17, 18).

2. *Gen.*, 49, Ord. 5, Cl. 3.

3. In *Dict.*, V, 347 (Ord.).

4. In *H. B. K. Nov. gen. et spec.*, I, 289.

5. In *Bot. Reg.* (1827), 1068; *Veg. Kingd.*, 147, Ord. 42. — ENDL., *Gen.*, 181, Ord. 65.

6. *Die Fam. Brom.* (Wien, 1857). « Systema... imprimis ad variationes vegetationis constructum, sed char. floris et fructu fere unigue neglectis, botanicis minime conveniens » (B. H.).

7. *Phyto-Iconogr. d. Bromeliaceen* (Wien, 1880).

8. *Handb. of the Bromel.* (Londres, 1889).

9. In *Mart. Fl. bras.*, fasc. 110, 112, 115.

10. Surtout depuis qu'il est démontré que les ovaires absolument supères sont exceptionnels parmi les Broméliacées, plantes, on peut dire, toujours plus ou moins périgynes.

I. BROMÉLIÉES¹. — Fleurs à ovaire infère, avec des ovules ordinairement en nombre indéfini, descendants ou horizontaux. Fruit charnu ou coriace, indéhiscant ou rarement ouvert latéralement. Graines non appendiculées ou à appendice chalazique fort peu développé. — Feuilles presque toujours dentées-épineuses. — 17 genres.

II. TILLANDSIÉES². — Fleurs à ovaire infère seulement à sa base, libre dans la plus grande portion de sa hauteur, avec des ovules en nombre indéfini, ascendants. Fruit sec, septicide. Graines inégalement prolongées aux deux extrémités et à tégument extérieur longitudinalement divisé en filaments (simulant une aigrette). — Feuilles entières. — 5 genres.

III. PITCAIRNIÉES³. — Fleurs hermaphrodites ou unisexuées, à ovaire infère seulement à sa base ou jusque vers le milieu de sa hauteur; la portion supérieure libre. Fruit sec, septicide ou plus rarement loculicide. Graines à appendice des deux extrémités peu développé, linéaire, non divisé en fils, ou à aile marginale, ou sans appendice. — Feuilles ordinairement dentées-épineuses. — 7 genres.

USAGES⁴. — La plus connue des Broméliacées utiles est l'*Ananas*⁵, introduit d'Amérique dans toutes les régions tropicales du globe et cultivé chez nous en serre pour son fruit (fig. 75) excellent, sucré, parfumé, vanté en Amérique comme diurétique et vermicide, abortif avant sa maturité, de même que plusieurs *Bromelia*, tels que les *B. Pinguin*⁶, *fastuosa*⁷ et autres. C'est aussi une plante textile et dont les

1. B. H., Gen., III, 658, Trib. 1. — BAK., Brom., IX, 1, Trib. 1. — WITTM., Pflanzenfam., 41.

2. REICH., Cons., 62. — B. H., Gen., III, 659, Trib. 2. — BAK., Brom., 88. — WITTM., Pflanzenfam., 49. — PUYE BEER, Brom., 9, 22. — PUYE WITTM., Pflanzenfam., 52.

3. A. RICH., in Dict. d'Orb., II, 740 (Trib.). — BEER, Brom., 7 (Phylanthearum Div.). — B. H., loc. cit., 659, Trib. 3. — WITTM., loc. cit., 54. — BAK., Brom., 140, Trib. 3.

4. ENDL., Enchirid., 106. — LINDL., Veg. Kingd., 147. — ROSENTH., Syn. pl. diaphor., 118, 1083. — MEZ, in Mart. Fl. bras., 631.

5. *Ananas sativus* SCH. F., Syst., VII, 1283. — BAK., Brom., 28, n. 1. — *Bromelia Ananas* L., Spec., ed. 1, 285. — LAMK. Dict., I, 143. — *B. sylvestris* VELL. (*Nanas*, *Pita*, *Vanacous*, *Yayama*, *Boniama*, *Pinas*, *Ungley*, *Matzatti*, *Kapatsiaka*). Bien des auteurs ne considèrent que comme des variétés d'une même espèce les

A. pyramidalis MILL., *coccineus* MOR., *variegatus* BOJ., *Porteanus* K. KOCH, *glaber* MILL., *lucidus* MILL., *semiserratus* W., *debilis* SCHULT. F., *macrodonates* MORR., *bracteatus* SCHULT. F., *Sagenaria* ARRUD., *muricatus* ARRUD., *microstachys* LINDL., etc., de même que les divers *Abacaxi* qu'on dit si recherchés au Brésil (ARRUD., Disc. util. Jard., 33).

6. L., Spec., I, 285, n. 2. — LAMK. Dict., I, 145; Ill., t. 223, fig. 2. — *B. ignea* BEER, Brom., 35, 165. — *Agallostachys Pinguin* BEER, Brom., 36. — *Ananas Pinguin* MILL. — *Karatas Plumieri* DEVANS. (non MORR.) (*Pinguin*, *Maya*).

7. LINDL., Coll., I, t. 1. — BAK., Brom., 26, n. 5. — *Bromelia Acanga* W. (non Auctt.). — *B. antiacantha* BERTOL. — *B. Sceptum* FENZL. — *B. Commeliniana* DE VR. — *Agallostachys fastuosa* BEER. — *A. Commeliniana* BEER (*Gravata do mato*). Le *Greigia sphacelata* REG. passe pour avoir aussi un fruit comestible (*Chupon*).

fibres servent à faire des tissus délicats¹. Les baies des vrais *Bromelia* sont rarement volumineuses et plaisent peu aux Européens, à cause de leur saveur vineuse ou acidulée. On les a dites âcres ; mais, si elles irritent la muqueuse buccale, c'est probablement par les nombreuses raphides d'oxalate de chaux qu'elles renferment. Les fibres textiles du *Caróá* servent à faire des cordages et des filets : c'est le *Dyckia variegata*². On croit aussi, dans l'Amérique tropicale, que le suc des fruits des Ananas est digestif et, par conséquent, favorable aux dyspeptiques. Ce suc fermenté constitue un vin alcoolique³ qu'on préconise comme stomachique et emménagogue. On accorde les mêmes vertus à celui des *Bromelia laciniosa*⁴, *Binoti*⁵ et des autres espèces mentionnées plus haut. Bien mûr, il devient mucilagineux et pectoral et perd ses qualités vermifuges et anti-aphtheuses. Plusieurs *Tillandsia* et *Ananas* servent encore à l'extraction d'un liquide acide, résineux et balsamique.

Le *Tillandsia usneoides*⁶, petite espèce épiphyte, qui ressemble à une humble mousse blanchâtre, sert à rembourrer des coussins, matelas et divers autres meubles. On en fait aussi des cordages, et son suc est vanté au Pérou comme antihémorrhoidal. Les *T. recurvata* L. et *utriculata* L. servent, dit-on, aux mêmes usages que l'espèce précédente. Le *Puya chilensis*⁷ a la tige gorgée d'une sorte de moelle blanche, spongieuse et aqueuse, qui renferme une sève rafraîchissante, employée par les voyageurs altérés. Sèche, elle constitue un liège léger et poreux. Les fleurs du *P. lanata*⁸ renferment un suc doux et gommeux. La moelle des tiges du *P. Bonplandiana*⁹ est aussi alimentaire en Colombie, sous le nom d'*Achupalla*. L'*Æchmea tincto-*

1. Pitta, *Fil d'Ananas* (à ne pas confondre avec les produits textiles des *Agave*).

2. D. *Glaziovii* BAK., *Brom.*, 133. — *Bromelia variegata* ARRUD., *Pl. Pernamb.* — *Billbergia variegata* SCHULT. F., *Syst.*, VII, 1262. — *B. speciosa* BAK. — *Agallotachys variegata* REER. — *Neoglaziovia variegata* MEZ. *Fl. bras.*, 427, t. 80, fig. 1 (voy. p. 112).

3. *Vino de Ananas*, *Chicha*.

4. MART., in *Rœm. et Sch. Syst.*, VII, 1278. — *Agallotachys laciniosa* K. KOCH. — BAK., *Brom.*, 26.

5. MORR. — BAK., *Brom.*, 26 (*Gravata do mato*). Les fleurs de l'*Æchmea exsudans* BAK. (*Gravisia exsudans* MEZ) excrètent un abondant nectar à odeur de miel.

6. L., *Spec.*, ed. II, 411. — LAMK., *Dict.*, I, 619. — MORR., in *Belg. hort.* (1877), t. 17. — MEZ, in *Mart. Fl. bras.*, 613, n. 35. — Bot.

Mag., t. 6309. — *Renealmia usneoides* L. — *R. filiformis intorta* L., *H. Cliff.*, 129. — *Rhizomorpha ochreate* ACHAR., *Syn.*, 391. — *Fucus filum* ESP. — *Camanbaya* MARCGR. (*Crin végétal*, *Barbon*, *Barba de uçar*, *Baumhaar*).

7. MOL., *Sag. Chil.*, ed. II, 284. — REG., *Gartenfl.*, t. 225. — *Fl. serres*, t. 869, 870. — *Bot. Mag.*, t. 4715. — *P. suberosa* MOL. — *P. coarctata* FISCH. — C. GAY, *Fl. chil.*, VI, 11. — *Pourretia coarctata* R. et PAV., *Fl. per. et chil.*, III, 32. — GAUDICH., *Voy. Bon. Bot.*, t. 41-44 (*Puya*, *Cardon*, *Chagual*, *Naguey*).

8. SCHULT. F., *Syst.*, VII, 1233. — BAK., *Brom.*, 125, n. 6. — *Pourretia laxata* H. B. K. — *Bromelia lasiantha* W. — *Pitcairnia lanata* DIETR.

9. SCHULT. F., *Syst.*, VII, 1236. — BAK., *Brom.*, 126, n. 12. — *P. pyramidata* H. B. K. (non R. et PAV.).

*ria*¹ a une racine qui sert à teindre en jaune les étoffes et les filets des Indiens. Presque toutes les Broméliacées connues sont cultivées, pour la singularité de leur feuillage ou la beauté de leurs fleurs, dans les serres des amateurs qui ont déjà obtenu, principalement des *Tillandsia*, *Æchmea*, *Billbergia* et *Pitcairnia*, un grand nombre de variétés et d'hybrides².

1. MEZ, in *Mart. Fl. bras.*, 373, t. 73. — *Æ. bromeliæfolia* BAK. — *A. conspicuiarmata* BAK. — *Bromelia tinctoria* MART., *Reis.*, II, 554. — *Billbergia tinctoria* MART. — *Macrochordium tinctorium* DE VR., in *Jaarb. Ned.*

maal. tuins. (1853), 14, c. ic. — *M. macracanthum* REG., *Gartenfl.* (1886), fig. 37.

2. MORR., *Cat. Brom.* — WITT., *Cat. Brom. Jard. Leid.*, ed. II (1894); *Hybr. Brom. cult. Eur.* (1894).

GENERA

I. BROMELIÆ.

1. **Billbergia** THUNB. — Flores hermaphroditi; receptaculo sacci-formi germen intus adnatum fovente ultraque illud in cupulam margine perianthiiferam producto. Sepala 3, libera obtusa torta, sinistrorsum obtegentia. Petala alterna 3, multo longiora erecta, apice æqualiter v. sub-2-labiatis patula, nunc revoluta, in alabastro torta dextrorsumque obtegentia. Laminæ verticales 2, petalis interiores iisque nisi ad margines integras v. undulatas longitudinaliter adnatæ, apice attenuatæ obtusæ v. 2-lobæ, nunc ibi evanidæ v. omnino deficientes. Stamina 6, quorum alternipetala 3, libera; oppositipetala autem sublibera v. imo v. ad medium petalum connata, compressa v. (*Quesnelia*) latiora fereque ad apicem petalo adnata; anthera dorso cum filamento continua, nunc versatili, oblonga; loculis ima basi liberis, introrsum rimosis. Squamæ 2, ad stamen quodque laterales, receptaculi margini affixæ, aut supra concavæ fimbriato-laciniatæ, aut plus minus verticales planæque. Germen inferum, 3-loculare, extus glabrum, costatum v. rugosum, sæpe farinaceum; glandulis septalibus nectariferis evolutis, supra germen apertis; stylo erecto obtuse 3-gono tubuloso; ramis stigmatosis membranaceis induplicatis, margine papilloso, inter se plus minus tortis. Ovula in loculis singulis ∞ , placentæ axili brevi v. ellipsoideo-2-lobæ inserta anatropa; chalaza plus minus in conum rectum v. arcuatum producta. Fructus indehiscens, plus minus carnosus; seminibus ∞ ; albumine farinaceo; embryone infero. — Herbæ perennes rupibus v. arboribus affixæ; caule brevi crassiusculo nunc sublignoso, aut simplici, aut e basi ramoso sympodiali. Folia rosulata rigida elongata concavo-convexa, basi nunc dilatata vaginantia, sæpe extus horizontaliter

albido-zonata; marginibus spinoso-serratis; inflorescentia ad summos ramos terminali varia, aut spiciformi flexuosa v. nutante; floribus distichis, 1-bracteatis; aut varie composita; bracteis quaquaversis imbricatis; nunc rarius (*Jonghea*) erecta spiciformi v. (*Quesnelia*) strobiliformi; floribus congestis quaquaversis; bracteis inferioribus vacuis remotiusculis plus minus petaloideo-dilatatis. (*America trop. austr.*) — *Vid. p. 86.*

2. *Æchmea* R. et PAV.¹ — Flores fere *Billbergiæ*²; sepalis ovatis v. lanceolatis, crassis v. coriaceis, sæpe mucronatis, tortis. Petala libera v. sublibera, plerumque sepalis vix v. haud multo longiora, tenuiora, basi intus squamigera³, torta. Stamina 6, corolla breviora, quorum 3 petalorum basi adnata; 3 autem receptaculi margini affixa libera; filamentis tenuibus v. complanatis; antheris oblongis, dorso plus minus alte affixis; loculis basi liberis, introrsum rimosis. Germen inferum; ovulis in loculo ∞ , rarius paucis (2-4), ad chalazam mucronatis. Stylus tenuis; lobis stigmatosis induplicatis tortisque. Fructus baccatus v. subcoriaceus; seminibus minutis. — Herbæ perennes; foliis dense rosulatis, sæpius loriformibus, margine spinoso-dentatis. Inflorescentia varia, spicata v. simpliciter composita racemosa; ramis distichis v. multifariis⁴; bracteis sub flore sæpius coriaceis et terminali-spinosis⁵; pedunculi bracteis foliifor-

1. *Prodr.*, 47, t. 8; *Syst.*, 83; *Fl. per. et chil.*, III, 37, t. 264. — ENDL., *Gen.*, n. 1301. — BAK., in *Trim. Journ.* (1879), 129 (part.); *Brom.*, 32. — WITTM., *Pflanzenfam.*, 47.

2. Plerumque breviores; corolla brevior obtusior recta.

3. Squamis variis, liberis v. adnatis.

4. Floribus purpureis, cærulescentibus, albidis v. flavis.

5. Sectiones in genere heteromorphæ sunt: *Æchmea* (BAK., *Amar.*, 32, 34); inflorescentia composita racemosa multifaria cymigera; sepalis mucronatis; petalis 2-4-plo longioribus. *Hohenbergia* (SCH. F., *Syst.*, VII, 71, 1251 (part.)). — BAK., *Brom.*, 32, Subgen. 2. — *Hoplophytum* BEER. — MORR., *Belg. hort.* (1865), c. ic.; (1873), t. 5. — WITTM., *Pflanzenfam.*, 49, n. 20); inflorescentia 2, 3-pinnatim racemosa; bracteis sepaliisque mucronatis; corolla breviter exserta.

Pironneava (GAUDICH., *Voy. Bon. Bot.*, t. 63. — WITTM., *Pflanzenfam.*, 49, n. 26. — BAK., *Amar.*, 33, Subgen. 3); inflorescentia 2, 3-pinnatim racemosa; spicis dense strobiliformi-cymigeris; germine versus axin incrassato.

Androlepis (AD. BR., ex MORR., *Cat. Brom.*; ex BOULL., in *Rev. hort.* (1870), 12. — BAK., *Brom.*,

33, Subgen. 4); inflorescentia composita racemiformi, spiciformi v. capituliformi; ramis multifariis cymigeris (haud nitide coloratis); germine tereti; bracteis floralibus parvis v. 0.

Lamprococcus (BEER, *Brom.*, 103. — WITTM., *Pflanzenfam.*, 48, n. 17. — BAK., *Brom.*, 33, Subgen. 5); inflorescentia composita cymigera; axibus nitide rubris; bracteis minutis v. 0; sepalis ovatis brevibus inermibus.

Platyæchmea (B. H., *Gen.*, III, 663. — WITTM., *Pflanzenfam.*, 48, sect. 2. — BAK., *Brom.*, 33, Subgen. 6); inflorescentia composita-cymigera ramis distichis; bracteis sæpe rhachidi varie adnatis.

Pectinaria (B. H., *Gen.*, III, 664. — BAK., *Brom.*, 33, Subgen. 7); inflorescentia dense simpliciformi-spicata, raro 2, 3-nata; bracteis floralibus ovato-acuminatis pectinatis; germine subtereti.

Pothuava (GAUDICH., *Voy. Bon. Bot.*, t. 116, 117. — WITTM., *Pflanzenfam.*, 48, n. 16. — BAK., *Brom.*, 33, Subgen. 8); spica simplici; sepalis parvis mucronatis coriaceis; germine subtereti.

Chevaliera GAUDICH., *Voy. Bon. Bot.*, t. 61, 62. — WITTM., *Pflanzenfam.*, 48, n. 18. — BAK.,

mibus scariosis, acutis v. sæpe mucronatis, sæpe rubro-coloratis. (*America trop.*¹)

3. **Streptocalyx** BEER². — Flores fere *Æchmeæ*; sepalis crassis mucronatis arcte tortis³. Petala plus minus elongata; squamis interioribus 0. Stamina libera. Germinis septa crassa, nunc sinuata; ovulis ∞, ad loculi summum angulum inserta, pleraque descendunt. Styli rami valde torti. Fructus indehiscens subexsuccus. — Herbæ perennes; foliis spinescenti-serratis; floribus in racemos terminales elongatos cymigeros dispositis; cymis sæpius 1-paris; bracteis sæpe coloratis. Cætera *Æchmeæ*. (*Brasilia, Guiana*⁴.)

Brom., 34, Subgen. 9); spica simplici densissima strobiliformi; bracteis late ovatis coriaceis, 1-floris; germine ad axin incrassato.

Wittmackia (MEZ, in *Mart. Fl. bras.*, fasc. CX, 274, t. 61); foliis 2-morphis; sepalis haud spiraliter tortis; placentis in angulo loculorum linearibus; ovulis haud caudatis; cæteris *Hohenbergiæ*.

Pranleia (MEZ, loc. cit., 257, t. 58); inflorescentia composita; foliis omnibus basilaribus, 1-morphis, valde aculeato-dentatis, basi haud vaginantibus; perianthii foliolis demum parce v. haud tortis; petalorum callis 2 (v. 0); staminibus 3 petalis altiuscule adnatis; germine suborbiculari; ovulis muticis.

Macrochordium (DE VRIESE. — BEER, *Brom.*, 145. — WITTM., *Pflanzenfam.*, 49, n. 24. — BAK., *Brom.*, 34, Subgen. 10); spicis densis tomentosis; bracteis sepalisque ovatis inermibus; styli ramis brevibus et plerumque breviter tortis.

Canistrum (MORR., *Belg. hort.* (1873), 257, t. 15; (1874), 376, t. 16; (1870), t. 13, 14. — WITTM., *Pflanzenfam.*, 49, n. 25. — BAK., *Brom.*, 34, Subgen. 11); floribus globoso-capitatis; bracteis inferioribus ovatis involuerantibus (coloratis).

Mosenia (LINDM., in *Kon. Svensk. Vet. Akad. Handl.* (1891), 27, t. 5, fig. 1-11); summo pedunculo foliorum involucri cyathiformi cincto; staminibus omnibus a corolla liberis; cæteris *Canistri*.

Gravisia (MEZ, loc. cit., 298, t. 65); foliis anguste linearibus (brunneo-lepidotis) vaginantibus; inflorescentia composita; bracteis coloratis; floribus sessilibus; germine tubo receptaculi coronato; sepalis mucronulatis; petalis conniventibus, 2-ligulatis; placentis linearibus superioribus.

Ortigiesia (REG., *Gartenfl.* (1867), 193, t. 517. — WITTM., *Pflanzenfam.*, 48. — BAK., *Brom.*, 18); foliis sessilibus; inflorescentia centrali dense spiciformi v. capituliformi; sepalis plus minus basi connatis v. liberis, apice mucronatis;

petalorum limbo parvo; bracteis floralibus serratis; ovulis haud appendiculatis.

1. Spec. ad 140. VELL., *Fl. Num.*, Atl., III, t. 135, 138 (*Tillandsia*). — SALISB., *Par. lond.*, t. 40. — PÖPP. et ENDL., *Nov. gen. et spec.*, t. 159. — HOOK., *Exot. Fl.*, t. 143 (*Bromelia*). — RUDGE, *Pl. Guian.*, t. 50 (*Tillandsia*). — KN. et WESTC., *Fl. Cab.*, t. 284. — REICHB., *Icon. exot.*, t. 239, 240 (*Bromelia*). — LODD., *Bot. Cab.*, t. 801 (*Bromelia*). — WAWR., in *Öst. Bot. Zeitschr.* (1880), 116; *Pr. Maxim. Reis. Bot.*, t. 28; *Pr. Cob. Reis. Bot.*, I, t. 23, 24; 28 (*Lamprococcus*); 31 A, 35. — GRISEB., *Fl. brit. W.-Ind.*, 592; *Symb. Fl. argent.*, 329 (*Chevaliera*). — MAUR., in *C. rend. Ass. fr.* (1857), 246, 555, c. tab. (*Chevaliera*). — LINDM., in *Kon. Svensk. Vet. Akad. Handl.* (1891), Bd 24, t. 5, 6; t. 8 (*Canistrum*, *Macrochordium*). — SAUND., *Ref. bot.*, t. 284; 285 (*Hohenbergia*). — MORR., *Belg. hort.* (1862), 97, c. ic.; (1865), c. ic.; (1870), t. 18; (1873), t. 5, 15; (1874), t. 16; (1879), t. 13, 14; (1880), t. 13; (1881), t. 13. — MEZ, in *Mart. Fl. bras.*, fasc. CX, 247, t. 57 (*Canistrum*), 257, t. 58 (*Pranleia*), 267, t. 60 (*Hohenbergia*), 274, t. 61 (*Wittmackia*). — F. MUELL., in *Ber. deutsch. Bot. Ges.*, XI, 364. — HOOK. *Icon.*, t. 1851. — *Bot. Reg.*, t. 766, 1130. — *Bot. Mag.*, t. 3186, 3304 (*Billbergia*), 4832; 4883 (*Billbergia*), 5235, 5321 (*Echinostachys*), 5447, 5668, 6329, 6435, 6447, 6565, 6939.

2. In *Flora* (1854), 348; *Brom.*, 22, 141. — B. H., *Gen.*, III, 629, n. 1. — WITTM., *Pflanzenfam.*, 48. — BAK., *Brom.*, 30.

3. Latere aperto sæpe in alam magnam producto.

4. Spec. 7, 8. MART., in *Ram. et Sch. Syst.*, VII, 1271 (*Æchmea*). — GAUDICH., *Voy. Bon. Bot.*, t. 64 (*Pironneava*). — BAK., *Brom.*, 35, n. 3 (*Æchmea*). — LINDM., in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* (1891), 37. — WITTM., in *Engl. Jahrb.* (1891), Beibl., 29, 14 (*Pironneava*). — CARR., in *Rev. hort.* (1877), 129, c. ic. (*Lamprococcus*). — MORR., in *Belg. hort.* (1883), 13, t. 1, 2. — MEZ, in *Mart. Fl. bras.*, fasc. CX, 279, t. 62.

4. *Bromelia* L.¹ — Flores liberi; receptaculo ultra germen inferum adnatumque cupulari. Sepala 3, libera, receptaculi margini inserta obtusa torta. Petala 3, calyce longiora, basi in tubum brevem connata, apice obtusa torta. Stamina 6, tubo affixa; filamentis liberis; antheris linearibus erectis subbasifixis; loculis basi liberis, introrsum rimosis. Germen cylindraceum v. obtuse 3-gonum; styli gracilis ramis brevibus late conduplicatis tortis. Fructus baccatus sphaericus v. ovoideus. Semina compressa, nunc orbicularia, albuminosa. — Herbæ perennes, nunc elatæ; foliis rosulatis longis ensiformibus rigidis late spinoso-dentatis; floribus² in racemum spurium cymigerum terminalem longiusculum (*Eubromelia*) v. breviorum contractumque capituliformem (*Rhodostachys*³) dispositis; bracteis variis, nunc coloratis; inferioribus nunc spinoso-dentatis. (*America trop. et extratrop.*⁴)

5. *Ananas* T⁵. — Flores *Bromeliæ*; sepalis liberis carinato-acuminatis. Petala erecta multo longiora, staminum ope nunc cohærentia. Squamellæ ad petalorum basin 2. Stamina oppositipetala basi adnata; antheris linearibus introrsis petalo brevioribus. Germen inferum, basi rhachi adnatum v. immersum; styli erecti ramis linearibus rectis v. arcuatis vix tortis. Ovula in loculis plura horizontalia v. descendencia. Fructus baccati cum rhachi et cum bracteis adnatis in syncarpium ovoideum connati, nunc ex parte decidui basinque persistentem relinquentibus. Semina oblongo-ovoides compressiuscula; embryo juxta hilum intra albumen omnino v. ex parte intruso. — Herbæ perennes; caule brevi, parce v. dense foliato; foliis elongatis spinoso-serratis; inflorescentia strobiliformi terminali; floribus⁶ crebris spiraliter quaquaversis; bracteis fertilibus apice tantum liberis;

1. *Gen.*, ed. I, n. 282 (part.). — ADANS., *Fam. des pl.*, II, 67 (part.). — K., *Syn.*, I, 299 (part.). — ENDL., *Gen.*, n. 1300 (part.). — SPRENG., *Syst.*, II, 20 (part.). — RÖEM. et SCHULT., *Syst.*, VII, 1274. — B. H., *Gen.*, III, 660, n. 2. — WITTM., *Pflanzenfam.*, 43. — BAK., *Brom.*, 25. — *Agallostachys* BEER, *Brom.*, 35.

2. Majusculis, sæpe decoris, albidis, roseis, rubris, violaceis v. cærulescentibus.

3. PHIL., in *Linnaea*, XXIX, 57; XXX, 201. — B. H., *Gen.*, III, 662, n. 10. — WITTM., *Pflanzenfam.*, 45. — BAK., *Brom.*, 27. — *Ruckia* REIC., *Gartenfl.* (1868), 69, t. 571.

4. Spec. ad 15. L., *Spec.*, ed. I, I, 285. — GÆRTN., *Fruct.*, t. 11 (*Ananas*). — JACQ., *H. schænbr.*, t. 55. — RED., *Lil.*, t. 396. — LINDL.,

Coll., I, t. 1; in *Part. Fl. Gard.*, II, t. 65 (*Bromelia*). — W., *Spec.*, II, 10. — RUDGE, *Pl. Guian.*, t. 49 (*Bromelia*). — C. GAY, *Fl. chil.*, t. 67 (*Bromelia*). — MORR., in *Belg. hort.* (1873), t. 14; (1881), 164. — VERL., in *Rev. hort.* (1868), 211, c. ic. (*Hechtia*). — BERTOL., *Misc.*, IV, t. 1. — GRISEB., *Symb. Fl. argent.*, 329. — MEZ, in *Mart. Fl. bras.*, fasc. CX, 181, t. 51 (*Rhodostachys*), 183 (part.). — BLANCH., in *Rev. hort.* (1881), 153, c. fig. — *Bot. Mag.*, t. 2392.

5. *Inst.*, 653, t. 126-128. — ADANS., *Fam. des pl.*, II, 67 (*Zingiberaceæ*). — B. H., *Gen.*, III, 662, n. 11. — WITTM., *Pflanzenfam.*, 45, fig. 23. — BAK., *Brom.*, 22. — *Ananassa* LINDL., *Bot. Reg.*, sub t. 1068; t. 1081.

6. Purpureis, violaceis v. cærulescentibus.

summis vacuis foliaceis v. coloratis comamque sæpe viviparam ultra fructum compositum formantibus. (*America trop. utraque*¹.)

6. *Acanthostachys* LINK, KL. et OTT.² — Flores fere *Bromeliæ*; receptaculo subsphærico, basi lateraliter dilatato. Sepala deltoidea acuta. Petala paulo longiora lingulata, basi squamata. Stamina 6: alternipetala libera; oppositipetala autem imæ corollæ adnata; filamentis valde complanatis; antheris introrsis ad basin dorsifixis. Germen inferum; styli gracilis ramis stigmatosis breviter cuneatis haud tortis. Ovula in loculis 2, 3, collateraliter descendencia, ad chalazam longe tenuiterque caudata. Fructus perianthio coronatus pulposus. — Herba perennis; foliis paucis rigidis subulatis, intus canaliculatis, obscure lepidotis, margine spinoso-denticulatis; pedunculo ad medium v. apice strobilifero; strobili squamis rigidis serratis; bracteolis tenuioribus; floribus ad squamas axillaribus abque iis cum fructibus omnino liberis. Cætera *Ananassæ*. (*Brasilia*³.)

7. *Aræococcus* AD. BR.⁴ — Flores fere *Æchmæ*; receptaculo ovoideo. Sepala supera parva ovata, torta v. imbricata. Petala paulo longiora torta. Stamina 6, libera; filamentis basi crassioribus; antheris corolla brevioribus dorsifixis, introrsum rimosi. Germen inferum; styli tenuis ramis stigmatosis brevibus erectis v. parce tortis. Ovula in loculis 2, collateraliter descendencia; altero nunc abortivo, v. ∞. Fructus subexsuccus. Semina pauca v. 1, oblonga (nigrescentia) exappendiculata; albumine copioso farinaceo; embryone juxta hilum parvo subintruso. Herbæ perennes; rhizomate repente; ramis aeriis basi vaginis foliorum obtectis; vaginis superioribus limbo angusto spinescenti-serrato superatis; floribus⁵ in racemum amplum terminalem longe pedunculatum laxè compositum cymigerumque dispositis, ad axillam bractearum sessilibus v. pedicellatis. (*Guiana, Brasilia*⁶.)

1. Spec. 3, 4. PLUM., *Amer.*, t. 60. — L., *Spec.*, 408 (*Bromelia*). — RED., *Lil.*, t. 455, 456 (*Bromelia*). — VELL., *Fl. flum.*, Atl., III, t. 113 (*Bromelia*). — ROEM. et SCH., *Syst.*, VII, 1283. — DC., in *Mém. Gen.*, VII, 161. — MORR., *Belg. hort.* (1872), t. 17, 19; (1878), t. 4, 5. — MEZ, in *Mart. Fl. bras.*, 287. — *Bot. Reg.*, t. 1081. — *Bot. Mag.*, t. 1554, 5025.

2. *lc. pl. rar.*, I, 21, t. 9. — BAK., *Brom.*, 24 (part.).

3. Spec. 1. *A. strobilacea* LINK. — LINDL., in *Paxl. Gardn.*, III, 46, c. ic. — MEZ, in *Mart. Fl. bras.*, 287, t. 63, l. — *Hohenbergia*

strobilacea SCHULT., *Syst.*, 1252. — BEER, *Brom.*, 72.

4. In *Ann. sc. nat.*, sér. 2, XV, 370. — B. H., *Gen.*, III, 664, n. 13. — WITTM., *Pflanzenfam.*, 49. — BAK., *Brom.*, 28.

5. Minutis, nunc cærulescentibus.

6. Spec. 2. *A. micranthus* AD. BR. — *Bromelia Acanga* SCHULT. F., VII, 1281 (non alior.); et *A. parviflorus* LINDL., *Brom. Regnell.*, 12. — MEZ, in *Mart. Fl. bras.*, 262, t. 69. — *Æchmea parviflora* BAK., *Brom.*, 50. — *Lamprococcus chlorocarpus* WAWR., *Reis. Maxim. Bot.*, t. 28 (? Vid. *Bakeria*, p. 118. n. 28).

8. **Karatas** PLUM.¹ — Flores fere *Bromeliæ*; sepalis sæpius oblongo-lanceolatis. Corollæ gamopetalæ exsertæ tubus cylindraceus; lobis ovatis v. lingulatis tortis patulis. Stamina tubo affixa; filamentis brevibus v. longiusculis, aut dorso ad medium (*Nidularium*²), aut ad basin affixis; antheris lineari-oblongis; loculis sape basi liberis, introrsum rimosis. Germen inferum, ∞ -loculare; placenta nunc subpeltata; styli ramis complicatis tortis. Fructus baccatus v. coriaceus, glaber v. tomentosus, nunc fusiformis; seminibus sphaericis inappendiculatis. — Herbæ perennes; foliis ensiformibus, loratis v. lanceolatis, basi nunc dilatata vaginantibus, margine spinosis; floribus³ in capitulum spurium pedunculatum dispositis; pedunculo brevi crasso; bracteis cymigeris; cymis contractis, 1-paris; foliis interioribus (sæpe coloratis) involucrantibus. (*America trop. utraque*⁴.)

9. **Greigia** REG.⁵ — Flores fere *Karatas*; sepalis liberis lanceolatis. Petala in tubum longum infundibularem connata; limbi lobis ovatis. Stamina fauci affixa; antheris filamento longioribus subbasifixis lineari-oblongis; loculis ima basi liberis, introrsum rimosis. Germen inferum, clavato-3-quetrum; styli gracilis lobis stigmatosis exsertis brevibus crassiusculis rectis. Fructus baccatus⁶ pulposus, basi attenuatus; seminibus⁷ oblongis ∞ ; albumine copioso. — Herbæ perennes; foliis longissimis ensiformibus rigidis spinosis; floribus⁸ ad axillam foliorum exteriorum dense capitatis; cæteris *Karatas*. (*Chili et Columbia austr. andin.*⁹)

10? **Distiactanthus** BAK.¹⁰ — Flores fere *Karatas* (v. *Bromeliæ*); sepalis lineari-oblongis, ima basi connatis. Petala multo longiora in tubum cylindraceum connata, apice tantum patula. Stamina corolla

1. ADANS., *Fam. des pl.*, II, 67. — B. H., *Gen.*, III, 660, n. 3. — WITTM., *Pflanzenfam.*, 44. — BAK., *Brom.*, 1.

2. LEME, *Jard. fleur.*, IV, *Misc.*, 60, t. 411. — WAWRA, in *Est. Bot. Zeitschr.* (1880), 112. — WITTM., *loc. cit.*, n. 3, fig. 22. — MEZ, in *Mart. Fl. bras.*, 210, t. 55, 56. — Regelia LEME, *Ill. hort.* (1880), sub t. 245 (non SCHAU.). — Gemellaria PIN., in *Leme Jard. fl.*, II, 13; IX, sub t. 329.

3. Albis, lutescentibus, lilacinis v. purpureis.

4. Spec. ad 25. JACO., *H. vindob.*, t. 31, 32; *lc. rar.*, t. 60 (*Bromelia*). — RED., *Lil.*, t. 457 (*Bromelia*). — LINDL., *Of. Acad. holm.* (1890), 542; in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.*, Bd 24, 6.

— ANT., *Brom.*, t. 24-33. — BEER, *Brom.*, 28, 75 (*Nidularium*). — REG., *Gartenfl.* (1859), 265, 267 (*Nidularium*). — MORR., in *Belg. hort.* (1872), t. 11-13. — MEZ, *loc. cit.*, 187, n. 3-6 (*Bromelia*). — *Bot. Mag.*, t. 2892, 5502 (*Billbergia*), 6024, 6904.

5. *Gartenfl.* (1865), 137, t. 474. — B. H., *Gen.*, III, 660, n. 4. — WITTM., *Pflanzenfam.*, 45. — BAK., *Brom.*, 12.

6. Pulposus, albidus.

7. Fuscatis.

8. Albis v. rubris.

9. Spec. 3. R. et PAV., *Fl. per. et chil.*, III, 32 (*Bromelia*). — C. GAY, *Fl. chil.*, VI, 8 (*Bromelia*). — PHIL., *Cat. pl. chil.*, 278.

10. *Brom.*, 13.

multo breviora ejusque ad faucem affixa; antheris linearibus dorsifixis. Germen ∞ -ovulatum; styli ramis stigmatosis linearibus haud tortis. Fructus oblongo-cylindræus baccatus. Herbæ perennes; foliis petiolatis; limbo lato; floribus¹ in capitulum spurium terminale congestis; cæteris *Bromeliæ*. (*N. Granada, Reg. amazon.*²)

11. **Cryptanthus** OTT. et DIETR.³ — Flores fere *Karatas*; calycis superi tubo campanulato v. subcylindrico; lobis ovato-lanceolatis muticis, imbricatis v. tortis. Petala longiora, ima basi connata, torta demumque expansa. Stamina 6, corollæ 2-seriatim affixa; filamentis tenuibus; antheris oblongis plus minus alte dorsifixis, versatilibus; loculis basi sæpius discretis, introrsum v. fere ad margines rimosis. Germen inferum; ovulis in loculo quoque paucis (3, 4) v. ∞ . Stylus gracilis; ramis stigmatosis falcatis induplicatis, superne ad margines papillois, haud tortis. Fructus demum siccus; seminibus subsphæricis. — Herbæ perennes fragiles; foliis rosulatis ∞ , oblongo-lanceolatis, sæpe maculatis v. vittatis; exterioribus in axilla stolonigeris; sessilibus v. petiolatis, ad apicem aculeatis; floribus⁴ ad axillam foliorum supremorum spurie capitatis. (*America merid. trop.*⁵)

12? **Ochagavia** PHIL.⁶ — Flores hermaphroditi; α perianthii superi tubulosi lobis 6; exterioribus calycinis erectis; interioribus autem paulo longioribus (corallinis), apice subreflexis. Stamina 6, tubi fauci inserta; filamentis longe filiformibus, basi dilatatis; antheris lineari-oblongis, infra medium affixis, basi emarginatis. Germen inferum, 3-quetrum; stylo filiformi, apice incrassato truncato infundibulari stigmatoso-sub-3-lobo. Ovula ∞ , horizontalia, angulo interno loculorum 2-seriatim inserta. Fructus (latus) baccatus compressus. — Herba perennis caulescens, dense foliosa; caule (pedali) simplici v. parce ramoso; foliis breviusculis, subtus argenteo-lepidotis,

1. Lutescentibus v. purpureis et albo-marginatis.

2. Spec. 2. REG., *Gartenfl.* (1888), 157 (*Cryptanthus*). — MORR., in *Belg. hort.* (1881), 164 (*Bromelia*). — MEZ, in *Mart. Fl. bras.*, 186, n. 1, 2, t. 52 (*Bromelia*). — WITT., *Cat. Brom. Jard. Leid.*, 19 (*Bromelia*).

3. In *Gartenz.*, IV, 297 (1836). — ENDL., *Gen.*, n. 1301¹. — SPACH, *Suit. à Buff.*, XII, 399. — BEER, *Brom.*, 18, 75. — B. H., *Gen.*, III, 661, n. 5. — WITTM., *Pflanzenfam.*, 45. — BAK., *Brom.*, 14. — *Pholidophyllum* VIS., *Ind. sem. H. patav.* (1845); in *Mem. Ist. venet.*, V, 343.

— *Madvigia* LIEBM., in *Ann. sc. nat.*, sér. 4, II, 373 (part.).

4. Albis, inconspicuis.

5. Spec. ad 12. BAK., in *Scand. Ref. bot.*, t. 287. — WAWR., in *Pr. Maxim. Reis. Bot.*, 163, t. 87. — MORR., *Belg. hort.* (1880), 241; (1881), 342, t. 17. — REG., *Gartenfl.*, t. 458. — MEZ, in *Mart. Fl. bras.*, 200. — ROEM. et SCH., *Syst.*, VII, 1229 (*Tillandsia*). — *Bot. Reg.*, t. 1157 (*Tillandsia*). — *Bot. Mag.*, t. 5270 (*Billbergia*). — WALP., *Ann.*, VI, 66 (*Madvigia*).

6. In *Ann. sc. nat.*, sér. 4, VII, 107. — B. H., *Gen.*, III, 661, n. 8. — BAK., *Brom.*, 19.

margine spinoso-dentatis; floribus⁴ in spicam terminalem dispositis bracteasque æquantibus. (*Ins. J. Fernandez* ².) »

13? *Disteganthus* LEME³. — Flores fere *Bromeliæ*; calyce tubuloso; lobis paryis ovatis tortis. Petala multo longiora, oblongo-unguiculata libera; limbis exsertis patentibus. Stamina 6, quorum 3 sepalorum basi, 3 autem corollæ fauci affixa; antheris oblongis dorsifixis introrsis inclusis. Germen turbinatum inferum; stylo gracili; ramis stigmatosis sublinearibus tortis. Ovula in loculis 2-4. Fructus oblongus baccatus; seminibus oblongis glabris. — Herba perennis brevis; rhizomate crassiusculo; foliis rosulatis spinoso-serratis; floribus⁴ in spicas breves strobiliformes crassas e rhizomate ortas dispositis; bracteis⁵ imbricatis obtusis crebris. (*Guiana* ⁶.)

14. *Portea* AD. BR.⁷ — Flores fere *Streptocalycis*; receptaculo ultra germen in cupulam intus disciferam producto; disco margine tenui sinuato. Calyx basi tubulosus; lobis inæqui-obovatis, valde inæqualibus; costa excentrica plus minus longe aristata; præfloratione torta; latere minore intimo. Petala longe lingulata calyce multo longiora torta. Stamina 6: alternipetala receptaculi margini affixa; oppositipetala autem petalo adnata. Squamæ ad filamenta laterales elongatæ, petalo secundum lineam verticalem affixæ, margine liberæ. Squamulæ 6, cum staminibus receptaculo affixæ alternantes suborbiculares laciniatæ. Antheræ lineares introrsæ dorsifixæ. Germinis loculi completi v. superne incompleti, ∞-ovulati. Stylus longe filiformis; lobis stigmatosis complicatis arcte tortis. Ovula ∞, acuminata. Fructus (parvus) indehiscens. — Herbæ perennes; foliis fere *Billbergiæ*; floribus⁸ in spicam terminalem stipitatum dispositis; bracteis magnis (coloratis); axilla 1-pluriflora. (*Brasilia* ⁹.)

1. Roseis, parvis.

2. Spec. 1. *O. elegans* PHIL. « Genus evidenter (B. H.) *Rhodostachyo* affine ».

3. *Fl. serres* (1847), t. 227. — B. H., *Gen.*, III, 661, n. 6. — WITTM., *Pflanzenfam.*, 45. — BAK., *Brom.*, 18.

4. Aureis, majusculis.

5. Rubris; inferioribus sterilibus.

6. Spec. 1. *D. basilateralis* LEME.

7. K. KOCH, *Ind. sem. H. berol.* (1856). — B. H., *Gen.*, III, 662, n. 9 (part.). — WITTM., *Pflanzenfam.*, 47. — BAK., *Brom.*, 21. — H. BN, in *Bull. Soc. Linn. Par.*, 1145.

8. Purpureis v. violaceis.

9. Spec. 3. ANT., in *Gartenfl.* (1875), 129. — REG., in *Act. H. petrop.*, III, 283 (*Billbergia*); *Gartenfl.* (1875), 166 (*Billbergia*). — *Rev. hort.* (1870), 230, c. fig. — WAWR., in *Æst. Bot. Zeitschr.*, XXX, 116 (*Æchmea*); *Pr. Sax.-Cob. Reis. Bot.*, 146, t. 34, A; t. 147, t. 24, 35, A; in *Gartenfl.* (1884), 190; in *Bull. Fédér. Soc. hort. Belg.* (1880), 57 (*Æchmea*). — BAK., *Brom.*, 32, n. 8 (*Streptocalyx*), 34, n. 2; 51, n. 65 (*Æchmea*). — ANT., in *Gartenfl.* (1875), t. 829. — WITTM., *Cat. Brom. Jard. Leid.*, 49. — MEZ, in *Mart. Fl. bras.*, 294, t. 64.

15. **Fernseea** BAK.¹ — Flores fere *Bromeliæ*; sepalis lineariblongis obtusis, basi breviter ultra receptaculum connatis. Petala lingulata paulo longiora. Stamina 6, fauci affixa corollaque breviora; filamentis linearibus; antheris lineari-oblongis introrsis, ad basin dorsifixis. Germen inferum subsphæricum, 3-sulcum; styli gracilis ramis stigmatosis longe linearibus arcte tortis. Ovula in loculis pauca, ad chalazam appendiculata. Fructus sphæricus (parvus) indehiscens; seminibus 1-paucis (parvis). — Herba perennis; caule brevissimo; foliis basilaribus crebris, e basi ovata longe linearibus arcuatis, subtus lepidotis, margine deltoideo-spinosis, secundum axin ad bracteas scariosas integras reductis; floribus² in racemum cylindraceum densum parce compositum dispositis; bracteis lanceolatis scariosis. (*Brasilia mont. centr.*³)

16? **Neoglaziovia** MEZ.⁴ — Flores fere *Portesiae* (v. *Fernseeæ*); sepalis summo tubo receptaculi infundibulari affixis, erectis conniventibus, margine intimo alatis, apice mucronulatis. Petala longiora erecta obovato-oblonga, basi intus verticali-2-callosa. Stamina inclusa; filamentis linearibus compressis. Germen teres glabrum; styli gracilis lobis stigmatosis contortis. Ovula in placentis singulis 2-5, inappendiculata; funiculo brevi. Fructus baccatus succosus. — Herba perennis alta; foliis paucis, basi anguste vaginanti-amplexicaulibus, minute aculeatis, dorso lepidotis; superioribus coloratis; floribus⁵ in summo scapo racemosis, breviter pedicellatis; bracteis lineari-lanceolatis, 1-floris. (*Brasilia centr.*⁶)

17. **Ronnbergia** MORR.⁷ — Flores fere *Billbergiæ*; calyce supra germen breviter campanulato-tubuloso; lobis ovatis parvis inermibus. Petala oblongo-unguiculata, in tubum ultra calycem conniventia; summo limbo solo patente. Stamina breviora, calycis fauci affixa; antheris breviter linearibus basifixis inclusis. Germen ∞-ovulatum; ovulis apice appendiculatis; styli ramis linearibus tortis. Fructus

1. *Brom.*, 19.

2. Rubentibus, parvis.

3. Spec. 1. *F. Itatiaia* BAK. — MEZ, in *Mart. Fl. bras.*, 429, t. 80, II. — *Bromelia Itatiaia* WAWR., *Reis. Pr. Sax.-Cob. Bot.*, 141, t. 19; in *Est. Bot. Zeitschr.*, XXX, 114. — *Æchmea stenophylla* BAK., *Brom.*, 64.

4. In *Mart. Fl. bras.*, 426, t. 80, I.

5. Purpureo-violaceis, parvulis.

6. Spec. 1. *N. variegata* MEZ. — *Bromelia variegata* ARRUD., *Diss.*, 7; *Discors.*, 42; *Cent. pl. Pernamb.* — *Billbergia variegata* SCHULT., *Syst.*, VII, 1262. — *B. speciosa* BAK., *Brom.*, 73. — *Agallostachys variegata* BEER. — *Dyckia Glaziovii* BAK., *Brom.*, 133.

7. Ex ANDRÉ, in *Ill. hort.* (1874), 120, t. 177. — B. H., *Gen.*, III, 661, n. 7. — PAX, *Pflanzenfam.*, 49. — BAK., *Amar.*, 20.

parvus sphæricus baccatus. — Herba perennis erecta; foliis longe petiolatis integerrimis amplis; floribus¹ in summo scapo longo in racemum compositum dense spiciformem dispositis; bracteis inferioribus erectis angustis. (*Columbia*².)

II. TILLANDSIÆ.

18. *Tillandsia* L. — Flores regulares v. subregulares; receptaculo subplano v. concaviusculo. Sepala 3, margini receptaculi inserta libera rigidula erecta, torta sinistrorsumque obtegentia. Petala multo v. paulo longiora 3, erecta inque tubum rectum v. arcuatum conniventia, calyce multo v. paulo longiora, dextrorsum obtegentia. Squamulæ petalis interiores 2, variæ v. 0. Stamina 6, intra corollam inserta; filamentis gracilibus liberis; antheris oblongo-linearibus erectis inclusis v. exsertis, basifixis v. dorsifixis; loculis inferne liberis, introrsum rimosis. Germen sessile; basi sublibera v. receptaculo plus minus immersa; stylo gracili, nunc exserto, apice stigmatoso-3-lobo; lobis patentibus brevibus obtusis v. 2-lobulatis, margine papilloso, haud v. leviter tortis. Ovula in loculis ∞ , adscendentia; chalaza nunc varie producta. Fructus pyramidatus, oblongus v. linearis, maxima ex parte superus, septicidus; exocarpio nunc solubili; endocarpii v. pericarpii totius valvis margine placentiferis, nunc inflexo-subclausis invicemque solubilibus. Semina ∞ , adscendentia longe linearia; nucleo demum a testa in fila longa fissa indeque pappiformi soluto; chalaza varie producta. Embryo ad imum nucleum sæpius albumine farinaceo longior. — Herbæ epiphyticæ v. saxicolæ, nunc rarius terrestres, glabræ v. rarius furfuracæ; foliis rosulatis angustis integris, sæpe rigidis; floribus in spicam terminalem simplicem v. ramosam dispositis, nunc raro solitariis; bracteis variis, 1-floris. (*America trop. et temp. utraque.*) — *Vid. p. 93.*

19. *Catopsis* GRISEB.³ — Flores fere *Tillandsiæ*⁴; sepalis erectis obtusis persistentibus. Petala æqualia v. paulo longiora tenuiora.

1. Cæruleis v. violaceis.

2. Spec. 1. *R. Morreniana* LIND. et ANDRÉ.

3. In *Nachr. Ges. Wiss. Gött.* (1844), 10, 21. — B. H., *Gen.*, III, 670, n. 27. — WITTM., *Pflanzenfam.*, 59. — BAK., *Brom.*, 153. — *Pogon-*

spermum AD. BR., in *Ann. sc. nat.*, sér. 5, I, 327, t. 23. — *Tussacia* W. — SCHULT., *Syst.*, VII, X, 57. — KL. — BEER, *Brom.*, 99 (non REICHB., non BENTH.).

4. Minores indecori.

Stamina hypogyna inclusa. Germen sessile liberum; styli brevissimi ramis erectis, patentibus v. recurvis. Fructus septicidus; valvis arcte incurvis. Semina ∞ , adscendentia; stipite brevi crasso; embryone ad imum albumen farinaceum parvo breviter intruso; appendice apicali brevi v. longissima pluries plicata, in fila numerosa fissa indeque longe pappiformi. — Herbæ perennes; foliis in caule brevi integris, membranaceis v. crassiusculis; floribus in spicam simplicem v. compositam dispositis, remotis, sessilibus, ad axillas bractearum solitariis v. 2-nis. (*Antillæ, Mexicum, America austr. andin.*¹)

20. **Caraguata** LINDL.² — Flores fere *Tillandsiæ*. Sepala 3, libera, torta, rigida v. scariosa. Petala totidem libera, majora v. minora, torta. Stamina 6, 2-seriata; filamentis liberis; antheris introrsis, 2-rimosis. Germen superum liberum; loculis 3, completis, angulo interno ∞ -ovulatis; stylo erecto, apice in ramos intus papillosos v. plumosos tortos diviso. Capsula trigona septicida; seminibus ∞ , basi in stipitem elongatum demumque in fila fissum productis. — Herbæ perennes; foliis inferioribus confertis concavis; superioribus paucis angustis; summis sub inflorescentia involucrantibus plerumque majoribus; floribus in glomerulos densos composite capituliformes dispositis, pluribracteatis; bracteis nunc nitide coloratis. (*Antillæ, America centr. et austr. occid.*³)

21. **Guzmania** R. et Pav.⁴ — Flores *Caraguatæ*; sepalis oblongis tortis, ima basi connatis. Corollæ gamopetalæ lobi torti, tubo cylindrico breviores. Stamina corollæ fauci affixa; antheris circa stylum plus minus alte syngenesi. Germen superum v. subsuperum; styli elongati ramis brevibus obtusis induplicatis. Fructus cæteraque

1. Spec. ad 15. R. et Pav., *Fl. per. et chil.*, t. 269, 271 b (*Tillandsia*). — Hook., *Exot. Fl.*, t. 218 (*Tillandsia*). — Link, Kl. et Ott., *l.c. pl. rar.*, t. 40 (*Tillandsia*). — Cham. et Schchtl., in *Linnaea*, VI, 35 (*Tillandsia*). — Bak., in *Trim. Journ.* (1887), 175. — Wittm., in *Engl. Jahrb.*, XI, 70. — Mez, in *Mart. Fl. bras.*, 575, t. 107. — Witt., *Cal. Brom. Jard. Leid.*, 21.

2. In *Bot. Reg.*, sub t. 1068. — Endl., *Gen.*, 183. — B. H., *Gen.*, III, 668, n. 23. — Wittm., *Pflanzenfam.*, 55. — Bak., *Brom.*, 142. — Devillea Bert., in *R. et Sch. Syst.*, VII, 1229. — *Mas-sangea* Morr., in *Belg. hort.* (1877), 59, 199, t. 8. — *Schlumbergeria* Morr., in *Belg. hort.* (1883), 46, t. 4-6. — B. H., *Gen.*, III, 668, n. 24.

3. Spec. ad 40. Jacq., *St. amer.*, t. 62 (*Tillandsia*). — Mart., in *R. et Sch. Syst.*, VII, 1198 (*Bonaparteia*). — Beer, *Brom.*, 43 (*Anoplophytum*). — André, in *Rev. hort.* (1886), 324 (*Guzmania*). — Morr., in *Belg. hort.* (1882), 113, t. 8, 9 (*Guzmania*). — Reg., *Gartenfl.* (1885), 116 (*Guzmania*). — Mez, in *Mart. Fl. bras.*, 618. — *Bot. Mag.*, t. 4991 (*Puya*), 6059, 6675, 6765.

4. *Fl. per. et chil.*, III, 38, t. 261. — Pers., *Enchir.*, n. 765. — Endl., *Gen.*, n. 1308. — Beer, *Brom.*, 21, 101. — B. H., *Gen.*, III, 669, n. 25. — Wittm., *Pflanzenfam.*, 55, fig. 20, B. — Bak., *Brom.*, 152. — *Guzmania* Pers., *Enchir.*, I, 344. — Beer, *Brom.*, 21, 101.

Caraguatæ. — Herbæ perennes; foliis *Caraguatæ*; floribus in spicam simplicem bracteata dispositis. (*America trop.*¹⁾)

22? **Sedirea** ANDRÉ². — « Flores fere *Caraguatæ*; sepalis ad medium connatis, superne valde dilatatis, convoluto-imbricatis, demum patentibus. Petala intra calycem angustissima, ibi cohærentia, apice ovata patentia exserta. Stamina tubo adnata; antheris sagittatis connatis dorsifixis inclusis. Germen liberum; stylo filiformi, apice clavato breviter stigmatoso-3-lobo; ovulis ∞ . Fructus coriaceus (*Tillandsiæ*); seminibus ∞ , erectis angustis, basi in stipitem pappiformem inque fila fissum productis. — Herbæ perennes, scandentes et ab arboribus pendentes, basi radicales vaginisque oblectæ, usque ad inflorescentiam foliatæ. Folia breviter vaginantia, graminea v. caricina. Flores³ in summis caulibus pauci, ad axillam bractæ coloratæ solitarii; folio florali ad inflorescentiæ basin spathaceo colorato. (*Columbia et Ecuadoria andin.*⁴⁾ »

III. PITCAIRNIEÆ.

23. **Pitcairnia** LHÉR. — Flores hermaphroditi; receptaculo cupulari germinis partem inferam brevissimam v. altiore fovente, margine perianthiifero. Sepala 3, libera acutata rigidula torta, sinistrorsum obtegentia. Petala libera unguiculata, erecta v. apice patentia, dextrorsum obtegentia. Squamellæ sæpius 2, petalis interiores. Stamina 6, perianthio interiora; filamentis subulatis tenuibus v. basi compressa dilatatis; antheris basifixis v. supra basin dorsifixis; loculis inferne liberis, introrsum rimosis. Germen subliberum sessile v. basi v. ad medium inferum, cæterum liberum; styli gracilis elongati ramis induplicatis, plus minus tortis, margine papillosis. Ovula in loculis ∞ , adscendentia; chalaza obtusa v. nunc appendiculata. Fructus nisi basi liber, septicidus. Semina ∞ , nunc apice basique in appendiculam variam producta, nunc mutica; albumine

1. Spec. ad 5. PLUM., *lc.*, 288, fig. 1 (*Tillandsia*). — HOOK., *Exot. Fl.*, t. 163. — BAK., in *Trim. Journ.* (1887), 178. — WITTM., in *Engl. Jahrb.*, XI, 62. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 462. — *Fl. serres*, t. 918, 1089. — REG., *Gartenfl.* (1885), 116. — WITT., *Cat. Brom. Jard. Leid.*, 26.

2. In *Bull. Soc. bot. Fr.*, XXIV, 167. — B. H., *Gen.*, III, 668, n. 22. — WITTM., *Pflanzenfam.*, 55. — BAK., *Brom.*, 140.

3. Virides v. flavescences, speciosi.

4. Spec. ad 7. Plantarum male cognitarum, ut aiunt, habitus omnino singularis.

farinaceo copioso; embryone parvo inferiore leviter intruso. — Herbæ perennes, nunc suffrutescentes; foliis basilaribus v. ad apicem caulis confertis v. rosulatis, integris membranaceis v. rigidis spinoso-serratis; floribus in racemum terminalem simplicem v. parce ramosum, nunc spiciformem v. valde reductum, dispositis; bracteis minimis, medio-cribus v. amplis imbricatis, aut herbaceis, aut rarius coloratis. (*America trop.*) — *Vid. p. 97.*

24. **Puya** MOL.¹ — Flores fere *Pitcairniæ*; sepalis leviter tortis v. imbricatis. Petala multo longiora, oblonga v. spathulata, torta. Stamina 6, petalis breviora; antheris dorsifixis linearibus introrsis. Germen nisi basi liberum; styli elongati ramis linearibus leviter tortis; ovulis ∞ . Fructus oblongus loculicidus; seminibus sessilibus corneo-marginatis. — Herbæ perennes v. arborescentes; foliis dense rosulatis ensiformi-acuminatis rigidis late spinoso-arcuato-dentatis; floribus² terminali-racemosis; inflorescentia angusta spiciformi v. late composito-pyramidata. (*Columbia, Ecuadoria, Peruvia et Chili andin.*³)

25. **Dyckia** SCHULT.⁴ — Flores regulares v. leviter irregulares, hermaphroditi v. polygami; receptaculo subplano v. plus minus cupulari. Sepala 3, libera v. ima basi connata; antico 1; præfloratione imbricata, torta v. demum subvalvata. Petala 3, longiora, sæpe basi angustata, sæpius obliqua asymmetrica, torta v. imbricata. Stamina 6, subhypogyna v. leviter perigyna; filamentis angustis v. latiusculis, liberis v. imæ corollæ adnatis; antheris ad basin dorsifixis, introrsum rimosissimis. Germen (in floribus masculis rudimentarium) aut subsuperum sessile, aut ima basi plus minus receptaculo immersum, pyramidato-3-quetrum; styli sæpius brevissimi ramis stigmatosis induplicatis leviter tortis, margine papillosis. Ovula ∞ , 2-seriatim subhorizontalia v. obliqua. Fructus omnino v. majore ex parte liber, septicidus; valvis plus minus alte 2-fidis. Semina ∞ , superposita,

1. *Sagg. Chil.*, 162; ed. II, 284. — J., *Gen.*, 447. — BEER, *Brom.*, 22, 141. — B. H., *Gen.*, III, 666, n. 18. — WITTM., *Pflanzensam.*, 52, fig. 25. — BAK., *Brom.*, 123. — *Pourretia* R. et PAV., *Prodr.*, 46, t. 7; *Syst.*, 80; *Fl. per. et chil.*, III, 33, t. 256, 257. — ENDL., *Gen.*, n. 1314.

2. Cæruleis, albis v. luteis, nunc speciosis.

3. Spec. ad 14. FEUILL., *Obs.*, III, t. 491 (*Renealmia*). — H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, I, 296 (*Pourretia*). — SCHULT. F., *Syst.*, VII, 1233.

— GAUDICH., *Voy. Bonit. Bot.*, t. 41-44. — FISCH., *Sert. petrop.*, t. 12. — REG., *Gartenfl.*, t. 225. — ANDRÉ, in *Rev. hort.* (1881), 315, c. ic.; *Enum.*, 5. — C. GAY, *Fl. chil.*, V, 10. — *Fl. serres*, t. 869, 870. — WITT., *Cat. Brom. Jard. Leid.*, 50. — *Bot. Mag.*, t. 4715, 5732.

4. *Syst.*, VII, 65, 1194. — ENDL., *Gen.*, n. 1312. — B. H., *Gen.*, III, 667, n. 20. — BEER, *Brom.*, 24, 157. — WITTM., *Pflanzensam.*, 54. — BAK., *Brom.*, 129. — *Garrelia* GAUDICH., *Voy. Bonit. Bot.*, t. 115.

marginē incrassata v. varie membranaceo-alata; albumine copioso; embryone ad basin laterali, hinc sæpe acuminato. — Herbæ perennes, nunc basi frutescentes; foliis basilaribus dense rosulatis crassiusculis, varie spinoso-serratis; floribus¹ in spicas nunc contractas, simplices v. superne ramosas, dispositis; bractea florali membranacea varia². (*Brasilia*, *Argentaria*³.)

26. *Cottendorfia* SCHULT. F.⁴ — Flores (fere *Dickiæ*) hermaphroditi; sepalis oblongis obtusis subliberis, tortis v. imbricatis. Petala longiora unguiculata, in alabastro (nec serius) torta. Stamina petalis breviora, quorum hypogyna alternipetala 3; 3 autem imæ corollæ adnata; filamentis subulatis; antheris linearibus, introrsum rimosis. Germen sessile liberum; styli brevis trifidi ramis linearibus tortis; ovulis ∞. Fructus...? — Herbæ perennes v. frutescentes; foliis angustis (*Pitcairniæ*); floribus⁵ in racemum nunc humilem compositum dispositis. (*Brasilia*,⁶ *Argentaria*⁶.)

27. *Hechtia* KL.⁷ — Flores (fere *Dickiæ*) polygamo-diœci; sepalis oblongis, imbricatis v. tortis, sæpe coriaceis. Petala longiora obtusa, demum patula. Stamina 6 (in flore fœmineo rudimentaria), oppositipetala imæ corollæ adnata; filamentis subulatis; antheris prope basin dorsifixis, introrsum rimosis. Germen superum (in flore masculo rudimentarium); styli brevissimi ramis linearibus subfalcatis haud tortis. Ovula in loculis singulis pauca superposita. Fructus septicidus; seminibus subsessilibus aliformi-marginatis; nucleo lineari-oblongo. Herbæ perennes; foliis dense rosulatis rigidis ensiformi-acuminatis late spinescenti-dentatis; floribus⁸ ab axilla foliorum exteriorum quorundam v. bractearum enatis; pedunculo plus minus ramoso;

1. Flavis, aurantiacis v. coccineis.

2. Sectiones, docente BAKER, in genere : *Prionophyllum* K. KOCH., *Ind. sem. H. berol.* (1873), App., 7. — MEZ, in *Mart. Fl. bras.*, 500, t. 92; floribus polygamis, 2-morphis.

Encholirion MART., in *R. et Sch. Syst.*, VII, LXVIII, 1233. — ENDL., *Gen.*, n. 1313. — B. H., *Gen.*, III, 667, n. 19. — WITTM., *Pflanzenfam.*, 54. — MEZ, *loc. cit.*, 504, t. 94.

Deuterocohnia MEZ, *loc. cit.*, 506, t. 95.

Navia R. et SCH., *Syst.*, VII, 1195. — ENDL., *Gen.*, n. 1310. — MEZ, *loc. cit.*, 508, t. 96.

Cephalonavia BAK., *Brom.*, 130, 137.

3. Spec. ad 50. SCHOMB., in *Verh. Preuss. Gart.*, 18, t. 2 (*Encholirion*). — GRISEB., *Symb. Fl. argent.*, 331. — MEZ, *loc. cit.*, 464, t. 88-91.

— LEME, *Jard. fleur.*, t. 224. — BAK., in *Scand. Ref. bot.*, t. 236; in *Gardn. Chron.* (1884), II, 198. — WITTM., *Cat. Brom. Jard. Leid.*, 24. — *Bot. Reg.*, t. 1782; (1881), *Misc.*, 183. — *Bot. Mag.*, t. 3449, 6294.

4. *Syst.*, VII, LXIV, 1193. — ENDL., *Gen.*, n. 1311. — REICHB., *Nom.*, 45. — A. RICH., in *Dict. d'Orb.*, II, 740. — BAK., *Brom.*, 128 (part.).

5. *Parvis*, albis.

6. Spec. 2, 3 (ex MEZ, 1). BEER, *Brom.*, 44 (*Anoplophytum*). — GRISEB., *Symb. Fl. argent.*, 330. — MEZ, in *Mart. Fl. bras.*, 502, t. 93.

7. Ex ZUCC., in *Abh. Akad. Wiss. Münch.*, III, 239, t. 6. — ENDL., *Gen.*, n. 1314². — WITTM., *Pflanzenfam.*, 53, fig. 26. — BAK., *Brom.*, 138.

8. *Albidis*, minutis.

ramis ad axillam bractearum varie cymigeris v. glomeruligeris. (*America bor. calid.*¹⁾)

28? **Bakeria** ANDRÉ². — Flores parvi « perianthio ad medium germen inserto. Sepala ovata. Petala multo longiora oblonga. Stamina 6, petalis æquilonga; filamentis linearibus; antheris parvis oblongis versatilibus. Germen magis quam semi-inferum clavato-3-gonum. Ovula in loculis ∞, superposita. Stylus brevissimus; ramis haud tortis. Fructus parvus clavato-3-gonus, apice septicide 3-valvis. — Herba acaulescens; foliis dense rosulatis patentibus ensiformi-acuminatis integris, utrinque lepidotis, apice convolutis; floribus³ in scapo tenui laxo composito-racemosis; bracteis minutis. (*Columbia*⁴.) »

29. **Brocchinia** SCHULT. F.⁵ — Flores fere *Cottendorfiæ*; sepalis perigynis, obovatis v. oblongis erectis tortis. Petala vix longiora latiora torta, basi contracta. Stamina perianthio breviora; filamentis brevibus, liberis v. ima basi perianthio adnatis; antheris dorsifixis brevibus subsphæricis. Germen semi-inferum, 3-gonum; styli brevis ramis stigmatosis erectis v. patentibus brevibus haud tortis. Ovula ∞. Fructus clavato-3-gonus, apice septicidus. Semina ∞, adscendentia imbricata, corneo-marginata, utrinque in appendicem lanceolatam producta. — Frutices; trunco⁶ erecto; foliis dense rosulatis late ligulatis, calloso-acuminatis integris; floribus⁷ in racemum terminalem amplum compositum furfuraceum v. scabrum, nunc glabrum, dispositis; bracteis sub ramis spathaceis, sæpe pungentibus. (*Guiana, Brasilia bor.*⁸)

1. Spec. 6, 7. Zucc., *Pl. nov. H. monac.*, IV, 241, t. 6. — Kl., in *Gartens.* (1835), 401. — Hbmsl., *Bot. centr.-amer.*, III, 317. — Leme, in *Ill. hort.*, t. 378. — Witt., *Cat. Brom. Jard. Leid.*, 27. — S.-Wats., in *Proc. Amer. Acad.*, XX, 374. — *Bot. Mag.*, t. 5842, 6554.

2. In *Rev. hort.* (1889), 84, c. tab. — Bak., *Amar.*, 89.

3. Violaceis, parvis pulchellis.

4. Spec. 1. *B. tillandsioides* André. — Witt., *Cat. Brom. Jard. Leid.*, 8. — *Vriesia glauco-*

phylla hort. (non Hook.). Planta raro florens, quoad flores cæteraque, ut videtur, cum *Aræococco parvifloro* Lindm. comparanda.

5. *Syst.*, VII, 70, 1250. — B. H., *Gen.*, III, 665, n. 116. — Wittm., *Pflanzenfam.*, 50. — Bak., *Brom.*, 88.

6. *Yuccæ* v. *Furcrææ*.

7. Parvis v. minimis, albidis.

8. Spec. 3. Bak., in *Gardn. Chron.* (1880), II, 241, 243, fig. 47 (*Cordyline*); in *Trim. Journ.* (1882), 330. — Mez, in *Mart. Fl. bras.*, 462, t. 87.

CXXV

IRIDACÉES

I. SÉRIE DES IRIS.

Les fleurs des Iridacées diffèrent essentiellement de celles des Amaryllidacées par leur androcée réduit à trois étamines, superposées aux sépales. Dans celles des Iris¹ (fig. 88-93), le réceptacle concave enveloppe l'ovaire infère et porte sur ses bords trois sépales pétaloïdes et trois pétales alternes ; les uns et les autres tordus² ou imbriqués dans le bouton. Les sépales sont d'ordinaire plus larges, étalés ou réfléchis, et leur face interne porte souvent sur sa ligne médiane une rangée de papilles claviformes plurisériées et colorées³. Les pétales, ordinairement plus étroits, sont dressés, incurvés ou légèrement récurvés vers leur sommet. Avec le périanthe s'insèrent les trois étamines, à filets grêles, libres, sauf dans leur portion inférieure, et à anthères basifixes, biloculaires, extrorses et déhiscentes par deux fentes longitudinales⁴. L'ovaire est infère, sauf dans sa portion tout à fait supérieure qui supporte un style à trois branches superposées aux sépales, dilatées sur les deux côtés en une lame pétaloïde qui présente à son sommet trois lobes, dont un médian et stigmatifère. Chaque loge ovarienne, répondant à une branche du style, et complète ou plus rarement incomplète, renferme deux séries d'ovules anatropes⁵, insérés dans l'angle interne. Le fruit est une capsule arrondie ou à trois ou six côtes, loculicide dans sa portion supérieure

1. *Iris* T., 358, t. 186-188. — L., *Gen.*, ed. I, n. 29; ed. VI, n. 59. — ADANS., *Fam. des pl.*, II, 60. — J., *Gen.*, 57. — GERTN., *Fruct.*, I, t. 13. — LAMK., *Dict.*, 293; *Ill.*, t. 33. — TURP., in *Dict. sc. nat.*, Atl., t. 190. — NEES, *Gen. Fl. germ.*, Monoc., V, n. 18. — ENDL., *Gen.*, n. 1226. — SPACH, *Suit. à Buff.*, XIII, 12; in *Ann. sc. nat.*, sér. 3, V, 89. — BAK., in *Gardn. Chron.* (1876); in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 136. — KLATT, in *Linnaea*, XXXIV; *Erg. u. Ber.*, 35; in *Ann. sc. nat.*, sér. 3, V, 89; in *Bot. Zeit.* (1872), 497, 513. — TAUSCH, in *R. et Sch. Syst.*, I, *Manf.*, Add., 369. — B. H., *Gen.*, III,

686, n. 1. — PAX, in *Engl. u. Prantl Pflanzenfam.*, II, 5, p. 145, fig. 99 B, 100.

2. Le bord droit le plus souvent recouvrant dans nos espèces cultivées.

3. D'où le nom de *Pogoniris* TAUSCH. — SPACH, in *Ann. sc. nat.*, loc. cit., 103 (Subgen., 12).

4. Le pollen est ellipsoïde, avec un sillon longitudinal et une membrane externe ponctuée (H. MOHL) dans la plupart des Iridacées, sauf les *Crocus*. La bande est unie ou ponctuée. Il y a des *Iris* (*I. flavescens*, *ruthenica*, *florentina*) où la membrane externe est celluleuse.

5. A double enveloppe.

ou dans toute sa hauteur, et à graines nombreuses, sphériques ou comprimées. Sous leurs téguments¹ se trouve un albumen corné qui loge un embryon excentrique et de longueur variable. Les Iris sont des herbes vivaces à organes végétatifs très divers.

Leur portion souterraine est très variable, comme celle de tant

Iris florentina.

Fig. 88 "Port.

d'autres Monocotylédones. Dans nos espèces vulgaires, c'est un rhizome simple ou plus ou moins ramifié, qui porte des écailles,

1. Souvent épais et même charnus, ou l'extérieur fongueux, scrobiculé, caronculé dans la section *Hermodactylus*. Dans les *Xyridion*,

le tégument extérieur se prolonge plus ou moins aux deux extrémités. L'intérieur est souvent assez épais, crustacé.

feuilles modifiées, ou leurs cicatrices, et inférieurement, de nombreuses racines adventives. Il est épais ou grêle, et il présente, dans l'aisselle de ses appendices, des bourgeons dont un certain nombre se développent en branches aériennes, simples ou ramifiées, foliifères et en partie terminées par l'inflorescence. Souvent la base de ces

Iris germanica.

Fig. 89. Inflorescence.

Fig. 90. Fleur, coupe longitudinale.

branches s'épaissit en un bulbe plein, ou bien les appendices qu'elle porte deviennent aussi plus ou moins charnus ou, plus tard, secs et fibreux-réticulés; et il se forme ainsi des bulbes sphériques, ovoïdes ou parfois très allongés, semblables à ceux qui s'observent dans divers autres genres de la famille. Quant au rhizome qui leur a

donné naissance, il peut persister plus ou moins longtemps aussi ; mais il arrive fréquemment qu'il se détruit ; auquel cas les axes secondaires et leurs renflements bulbiformes deviennent finalement

Iris Pseudoacorus.




Fig. 91. Graine, coupe longitudinale.

indépendants. Ainsi, les *Xiphion*¹, qu'on a parfois placés très loin des *Iris*, en constitueront pour nous une section qui ne se distingue essentiellement des autres espèces que par une portion souterraine renflée en forme de bulbe.

Les feuilles sont alternes et simples. Dans nos espèces vulgaires, où elles sont distiques, équistantes, elles se recouvrent les unes les autres par leur gaine, formée de deux moitiés symétriques l'une de l'autre et repliée suivant sa ligne dorsale.

En haut, ce dos supporte un limbe vertical², comprimé bilatéralement, rectinerve, à bords intérieur et extérieur tranchants, et dont le parenchyme peut se résorber en partie vers le milieu de son épaisseur. Sur les portions souterraines, ces feuilles sont réduites à une écaille plus ou moins charnue ou scarieuse. La feuille des *Xiphion* peut perdre beaucoup de sa largeur et devenir d'autant plus épaisse bilatéralement dans sa portion limbaire³. A la base des branches aériennes, la feuille

1. T., *Inst.*, 362, t. 189. — MILL., *Dict.*, ed. X. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 122, n. 33. — *Chamoletta* ADANS., *Fam. des pl.*, II, 60. — JUNO TRATT., *Ausw.*, I, 135. — *Thelysia* SALISB., in *Trans. Roy. Hort. Soc. Lond.*, I, 303. — PARLAT., *Fl. ital.*, III, 316. — *Diaphane* SALISB. (part.). — *Costia* WILK., in *Bot. Zeit.* (1860), 131. — *Coresanthe* ALEF., in *Bot. Zeit.* (1863), 298.

2. C'est M. TRÉCUL qui, par l'étude des développements (in *Ann. sc. nat.*, sér. 3, XX, 235), a constaté que telle est la nature de ce limbe, dans les feuilles dites ensiformes de ce genre et de beaucoup d'autres, suffisamment bien définies, il y a longtemps, par BISCHOFF (*Handb. Termin.*, I, 192). On peut donc négliger l'opinion des théoriciens qui, à l'exemple de M. VAN TIEGHEM (*Tr. Bot.*, éd. II, 300), supposent, on ne sait pourquoi, qu'une feuille d'*Iris* n'est qu'une gaine. L'opinion de M. NAUDIN, citée par A. SAINT-HILAIRE (*Morphol.*, 156), que le limbe est formé de deux moitiés soudées, de façon que son bord supérieur représente un des deux bords réunis, l'autre bord répondant à une côte dorsale, n'est pas non plus admissible. Dans leur mémoire récent sur la feuille des Iridées, M. CHODAT et M^{me} BALICKA-IWANOWSKA n'ont pas renoncé à cette idée, puisqu'ils disent de la feuille que, « repliée selon la nervure

médiane, elle applique ses deux moitiés l'une contre l'autre, de manière à ne plus laisser voir à l'extérieur que la face inférieure » (juin 1892). C'est en octobre 1892 que M. DUCHARTRE a commencé (in *Journ. Soc. hort. Fr.*, sér. 3, XIV, 556, 618) la publication d'observations sur les feuilles ensiformes des Iridées, où est cité le travail de M. H. ROSS sur l'anatomie comparée des feuilles des Iridées (*Malpighia*, VI, 90), mais qui ne renferme, bien entendu, aucun résultat nouveau de quelque importance.

3. Dans ce cas, le limbe foliaire fistuleux apparaît complètement clos sur sa coupe transversale, avec deux angles plus ou moins saillants en dehors et en dedans. Le tissu central se résorbant plus ou moins complètement ou ne laissant que des traces, sous forme de fausses cloisons, cette coupe est, quant à la disposition des faisceaux, tout à fait celle de certains axes creux et plus ou moins comprimés, tels que les hampes des Amaryllidacées ; tandis que, dans la gaine, l'orientation des faisceaux est celle de la plupart des feuilles. On pourrait dire qu'anatomiquement, la feuille de quelques espèces est appendice par sa gaine et axe par son limbe. Dans les espèces à limbe très aplati, le parenchyme du limbe se résorbe cependant fréquemment avec l'âge. Il y a souvent d'épaisses nervures latérales costiformes.

se réduit à sa portion vaginale condupliquée, tout en demeurant membraneuse et parfois très développée ; c'est alors le limbe qui fait défaut. Il y a quelques espèces qui, outre ces premières feuilles réduites à la gaine, n'ont qu'une ou deux feuilles plus élevées, pourvues d'un limbe vert et insérées sur l'axe florifère, en pareil cas presque toujours peu développé et, comme on va le voir, pauciflore. Le mode d'inflorescence des *Iris* est, en effet, plus ou moins compliqué. Sur l'axe aérien qui s'élève au printemps de la souche, il peut y avoir une seule fleur terminale, sous laquelle cet axe porte

Iris pumila.



Fig. 92. Inflorescence.

Fig. 93. Diagramme.

une, deux ou quelques bractées alternes, stériles, imparinerves et passant graduellement aux feuilles de la base. On désigne le plus souvent ces bractées sous le nom de *Spathe*.

Une de ces bractées, ou deux, trois d'entre elles peuvent, au contraire, devenir fertiles. Elles ont alors dans leur aisselle une fleur, représentant une cyme unipare réduite ; auquel cas, l'axe même de cette fleur porte en arrière une bractéole parinerve, concave sur la ligne médiane, du côté de l'axe qui la comprime. Au-dessus de cette bractéole peuvent, si l'axe secondaire qui la porte s'allonge davantage, s'insérer une ou quelques bractées imparinerves, ou stériles, ou

fertiles si l'inflorescence comportait trois degrés d'axes successifs. Avec tous ses développements possibles, l'inflorescence d'un *Iris* représenterait donc une grappe terminée de cymes unipares alternes et souvent réduites à une fleur. C'est généralement la fleur terminale de l'inflorescence totale qui s'épanouit la première ; après quoi les fleurs latérales s'ouvrent successivement de bas en haut.

Le périanthe présente dans l'ensemble du genre d'assez nombreuses variations. Ses folioles, plus ou moins longuement rétrécies à la base, y sont presque libres ou forment par leur réunion un tube plus ou moins allongé. Les sépales, dont le limbe est plus ou moins large, se réfléchissent quelquefois beaucoup, et leur sommet devient pendant en dehors de la fleur. Dans plusieurs groupes du genre, le cordon de papilles de la ligne médiane interne disparaît complètement. Les pétales, plus ordinairement dressés dans une grande étendue, se réfléchissent souvent aussi seulement au sommet. Dans quelques espèces ils se réduisent à de très courtes lames. Les étamines, qui ont toujours une anthère extrorse, abritée sous la courbure d'une lame styloïde, sont généralement libres jusqu'à leur base. Mais dans les *Gynandriris*¹, elles sont réellement monadelphes dans une courte étendue, tout le reste étant d'ailleurs semblable. Le sommet de l'ovaire peut être obtus et arrondi en dôme, mais parfois aussi il se prolonge en cône ou en bec acuminé². Le style est véritablement libre, et ses branches dilatées et pétaloïdes affectent des formes très variées. Dans nos espèces les plus vulgaires, ces branches portent sur leur dos, en dedans et en dessus, deux lames supplémentaires, plus ou moins unies avec la lame styloïde véritable, distinctes souvent sur la ligne médiane où se voit un étroit sillon, libres à leur sommet aigu qui dépasse plus ou moins la lame styloïde³. C'est celle-ci qui est stigmatifère dans son extrémité arrondie, dont la face supérieure porte des papilles saillantes et clairsemées sur une surface terminale de forme souvent semi-circulaire. Dans l'espèce japonaise et chinoise dont on a fait le genre *Evansia*⁴, les lobes supplémentaires sont découpés à leur sommet de nombreuses languettes formant franges. Le fruit est lisse ou à trois-six côtes, ou triquètre, les angles

1. *Nuov. gen. et spec. Monoc.*, 49. Fondé sur l'*Iris Sisyrinchium* L. et ses variétés.

2. Pris pour le tube du périanthe par M. ALEFELD qui a, pour cette raison, établi un genre *Neubeckia* (in *Bot. Zeit.* (1863), 290, 297. — B. H., *Gen.*, III, 686).

3. Leur ensemble a été décrit comme la lèvre intérieure ou supérieure du stigmate.

4. SALISB., in *Trans. Roy. Hort. Soc. lond.*, I, 303. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 143, Subgen. 3. — *Lophiris* TAUSCH. — REICHB., *Consp.*, 59.

dorsaux des loges saillants et étroitement aliformes. Comme celui de l'ovaire, le sommet de ce fruit est obtus ou prolongé en rostre de longueur variable, lequel peut, à la maturité, demeurer indivis ou bien se séparer en segments qui occupent le sommet des valves de la capsule. La graine a, comme on l'a vu, une enveloppe extérieure qui peut s'épaissir et devenir spongieuse ou presque charnue.

Il est fréquent que dans nos espèces communément cultivées, les loges ovariennes soient plus ou moins incomplètes; c'est pour cela que nous ne considérerons que comme une section du genre les *Hermodactylus*¹, dont le type est l'*I. tuberosa*², de la région Méditerranéenne, herbe vivace, à rhizome digité³ et à pétales bien plus petits que les sépales.

Compris dans ces limites⁴, le genre renferme une centaine d'espèces⁵, originaires des régions tempérées de l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique septentrionale. Leurs fleurs⁶ sont souvent grandes et belles.

Les *Moræa* (fig. 94), de la région Méditerranéenne et du sud de l'Afrique, se distinguent à peine des *Iris* par les folioles libres de leur périanthe, les lames pétaloïdes de leur style pourvues de deux

1. T., *Coroll.*, 50. — ADANS., *Fam. des pl.*, II, 60. — SALISB., in *Trans. Hort. Soc. lond.*, I, 304. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 147. — B. H., *Gen.*, III, 687, n. 2. — PAX, *Pflanzenfam.*, 145.

2. SIBTH. et SM., *Fl. græc.*, t. 41. — RED., *Lil.*, t. 48. — REICHB., *lc. Fl. germ.*, t. 348. — *Bot. Mag.*, t. 531. — SPACH, in *Ann. sc. nat.*, sér. 3, V, 91. — *J. bispathacea* SPACH, *Suit. à Buff.*, XIII, 15. — *I. longifolia* SPACH. — *Hermodactylus tuberosus* SALISB. — GREN. et GODR., *Fl. de Fr.*, III, 245.

3. On désigne ainsi un axe souterrain court, qui porte deux ou trois branches tuberculiformes, allongées et radicales à leur base.

4. SPACH a divisé les *Iris* en quinze sous-genres : *Hermodactylus* (T.), *Hermodactyloides*, *Scorpiris*, *Xiphium* (T.), *Xyridion* (TAUSCH), *Graminiris*, *Spathula* (TAUSCH), *Eremiris*, *Ioniris*, *Limniris* (TAUSCH), *Phæiris*, *Pogoniris* (*Pogiris* TAUSCH), *Psammiris*, *Susiana*, *Crossiris*. Pour d'autres (B. H.), il y a dans le genre (dont les *Hermodactylus* et *Xiphium* sont séparés), quatre sections : *Euiris*, *Diaphane* (SALISB.), *Juno* (TRATT.), in *Ræm. et Schult. Syst.*, I, 471, 474. — *Thelysia* SALISB., in *Trans. Hort. Soc. lond.*, I, 303. — *Costia* WILLK., in *Bot. Zeit.* (1860), 131. — *Coresanthe* (ALEF.), *Gynandiris* (PARLAT.). Les *Chamolæta* ADANS., *Fam. des pl.*, II, 60, comprennent le *Gynandiris* avec

des *Juno* et *Diaphane*. L'*Onocyclus* SIEMSS., in *Bot. Zeit.* (1846), 706, est rapporté aux *Euiris*, de même que l'*Evansia* (SALISB.). Les *Xiphium* de M. BAKER correspondent à l'union des *Diaphane* et *Juno*.

5. JACQ., *Fl. austr.*, t. 1-5. — WALDST. et KIT., *Pl. rar. hung.*, t. 57, 226. — CAV., *lc.*, t. 193. — RED., *Lil.*, t. 29, 189, 211, 212, 337, 458. — DESF., *Fl. atl.*, t. 5, 6. — BROT., *Phyt. lusit.*, t. 95, 96. — SIBTH., *Fl. græc.*, t. 39-42. — LEDEB., *lc. Fl. ross.*, t. 101, 102, 342. — WALL., *Pl. as. rar.*, t. 86. — ROYLE, *Ill. himal.*, t. 91. — BOISS., *Voy. Esp.*, t. 170; *Fl. or.*, V, 117. — REG., *Gartenfl.*, t. 452. — GREN. et GODR., *Fl. de Fr.*, III, 239. — REICHB., *lc. Fl. germ.*, t. 327-347. — FR. et SAV., *En. pl. jap.*, II, 41. — BRANDZ., *Prodr. Fl. rom.*, 449. — HOOK. f., *Fl. brit. Ind.*, VI, 271. — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 325. — TH. MOR., in *Bull. Torr. Bot. Club*, XX, 467. — H. BN., *Iconogr. Fl. fr.*, n. 181, 279. — MAXIM., in *Bull. Ac. Pétersb.*, *Mél. biol.*, X, 687. — WILLK. et LGE., *Prodr. Fl. hisp.*, I, 141. — WALP., *Ann.*, VI, 53.

6. Blanches, bleues, jaunes, pourprées ou livides, plus ou moins verdâtres, souvent odorantes. Sur la constitution, la symétrie et les anomalies de ces fleurs, HEINRICH., *Beitr. Blüthenmorph.* *Iris*, in *Pringsh. Jahrb.*, XXIV, H. 1 (Voir aussi CELAK., *Ueb. Narben. Iris*, in *Österr. Bot. Zeitschr.*, XLIII).

crêtes apicales. Leurs étamines sont libres ou unies à la base, et leur portion souterraine est bulbeuse.

Dans les *Marica*, qui donnent leur nom à une petite sous-série (*Maricées*), les fleurs sont portées par un axe aplati; les divisions stylaires sont plurifides, et la portion souterraine est un rhizome. Très voisins de ce genre américain et africain sont encore les *Cypella* et les *Trimezia*, de l'Amérique du Sud.

Moraea (*Vieusseuxia*)
glaucoptis.



Fig. 94. Fleur.

Les *Tigridia* sont aussi le prototype d'un petit groupe (*Tigridiées*) où se rangent les *Alophia* et les *Rigidella*, américains comme eux. Ils ont un périanthe étalé et coloré, sans tube, avec des pétales bien plus petits que les sépales; un androcée monadelphie; un style à branches bifides; une portion souterraine bulbeuse et tuniquee.

Le genre *Cipura*, des régions chaudes de l'Amérique, se distingue par un bulbe, des spathes pluriflores et groupées en nombre variable au sommet des branches aériennes. Le tube du périanthe est très court, et les branches du style sont dilatées et pétaloïdes, compliquées. Les genres rapprochés des *Cipura* dans cette sous-série (*Cipurées*) n'en diffèrent guère que par des caractères d'importance secondaire, notamment la forme des branches stylaires et le mode de groupement des cymes sur l'axe. Ce sont les *Cardiostigma* et *Gelasine*, tous habitants du nouveau monde; les *Homeria*, du sud de l'Afrique; les *Calydorea*, de l'Amérique méridionale.

Dans les *Ferraria*, de l'Afrique australe, les caractères généraux sont aussi ceux des *Cipura*; mais les branches du style sont ramifiées, et les bractées s'unissent autour des fleurs en une sorte d'étui ou d'involucre plus ou moins étroit. Avec eux se rangent les *Nemastylis*, américains, et les *Hexaglottis*, de l'Afrique australe.

Les *Tekel* (fig. 95), plantes vivaces des deux mondes, ont pour portion souterraine un rhizome. Leurs cymes florales sont groupées le long d'un axe commun, et leurs fleurs ont deux périanthes à peu près égaux, à moins que la corolle ne soit un peu plus grande. Il n'y a pas de tube au-dessus de l'ovaire, et les branches stylaires sont simples. A cette sous-série (*Tekéliées*) se rapportent encore les trois genres: *Gemmingia*, d'Asie; *Bobartia*, de l'Afrique méridionale; *Diplarrhena*, d'Australie; ce dernier à périanthe et à androcée plus ou moins irréguliers.

Avec les caractères généraux du groupe précédent, les *Sisyrinchium*, *Tapeinia* et *Symphystemon*, plantes à rhizome (*Sisyrinchidiées*), ont les cymes terminales, solitaires ou en petit nombre et l'androcée monadelphie; un périanthe avec ou sans tube. Ce sont en général des plantes américaines.

Les *Genosiris*, type d'une autre sous-série (*Génosiridées*), sont des plantes australiennes à rhizome, à tube du périanthe grêle, à androcée monadelphie, à branches stylaires simples et ordinairement grêles. Les *Solenomelus* et *Chamælum*, herbes vivaces du Chili, appartiennent au même petit groupe.

Les *Aristea*, plantes africaines, à rhizome, ont les inflorescences en forme de capitules et un périanthe à limbe rotacé, avec des étamines libres. Leur ovaire, à loges bi- ou pluriovulées, est surmonté d'un style simple, dont le sommet est seulement partagé en trois dents stigmatifères. La sous-série à laquelle ce genre appartient (*Aristéées*) comprend aussi un type malgache, le *Geosiris*, dépourvu de chlorophylle et peut-être parasite ou saprophyte; puis les genres frutescents et africains *Nivenia*, *Witsenia*, *Klattia*; les *Cleanthe*, d'Afrique; les *Eleutherine*, d'Amérique; les *Orthrosanthus*, d'Australie et d'Amérique, types herbacés, à branches stylaires simples, courtes ou étroites, ordinairement non dilatées au sommet, et à fleurs solitaires ou en grappes de cymes.

Tekel paniculatum.

Fig. 95. Inflorescence.

II. SÉRIE DES SAFRANS.

Les Safrans¹ (fig. 96-102) ont des fleurs régulières, à périanthe pétaloïde en entonnoir, inséré sur les bords d'un réceptacle en forme de bourse dont la cavité loge l'ovaire. Ses bords donnent insertion au

¹ *Crocus* T., *Inst.*, 350, t. 183, 184. — L., *Gen.*, ed. 1, n. 26; ed. VI, n. 55. — ADAMS., *Fam. des pl.*, II, 60. — J., *Gen.*, 59. — ROEM. et SCH., *Syst.*, I, 340, 367. — ENDL., *Gen.*, n. 1248. — HERB., in *Journ. Hort. Soc.*, II, 249. — KER, *Irid. Gen.*, 72. — BAK., in *Gardn. Chron.*

(1873); in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 79. — J. MAW, in *Gardn. Chron.* (1881); *Mon. Croc.*, c. tab. (1886). — KLATT, in *Linnaea*, XXIV, 675. — B. H., *Gen.*, III, 693, n. 13. — PAX, *Pflanzenfam.*, 142, fig. 97, A-D, 98. — *Crocus* SCHUR, *Sert. pl. transs.*, 73; *Enum. pl. transs.*, 653.

tube étroit et allongé du péricorolle, graduellement dilaté à la gorge, avec un limbe de six folioles bisériées, toutes semblables, imbriquées ou tordues, dressées, puis étalées à la vive lumière du soleil. Les trois

Crocus sativus.



Fig. 96. Port.

Fig. 97. Style.

Fig. 98. Plante,
coupe longitudinale.

étamines, superposées aux sépales et insérées à la gorge, plus courtes que le limbe, ont un filet court et libre, qui vient s'insérer à la base du connectif, entre les extrémités inférieures libres des loges d'une anthère sagittée, qui s'ouvre en dehors ou vers les côtés par des fentes

longitudinales¹. L'ovaire infère a trois loges, généralement complètes, multiovulées, et il est surmonté d'un style grêle et allongé, qui suit la cavité du tube floral et vient sortir entre les anthères. Ses trois branches, souvent inégales, courtes ou longues, dressées ou pendantes hors de la fleur, sont dilatées en éventail, souvent inégalement divisées, lobées ou multifides, plus ou moins involutées; les bords supérieurs de leurs divisions chargés de papilles stigmatiques. Le fruit est une petite capsule membraneuse, oblongue et loculicide, dont

Crocus aureus.

Fig. 100. Bulbe.

Fig. 99. Port.

Fig. 101. Bulbe, coupe longitudinale.

les valves septifères sont finalement étalées ou même réfléchies. Les graines, sphériques ou ovoïdes, ont un tégument extérieur plus ou moins épais et charnu, et, sous leur tégument intérieur plus résistant et plus coloré, un albumen charnu ou très dur, qui renferme un petit embryon voisin du hile.

Les *Crocus* sont des herbes bulbeuses qui, au nombre de plus de

1. Le pollen est sphérique, avec une membrane externe pœuclée, sans plis ni pores, ou

formant une bande roulée en spirale (H. Moul., in *Ann. sc. nat.*, sér. 2, III, 308).

soixante¹, habitent l'Europe centrale et austro-orientale et l'Asie centrale. Leur tige est représentée par un bulbe plein, généralement sphérique-déprimé, portant inférieurement, à quelque distance de son centre, des racines adventives. En haut, il s'atténue en un axe qui s'élève vers le sol et dont, après la floraison, on trouve longtemps des traces. Sur la surface convexe du bulbe s'insèrent tout autour les feuilles alternes, par la large base, fortement concave en dedans, d'une gaine courte et assez épaisse. Le limbe qui lui fait suite et se colore en vert à la lumière, est longuement linéaire, aplati de dehors en dedans et le plus souvent parcouru extérieurement d'une large côte saillante à coupe transversale rectangulaire². Les bords, plus minces, se récurvent ou se révoluent de chaque côté de cette saillie. Les tuniques fibreuses et brunes qui entourent le bulbe




Fig. 102. Fruit déhiscent.

adulte³ sont formées par des gaines foliaires desséchées. Dans l'aisselle des feuilles naît un bourgeon à feuilles, toujours excentrique, par conséquent, ou un bourgeon à fleurs⁴ disposées en cymes unipares, réduites parfois à une fleur, et supportées par un pédoncule assez long, caché entre les feuilles et rendu anguleux par la compression de celles-ci.

Il y a une bractée ou spathe extérieure, largement membraneuse, souvent mince et hyaline, dont la fleur occupe l'aisselle, et une bractéole intérieure, parinerve, de même consistance, parfois peu développée ou même absente.

Les *Syringodea*, de l'Afrique australe, ont l'organisation générale des *Crocus*, avec un périanthe dont le tube est très long et très grêle; les lobes de son limbe connivents ou très étalés; le style partagé en branches subulées, non découpées, portant les papilles stigmatiques en haut et en dedans sur les bords.

Près des Safrans se rangent encore deux genres de l'ancien monde,

1. SIETH., *Fl. græc.*, t. 35. — BIEB., *Cent. pl. ross.*, t. 1. — CHAUB. et BOR., *Fl. pelop.*, t. 2, 3. — GRAEELS, *Ram. pl. Esp.*, t. 4. — BROU., *Phyt. lusit.*, t. 94. — WILLK. et LGE, *Prodr. Fl. hisp.*, I, 146. — TEN., *Mem. Croc. Fl. nap.* (1826), c. t. 4. — MOGGR., *Fl. Ment.*, t. 20, 40. — J. GAY, in *Bull. Féruss.* (1831). — RAFIN., *Caratt.*, 84, t. 19. — PARL., *Fl. ital.*, III. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 276. — BOISS., *Fl. or.*, V, 94. — REICHE., *lc. Fl. germ.*, 355-361. — BRANDZ., *Prodr. Fl. rom.*, 448.

— GREN. et GODR., *Fl. de Fr.*, III, 236. — H. BN., *Iconogr. Fl. fr.*, n. 60. — *Bot. Mag.*, t. 45, 652, 845, 860, 938, 1110, 1267, 1384, 2240, 2986, 2991, 3861, 3864, 3866, 3868, 3871, 3998, 5297, 6000, 6031, 6036, 6141, 6197, 6211. — WALP., *Ann.*, III, 614; VI, 50.

2. PAX, *Pflanzenfam.*, 139, fig. 94, B. — CHOD. et BAL., *Feuill. Irid.*, 3, fig. 1.

3. PAX, *loc. cit.*, 138, fig. 93.

4. Blanches, jaunes, violettes ou panachées, vernalles ou plus rarement automnales.

à périanthe en entonnoir : les *Galaxia* et *Romulea*. Le style des premiers se dilate en une sorte de cloche pétaloïde, à lobes papilleux ou frangés sur les bords. Celui des derniers a trois branches bifides ou bipartites, à bords papilleux compliqués. Les fleurs, solitaires ou en petit nombre dans la cyme unipare, se dégagent aussi, à la base de la plante, du milieu des feuilles étroites et dressées.

III. SÉRIE DES GLAIEULS.

Les Glaïeuls¹ (fig. 103, 104), par lesquels nous commençons cette étude, se font tout d'abord remarquer par l'irrégularité de leurs fleurs hermaphrodites. Leur réceptacle loge l'ovaire dans sa concavité et est surmonté d'un périanthe coloré, plus ou moins arqué, avec un tube épigyne, court ou long. Il est obliquement infundibuliforme, plus ou moins dilaté à la gorge. Dans le limbe bilabié, on distingue trois sépales imbriqués ou tordus, dont un antérieur. Celui-ci forme avec les deux lobes antérieurs de la corolle, qui sont ordinairement teintés et tachés comme lui, une lèvre plus courte, à laquelle viennent souvent se joindre les sépales latéraux. Quand ceux-ci sont reportés davantage en arrière, ils forment une autre lèvre avec le pétale postérieur, le plus grand de tous les lobes du périanthe. Toutes ces pièces peuvent être atténuées et comme onguiculées à la base. Celles de la corolle sont aussi imbriquées ou tordues dans le bouton. Les étamines, au nombre de trois, sont superposées aux sépales; elles ont un filet inséré à la gorge, arqué sous le pétale postérieur, et une anthère extrorse, dorsifixe et à deux loges déhiscentes par des fentes longitudinales². Le connectif est replié sur lui-même en canal; ce qui rapproche l'une de l'autre les deux loges parallèles. L'ovaire infère a trois loges oppositisépales. Il est surmonté d'un style creux, arqué et à concavité antérieure, dont le sommet se partage en trois branches récurvées, obovales, plus ou moins pétaloïdes, repliées sur elles-

1. *Gladiolus* T., *Inst.*, 365, t. 190. — L., *Gen.*, ed. I, n. 27; ed. VI, n. 57. — J., *Gen.*, 58. — NEES, *Gen. Fl. germ., Monoc.*, III, n. 9. — ENDL., *Gen.*, n. 1239. — KLATT, in *Linnaea*, XXXII, 689; *Erg. u. Ber.*, 3. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 170. — B. H., *Gen.*, III, 709, n. 56. — PAX, *Pflanzenfam.*, 156, fig. 105. — *Hebea* PERS., *Enchir.*, I, 44. —

Sphaerospira SWEET, *Brit. fl. Gard.*, ed. II, 501. — *Schweiggera* MEY., in hb. Drège (non MART.). — *Symphyodolon* SALISB. — *Ballosporum* SALISB. — *Ophiolyza* SALISB. — *Hyptissa* SALISB. — *Rensia* SALISB., *Gen. pl. Fragm.*, 142.

2. Le pollen ellipsoïde a souvent les bandes ponctuées (H. MOHL).

mêmes suivant leur nervure dorsale et chargées sur leurs bords rapprochés de papilles stigmatiques. Dans l'angle interne de chaque loge ovarienne s'insèrent deux rangées verticales d'ovules anatropes¹, qui se regardent par leurs raphés et sont horizontaux ou plus ou moins

Gladiolus tristis.

Fig. 103. Fleur.

Fig. 104. Fleur, coupe longitudinale.

obliques. Le fruit est capsulaire, membraneux, loculicide; et les graines, sphériques ou anguleuses, plus rarement ailées, renferment sous leurs téguments, parfois épais et spongieux, un albumen souvent dur, qui entoure l'embryon.

Les Glaieuls sont des herbes vivaces, de la région Méditerranéenne,

1. A double enveloppe. Ils peuvent parfois manquer sur la portion supérieure des placentas.

de l'Afrique tropicale et australe et de ses îles orientales. Ils ont un bulbe plein, entouré de quelques bases de feuilles ou tuniques membraneuses ou fibreuses.

Plus haut, les feuilles alternes sont linéaires ou ensiformes. L'inflorescence est un épi terminal et lâche, dont les fleurs sont distiques.

Antholyza æthiopica.



Mais elles s'inclinent finalement même côté de l'axe général. Les bractées uniflores, et le côté postérieur de l'axe accompagné d'une bractéole binerve dans le genre près de cent espèces².

Les *Antholyza* (fig. 105), de l'Afrique australe, sont très voisins d'auxquels on les a souvent rapporté un tube grêle et allongé, qui s'arête au niveau d'une gorge à peine renflée. Les lobes sont généralement beaucoup, et le limbe presque égales ou plus souvent très lobes égaux ou inégaux de la lèvre nant beaucoup au-dessus de l'inférieur.

De même, les genres africains *Acidanthera*, *Tritonia* et *Melasphaera* ont été confondus autrefois avec les *Gladiolus* que par des caractères tout à fait secondaires.

Les *Watsonia*, de l'Afrique australe, ont donné leur nom à un petit groupe (*Watsoniées*) dans lequel le périanthe est aussi plus ou moins irrégulier, à limbe plus ou moins oblique. Mais les filets staminaux, plus courts, y sont rectilignes ou à peu près, de même que le style, parfois un



Fig. 105. Fleur, coupe longitudinale.

1. Blanche, jaune ou pourprée.
2. THONB., *Diss.*, t. 1. — JACQ., *Obs.*, t. 78; *lc. rar.*, t. 242-252, 254-257, 259, 260. — SIBTH., *Fl. græc.*, t. 37, 38. — RED., *Lil.*, t. 35, 36, 122, 123, 125, 136, 267, 273, 344, 377, 425. — SALISB., *Par. lond.*, t. 8. — ANDR., *Bot. Rep.*, t. 8, 11, 12, 27, 49, 111, 123, 147, 188, 219, 227, 240, 241, 589. — Guss., *Pl. inarim.*, t. 14. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 1022 (*Antholyza*), 1756. — SWEET, *Brit. fl. Gard.*, t. 156, 501; ser. II, t. 140, 281. — REICHB., *Icon. eur.*, t. 598-600, 643; *lc. Fl. germ.*, t. 349-353. — OLIV., in *Trans. Linn. Soc.*, XXIX, t. 100. — SAUND., *Ref. bot.*, t. 23. — BOISS., *Fl. or.*, V, 133. — GREX. et GODR., *Fl. de Fr.*, III, 247. — WILLE. et LGE., *Prodr. Fl. hisp.*, I, 140. — *Bot. Reg.*, t. 169, 1442. — *Bot. Mag.*, t. 86, 135, 272, 538, 562, 574, 578, 582, 591, 602, 610, 625, 632, 645.

peu latéral dans sa portion supérieure, dont les deux branches

Lapeyrousia (Anomatheca) cruenta.

sont stigmatifères en dedans. A ce groupe se rapportent encore les genres africains *Lapeyrousia* (fig. 85) et *Freesia*. Les premiers ont des fleurs à peu près régulières ou, comme dans les *Anomatheca*, un périanthe nettement irrégulier, avec toutes les transitions possibles. Les derniers se rapprochent beaucoup plus encore des Glaiéuls.

Dans les *Ixia*, type d'une autre sous-série (*Ixiées*), le périanthe est de même, ou régulier, ou à limbe légèrement oblique; le style a trois branches simples, et il est à peu près droit, comme les étamines. Ici se rangent encore les quatre genres *Schizostylis*, *Geissorhiza*,

Fig. 106. Fleur, coupe longitudinale.

Streptanthera et *Hesperantha*, qui sont tous également africains.

La famille des Iridacées a été distinguée dès 1759 par B. DE JUSSIEU, sous le nom de *Iridées*¹. VENTENAT en fit en 1799 ses *Irideæ*², et le nom actuellement adopté ne date que de 1836³. On peut définir ces plantes: des Liliacées triandres⁴ à ovaire infère, ou des Amaryllidacées à trois étamines. Les organes de végétation y présentent, en somme, toutes les particularités qui peuvent s'observer chez les Liliacées; mais les feuilles y sont, plus que dans tout autre groupe de Monocotylédones, de celles qu'on appelle ensiformes⁵; et les

647, 648, 719, 727, 823, 874, 992, 1042, 1098, 1483, 1561, 1575, 1665, 2585, 3032, 3686, 5427, 5565, 5873, 5884, 5944, 6202, 6201, 6335, 6463, 6739, 6897, 6919. — WALP., *Ann.*, VI, 47.

1. In *Hort. Trian*, Ord. 10. — A.-L. JUSS., *Gen.*, 57, Ord. 8.

2. *Tabl.*, II, 188, Ord. 8. — KER, *Irideæ*. *Gen.* (1837) — ENDL., *Gen.*, 164, Ord. 61. — B. H., *Gen.*, III, 681, Ord. 173.

3. *Iridacæ* LINDL., *Nat. Syst.*, ed. II, 332; *Veg. Kingd.*, 159, Ord. 47. — BAK., *Syst.*

Iridac., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 61 (1877). — PAX, in *Engl. et Prantl Pflanzenfam.*, II, 5, p. 137 (1887).

4. Pour ADANSON (*Fam. des pl.*, II, 58), elles constituent la section 8 des Liliacées.

5. D'où le nom de *Ensatae* (L., *Phil. bot.* (1751), 27). — BATSCH, *Tab.*, 143 (*Gladialium* fam. un.). — KER, in *Kœh. Ann. bot.*, I, 219. — BARTL., *Ord.*, 40 (part.). — ENDL., *Gen.*, 159 (part.). Les particularités anatomiques et morphologiques que présentent parfois les

anthères y sont constamment alternipétales et extrorses; le fruit, presque toujours finalement capsulaire.

Les sept cents espèces environ que comprend cette famille sont réparties dans cinquante-trois genres qui habitent les régions tempérées et chaudes des deux mondes, et surtout l'Afrique australe et la région Méditerranéenne. Ils sont moins richement représentés en Asie, en Australie et dans les deux Amériques. Nous les disposons en trois séries de la façon suivante :

I. IRIDÉES¹. — Fleurs régulières, à sépales ordinairement différents comme forme des pétales. Étamines disposées régulièrement autour du centre, libres ou monadelphes. — Herbes vivaces, à rhizomes ou à bulbes variables, rarement à tige frutescente. Inflorescence générale ordinairement pédonculée, souvent composée de plusieurs cymes unipares latérales. — 34 genres.

II. CROCÉES². — Fleurs régulières, à sépales généralement semblables aux pétales. Étamines disposées régulièrement autour du centre, ordinairement libres. — Herbes vivaces, à bulbe plein, avec tuniques plus ou moins développées. Inflorescence terminale, uniflore ou en cyme unipare, au sommet d'un axe basilaire, souvent court, caché entre les feuilles. — 4 genres.

III. GLADIOLÉES³. — Fleurs plus ou moins irrégulières; les étamines plus ou moins déjetées d'un côté de la fleur, souvent inégales. — Herbes vivaces, bulbeuses; les fleurs en épis ou en grappes, solitaires ou groupées en cymes pauciflores sur les côtés d'un axe d'inflorescence commun. — 15 genres.

USAGES⁴. — Les Iridacées utiles sont peu nombreuses. Celle que l'homme emploie le plus souvent est sans contredit le Safran cultivé⁵

feuilles (voy. p. 122, not. 2, et 139, not. 2) ne peuvent être appliquées à la classification, parce que, dans un genre d'ailleurs très naturel (*Crocus*, *Iris*, etc.), ces caractères peuvent être absolument variables.

1. BAK., loc. cit., 76, ser. 2. — *Morææ* B. H., Gen., III, 682, Trib. 1. — *Iridoideæ* PAX, loc. cit., 144, II.

2. *Croceæ* RITG., *Schr. Marb. Ges.*, II, 128 (part.). — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 73 (*Ixiæarum* Trib. 1). — *Crocoideæ* PAX, *Pflanzenfam.*, 142.

3. *Gladiolææ* SALISB., in *Trans. Hort. Soc. lond.* (1812), I, 316. — BAK., loc. cit., 78, ser. 3. — *Ixiææ* B. H., Gen., III, 684, Trib. 3. — *Ixioidææ* PAX, *Pflanzenfam.*, 153.

4. ENDL., *Enchirid.*, 99. — LINDL., *Veg. Kingd.*, 160. — ROSENTH., *Syn. plant. diaphor.*, 108, 1082. — H. BN., *Tr. Bot. méd. phanér.*, 1418.

5. *Crocus sativus* L., *Spec.*, 50. — LAMK., *Ill.*, t. 30. — FOUGER. DE BONDER., in *Mém. math. Ac. sc. Par.* (1782), 89, 105. — RED., *Lil.*, t. 173. — ROYLE, *Ill. himal.*, t. 91, fig. 1. — GUIB., *Drog. simpl.*, éd. 7, II, 193. — BERG et SCHM., *Darst. off. Gew.*, t. 1 d. — CHAPP., in *Bull. Soc. bot. Fr.*, XX, 191. — H. BN., *Tr. Bot. méd. phanér.*, fig. 3458-3462. — G. MAW, *Mon. gen. Crocus*, t. 29-29d (à la suite de ce travail, LACAÏTA, *App. on etym. words Saffron and Crocus*). — C. Orsinii PARLAT. — ? *C. intro-missus* HERB. (*Kesar, Azafran*).

(fig. 96-98), espèce orientale, plantée en Espagne depuis le dixième siècle et chez nous depuis le quatorzième, notamment dans le Gâtinais, l'Orléanais et l'Angoumois. La partie employée dans l'industrie comme tinctoriale, et dans la thérapeutique comme emménagogue, stimulante, antispasmodique, est le style orangé, à lobes flabelliformes, qu'on arrache lors de la floraison automnale et dont il faut environ 140 000 pour faire un kilogramme de safran commercial¹. Les *Crocus aureus*² (fig. 99-101) et *vernus*³ peuvent servir comme substitutifs en teinture, mais non en médecine⁴. En Syrie, on mange le bulbe du *C. cancellatus*⁵. Le plus recherché des *Iris* est l'*I. florentina*⁶ (fig. 88), dont le rhizome passe pour donner la meilleure poudre d'Iris, à odeur de violettes, usitée en parfumerie. Mais en Italie, où ces plantes se cultivent pour le commerce, on plante également, sous le nom commun de *Giaggioli*, les *I. germanica*⁷ (fig. 89, 90) et *pallida*⁸. Frais, leurs rhizomes sont âcres et irritants; aussi servent-ils à aviver les exutoires; usage auquel on les emploie encore secs, sous forme de pois à cautères. L'*I. fœtidissima*⁹ de nos bois, remarquable par son odeur spéciale, a un rhizome purgatif et a passé pour antihystérique. L'*I. Pseudacorus*¹⁰ (fig. 91), de nos localités aquatiques, est dangereux, violemment éméto-cathartique. Depuis l'époque du blocus

1. J. MAISCH, *Saffron and its adulterations*, in *Amer. Journ. Pharm.* (1885), 487. Le périanthé du *Tritonia (Crocus) aurea* PAPPE a la coloration et l'odeur du Safran.

2. SIBTH., *Fl. græc.*, I, 24. — KER, in *Bot. Mag.*, sub t. 652. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 80. — *C. luteus* LAMK., *Dict.*, VI, 385. — RED., *Lil.*, t. 196. — *C. vernus* CURT. (non ALL.). — *C. floribundus* HAW. (*Safran jaune*).

3. ALL., *Fl. pedem.*, I, 84. — RED., *Lil.*, t. 266. — JACQ., *Fl. austr.*, V, t. 36. — REICHB., *lc. exot.*, t. 22; *lc. crit.*, t. 929-934; *lc. Fl. germ.*, t. 355. — H. BN, *Iconogr. Fl. fr.*, n. 60.

4. Le *C. odoratus* BIV. est employé comme tinctorial, de même que les *C. reticulatus* STEV., *susianus* KER, *variegatus* HOPPE, *autumnalis* MILL., *Thomasii* TEN., *Pallasii* GOLDB. Plusieurs espèces du genre ont été indiquées comme antiépileptiques.

5. HERB., in *Bot. Mag.*, t. 3864. — *C. nudiflorus* SIBTH. et SM. — *C. dianthus* K. KOCH. — *C. Schimperii* J. GAY. — *C. damascenus* HERB. — *C. edulis* BOISS. et HELDR. On dit qu'en Moldavie, on mange aussi le bulbe du *C. vernus* ALL.

6. L., *Spec.*, ed. II, 55. — RED., *Lil.*, t. 23. — SIBTH., *Fl. græc.*, t. 39. — REICHB., *lc. Fl. germ.*, t. 339. — WOODV., *Med. Bot.*, IV,

t. 263. — FLUCK. et HAMB., *Pharmacogr.*, 598. — BENTL. et TRIM., *Med. pl.*, t. 273. — H. BN, *Tr. Bot. méd. phanér.*, 1418. — *I. alba* SAV., *Fl. pis.*, 32.

7. L., *Spec.*, ed. II, 55. — RED., *Lil.*, t. 309. — REICHB., *lc. Fl. germ.*, t. 338; *lc. crit.*, t. 924. — GREN. et GODR., *Fl. de Fr.*, III, 241. — H. BN, *Iconogr. Fl. fr.*, n. 279. — *I. violacea* SAV. — *I. nepalensis* WALL., in *Bot. Reg.*, t. 818. — *I. destiza* KN. et WETSC., *Fl. Cab.*, II, t. 51 (*Glaieul bleu, Flamme bleue, Gle*).

8. LAMK., *Dict.*, III, 294. — RED., *Lil.*, t. 366. — *Bot. Mag.*, t. 685. — *I. odoratissima* JACQ. — *I. hortensis* TAUSCH. — *I. pallide-cærulea* PERS. — *I. glauca* SALISB.

9. L., *Spec.*, ed. II, 57. — RED., *Lil.*, t. 354. — POIT. et TURP., *Fl. par.*, t. 45. — *I. fœtida* THUNB. — *Xiphion fœtidissimum* PARLAT. (*Iris-jambon, I.-gigot, Glaieul puant, Spatule*).

10. L., *Spec.*, ed. II, 56. — POIT. et TURP., *Fl. par.*, t. 46. — GREN. et GODR., *Fl. de Fr.*, III, 242. — H. BN, *Iconogr. Fl. fr.*, n. 180; *Herbor. par.*, 435. — *I. lutea* LAMK., *Fl. fr.*, III, 496. — *I. palustris* MÖENCH. — *Xiphion Pseudacorus* PARLAT. — *Xyridion Pseudacorus* KLATT (*Flambe des marais, Fausse-Flambe, Glaieul jaune, Acore adullérin, Pavé, Liaverv, Ganche*).

continental, ses graines torréfiées ont parfois été substituées à celles du Caféier. Aux États-Unis, le rhizome de l'*I. versicolor*¹ est employé comme évacuant; on extrait de son rhizome une oléo-résine dont les effets ont été comparés à ceux de l'Aloès et de la Rhubarbe. L'*I. cristata*² a aussi un rhizome purgatif. Ses fleurs servent, en Virginie, à préparer un faux sirop de violettes. En Sibérie, le rhizome de l'*I. sibirica* L. se prescrit contre la syphilis. Celui des *I. dichotoma* L. f. et *virginica* L. est purgatif, vomitif et diurétique. Les fleurs de l'*I. Xiphium*³ servent à teindre en vert, et l'on mange en Mauritanie les bulbes de l'*I. juncea*⁴. Au Kashmyr, on nourrit le bétail, dans les prairies sèches, avec les feuilles de l'*I. pabularia* NDN. En Californie, l'*I. tenax*⁵ sert à faire des cordes et des filets. Les Glaïeuls ont jadis été fort employés en médecine : les *Gladiolus communis*⁶ et *segetum*⁷ comme antiscrofuleux, emménagogues. Le bulbe de plusieurs espèces, notamment du *G. tristis*⁸ (fig. 103, 104) serait comestible pour l'homme ou pour les animaux⁹. Ceux-ci mangent le bulbe du *Babiana plicata* KER¹⁰ et du *Sparaxis bulbifera* KER. On vend sur les marchés, dans l'Afrique australe, celui du *Tritonia crocata* KER. Au Mexique, on indique comme fébrifuge le *Tigridia Pavonia*¹¹. Dans l'Indo-Chine, le *Gemmingia chinensis*¹² se prescrit, à l'intérieur et à l'extérieur, contre les morsures des serpents venimeux. Les racines du *Witsenia maura*¹³

1. L., *Spec.*, ed. II, 57. — RED., *Lil.*, t. 339. — JACQ., *Fl. austr.*, t. 233. — Bot. Mag., t. 21. — I. *saliva* MILL. — I. *picta* MILL. — *Xiphium versicolor* ALEF. (*Blue Flag*).

2. SOLAND., in *Ait. H. kew.*, I, 71. — RED., *Lil.*, t. 376. — Bot. Mag., t. 412. — Bot. Cab., t. 1366. — I. *odorata* PERS. — *Neubeckia cristata* ALEF. (espèce de la section *Evansia*).

3. L., *Spec.*, 58 (part.). — EHRH., *Beitr.*, VII, 139. — RED., *Lil.*, t. 337. — GREN. et GODR., *Fl. de Fr.*, III, 245. — I. *variabilis* JACQ. — *Xiphium vulgare* MILL., (*Iris* d'Angleterre, I. en gouttière, *Lis* d'Espagne).

4. DESF., *Fl. atl.*, I, t. 4. — Bot. Mag., t. 5890. — I. *mauritanica* CLUS. — I. *imberbis* POIR. — *Diaphane stylosa* SALISB. — *Xiphium junceum* KLATT.

5. DOUGL., in *Bot. Reg.*, t. 1218. — Bot. Mag., t. 3343. — *Ioniris tenax* KLATT. MARTIUS a décrit, au Brésil, un *Iris cathartica*. L'Hermodacte, dont les anciens médecins faisaient si grand usage, a été en partie attribué (PL.) à l'*I. tuberosa* L. (*Hermodactylus tuberosus* SALISB.), mais probablement par erreur.

6. L., *Spec.*, I, 52. — RED., *Lil.*, t. 267. — REICHB., *lc. Fl. germ.*, t. 349. — GREN. et GODR., *Fl. de Fr.*, III, 248. — Bot. Mag., t. 86,

1575 (*Glais, Iris nostras, Petite Flambe, Lis de la Saint-Jean*).

7. KER, in *Bot. Mag.*, t. 719. — REICHB., *lc. Fl. germ.*, t. 353. — GREN. et GODR., *Fl. de Fr.*, III, 248. — *G. italicus* GAUD. — *Sphaerospora imbricata* SWEET (*Glaïeul des moissons*).

8. L., *Spec.*, I, 53 (part.). — RED., *Lil.*, t. 35. — JACQ., *lc. rar.*, t. 243. — Bot. Mag., t. 272.

9. Il y aurait, au Cap, un *G. edulis* BURCH.

10. In *Bot. Mag.*, t. 576. — *Gladiolus plicatus* THUNB. (part.). — *G. fragrans* JACQ. — *G. reflexus* LIGHT.

11. KER, in *Kæn. et Sims Ann.*, I, 246. — *Ferraria Pavonia* L. f. — CAV., *Diss.*, VI, t. 189, fig. 1. — RED., *Lil.*, t. 6. — *F. Tigridia* KER, in *Bot. Mag.*, t. 532. — *Moræa Tigridia* THUNB. (*Œil-de-paon*).

12. O. K., *Revis.*, 701. — *Belemcanda chinensis* LEM., in *Red. Lil.*, t. 121. — *B. punctata* MOENCH. — *Ixia chinensis* L. — *Pardanthus chinensis* KER. — *Fl. serres*, t. 1632. — *P. nepalensis* SWEET.

13. THUNB., *Nov. gen.*, II, 34. — RED., *Lil.*, t. 245, 463. — MAUND, *Bot.*, t. 125. — REICHB., *lc. exot.*, t. 23. — *Fl. serres*, t. 72. — Bot. Reg., t. 5. — *Antholyza maura* L. — *Ixia disticha* LAMK.

sont adoucissantes et sucrées. Au Brésil, on emploie comme purgatifs plusieurs *Trimeria* de la section *Lansbergia*, notamment les *T. purgans*¹ et *cathartica*². Aux Antilles, on a vanté le *T. martinicensis*³ comme tonique, astringent et emménagogue; son suc comme sternutatoire; son périanthe et son rhizome comme tinctoriaux; ce dernier sert à préparer une encre. Dans l'Amérique méridionale, le *Tekel ixioides*⁴ est usité comme évacuant et diurétique. Les souches de plusieurs *Sisyrinchium* sont indiquées comme évacuantes, hydragogues et dépuratives. Le nombre d'Iridacées ornementales⁵ est considérable; la plupart appartiennent aux genres *Iris*, *Tigridia*, *Crocus*, *Gladiolus*, *Ixia*, *Sparaxis*, *Ferraria*, *Nivenia*, *Aristæa*, *Moræa*, *Marica*, *Lapeyrousia*, *Watsonia*, *Tritonia*, *Babiana*, *Freesia* et *Antholyza*. Celles de l'Afrique tropicale, cultivées dans le midi et l'ouest de la France, affluent aujourd'hui sur les marchés des grandes villes et deviennent l'objet d'un commerce qui prend de jour en jour plus d'importance.

1. *Ferraria purgans* MART., *Reis.*, II, 547. — *Lansbergia purgans* KLATT (*Ruibarba da Pyretro*).

2. *Ferraria cathartica* MART., *Reis.*, II, 547. — *Lansbergia cathartica* KLATT (*Ruibarba do campo*).

3. *T. lurida* SALISB., in *Trans. Hort. Soc. lond.*, I, 280. — *Iris martinicensis* L. — RED., *Lil.*, t. 172. — DESCOURT., *Fl. Ant.*, t. 252. — *Bot. Mag.*, t. 416. — *Cipura martinicensis* H. B. K. — *Marica martinicensis* KER. — *Sisyrinchium fluminense* VELL. — *S. galazioides* GOM. — *Vieusseuxia martinicensis* DC. — *Poarchon*

fluminense ALLEM. — *Remaclea funebris* MORR. — *Xanthocromyon Herberti* KARST. — *Lansbergia caracasana* DE VR. — *L. martinicensis* BAK.

4. *Tekelia ixioides* O. K., *Revis.*, 702. — *Libertia ixioides* SPRENG., *Syst.*, I, 168. — REICH., *Hort.*, t. 157. — *Moræa ixioides* THUNB. — *Ferraria ixioides* W. — *Sisyrinchium ixioides* FORST. — *Nematostigma ixioides* DIETR.

5. Figurées en grand nombre dans les *Liliacées* de REDOUTÉ, le *Botanical Magazine*, le *Botanical Register*, le *Botanical Repository*, le *Botanical Cabinet*, les *Icones* de JACQUIN, etc., etc.

GENERA

I. IRIDEÆ.

1. *Iris* T. — Flores hermaphroditi regulares; receptaculo oblongo sacciformi germenque cavitate intus adnatum fovente. Perianthium petaloideum receptaculi margini affixum; foliolis 2-seriatis infra medium unguiculatis inque tubum sæpius brevem connatis. Sepala 3, basi contracta; limbo dilatato patente v. reflexo; costa sæpe intus inferne papilloso-cristata; præfloratione sæpius torta. Petala alterna 3, sæpe angustiora, nunc minora linearia subulata; limbo patente v. nunc erecto, recurvo v. connivente; præfloratione torta v. rarius imbricata. Stamina 3, alternipetala, tubo sub sepalis affixa; filamentis subulatis, liberis v. raro (*Gynandriris*) basi 1-adelphis; antheris basifixis linearibus, styli ramis extus arcte applicitis; loculis parallelis distinctis, extrorsum rimosis. Germen inferum, apice obtusum, acuminatum v. plus minus longe rostratum; styli brevis ramis multo longioribus petaloideo-dilatatis, supra antheras recurvis, apice obtuso membranaceo superne stigmatoso-papilloso; additis laminis interioribus 2 plus minus alte connatis, apice liberis angulatis, integris v. raro (*Evansia*) parce v. longe ciliato-fimbriatis. Ovula in loculis sæpius completis v. (*Hermodactylus*) in placentis parietalibus ∞ , 2-seriatim angulo interno affixa anatropa. Fructus brevis, oblongus v. sæpius longiusculus, teres lævis v. 3-6-costatus, raro 3-queter v. subalatus, vertice obtusus v. rostratus, loculicidus; rostro farcto aut 3-fido, aut varie disrupto v. marcescente. Semina ∞ , sphærica v. angulato-compressa, extus nunc spongioso-incrassata v. spurie arillata; albumine corneo; embryone excentrico plus minus elongato. — Herbæ perennes; rhizomate vario, brevi v. elongato, crasso v. tenui, simplici v. ramoso, squamato v. cicatrisato; ramis aeriis alternis

solitariis v. fasciculatis, simplicibus v. rarius ramosis, basi in bulbum solidum v. varie tunicatum incrassatis (*Xiphion*); tunicis variis, nunc elongatis, nunc demum in fibras reticulatas solutis. Folia ad ramorum basin pauca vaginata, aut linearia tenuia, aut sæpius ensata plana disticha et equitantia; limbo lato radiante; foliis altius alternis paucis in bracteas abeuntibus. Flores terminales solitarii v. sæpius racemosi; cymis lateralibus alternis in axilla bractæ (spathæ) imparinervis 1-paucifloris; bracteola inter florem axinque postica parinervi. (*Europa, Asia temp., Africa bor., America bor.*) — *Vid. p. 119.*

2. **Moræa** L.¹ — Flores fere *Iridis*; perianthii foliolis ad basin liberis. Petala sæpius unguiculata, sepalis maculatis angustiora minoraque, nunc minima v. (*Vieusseuxia*²) 3-dentata v. 3-fida. Stamina plus minus alte 1-adelpha; antheris ad styli ramos alatos arcte applicitis. Cætera *Iridis*. — Herbæ perennes; rhizomate brevissimo; bulbo in eo solitario v. 0; foliis basilaribus ensiformibus v. angustissime linearibus; cymis³ spathaceis 2-∞-floris; fructibus cum pedicello sæpius exsertis. (*Africa austr., trop. cont. et ins. or., Australia*⁴.)

3. **Marica** KER.⁵ — Flores fere *Morææ*; perianthii foliolis liberis tortis; tubo 0. Sepala ovato-oblonga patentia. Petala angustiora, basi erecta, superne patentia, incrassata v. undulata. Stamina 3; filamentis gracilibus liberis erectis, basi breviter dilatatis; antheris linearibus basifixis stylo applicitis⁶. Germen ∞-ovulatum; styli gracilis ramis erectis, 3-alatis v. acute 3-quetris; angulis 2, 3 in lobos acuminatos erectos ultra antheram applicitam productis; lobulis stigmatosis ad loborum basin transversis auriculiformibus, breviter patentibus, 2-partitis v. 2-fidis. Fructus obovoideo-oblongus, apice

1. *Spec.*, ed. II, 59; *Gen.*, ed. VI, n. 60. — J., *Gen.*, 58. — GÆRTN., *Fruct.*, I, t. 13, fig. 2. — ROEM. et SCH., *Syst.*, I, 342, 450. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 129. — KLATT, in *Linnaea*, XXXIV, 557. — B. H., *Gen.*, III, 688, n. 3. — PAX, *Pflanzensam.*, 146, fig. 99, C. — *Diets* SALISB., in *Trans. Hort. Soc. lond.*, I, 307. — KLATT, *Erg. u. Ber.*, 40. — *Helizyra* SALISB., loc. cit., 305. — *Hymenostigma* HOCHST., in *Flora* (1844), 24. — *Freuchenia* ECKL., *Verz. Pfl. Samml.*, 14.

2. DELAR., ex DC., in *Ann. Mus.*, II, 136, t. 42. — BAK., loc. cit., 132. — KLATT, *Erg. u. Ber.*, 34.

3. Floribus majusculis, nunc speciosis.

4. *Spec. ad 40.* JACQ., *Ic. rar.*, t. 221, 222,

224, 225; *H. schænbr.*, t. 196, 197; *H. vindob.*, III, t. 10 (*Iris*), 20. — RED., *Lil.*, t. 71. — SALISB., *Par. lond.*, t. 10. — Lodd., *Bot. Cab.*, t. 1861, 1886. — ANDR., *Bot. Rep.*, t. 45 (*Iris*), 364. — *Fl. serres*, t. 423. — *Bot. Reg.*, t. 312, 1074, 1404. — *Bot. Mag.*, t. 168; 571 (*Iris*), 577, 593, 613, 693, 696, 702, 712, 750, 759, 771, 772, 1012, 1045, 1047, 1061, 1247, 1276, 1284, 5785. — WALP., *Ann.*, VI, 46.

5. In *Bot. Mag.*, t. 654 (non t. 655, nec SCHREB.). — ENDL., *Gen.*, n. 1228 (part.). — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 149. — B. H., *Gen.*, III, 689, n. 4. — PAX, *Pflanzensam.*, 147, fig. 99 A.

6. Connectivo inter loculos extrorsum lineari prominulo.

truncatus v. obtusus, loculicidus; seminibus ∞ , sphæricis v. angulatis; albumine durissimo. — Herbæ perennes; rhizomate brevi; ramis aeriis erectis brevibus, sæpius validis; foliis basilaribus distichis equitantibus ensatis, florali 1; angulis in axi decurrentibus 2; spathis in folio florali 2-paucis; altera sessili v. brevius stipitata; floribus¹ in spatha pluribus 1-pari-cymosis pedicellatis; fructu demum exserto. (*America trop. or., Africa trop. occid.*²)

4. **Cypella** HERB.³ — Flores *Maricæ*; perianthii foliolis liberis. Stamina alte libera v. plus minus monadelphæ. Styli cæteraquæ *Maricæ*. — Herbæ perennes; bulbo tunicato; foliis basilaribus paucis, ensiformibus plicato-venosis v. angustissimis; spathis in axi tenui v. validiore solitariis v. ∞ , nunc fasciculato-axillaribus, stipitatis v. ex parte sessilibus. (*America austr. subtrop. et extratrop.*⁴)

5. **Trimezia** SALISB.⁵ — Flores fere *Maricæ*; perianthii tubo 0. Sepala libera torta. Petala sæpius minora concava, sub apice sæpe angustata. Stamina 3; filamentis filiformibus; antheris extrorsis, nunc styli ramis applicitis. Ovula adscendentia. Stylus basi tenui simplex; ramis crassioribus erectis, apice sæpius 4-lobis; lobis interioribus brevibus dentiformibus, aculis v. nunc setaceis; exterioribus autem stigmatoso-papillosis. Fructus brevis v. oblongus loculicidus. — Herbæ perennes; bulbo tunicato; foliis basilaribus paucis, planis v. teretibus; floribus in summo scapo in cymas 1 v. plures alternantes dispositis; bracteis primum cymas includentibus; pedicellis longe exsertis. (*America austr. et antillana*⁶.)

1. Flavis v. cærulescentibus.

2. Spec. 8, 9. PERS., *Syn.*, I, 52 (*Iris*). — RED., *Lil.*, t. 56 (*Moræa*). — LINK, KL. et OTT., *lc. pl. sel.*, t. 58. — HOOK., *Exot. Fl.*, t. 222. — LINDL., in *Trans. Roy. Hort. Soc.*, VI, t. 1. — ANDR., *Bot. Rep.*, t. 255 (*Moræa*). — LODD., *Bot. Cab.*, t. 1164. — SALISB., *Prodr.*, 42 (*Ferraria*). — KLATT, *Erg. u. Ber.*, 40; in *Mart. Fl. bras.*, III, I, t. 66 (*Cypella*). — HEMSLE., *Bot. centr.-amer.*, III, 325. — *Bot. Reg.*, t. 713. — *Bot. Mag.*, t. 654, 3713, 3803, 6380.

3. In *Bot. Mag.*, sub t. 2637. — ENDL., *Gen.*, n. 1228. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 128. — B. H., *Gen.*, III, 689, n. 5. — PAX, *Pflanzenfam.*, 147. — POLIA TEN., in *Mem. Ac. Pontad.* (ann. ?), t. 2. — *Hesperoxiphon* BAK., *loc. cit.*, 127. — *Phalocallis* HERB., in *Bot. Mag.*, t. 3710. — O. K., *Revis.*, 702.

4. Spec. 4, 5. SWEET, *Brit. fl. Gard.*, ser. II,

t. 33; ed. II, 497 (*Herbertia*). — HERB., in *Bot. Mag.*, t. 2599 (*Tigridia*). — KLATT, in *Linnaea*, XXXI, 544; 545 (*Polia*); in *Mart. Fl. bras.*, III, I, t. 66 (*Phalocallis*). — LINK, KL. et OTT., *lc. pl. sel.*, t. 59 (*Ferraria*). — BAK., in *Bot. Mag.*, t. 6213. — *Fl. serres*, t. 395, 1466 (*Phalocallis*). — *Bot. Reg.*, t. 949 (*Moræa*).

5. In *Trans. Roy. Hort. Soc. lond.*, I, 308. — B. H., *Gen.*, III, 690, n. 6. — PAX, *Pflanzenfam.*, 147. — *Lansbergia* DE VR., *Ind. sem. H. lugd.-bat.* (1846), 2. — KLATT, in *Linnaea*, XXXI, 547. — *Xanthocromyon* KARST., in *Bot. Zeit.* (1847), 694. — *Poarchon* MART., *Mat. med. bras.*, 77. — ALLEM., *Tract., R. Jan.* (1849). — *Remaclea* MORR., in *Belg. hort.*, III, 3, t. 1.

6. Spec. ad 6. L., *Spec.*, 58 (*Iris*). — JACQ., *St. amer.*, t. 7 (*Iris*). — RED., *Lil.*, t. 416 (*Iris*). — DC., in *Ann. Mus.*, II, 188 (*Vicus*

6. **Tigridia** J.¹ — Flores hermaphroditi; perianthii foliolis 6, sessilibus liberisque. Sepala latissima subsessilia, apice patentia v. incurva, torta. Petala multo minora patentia oblonga, apice obtusa, basi breviter abruptepue contracta, plus minus undulata, torta. Stamina intra perianthium affixa; filamentis longe in tubum cylindraceum connatis; antheris sessilibus ad apicem tubi basifixis; antheris linearibus; loculis extrorsis adnatis, longitudine rimosis. Germen 3-loculare; loculis ∞ -ovulatis; stylo intra tubum stamineum gracili; ramis plus minus alte 2-lobis; lobis linearibus, induplicatis, apice intus papillois; dente ad basin loborum subulato, glanduliformi v. nunc 0. Fructus lineari-oblongus, apice convexus, loculicidus. Semina angulata ∞ . — Herbæ perennes; bulbo tunicato; foliis ad basin caulis paucis, angustis v. nunc latoribus, plicato-venosis; caulinis paucis dissitis minoribus; floribus² in spatha terminalibus paucis v. 2, 1-pari-cymosis. (*Mexicum, America centr. et austr. bor.-occid.*)³

7. **Alopha** HERB.⁴ — Flores fere *Tigridiæ*; perianthii foliolis liberis membranaceis; sepalis obovatis v. late oblongis, breviter unguiculatis, mox patentibus; tubo 0; petalis calyci subæqualibus v. minoribus acutis, sæpe erectis. Stamina fauci affixa; filamentis usque ad apicem 1-adelphis; antheris linearibus, nunc demum tortis. Germen ∞ -ovulatum; stylo intra androcæi tubum gracili; ramis divergentibus linearibus v. membranaceo-dilatatis, nunc 2-fidis, antheræ superpositis eique arcte applicitis. Fructus apice truncatus v. prominulus, loculicidus; seminibus angulatis ∞ . — Herbæ perennes; bulbo tunicato; foliis paucis anguste linearibus v. latoribus et plicato-nervosis; floribus in spatha terminali solitaria v. in spathis

seuzia). — KLATT, in *Mart. Fl. bras.*, III, 1, t. 67 (*Lansbergia*), 68 (*Remaclea*); *Erg. u. Ber.*, 29. — KER, in *Kæn. et Sims Ann.*, I, 225 (*Marica*). — *Bot. Mag.*, t. 416 (*Iris*).

1. *Gen.*, 57. — KER, in *Kæn. et Sims Ann.*, I, 246. — ENDL., *Gen.*, n. 1229. — KLATT, in *Linnaea*, XXXI, 566. — B. H., *Gen.*, III, 690, n. 7. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 135. — PAX, *Pflanzenfam.*, 147, fig. 99, C, D. — *Bea-tonia* HERB., in *Bot. Mag.*, sub t. 3779. — KLATT, *loc. cit.*, 565. — *Hydrotænia* LINDL.

2. Purpureis, violaceis v. lutescentibus, in specie 1 magna speciosis.

3. Spec. 6, 7. GAV., *Diss. Monad.*, t. 189 (*Ferraria*), 192, fig. 2 (*Sisyrinchium*). — THUNB., *Diss.*, n. 20 (*Moræa*). — SALISB., in *Trans.*

Hort. Soc., I, 309. — RED., *Lil.*, t. 6 (*Ferraria*). — LINK, KL. et OTT., *lc. pl. sel.*, t. 20, 34. — SWEET, *Brit. fl. Gard.*, t. 123. — ANDR., *Bot. Rep.*, t. 178 (*Ferraria*). — *Fl. serres*, t. 908-910, 2174. — HERB., in *Bot. Reg.* (1843), *Misc.*, 72. — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 326. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 1424. — PAXT., *Mag.*, XIV, 53. — *Bot. Mag.*, t. 532 (*Ferraria*), 6295. — WALP., *Ann.*, VI, 47.

4. In *Bot. Mag.*, sub t. 3779 (1848). — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 125. — B. H., *Gen.*, III, 691, n. 9. — PAX, *Pflanzenfam.*, 147. — *Trifurcia* HERB., *loc. cit.* — *Herbertia* SWEET, *Brit. fl. Gard.*, t. 222. — KLATT, in *Linnaea*, XXXI, 553. — BAK., *loc. cit.*, n. 133 (non S.-F. GRAY).

paucis ad axillam folii floralis pedunculatis paucis; bracteola 2-nervi membranacea spathaque inclusa. (*America calid. utraque*¹.)

8. **Rigidella** LINDL.² — Flores³ fere *Tigridiæ*; perianthii foliolis supra germen in cupulam conniventibus; sepalis latioribus, breviter unguiculatis, oblongis, superne patentibus v. reflexis; petalis autem suberectis styloque appressis angustioribus v. in cupula perianthii occultis. Stamina 3, 1-adelpha; filamentis circa stylum in tubum anguste cylindraceum omnino connatis; antheris lineari-elongatis erectis; loculis adnatis, extrorsum rimosis. Germen angustum, ∞ -ovulatum; stylo gracillimo; ramis 3 mox 2-partitis; ramulis stigmatosis lineari-subulatis, margine induplicato papillois; addito et sæpe dente inter ramulos patente nudo. Fructus oblongus loculicidus, apice convexus; seminibus subsphæricis ∞ . — Herbæ perennes; bulbo parce tunicato; foliis basilaribus paucis plicato-nervosis petiolatis; inflorescentia pluriflora cæterisque *Tigridiæ*. (*Mexicum, Guatemala*⁴.)

9. **Cipura** AUBL.⁵ — Flores fere *Tigridiæ*; perianthii tubo brevi, mox in sepala plana lata, plus minus distincte unguiculata, dilatato; petalis minoribus et magis quam sepalis erectis. Stamina libera imis lobis affixa. Germen ∞ -ovulatum; styli tenuis ramis androcæo longioribus et apice v. fere a basi petaloideo-dilatatis, integris v. ciliato-denticulatis. Fructus⁶ loculicidus; seminibus angustis v. subsphæricis. — Herbæ perennes; bulbo tunicato; axi aërio simplici; foliis basilaribus paucis, aut angustis, aut latioribus plicato-venosis; floribus in racemum terminalem dispositis; ramis ad axillam bracteæ floralis flores paucos 1-pari-cymosos v. nunc solitarios pedicellatos gerentibus; spathis angustis; bracteola postica parinervi. (*America centr. et calid. utraque*⁷.)

1. H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, I, 321 (*Moræa*). — HERB., in *Bot. Mag.*, t. 3862. — STEUD., in *Lechl. Pl. chil.*, n. 298 (*Roterbe*). — GRAB., in *Edinb. N. Phil. Journ.*, XX, 190 (*Cypella*).

2. *Bot. Reg.* (1840), t. 16; *Misc.*, 35. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 134. — B. H., *Gen.*, III, 691, n. 8. — PAX, *Pflanzenfam.*, 147.

3. Rubri v. violacei, longe pedicellati.

4. Spec. 3. HERB., in *Bot. Reg.* (1841), t. 68. — PAXT., *Mag.*, VII, 247; XIV, 121, c. ic. — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 327. — *Fl. serres*, t. 502, 2215.

5. *Pl. Guian.*, I, 38, t. 13. — POIR., *Dict.*, IX, 247. — K., *Syn.*, I, 313. — ENDL., *Gen.*, n. 1222. — KLATT, in *Linnaea*, XXXI, 551. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 125. — B. H., *Gen.*, III, 694, n. 17. — PAX, *Pflanzenfam.*, 149. — *Marica* SCHREB., *Gen.*, 37.

6. E spathis exsertus.

7. Spec. 2, 3. GWEL., *Syst.*, 118 (*Marica*). — W., *Spec.*, I, 246 (*Marica*). — H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, I, 320. — KLATT, in *Mart. Fl. bras.*, III, 514, t. 64, fig. 1. — KER., in *Bot. Mag.*, t. 646 (*Marica*). — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 328.

10. **Cardiostigma** BAK.¹ — Flores fere *Tigridiæ*; perianthii mox explanato-patentis foliolis obovatis, basi vix connatis; petalis nunc brevioribus tenuioribus. Stamina imis foliolis affixa libera; antheris oblongis extrorsum rimosis. Germen ∞ -ovulatum; styli gracilis ramis androcæo longioribus, a basi v. a medio in laminam petaloideam conduplicatam marginibusque papillosam dilatatis. Fructus ovoideo-oblongus loculicidus, apice truncatus v. obtusus. Semina ∞ , sphærica v. oblonga. — Herbæ perennes; bulbo tunicato; foliis paucis elongatis plicato-nervosis; floribus ad summum pedunculum in spathis paucis v. in spatha solitaria terminali cymosis; cymis 1-paris paucifloris; fructibus exsertis; cæteris *Cipuræ*. (*America trop. et temp. utraque*².)

11. **Gelasine** HERB.³ — Flores fere *Tigridiæ*; perianthii tubo subnullo v. brevissimo subcampanulato v. subinfundibulari; lobis 6, æqualiter ovatis erecto-patentibus. Stamina fauci affixa; filamentis 1-adelphis; tubo brevi; antheris in summo tubo rectis linearibus, extrorsum rimosis. Germen ∞ -ovulatum; styli brevis ramis divergentibus subulatis integris complicatis, superne secundum margines papillosis. Fructus oblongus, apice truncatus v. convexus, loculicidus; seminibus ∞ , sphæricis v. angulatis. — Herbæ perennes; bulbo tunicato; foliis basilaribus lineari-lanceolatis plicato-nervosis; floribus⁴ in spatha terminali cymosis ∞ ; pedicellis fructiferis e spatha herbacea striata exsertis; bracteolis interioribus tenuioribus v. scariosis. (*America austr. extratrop.*⁵)

12. **Homeria** VENT.⁶ — Flores fere *Trigidiæ* (v. *Morææ*); perianthii hypocraterimorphi v. subinfundibularis tubo brevi, mox ampliato; limbi lobis 6, subintegris obtusis erecto-patentibus. Stamina fauci affixa; filamentis monadelphis; antheris lineari-oblongis styli ramis basi applicitis. Germen longissime lineare; ovulis crebris; styli erecti androcæoque inclusi ramis exsertis v. brevioribus divergentibus, aut

1. In *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 102. — *Sphenostigma* BAK., loc. cit., 124. — B. H., *Gen.*, III, 694, n. 18. — PAX, *Pflanzenfam.*, 149.

2. Spec. ad 5. HERB., in *Benth. Pl. Hartweg.*, 53 (*Gelasine*). — BAK., in *Trim. Journ.* (1876), 188 (*Calydorea*). — KLATT, in *Linnæa*, XXXI, 557 (*Alophia*), 565 (*Rotherbe*); in *Mart. Fl. bras.*, III, 1, 516, t. 65 (*Alophia*). — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 328 (*Sphenostigma*).

3. In *Bot. Mag.*, t. 3779 (part.). — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 106. — B. H., *Gen.*, III, 696, n. 21. — PAX, *Pflanzenfam.*, 149.

4. Cæruleis v. flavidis, pulchellis.

5. Spec. 3, 4.

6. *Dec.*, 5. — ENDL., *Gen.*, n. 1224. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 104. — KLATT, in *Linnæa*, XXIV, 625. — B. H., *Gen.*, III, 692, n. 11. — PAX, *Pflanzenfam.*, 149.

linearibus, aut longioribus petaloideo-cuneatis, 2-dentatis v. fimbriatis. Fructus elongatus loculicidus. — Herbæ perennes; bulbo tunicato; foliis angustis paucis; floribus¹ in spatha ∞ , longe pedicellatis, 1-pari-cymosis; cymis axin simplicem v. ejus ramos breves terminantibus; bracteolis interioribus tenuibus hyalinis. (*Africa austr.*²)

13. **Calydorea** HERB.³ — Flores fere *Tigridiæ*; perianthii tubo breviter campanulato v. brevissimo; lobis 6, patentibus, basi contractis; petalis nunc minoribus angustioribus. Stamina imo perianthio affixa libera; antheris linearibus, nunc flexuosis. Germen 3-loculare, ∞ -ovulatum; styli columnaris ramis divergentibus v. divaricatis, subulatis v. apice stigmatoso emarginatis clavatisve, supra basin nunc dente auctis. Fructus obovoideus truncatus loculicidus; seminibus ∞ , sphaericis v. angulatis. — Herbæ perennes; bulbo tunicato lævi; foliis basilaribus paucis angustis; floralibus in axi minoribus 1, 2; spathis paucis v. 1, summo axi insertis, sessilibus v. stipitatis; cymis paucifloris, 1-paris. (*Mexicum, America austr. trop. et extratrop.*⁴)

14. **Ferraria** L.⁵ — Flores fere *Tigridiæ* (v. *Morææ*); perianthii tubo breviter campanulato; limbi lobis æqualibus oblongo-lanceolatis, basi angustatis, margine undulatis, patentibus. Stamina 1-adelpha v. conniventia. Germen rostratum, ∞ -ovulatum; styli gracilis ramis mox petaloideo-dilatatis, complicatis v. expansis, apice 2-fido ∞ -setis; setis papillois. Fructus acuminatus membranaceus loculicidus; seminibus evolutis paucis (fuscatis) compresso-inæquiquadratis rugulosis. — Herbæ perennes; bulbo tunicato; axi aërio foliato, superne ramoso; foliis ensiformibus; floribus⁶ cymosis pedi-

1. Sæpe speciosus.

2. Spec. 5. — THUNB., *Dis.*, n. 13 (*Moræa*). — RED., *Lil.*, t. 171, 250 (*Sisyrinchium*). — JACQ., *H. schœnbr.*, t. 12; *lc. rar.*, t. 226 (*Moræa*). — ANDR., *Bot. Reg.*, t. 404 (*Moræa*). — SWEET, *Brit. fl. Gard.*, t. 152, 178; ser. II, t. 178. — ECKL., *Top. Verz.*, 14 (*Moræa*). — SALISB., in *Trans. Hort. Soc. lond.*, I, 308. — *Bot. Mag.*, t. 1033, 1103, 1283, 1612 (*Moræa*).

3. In *Bot. Reg.* (1843), *Misc.*, 85. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 101 (part.). — B. H., *Gen.*, III, 695, n. 20. — PAX, *Pflanzenfam.*, 149. — *Boterbe* STEUD., ex KLATT, in *Linnæa*, XXXI, 562. — *Roterbe* KLATT, in *Mart.*

Fl. bras., III, 543, t. 71, fig. 4; *Erg. u. Ber.*, 53.

4. Spec. ad 8. HERB., in *Bot. Mag.*, sub t. 3779 (*Gelasine*). — BAK., in *Trim. Journ.* (1876), 188. — HOOK., in *Bot. Mag.*, t. 3544 (*Sisyrinchium*).

5. *Spec.*, ed. II, 1353; *Gen.*, ed. VI, n. 1018. — J., *Gen.*, 57. — TURP., in *Dict. sc. nat.*, Atl., t. 191. — ENDL., *Gen.*, n. 1230. — K., *Syn.*, I, 317. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 105. — KLATT, in *Linnæa*, XXXIV, 624. — B. H., *Gen.*, III, 692, n. 10. — PAX, *Pflanzenfam.*, 148.

Majusculis, nunc speciosus.

cellatis; cymis in spatha pluribus in ramulis congestis; bracteola postica hyalina. (*Africa austr.*⁴)

15. **Nemastyllis** NUTT.² — Flores fere *Morææ*; perianthii tubo brevissimo expanso; lobis obovatis æqualibus, v. petalis minoribus. Stamina imo perianthio affixa; antheris plus minus alte 1-adelphis; antheris oblongis, nunc apice tortis; connectivo lineari v. latiore. Germen ∞ -ovulatum; styli erecti ramis linearibus patentibus, apice stigmatoso 2-fidis. Fructus membranaceus, apice prominulus v. truncatus, loculicidus; seminibus sphæricis v. angulatis. — Herbæ perennes; bulbo tunicato; foliis ensiformibus v. subteretibus angustis; floralibus minoribus 1, 2; spatha terminali; floribus³ solitariis v. 1-pari-cymosis pedicellatis. (*America bor. et trop.*⁴)

16. **Hexaglottis** VENT.⁵ — Flores fere *Nemastylidis*: perianthii tubo 0. Stamina ima basi vix sepalis adnata; antheris elongatis, rectis v. demum tortis. Germen cylindraceo-elongatum; styli brevis ramis antheras subæquantibus sub-2-partitis; ramulis demum inter stamina patentibus, anguste complicatis. Fructus linearis, sub-3-queter, apice obtusus, demum loculicidus. — Herbæ perennes; bulbo tunicato; ramis aeriis elongato-ramulosis virgatis; foliis longe linearibus rigidulis; floribus⁶ in spatha 1-pari-cymosis pluribus; spathis angustis secus ramos inflorescentiæ sessilibus. (*Africa austr.*⁷)

17. **Tekel** ADANS.⁸ — Flores fere *Tigridiæ*; perianthii regularis

1. Spec. ad 6. JACQ., *H. schænbr.*, t. 450 (*Moræa*); *H. vindob.*, t. 63. — CAV., *Diss. Monad.*, t. 190, fig. 1. — RED., *Lil.*, t. 28. — ANDR., *Bot. Rep.*, t. 285. — SWEET, *Brit. fl. Gard.*, t. 148, 161, 192. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 1356. — PERS., *Syn.*, I, 50. — MILL., *l.c.*, 187, t. 280. — *Bot. Mag.*, t. 144, 751.

2. In *Trans. Amer. Phil. Soc.*, V, 157. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 102. — B. H., *Gen.*, III, 696, n. 22. — PAX, *Pflanzenfam.*, 148, fig. 101. — *Nemostylis* HERB., in *Bot. Mag.*, sub t. 3779. — *Eustylis* ENGELM. et A. GRAY, in *Pl. Lindheim.*, 27, 28. — *Chlamydestylis* BAK., in *Trim. Journ.* (1876), 185; in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 107.

3. Cæruleis v. violaceis.

4. Spec. 8-10. BART., *Fl. N.-Amer.*, I, 76 (*Ixia*). — KLATT, in *Mart. Fl. bras.*, III, I, 515, t. 65; in *Linnæa*, XXXI, 567; XXXIV, 733 (*Beatonia*). — BENTH., *Pl. Hartw.*, 95. — *Fl. serres*, n. 2171. — HEMS., *Bot. centr.-*

amer., III, 328. — *Bot. Mag.*, t. 6666.

5. *Dec.*, 6. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 99. — B. H., *Gen.*, III, 692, n. 12. — PAX, *Pflanzenfam.*, 148. — ? *Plantia* HERB., in *Bot. Reg.* (1844), *Misc.*, 89.

6. Parvis, nunc flavis.

7. Spec. 2, 3. JACQ., *H. vindob.*, III, t. 90 (*Ixia*); *l.c. var.*, t. 228 (*Moræa*). — L. F., *Suppl.*, 100 (*Moræa*). — KER, in *Bot. Mag.*, t. 695 (*Moræa*). — SWEET, *Brit. fl. Gard.*, ed. II, 498. — W., *Spec.*, I, 202 (*Ixia*). — SPRENG., *Syst.*, I, 167 (*Sisyrinchium*). — SAUND., *Ref. bot.*, t. 24 (*Homeria*). *Keitia* REG., in *Act. H. petrop.*, V, 639, genus ad plantam cultam natalensem conditum, hic ab auctt. locatur (PAX, *Pflanzenfam.*, 448) et distinguitur « spathis pedunculatis ovatis; filamentis ima basi connatis; styli ramis applanatis » (B. H., *Gen.*, III, 697, n. 27).

8. *Fam. des pl.*, II, 497. — *Libertia* SPRENG., *Syst.*, I, 127, 168. — ENDL., *Gen.*, n. 1221.

rotati foliolis erecto-patulis; tubo brevissimo. Sepala sæpius brevius minus petaloidea. Petala majora magisque colorata, torta. Stamina æqualia; filamentis liberis v. plus minus alte connatis; antheris versatilibus; loculis basi liberis. Germen breve, ∞ -ovulatum; styli gracilis ramis divergentibus induplicato-subulatis integris, rectis v. falcatis, ad apicem stigmatosis. Fructus coriaceus brevis loculicidus; seminibus sphæricis v. minute 3-quetris; albumine corneo. — Herbæ perennes; rhizomate repente; foliis basilaribus distichis equitantibus; caulinis minoribus; floribus¹ in axi communi simplici v. ramoso cymosis; bracteis 1-plurifloris; bracteola postica duplici. (*Australia, America austr. extratrop., N. Zelandia*².)

18. **Gemmingia** HEIST.³ — Flores fere *Morææ*; tubo supra germen brevissimo; lobis subæqualibus, 2-seriatim tortis, oblongis, patentibus. Stamina imo perianthio affixa libera; antheris basifixis sagittatis. Germen obovoideum, ∞ -ovulatum; styli tenuis lobis elongatis obtriangularibus conniventibus, apice stigmatoso truncato-emarginatis; marginibus complicatis? Fructus obovoideus loculicidus; valvis demum reflexis placentasque relinquentibus. Semina subsphærica⁴; albumine corneo; embryone brevi. — Herba perennis; rhizomate repente; ramis aeriis erectis validis; foliis basilaribus ensiformibus equitantibus; floribus⁵ in racemum 2, 3-chotomum dispositis; foliis sub ramis primariis spathaceis (viridibus); cymis ad ramos in axilla spatharum membranacearum insertis, 1-paris; bracteola postica 2-fida. (*India, China, Japonia*⁶.)

19. **Bobartia** KER⁷. — Flores fere *Gemmingiæ*; perianthii foliolis 6,

— BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 152. — KLATT, in *Linnaea*, XXXI, 380. — B. H., *Gen.*, III, 696, n. 24. — PAX, *Pflanzenfam.*, 149, fig. 102. — *Renalmia* R. BR., *Prodr.*, 591 (non L. f.). — KER, *Irid. Gen.*, 26. — *Nematostigma* DIETR., *Syn.*, I, 150. — *Tekelia* O. K., *Revis.*, 702.

1. Albis v. cærulescentibus, mediocribus.

2. Spec. ad 8. SPRENG., *Syst.*, I, 168. — C. GAY, *Fl. chil.*, VI, 31. — SWEET, *Brit. fl. Gard.*, ed. I, 498. — HOOK. F., *Handb. N. Zeal. Fl.*, 274; *Fl. tasman.*, t. 129. — BENTH., *Fl. austral.*, VI, 412. — KLATT, in *Mart. Fl. bras.*, III, 1, t. 68. — GRAH., in *Edinb. N. Phil. Journ.*, XV, 383. — K., in *Linnaea*, XIX, 382. — PHIL., in *Linnaea*, XXIX, 63. — *Bot. Reg.*, t. 1630. — *Bot. Mag.*, t. 3294, 6263 (omn. sub *Libertia*).

3. In *Fabr. Enum. pl. H. helmst.* (1759). — O. K., *Revis.*, 701. — *Belemcanda* ADANS., *Fam. des pl.*, II, 60. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 113. — B. H., *Gen.*, III, 697, n. 25. — PAX, *Pflanzenfam.*, 150. — *Pardanthus* KER, in *Kæn. et Sims Ann.*, I, 246. — ENDL., *Gen.*, n. 1231.

4. Nigra nitida et in axi diu persistentia, Rubi fructum nonnihil simulantia.

5. Speciosis, punctatis, fugitivis.

6. Spec. 1. *G. chinensis* O. K. — *Belemcanda chinensis* LEMAN, in *Red. Lil.*, t. 121. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 276. — *B. punctata* MOENCH. — *Ixia chinensis* L., *Spec.*, 52. — TREW., *Ehret. Ic.*, t. 52. — CURT., in *Bot. Mag.*, t. 171. — *Pardanthus chinensis* KER. — *Fl. serres*, t. 1632. — *P. nepalensis* SWEET (*Blackberry Lily*).

7. *Gen. Irid.*, 29 (non L.). — BAK., in *Journ.*

liberis æqualibus ovato-oblongis patulis. Stamina libera, imo perianthio affixa; antheris erectis linearibus. Germen obovoideum v. obpyramidatum, ∞ -ovulatum; styli brevis ramis longe linearibus induplicatis, apice integro nunc parum latioribus; marginibus papillois. Fructus exsertus obovoideus v. sphaericus, vertice truncatus, loculicidus; seminibus angulatis ∞ . — Herbæ perennes; rhizomate fibroso; ramis aeriis raro basi in bulbum incrassatis; foliis basilaribus paucis linearibus compressis v. subteretibus; floribus in spicas spurie umbellatas summoque pedunculo communi insertas dispositis; cymis spathiferis, 1-paris; spathis paucifloris⁴; bracteis circa inflorescentiam vacuis involucrantibus ∞ ; folio florali ad inflorescentiæ basin erecto pedunculumque spurie continuante. (*Africa austr.*³)

20. **Diplarrhena** LABILL.³ — Flores (fere *Morææ*) irregulares; perianthii foliolis subliberis, apice patentibus; sepalo medio majore, apice subgaleato v. fornicato; petalis paulo angustioribus. Stamina 3; filamentis brevibus liberis; lateralibus inæqualibus; antheris lineari-oblongis; postico autem sæpius ananthero. Germen ∞ -ovulatum; styli gracilis ramis dissimilibus; lateralibus apice stigmatoso dilatatis membranaceis obovatis v. flagellatis; intermedio autem brevissimo v. 0. Fructus oblongo-3-queter loculicidus; seminibus inæqui-compressis. — Herbæ perennes; rhizomate brevi; ramis aeriis simplicibus v. ramosis; foliis basilaribus angustis equitantibus; spathis in summo pedunculo 1, 2; floribus⁴ in singulis 1-pari-cymosis pedicellatis⁵. (*Australia austr., Tasmania*⁶.)

21. **Sisyrinchium** L.⁷ — Flores (fere *Tekelis*) regulares; perianthii

Linn. Soc., XVI, 114. — KLATT, in *Linnæa*, XXXIV, 554. — B. H., *Gen.*, III, 698, n. 28. — PAX, *Pflanzenfam.*, 150.

1. Pedicello compresso, nunc anguste marginato-alato.

2. Spec. 4, 5. L. F., *Suppl.*, 99. — TRUMB., *Diss. Morææ*, t. 1, fig. 1, 2; 2, fig. 1. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 1900 (*Xyris*). — SPRENG., *Syst.*, I, 166 (*Sisyrinchium*). — PERS., *Syn.*, I, 50 (*Sisyrinchium*). — SALISB., in *Trans. Hort. Soc.*, I, 313. — Bot. Reg., t. 229 (*Marica*).

3. Voy., I, 157, t. 15. — KER, *Irid. Gen.*, 44. — ENDL., *Gen.*, n. 1225. — KLATT, in *Linnæa*, XXXIV, 586. — B. H., *Gen.*, III, 696, n. 53. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 158. — PAX, *Pflanzenfam.*, 149.

4. Sæpius albis, mediocribus.

5. Genus ob flores irregulares *Irideas* cum *Gladioleis* nonnihil connectens.

6. Spec. 2. VAHL, *Enum.*, II, 154 (*Morææ*). — R. BR., *Prodr.*, 304. — HOOK. F., *Fl. tasm.*, II, 34. — BENTH., *Fl. austral.*, VI, 399.

7. *Gen.*, ed. I, n. 689; ed. VI, n. 1017. — J., *Gen.*, 57. — TURP., in *Dict. sc. nat.*, Atl., t. 192. — ENDL., *Gen.*, n. 1220. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 115. — KLATT, in *Linnæa*, XXXI, 63, 371; *Erg. u. Ber.*, 42. — PAX, *Pflanzenfam.*, 150, fig. 95, 103. — *Bermudiana* T., *Inst.*, 387, t. 208. — ADANS., *Fam. des pl.*, II, 60. — *Syrorhynchium* HOFFM., *Nachtr.*, II, 216. — SOUZA VELL., *Fl. sum.*, Atl., VII, t. 1-3. — *Hydastylus* SALISB., in

campanulati v. cupularis foliolis petaloideis, ima basi inter se et cum imo androcæo connatis, tortis v. imbricatis. Stamina 3; filamentis in tubum cylindraceum v. breviter urceolatum connatis, rarissime autem (*Nuno*¹) subliberis; antheris variis erectis ad basin dorsifixis v. versatilibus; loculis extrorsum rimosis. Germen oblongum v. sphæricum; ovulis in angulo interno ∞ , 2- ∞ -seriatis; styli brevis v. elongati ramis induplicatis, intus fissis, apice stigmatoso truncatis v. minute capitatis. Fructus loculicidus, apice sæpius truncatus; seminibus ∞ . — Herbæ perennes, mediocres v. humiles; rhizomate brevi; radicibus nunc carnoso-incrassatis; ramis aeriis nunc basi incrassata bulbosis; foliis ensiformibus v. teretibus basilaribus v. ad imos ramos confertis; floribus² in spatha terminali unica 1-paricymosis, v. cymis pluribus in axi communi spathigeris; pedicellis sæpius longiusculis; fructibus exsertis. (*America trop. et temp.*³)

22. **Tapetia** COMMERS.⁴ — Flores fere *Sisyrinchii*; perianthii infundibularis foliolis ima basi vix connatis, oblongo-lanceolatis; petalis angustioribus. Stamina 3, imo perianthio affixa; filamentis basi 1-adelphis; antheris inter lobos basifixis subsagittatis. Germen 3-loculare; ovulis (ad 10) 2-seriatis, demum adscendentibus; stylo gracili; ramis subsubulatis induplicatis, apice stigmatoso semicapitatis. Fructus loculicidus; valvis obtusis, demum patentissimis; seminibus ellipticis v. obovoideis. — Herba perennis pusilla cæspitosa; ramis crebris radicanibus; foliis distichis equitantibus lineari-confertis acutatis; floribus⁵ solitariis terminalibus; bracteis sub flore dissitis inæqualibus lanceolatis 2. (*Magellania*⁶.)

Trans. Roy. Hort. Soc. lond., I, 310. — *Echthronema* HERB. — *Eriphilema* HERB. — *Glumosisia* HERB., in *Bot. Reg.* (1843), *Misc.*, 85. — *Androsolen* LEMÉ (ex BAK.).

1. BENTH., *Gen.*, III, 699.

2. *Albis*, lutescentibus v. cæruleis, sæpius parvis.

3. Spec. ad 50. CAV., *Diss. Monad.*, t. 190, 192; *l.c.*, t. 104. — W., *H. berol.*, t. 91. — RED., *Lil.*, t. 47, 66, 275. — JACQ., *H. schænbr.*, t. 11 (*Moræa*). — LODD., *Bot. Cab.*, t. 1870. — LINK, KL. et OTT., *l.c. pl. rar.*, t. 10. — HOOK., *l.c.*, t. 218, 219, 513. — SWEET, *Brit. fl. Gard.*, ser. II, t. 388. — COLL., in *Mem. Ac. torin.*, XXXIX, t. 54. — HOOK. F., *Fl. antarct.*, t. 126. — KER, *Irid. Gen.*, 16 (*Marica*, part.). — E. MEY., in *Rel. Hænk.*, I, 118. — H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, I, 323. — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 329. — TH. MOR., in *Bull.*

Torr. Bot. Club, XX, 467. — KLATT, in *Mart. Fl. bras.*, III, I, 534. — *Fl. serres*, t. 146. — HILLEBR., *Fl. haw.*, 436. — *Bot. Reg.*, t. 1067, 1364, 1914. — *Bot. Mag.*, t. 701 (*Marica*), 2116, 2117, 2313, 3509. — WALP., *Ann.*, VI, 46. Species 1, in Hibernia indigena sic dicta, sæpe apud nos culta, inquilina potius videtur (*S. bermudianum* L., *Spec.*, 1353).

4. J., *Gen.*, 59. — ENDL., *Gen.*, n. 1233. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 114. — B. H., *Gen.*, III, 599, n. 30. — PAX, *Pflanzenfam.*, 151.

5. *Albis*, minutis.

6. Spec. 1. *T. pumila*. — *T. magellanica* KER, *Irid. Gen.*, 9. — *Ixia pumila* FORST., in *Comm. gælt.*, IX, 20, t. 8. — *I. magellanica* LAMK., *Ill.*, I, 109, t. 31, 4. — *Wilsenia pumila* Vahl, *Enum.*, II, 48. — *W. magellanica* PERS. — *Echthronema pusillum* HERB. — *Galaxia*

23. **Symphystemon** MIERS¹. — Flores fere *Sisyrinchii*; perianthii longe infundibularis tubo cum limbi lobis subæqualibus acuminatis erecto-patentibus continuo. Stamina fauci affixa, alte 1-adelpha; filamentis apice liberis; antheris elliptico-oblongis versatilibus. Germen apice ∞ -ovulatum; stylo tenui tubo stamineo incluso; ramis clavato-subcapitatis. Fructus subsphæricus loculicidus; seminibus angulatis 8. — Herbæ perennes; rhizomate brevi; radicibus fasciculatis; floribus² in summo scapo nunc brevissimo cymosis; cymis 2-paucifloris; pedicellis gracilibus. (*America austr. andin. et extratrop.*³)

24. **Genosiris** LABILL.⁴ — Flores fere *Sisyrinchii*; perianthii tubo tenui, plus minus, nunc valde elongato. Sepala 3 (petaloidea) lata patentia torta. Petala multo minora, minuta v. 0. Stamina 3, limbi basi affixa; filamentis subliberis v. plus minus alte 1-adelphis; antheris erectis; connectivo lineari v. nunc dilatato. Germen 3-merum; loculis completis v. incompletis. Stylus antheris demum longior, nunc sub ramis articulatus v. constrictus; ramis lineari-oblongis v. obovatis, demum patentibus. Fructus⁵ loculicidus. Semina ∞ , linearia v. angulata. — Herbæ perennes; rhizomate brevi, nunc crasso; foliis basilaribus distichis, nunc rigidis; floribus⁶ in summo scapo 1- ∞ , 1-pari-cymosis; spathis 2, lanceolatis coriaceis rigidis involucran-
tibus; bracteis scariosis v. membranaceis ∞ . (*Australia calid.*⁷)

25. **Solenomelus** MIERS⁸. — Flores fere *Sisyrinchii*; perianthii tubo tenui; fauce ampliata; limbi lobis patentibus subæqualibus. Stamina fauci affixa, 1-adelpha; tubo nunc villosulo; antheris

obscura CAV., *Diss.*, t. 189, fig. 4. — *Sisyrinchium frigidum* PÖRPP. — *S. pumilum* HOOK. F., *Fl. antarctic.*, t. 129. — *Moræa magellanica* W., *Spec.*, I, 241.

1. In *Trans. Linn. Soc.*, XIX, 97. — B. H., *Gen.*, III, 700, n. 32. — PAX, *Pflanzenfam.*, 151. — *Psithyrisma* HERB., in *Bot. Reg.* (1843), *Misc.*, 85. — *Susarium* PHIL., in *Linnaea*, XXVIII, 248 (part.).

2. Albidis, flavis v. purpureo-striatis, medioeribus.

3. *Spec.* 2, 3. THUNB., *Diss. Glad.*, n. 5 (*Gladolus*). — CAV., *Diss.*, VI, t. 191, fig. 3 (*Sisyrinchium*). — W., *Spec.*, III, 583 (*Galaxia*). — *Bot. Reg.*, t. 1283 (*Sisyrinchium*). — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 121, n. 6, 7.

4. *Pl. N.-Holl.*, I, 13, t. 9 (1804). — DESVX., in *Ann. sc. nat.*, sér. I, XIII, 39 (*Xyrideæ*). — *Paterosia* R. BR., *Prodr.*, 303. — ENDL.,

Gen., n. 1234; *Iconogr.*, t. 50. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 150. — KLATT, in *Linnaea*, XXIV, 630. — PAX, *Pflanzenfam.*, 151, fig. 104.

5. Spathis inclusus.

6. Cæruleis, speciosis, fugitivis.

7. *Spec.* ad 15-20. LODD., *Bot. Cab.*, t. 768, 1182. — SWEET, *Fl. austral.*, t. 15, 39. — BENTH., *Fl. austral.*, VI, 400. — F. MUELL., *Fragm. phyt. Austral.*, I, 214; VII, 32. — ENDL., in *Lehm. Pl. Preiss.*, II, 29. — LINDL., *Swan-Riv. App.*, 58. — *Bot. Reg.*, t. 51 (1839), t. 60. — *Bot. Mag.*, t. 1041, 2677 (pleraq. sub *Paterosia*).

8. In *Trans. Linn. Soc.*, XIX, 95, t. 8. — B. H., *Gen.*, III, 700, n. 34. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 120. — PAX, *Pflanzenfam.*, 152. — *Symphystemon* MIERS, *loc. cit.*, 97. — *Crucksanksia* MIERS, *Trav.*, II, 259 (non

oblongo-ellipticis conniventibus. Germen ∞ -ovulatum; stylo tenui, apice exserto parum dilatato denseque papilloso-ciliato. Fructus oblongus loculicidus; seminibus ∞ . — Herbæ perennes; rhizomate brevi; ramis subfasciculatis, nunc basi incrassatis. Folia basilaria, v. minora cauli inserta, linearia, angusta v. ensata; floribus⁴ in spathis paucis v. terminali solitaria pluribus, 1-pari-cymosis. (*Chili*².)

26. *Chamælum* PHIL.³ — Flores fere *Solenomeli*; perianthii tubo infundibulari; lobis subæqualibus erecto-patentibus. Stamina 1-adelpha fauci affixa; antheris filamentis longioribus erectis. Stylus gracilis; ramis brevibus recurvis acutatis, ad apicem stigmatosis. Fructus loculicidus. — Herbæ perennes; rhizomate repente; foliis basilaribus paucis, linearibus v. subteretibus; floribus⁴ in spatha herbacea terminali solitaria v. in pluribus aggregatis cymosis 2-paucis; pedicellis brevissimis; fructibus spatha inclusis. (*Chili*⁵.)

27. *Aristea* SOLAND.⁶ — Flores fere *Sisyrinchii*; receptaculo concavitate germen totum fovente utraque in cupulam producto. Perianthii superi lobi 2-seriati subæquales obtusi, torti v. imbricati, demum rotato-patentes. Stamina imo perianthio affixa; filamentis liberis; antheris erectis oblongis, inter lobos basifixis. Stylus gracilis, nunc elongatus; apice vix v. parum dilatato, 3-dentato v. 3-lobo. Ovula 2, demum subsuperposita; micropyle quoad situm varia; v. 3- ∞ ⁷. Fructus ovoideus v. oblongus, 3-quet, loculicidus; seminibus sæpius compressis. — Herbæ perennes; rhizomate brevi v. cylindræo; axi aërio nunc basi frutescente, simplici v. ramoso; foliis basilaribus v. in axi equitantibus, gramineis v. ensiformibus; floribus⁸ in cymas 1-paras dispositis; cymis in racemum v. capitulum spurium dispositis. (*Africa trop. et austr.*, *Malacassia*⁹.)

HOOK.). — *Lechlera* GRISEB., in *Lechl. exs.*, n. 2966. — ? *Susarium* PHIL., in *Linnaea*, XXXIII, 248 (part.).

1. Flavis, parvis.

2. Spec. ad 2 (*S. chilense* et *Lechleri* BAK.). THUNB., *Diss. Glad.*, n. 5 (*Gladiolus*). — CAV., *Diss.*, VI, t. 191, fig. 3 (*Sisyrinchium*). — W., *Spec.*, III, 583 (*Galaxia*). — KLATT, in *Linnaea*, XXXIV, 736 (*Sisyrinchium*). — LEME, in *Fl. serres*, t. 255 (*Sisyrinchium*). — PHIL., in *Linnaea*, XXIX, 62 (*Sisyrinchium*). — *Bot. Mag.*, t. 2965 (*Sisyrinchium*).

3. In *Linnaea*, XXXIII, 250. — B. H., *Gen.*,

III, 700, n. 32. — PAX, *Pflansenfam.*, 152.

4. Flavis, parvis.

5. Spec. 2. BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 121 (*Solenomelus*).

6. In *Ait. H. kew.*, ed. 1, I, 67. — ENDL., *Gen.*, n. 1232. — KLATT, in *Linnaea*, XXXIV, 548; *Erg. u. Ber.*, 47. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 110. — B. H., *Gen.*, III, 701, n. 36. — PAX, *Pflansenfam.*, 152. — ? *Wredowia* ECKL., *Vers. Pfl. Samml.*, 16.

7. H. BN, in *Bull. Soc. Linn. Par.*, n. 146.

8. Sæpe cærulescentibus, pulchellis.

9. Spec. ad 15. RED., *Lil.*, t. 462. — ANDR.,

28. **Geosiris** H. BN¹. — Flores (fere *Aristeæ*) regulares; perianthii superi tubo breviter lateque infundibulari; lobis calycinis (coloratis) tortis; petalis conformibus, ovato-oblongis demumque longioribus lanceolatis persistentibus. Stamina 3, ad faucem affixa; filamentis liberis subulatis; antheris oblongis inter lobos basifixis; loculis apice liberis basique acuminata longius solutis, extrorsum rimosis. Germen compresso-3-quetrum; loculis 3, ∞ -ovulatis; placentis axilibus 2-lobis. Stylus columnaris sub-3-queter, apice stigmatoso tubuloso breviter obtuseque 3-lobus. Fructus...? — Herba (parasitica v. saphrophyta) haud viridis; ramis aeriis erectis brevibus, simplicibus v. superne parce ramulosis; foliis ad bracteas parvas reductis; floribus² in ramis corymbi spurii alternatim cymosis; cymis brevibus contractis, 1-paris; bracteis anticis posticisque demum late membranaceis imbricatis fusco-lineatis. (*Madagascaria*³.)

29. **Nivenia** VENT.⁴ — Flores fere *Aristeæ*; perianthii hypocraterimorphi tubo cylindraceo; limbo patulo. Stamina fauci affixa; antheris oblongis subbasifixis. Germen apice pulvinato minute 6-lobatum; ovulis adscendentibus, 2-seriatis; stylo tenui, apice anguste capitellato in dentes acutos 3 soluto. Fructus subturbinatus, ab apice loculicidus; seminibus paucis oblongis turgidis. — Herbæ perennes, basi frutescentes; foliis confertis distichis equitantibus amplexicaulibus lineari-acutatis; floribus⁵ cymosis spurie corymbosis; ramulis inflorescentiæ cymigeris; bracteis exterioribus crassioribus (fuscatis); interioribus membranaceis. (*Africa austr.*⁶)

30. **Witsenia** THUNB.⁷ — Flores (*Niveniæ*) regulares; tubo longe obconico-cylindraceo; lobis brevibus conniventibus. Sepala crassiuscula concava, extus tomentella. Petala paulo breviora subscariosa,

Bot. Rep., t. 10, 160. — L., *Spec.*, 51 (*Ixia*), 53 (*Gladiolus*). — THUNB., *Fl. cap.*, 1, 266 (*Moræa*). — LAMK., *Ill.*, t. 114 (*Moræa*). — KER, in *Kœn. et Sims Ann.*, 1, 236; *Irid. Gen.*, 13. — BAK., in *Trim. Journ.* (1876), 267; in *Journ. Linn. Soc.*, XX, 268. — *Bot. Mag.*, t. 458, 520, 605, 1231.

1. In *Bull. Soc. Linn. Par.*, 1149.

2. Cæruleis, parvis.

3. *Spec.* 1. *G. aphylla* H. BN.

4. *Dec.*, n. 1 (1808). — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 109. — PAX, *Pflanzenfam.*, 153. — *Genlisea* REICHB., *Consp.*, 60 (non A. S.-H.).

5. Cæruleis, parvis, fugitivis.

6. *Spec.* 2. SM., *Exot. Bot.*, t. 18. — RED., *Lil.*, t. 453. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 254. — REICHB., *Jc. exot.*, t. 24. — PAXT., *Mag.*, III, 269. — SALISB., in *Trans. Hort. Soc. lond.*, I, 311 (omn. sub *Witsenia*). — THUNB., *Diss. Ixia*, 1, t. 1, fig. 3 (*Ixia*). — LAMK., *Ill.*, t. 31, fig. 4 (*Ixia*). — KLATT, in *Linnæa*, XXXIV, 546 (*Witsenia*). — PERS., *Syn.*, I, 41 (*Aristea*).

7. *Gen. nov.*, 34, t. 17. — LAMK., *Ill.*, t. 30. — J., *Gen.*, 59. — RÖHM. et SCH. F., *Syst.*, I, 341. — ENDL., *Gen.*, n. 1233. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 108. — B. H., *Gen.*, III, 701, n. 37. — PAX, *Pflanzenfam.*, 153. — H. BN, in *Bull. Soc. Linn. Par.*, n. 146.

nisi apice glabra. Stamina fauci affixa; filamentis dilatatis; antheris basifixis sagittatis; foveola basilari intrusa. Germen cum disco epigyno crasse 3-lobo connatum; stylo gracili, apice tubuloso, 3-dentato. Ovula in loculis 2, adscendentia; collateraliter ad medium angulum internum affixa; micropyle infera. Fructus coriaceus nitidulus loculicidus. Semina angulata pauca. — Frutex elatus ramosus; caule compresso acutangulo; foliis equitantibus ensiformibus; bracteis ad axillam foliorum supremorum ∞ , complicatis, distiche imbricatis; superioribus gradatim majoribus. Flores¹ intra spatham sæpius solitarii; bracteola postica 2-plici. (*Africa austr.*²)

31. **Klattia** BAK.³ — Flores fere *Niveniæ*; perianthii tubo breviter cylindraceo et ad os constricto; loborum æqualium unguibus lineari-subulatis, apice in ligulam erectam dilatatis. Stamina 3, cum lobis similibus inserta; antheris erectis longe lineari-sagittatis. Germen obovoideum, apice incrassato solidum; loculis inferioribus 3; stylo gracili, apice stigmatoso minute 3-dentato. Ovula in loculo quoque pauca v. 1. Fructus brevis, apice induratus, loculicidus; semine in loculo 1, oblongo, compresso v. angulato. — Frutex ramosus⁴; ramis lignosis acute ancipitibus; foliis distichis equitantibus confertis linearibus rigidis, in bracteas 2-fariam imbricatas abeuntibus. Flores intra bracteas summas 2-4, singuli spatha occulti bracteolaque stipati. (*Africa austr.*⁵)

32. **Cleanthe** SALISB.⁶ — Flores fere *Aristeæ*; perianthii tubo recto brevi; limbi lobis ovato- v. obovato-oblongis; petalis majoribus. Stamina libera, fauci affixa; antherarum oblongo-linearium basifixarum loculis basi liberis. Germen lineare; stylo elongato, apice infundibulari; lobis brevibus. Ovula ∞ . Fructus linearis. — Herba perennis; rhizomate brevi; ramis aeriis solitariis v. pluribus erectis; foliis basilaribus distichis ensiformibus; floribus in summo ramo umbelliformi-cymosis paucis; spatha rigida lanceolato-acuminata;

1. Majusculi longi, erecti, apice flavi, basi autem cæruleo-nigrescentes.

2. Spec. 1. *W. maura* THUNB. — RED., *Lil.*, t. 245, 463. — REICHB., *lc. exot.*, t. 23. — MAUND, *Bot.*, t. 125. — PAXT., *Mag.*, VIII, 221, c. ic. — *Fl. serres*, t. 72. — *Bot. Reg.*, t. 5. — *W. tomentosa* SALISB. — *Antholyza maura* L., *Montiss.*, 175. — *Ixia disticha* LAMK, *Dict.*, III, 333, n. 2.

3. In *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 109. — KLATT, in *Linnæa*, XXXIV, 546. — B. H., *Gen.*, III, 702, n. 38. — PAX, *Pflanzenfam.*, 153.

4. *Wilseniæ* habitu.

5. Spec. 1. *K. partita* BAK. — *Wilsenia partita* KER, in *Kæn. et Sims Ann.*, I, 237.

6. In *Trans. Roy. Hort. Soc. Lond.*, I, 312. — B. H., *Gen.*, III, 701, n. 35. — PAX, *Pflanzenfam.*, 152.

bractea opposita subsimili; bracteolis interioribus tenuioribus. (*Africa austr.*¹)

33. **Eleutherine** HERB.²— Flores fere *Cipura*; staminibus liberis. Germen ∞ -ovulatum; styli ramis elongatis subulatis integris complicatis, superne intus ad margines stigmatosis. Fructus subinclusus truncatus. — Herbæ perennes; bulbo tunicato; foliis elongatis acuminatis plicato-venosis; inflorescentia terminali in axilla folii floralis laxa flexuosa; pedicellis paucis; spathis ad pedicellos terminalibus; floribus 1-pari-cymosis. (*America centr. et trop. austr.*³)

34. **Orthrosanthus** SWEET⁴. — Flores fere *Cipura*; perianthii tubo brevi; limbi lobis ovato-oblongis patentibus. Stamina imo perianthio affixa; filamentis liberis v. brevissime 1-adelphis; antheris oblongis erectis. Germen ∞ -ovulatum; styli brevis ramis filiformibus induplicatis, apice truncatis v. vix dilatatis. Fructus oblongus v. clavatus, apice truncatus, loculicidus; seminibus subsphæricis, ovoideis v. angulatis. — Herbæ perennes; rhizomate brevi duro; foliis elongatis v. gramineis, lineari-ensiformibus v. tenuissimis, basi equitantibus; floribus⁵ in summo pedunculo simplici v. ramoso in spathis dissitis sessilibus v. stipitatis 2- ∞ ; bracteola parinervi membranacea v. scariosa. (*Australia occid., America andin. et extratrop.*⁶)

II. CROCEÆ.

35. **Crocus** T.— Flores regulares; receptaculo germen concavitate totum fovente. Perianthii superi longe infundibularis tubus longus

1. Spec. 1. *C. melaleuca* SALISB. — *Aristea melaleuca* KER, in *Kæn. et Sims Ann.*, 1, 236; in *Bot. Mag.*, t. 1277. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 112. — *Moræa melaleuca* THUNB., *Diss. Moræa*, I, t. 1, fig. 3. — *M. lugens* L. f. — *Sisyrinchium melaleucum* ECKL., *Verz.*, 16. — *S. inundatum* ECKL.

2. In *Bot. Reg.* (1843), sub t. 57. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 100. — B. H., *Gen.*, III, 695, n. 19. — PAX, *Pflanzenfam.*, 152. — *Galatea* SALISB., in *Trans. Hort. Soc.*, 1, 310.

3. Spec. 2. CAV., *Diss. Monad.*, t. 19, fig. 1

(*Sisyrinchium*). — JACQ., *Ic. rar.*, t. 227 (*Moræa*). — RED., *Lil.*, t. 352 (*Sisyrinchium*). — Sw., *Prodr.*, 17 (*Sisyrinchium*); *Fl. ind. occ.*, 82 (*Moræa*). — AUBL., *Guan.*, I, 33 (*Ixia*). — GRISEB., *Fl. brit. W.-Ind.*, 589 (*Cipura*). — *Bot. Mag.*, t. 655 (*Marica*).

4. *Fl. austral.*, t. 11. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 112. — B. H., *Gen.*, III, 697, n. 26. — PAX, *Pflanzenfam.*, 152.

5. *Parvis*.

6. Spec. ad 7. H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, I, 322 (*Moræa*). — LODD., *Bot. Cab.*, t. 1474.

tenuisque, sensim in faucem ampliatus; limbi lobis petaloideis sub-æqualibus, v. petalis minoribus; præfloratione imbricata v. torta. Stamina 3, fauci affixa, limbo breviora; filamentis subulatis liberis; antheris basifixis erectis linearibus filamento brevioribus; connectivo nunc canaliculato; loculis marginalibus, basi sæpe liberis, extrorsum rimosis. Germen inferum; loculis 3, nunc incompletis, ∞ -ovulatis; styli gracilis ramis 3, lineari-cuneatis plicatis, lobatis, multifidis v. dentatis, margine superiore stigmatosis. Fructus membranaceus loculicidus. Semina ∞ , sæpe sphærica; integumento nunc carnosulo; albumine carnosulo v. duro. — Herbæ perennes parvæ; bulbo solido paucitunicato; tunicis fibrosis v. reticulatis. Folia basilaria alterna linearia, dorso incrassato sub-4-gona, intus concava; inferioribus ad vaginas reductis. Flores basilares solitarii v. in cymas 1-paras congesti stipitati, bracteis sæpe cincti; bracteola nunc postica parinervi. (*Europa et Asia centr., Reg. Medit. et caspica.*) — *Vid. p. 127.*

36. **Syringodea** HOOK. F.¹ — Flores fere *Croci*; perianthii longe infundibularis v. hypocraterimorphi tubo gracillimo longo; limbi lobis patentibus v. conniventibus. Antheræ lineari-sagittatæ. Germen ∞ -ovulatum; styli gracillimi ramis tenuibus cuneato-subulatis integris, apice intus stigmatosis. Fructus...? — Herbæ pusillæ; bulbi solidi tunicis lævibus; foliis basilaribus filiformibus; exterioribus ad vaginas squamiformes hyalinas reductis; floribus² in spatha intrafoliari angusta hyalina solitariis; bracteola parinervi angusta hyalina summo pedicello sub germine inserta. (*Africa austr.*)³

37. **Galaxia** THUNB.⁴ — Flores fere *Croci*; perianthii infundibularis tubo tenui, superne ampliato; lobis ovato-oblongis erecto-patentibus. Stamina fauci affixa, 1-adelpha. Germen ∞ -ovulatum; stylo gracili ultra androcæum campanulato-petaloideo-dilatato; lobis cuneatis fimbriatis v. margine papillosis. Fructus oblongus v. subfusiformis loculicidus, ∞ -spermus. — Herbæ perennes nanæ; bulbo solido, v.

— HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 329. — C. GAY, *Fl. chil.*, VI, 22 (*Sisyrinchium*). — KLATT, in *Linnaea*, XXXVI, 377 (*Sisyrinchium*). — BENTH., *Fl. austral.*, VI, 410. — *Bot. Reg.*, t. 1090 (*Sisyrinchium*).

1. In *Bot. Mag.*, t. 6072. — BAK., in *Trim. Journ.* (1876), 66; in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 85. — B. H., *Gen.*, III, 693, n. 14. — PAX, *Pflanzenfam.*, 143.

2. Lilacinis, pulchellis.

3. Spec. 3. KLATT, in *Linnaea*, XXXIV, 665 (*Trichonema*). — *Fl. serres*, t. 965.

4. *Nov. gen.*, II, 50, c. ic. — ENDL., *Gen.*, n. 1235. — KER, *Irid. Gen.*, 72. — KLATT, in *Linnaea*, XXXII, 782; *Erg. u. Ber.*, 51. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 102. — B. H., *Gen.*, III, 693, n. 15. — PAX, *Pflanzenfam.*, 143.

subsuperpositis 2, parce tunicatis; foliis in summo caule erecto angustis, basi vaginantibus; extimis ad vaginam reductis; spathis inter folia sessilibus, 1-floris; cæteris *Croci*. (*Africa austr.*¹)

38. **Romulea** MARATT.² — Flores fere *Croci*; perianthii infundibularis tubo vario, nunc brevissimo; limbi lobis subæqualibus erecto-patentibus. Stamina fauci affixa sublibera conniventia; antheris lineari-sagittatis inter lobos basifixis. Germen ∞ -ovulatum; styli gracilis ramis plus minus elongatis, 2-fidis v. 2-partitis, margine complicato papillois. Fructus sphæricus v. ovoideo-oblongus loculicidus; seminibus sphæricis v. angulatis ∞ . — Herbæ perennes, sæpius parvæ; bulbo lævi tunicato; foliis basilaribus, linearibus v. subulatis, nunc basi vaginantibus; caulinis minoribus; floribus³ in spathis solitariis; pedicello brevi v. 0; bracteola sub flore postica parinervi. (*Europa occid.*, *Reg. Medit.*, *Africa occid. et austr.*⁴)

III. GLADIOLEÆ.

39. **Gladiolus** T. — Flores irregulares; receptaculo sacciformi germen cavitate fovente. Perianthium plus minus incurvum; tubo brevi longove, ad faucem ampliato infundibulari; limbi 2-labiati lobis imbricatis v. tortis, basi angustatis v. unguiculatis. Sepalum anticum cum petalis minoribus 2 antice patens, sæpe maculatum. Posticum majus erectum convexum v. subforficatum. Stamina 3.

1. Spec. 2. L. F., *Suppl.*, 93 (*Ixia*). — RED., *Lil.*, t. 246. — JACQ., *Ic. rar.*, t. 291; *Coll.*, II, t. 18. — CAV., *Diss. Monad.*, t. 189. — ANDR., *Bot. Rep.*, t. 94, 164. — SALISB., in *Trans. Hort. Soc.*, I, 315. — ECKL., *Top. Verz.*, 17. — *Bot. Mag.*, t. 1208, 1292.

2. *Diss. Romul. et Sat.* (1772), 13, t. 1. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 86. — B. H., *Gen.*, III, 694, n. 16. — PAX, *Pflanzenfam.*, 143. — *Trichonema* KER, in *Bot. Mag.*, sub t. 575; *Irid. Gen.*, 79. — ENDL., *Gen.*, n. 1247. — KLATT, in *Linnaea*, XXXIV, 659; *Erg. u. Ber.*, 64. — *Bulbocodium* T., *Inst.*, *Coroll.*, 50 (non L.). — LUDW., *Def.*, 12. — O. K., *Revis.*, 700. — ? *Spaltanthus* SWEET, *Brit. fl. Gard.*, t. 300 (ex B. H.).

3. Parvis, albidis, luteis, lilacinis v. violaceis. nunc purpureo-striatis.

4. Spec. ad 15. JACQ., *Ic. rar.*, t. 271, 272. — RED., *Lil.*, t. 88, 251. — TEN., in *Atl. Ac. Nap.*, III, t. 7; *Fl. nap.*, t. 3, 203. — SIBTH., *Fl. græc.*, t. 36. — WEBB, *Phyt. canar.*, t. 222. — ANDR., *Bot. Rep.*, t. 170. — VIS., *Fl. dalm.*, *Suppl.*, t. 2. — LGE, *Pl. nov. hisp.*, t. 34. — WILLK. et LGE, *Prodr. Fl. hisp.*, I, 144. — MOGGR., *Fl. Ment.*, t. 91-93. — REICH., *Ic. Fl. germ.*, t. 356. — GREN. et GODR., *Fl. de Fr.*, III, 238. — JORD. et FOUR., *Ic. plant. eur.*, t. 106-110. — BOISS., *Fl. or.*, V, 115. — PAX, in *Engl. Jahrb.* (1892), 150. — *Bot. Reg.* (1847), t. 40. — *Bot. Mag.*, t. 265, 575, 1225, 1244, 1392, 1476 (plur. sub *Trichonema*).

fauci affixa libera; filamentis arcuatis; antheris linearibus sub petalo postico incurvis; connectivo canaliculato; loculis extrorsum rimosis. Germen 3-loculare; loculis ∞ -ovulatis; ovulis 2-seriatim horizontalibus v. obliquis; stylo arcuato cavo; ramis obovatis subpetaloideis complicatis, ad margines papilliferis. Fructus membranaceus obtusus, integer v. sub-3-dymus loculicidus. Semina sphærica v. angulata, nunc alata, extus sæpe spongiosa; albumine duro; embryone intrario parvo. — Herbæ perennes; bulbi solidi tunicis paucis membranaceis v. fibrosis; foliis alternis linearibus v. ensiformibus, basi complicatis; floribus in spicam terminalem dispositis, distichis demumque 1-lateraliter inclinatis omnibus; bracteis herbaceis, 1-floris; bracteola postica parinervi. (*Europa med., Reg. Medit., Africa trop., austr. et insul. trop.-or.*) — *Vid. p. 131.*

40. *Antholyza* L.¹ — Flores² *Gladioli*; perianthii tubo elongato tenui inque faucem incurvam longe tubulosam ampliato; limbi oblique 2-labii imbricati lobis plus minus inæqualibus; petalo summo sæpius longiore. Stamina exserta; antherarum loculis inferne liberis; filamento subulato inter lobos affixo. Germen ∞ -ovulatum; styli ramis tenuibus, apice obtusis v. leviter incrassatis. Fructus membranaceus loculicidus cæteraque *Gladioli*. — Herbæ perennes; bulbi solidi tunicis fibrosis; foliis ensiformibus; spica laxa densave, 1, 2-sticha; bracteola postica 2-plici. (*Africa trop. et austr.*³)

41. *Babiana* KER⁴. — Flores fere *Gladioli*; perianthii tubo recto longo v. brevi; fauce infundibulari; limbi lobis æqualibus v. nunc inæqualibus; postico nunc longiore suberecto; præfloratione imbricata v. torta. Stamina 3, libera, fauci inserta; antheris lineari-sagittatis. Germen ovoideum; stylo gracili longo; ramis stigmatosis

1. *Gen.*, ed. I, n. 28; ed. VI, n. 58. — J., *Gen.*, 58. — ENDL., *Gen.*, 168. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 178; in *Trans. Linn. Soc., Bot.*, I, 270. — KLATT, in *Linnæa*, XXXII, 729; XXXII, 726; XXXIV, 544; *Erg. u. Ber.*, 10. — B. H., *Gen.*, III, 710, n. 57. — PAX, *Pflanzenfam.*, 156. — *Cunonia* MILL., *Dict.*, ed. VI. — *Petamenes* SALISB., in *Trans. Hort. Soc. lond.*, I, 324. — *Anisanthus* SWEET, *Brit. fl. Gard.*, ser. II, t. 84. — KLATT, *loc. cit.*, 726. — *Homoglossum* SALISB., *loc. cit.*, 325. — BAK., *loc. cit.*, 161.

2. Sæpe speciosi majusculi.

3. *Spec.* 12, 13. L., *Spec.*, 54. — THUNB.,

Diss., n. 3. — RED., *Lil.*, t. 12, 110; 369 (*Gladiolus*), 387. — JACQ., *lc. rar.*, t. 233 (*Gladiolus*). — ANDR., *Bot. Rep.*, t. 32, 38, 116 (*Gladiolus*), 210. — SPRENG., *N. Entd.*, I, 253. — *Bot. Reg.*, t. 1159; (1838), t. 35 (*Tritonia*). — *Bot. Mag.*, t. 450, 561, 567, 569, 1172 (*Gladiolus*). — WALP., *Ann.*, VI, 44.

4. In *Kæn. et Sims Ann.*, I, 233. — SPRENG., *Ant.*, II, I, 260. — SPACH, *Suit. à Buff.*, XXI, 94. — ENDL., *Gen.*, n. 1238. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 164. — KLATT, in *Linnæa*, XXXII, 765; *Erg. u. Ber.*, 13. — PAX, *Pflanzenfam.*, 155. — *Acaste* SALISB., in *Trans. Roy. Hort. Soc. lond.*, I, 322.

simplicibus induplicatis, apice subulatis, cuneatis, truncatis v. membranaceo-dilatatis. Fructus ovoideus, nunc subinflatus, loculicidus; seminibus sphaericis v. angulatis; integumento nunc carnosulo. — Herbæ perennes, varie bulbosæ; tunicis paucis fibrosis; ramis aeriis erectis plerumque brevibus, sæpius varie pilosis. Folia latiuscula v. angusta, plicato-venosa, raro lævia; floribus dense spicatis; spica subsessili v. rarius longiore ramosa, sæpius pilosa; spathis angustis rigidis, striatis v. membranaceis; flore axillari sessili 1; bracteola postica membranacea, 2-fida v. 2-carinata. (*Africa austr.*, *Socotora*¹.)

42. **Sparaxis** KER². — Flores fere *Babianæ*; perianthii tubo brevi; fauce campanulata; limbi lobis 6, æqualibus v. inæqualibus; postico paulo v. multo (*Synnotia*³) majore; omnibus demum erecto-patentibus. Stamina ad faucem affixa; filamentis 1-lateralibus; antheris rectis v. arcuatis. Stylus gracilis, 1-lateralis; ramis induplicatis, margine introrsum papillosis. Fructus membranaceus loculicidus; seminibus sphaericis v. angulatis. — Herbæ perennes; bulbi solidi tunicis fibrosis; foliis linearibus v. ensiformibus; floribus⁴ in axi simplici v. parce ramoso spiciformi dissitis; bracteis scariosis, striatis v. fusco-striatis, margine fimbriato-dentatis⁵. (*Africa austr.*⁶)

43. **Acidanthera** HÖCHST.⁷ — Flores fere *Sparaxeos*; perianthii tubo tenui elongato, recto v. arcuato; fauce leviter ampliata; limbi lobis oblongis v. sublinearibus acutis erecto-patentibus. Stamina ad

1. Spec. ad 30. JACQ., *H. schænbr.*, t. 14, 15 (*Gladiolus*); *lc. rar.*, t. 237-239 (*Gladiolus*), 253, 264, 266; 284-287 (*Ixia*). — RED., *Lil.*, t. 44; 142 (*Gladiolus*), 364. — ANDR., *Bot. Rep.*, t. 5, 137. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 1006. — BAK., in *Trim. Journ.* (1876), 335. — *Bot. Mag.*, t. 410, 576, 583, 621, 626, 637, 638, 680, 847, 1019, 1053, 6585.

2. In *Kæn. et Sims Ann.*, I, 225. — ENDL., *Gen.*, n. 1241. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 98. — KLATT, in *Linnæa*, XXXII, 747; *Erg. u. Ber.*, 55. — B. H., *Gen.*, III, 708, n. 51. — PAX, *Pflanzenfam.*, 155.

3. SWEET, *Brit. fl. Gard.*, t. 150 (*Synnotia*). — BAK., *loc. cit.*, 169. — KLATT, in *Linnæa*, XXXII, 749. — B. H., *Gen.*, III, 709, n. 55.

4. Sæpe speciosis, flavis v. rubris.

5. *Dierama* K. KOCH, in *Walp. Ann.*, VI, 42. — BAK., *loc. cit.*, 99. — KLATT, in *Linnæa*, XXXII, 751 (*Dierama*); *Erg. u. Ber.*, 54. — B. H., *Gen.*, III, 703, n. 42. — PAX, *Pflanzenfam.*, 154, est, sensu nostro, *Sparaxeos* sect.,

styli ramis apice truncato cuneato-dilatatis; perianthio subregulari; spatharum scariosarum striatarum lineis brunneis tenuibus crebris interruptis. Rhizoma dicitur breve horizontale bulbigum radiculisque longis carnosius instructum.

6. Spec. 10-12. THUNB., *Diss. Glad.*, n. 16, t. 2, fig. 1 (*Gladiolus*). — JACQ., *H. schænbr.*, t. 17; *lc. rar.*, t. 240, 258, 273, 274, 283. — RED., *Lil.*, t. 85, 109, 128, 129, 132, 362. — SWEET, *Brit. fl. Gard.*, t. 160 (*Synnotia*); ser. II, t. 131, 383. — ANDR., *Bot. Rep.*, t. 48, 87. — KLATT, in *Dreck. Reis. Bot.*, 73, t. 3 (*Dierama*). — ECKL., *Verz. top.*, 27. — *Bot. Reg.*, t. 1360. — *Bot. Mag.*, t. 381, 541, 545; 548 (*Ixia*), 779, 1482, 5555. — WALP., *Ann.*, VI, 43 (*Dierama*), 49.

7. In *Flora* (1844), 25. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 159. — B. H., *Gen.*, III, 706, n. 49. — PAX, *Pflanzenfam.*, 155. — *Houttuynia* HOUTT., *Syst.*, XII, t. 85, fig. 3 (non THUNB.). — *Sphaerospora* KLATT, in *Linnæa*, XXXII, 275 (non SWEET).

faucem affixa, basi nunc dilatata cohærentibus; antheris erectis v. versatilibus linearibus, nunc acuminatis. Germen ∞ -ovulatum; stylo tenui, apice laterali; ramis subulatis v. compressis, integris recurvis, apice introrsum stigmatosis. Fructus oblongus loculicidus. Semina varia. — Herbæ perennes; bulbi tunicis fibrosis; caule simplici v. parce ramoso; foliis linearibus planis paucis; floribus ad spatham axillaribus; bracteola postica sæpe 2-fida. (*Africa austr. et trop.*¹)

44. Tritonia KER³. — Flores fere *Sparaxeos*; perianthii tubo cylindraceo, recto v. arcuato, brevi v. longo, apice haud v. parce ampliato, nunc infundibulari. Limbus subregularis v. obliquus, nunc magis irregularis; lobis aut omnibus similibus, aut inferioribus 3 basi callosis v. maculatis. Stamina 3; filamentis liberis, sæpius brevibus; antheris linearibus sæpe versatilibus; loculis basi sagittata liberis, extrorsum rimosis. Germen ∞ -ovulatum; stylo tenui, superne laterali; ramis nunc involutis, apice retuso v. clavato subintegris. Fructus membranaceus oblongus v. obovoideus loculicidus, apice obtusus v. sub-3-dymus; seminibus sphæricis, angulatis v. subulatis; cæteris *Sparaxeos*. — Herbæ perennes; bulbi solidi tunicis paucis varie fibrosis; foliis linearibus v. ensiformibus, nunc falcatis; ramis aeriis simplicibus v. parce ramosis; floribus³ in axilla bractearum solitariis racemiformi-cymosis⁴. (*Africa austr.*⁵)

45. Melasphærule KER⁶. — Flores fere *Tritoniæ*; receptaculo

1. Spec. ad 15. THUNB., *Diss. Glad.*, n. 8, t. 1, fig. 1 (*Gladiolus*). — HOUTT., *loc. cit.*, t. 78, fig. 2 (*Ixia*). — A. RICH., *Fl. abyss.*, II, 310 (*Ixia*). — BAK., in *Trim. Journ.* (1876), 338; in *Bert. Monatsb.*, XIX, 15. — ASCHERS. et KLATT, in *Linnaea*, XXXIV, 697 (*Tritonia*). — SCHINZ, in *Bull. herb. Boiss.*, II, 222. — *Gardn. Chron.* (1893), XIV, 682.

2. In *Kæn. et Sims Ann.*, I, 227. — ENDL., *Gen.*, n. 1242. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 161. — KLATT, in *Linnaea*, XXXII, 755. — PAX, *Pflanzenfam.*, 155. — *Waitisia REICH.*, *Consp.*, 63. — *Tritonisia KLATT, Erg. u. Ber.*, 21. — *Agretta ECKL.*, *Verz.*, 23 (part.). — ? *Dichone LAWS.*, ex SALISB., in *Trans. Hort. Soc. lond.*, I, 320.

3. Sæpe aurantiacis, speciosis.

4. Sectiones in genere sunt:

Montbretia DC., in *Bull. Soc. phil.*, III (1803), 251; in *Red. Lil.*, t. 53. — KLATT, in *Linnaea*, XXXII, 752. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 167; perianthii tubo producto adque apicem in-

fundibulari; spatharum valvis sæpius brevibus apiceque plus minus sphacelatis; foliis planis glabris.

Crococoma PL., in *Fl. serres*, t. 702. — B. H., *Gen.*, III, 707, n. 51. — *Crocanthus* KL., in *Pet. Reis. Moss. Bot.*, t. 57; floribus majusculis; tubo perianthii ad faucem subcylindrico; staminibus styloque longe exsertis; styli ramis apice leviter dilatato denticulatis; fructu sub-3-lobo.

5. Spec. 22, 23. JACQ., *H. schænbr.*, t. 24; *Fragm.*, t. 32, fig. 2; *lc. rar.*, t. 262, 267 (*Gladiolus*), 275. — RED., *Lil.*, t. 87, 89, 127, 335, 433 (*Ixia*). — ANDR., *Bot. Rep.*, t. 14, 128, 134 (*Ixia*), 142 (*Gladiolus*). — BAK., in *Trans. Linn. Soc.*, XXIV, t. 101. — PAX, in *Engl. Jahrb.* (1892), 152. — *Bot. Reg.*, t. 747; (1847), t. 61. — *Bot. Mag.*, t. 184, 487, 581, 599, 609, 622, 629, 678, 1275; 4335 (*Crococoma*). — WALP., *Ann.*, VI, 45.

6. In *Bot. Mag.*, t. 615. — ENDL., *Gen.*, n. 1244. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 167. — B. H.,

sphærico-3-lobo, germen intus adnatum fovente; perianthii superi tubo brevissimo; limbi lobis lanceolatis acuminatis tenuiter membranaceis. Stamina imo perianthio affixa; filamentis brevibus gracilimimis; antheris ovatis imo connectivo membranaceo latiusculo inter lobos basifixis. Germen breve; styli gracilis erecti ramis tenuibus divergentibus induplicatis, ad apicem obtusum anguste longèque dilatatis. Ovula in loculis adscendentia v. erecta 2-4; micropyle extrorsum infera. Fructus membranaceus, 3-lobus, loculicide 3-valvis. Semina pauca adscendentia oblongo-obovoidea, ad chalazam carnosula. — Herba perennis; bulbi parvi tunicis lævibus; foliis in caule gramineis; floribus¹ in racemum amplum laxè compositum dispositis et in ramis gracilibus inflorescentiæ spicatis, in axilla spatharum cum sepalis conformium solitariis sessilibus; bracteola postica 2-nervi hyalina. (*Africa austr.*²)

46. *Watsonia* MILL.³ — Flores fere *Gladioli*; perianthio gamophyllo tubuloso; tubo ad basin tenuem v. latiusculam subinflato-dilatato, plus minus arcuato, superne plerumque ampliato; limbi lobis 6, subæqualibus, tortis, tubo brevioribus v. subæqualibus, ovatis v. oblongo-lanceolatis, demum subæqui-patentibus. Stamina tubo affixa; filamentis longe subulatis, basi compressa dilatatis ibique tubo adnatis; antherarum perianthio breviorum et ad basin affixarum versatiliū loculis linearibus distinctis. Glandulæ cum staminibus alternantes 3, compressæ tubo adnatæ. Germen 3-loculare; ovulis ∞; stylo gracili, ad apicem laterali; ramis brevibus sæpe inæqualibus, 2-fidis; lobis gracilibus subulatis, nunc brevissimis, superne intus stigmatosis. Fructus ovoideus v. oblongus loculicidus. Semina ∞, sphærica v. angulata. — Herbæ perennes; bulbi tunicis fibrosis rigidis; caule sæpius elato; foliis ensiformibus rigidis, nunc costatis; floribus⁴ in spicas simplices v. ramosas dispositis; bracteis floralibus

Gen., III, 707, n. 52. — PAX, *Pflanzensam.*, 155. — *Aglæa* PERS., *Enchir.*, I, 46. — ECKL., *Vers. top.*, 44. — *Diasia* DC., in *Bull. Soc. philom.*, III, 151 bis.

1. Luteo-viridibus purpureo-striatis, parvis.

2. Spec. 1. *M. graminea* KER. — *M. parviflora* LODD., *Bot. Cab.*, t. 1444. — *Gladiolus gramineus* L. — JACQ., *lc. rar.*, t. 236. — ANDR., *Bot. Rep.*, t. 62. — *G. plicatus* L. — *Phalangium ramosum* BURM., *Prodr. Fl. cap.*, 3. — O. K., *Revis.*, 702. — *Diasia iridifolia* DC. — *Aglæa graminea* ECKL.

3. *Dict.*, ed. VI (1752); *lc.*, 276, t. 294. — ENDL., *Gen.*, n. 1240. — B. H., *Gen.*, III, 705, n. 47. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 157. — KLATT, in *Linnæa*, XXXII, 735; *Erg. u. Ber.*, 17. — PAX, *Pflanzensam.*, 157. — *Lomenia* POURR., in *Mém. Ac. sc. Toul.* (1786); in *Journ. phys.*, XXXV, 425 (*Lemonia*). (Specimen typ. certe ad *Watsoniam* pertinet). — *Meriana* TREW, *Pl. Erhet. sel.*, II, t. 40. — *Neuberia* ECKL., *Vers. Pfl. Samml.*, 37. — *Beilia* ECKL., *loc. cit.*, 43.

4. Parvis v. sæpe majusculis speciosis, albis, cærulescentibus v. roseis.

distichis v. quaquaversis; bracteola postica oblonga, 2-plici, apice nunc 2-dentata¹. (*Africa austr.*, *Madagascar*².)

47. **Lapeyrousia** POURR.³ — Flores plus minus irregulares; perianthii infundibularis v. subhypocraterimorphi tubo tenui, nunc valde elongato; limbi obliqui foliolis leviter inæqualibus; posticis 3 (petalo 1 cum sepalis 2) cum anticis haud concoloribus, imbricatis, v. sepalis subvalvatis. Stamina ad faucem affixa; filamentis in tubum plus minus conspicue decurrentibus, superne liberis subulatis; antheris⁴ oblongo-linearibus ad basin dorsifixis, extrorsum rimosis. Germen 3-loculare; stylo gracili, nunc demum elongato; ramis gracilibus, apice 2-fidis, introrsum ad margines induplicatos stigmatosis. Ovula in loculo quoque pauca v. ∞ , 2-seriata; raphe nunc prominula. Fructus ovoideus v. sphæricus loculicidus; seminibus ∞ , subsphæricis v. angulatis. — Herbæ perennes bulbosæ; habitu vario; bulbi solidi tunicis sæpius paucis, fibrosis v. rigide striatis reticulatisve, basi demum circumcissis. Folia sæpe pauca omnia basilaria ensata v. linearia; floribus⁵ inter folia subsessilibus v. ad summum pedunculum in ramis pluribus dissitis v. approximatis; spathis 1-floris; bracteola postica 2-nervi, nunc 2-carinata, apice subintegra, 2-dentata v. 2-fida. (*Africa trop. et austr.*⁶)

48. **Freesia** KLATT.⁷ — Flores⁸ fere *Gladioli*; perianthii tubo

1. Sectio generis est (BAK.) certe *Micranthus* PERS., *Syn.*, I, 46. — KLATT, in *Linnaea*, XXXII, 744. — PAX, *Pflanzenfam.*, 157, n. 154; tubo ob brevitudinem minus arcuato; filamentis breviusculis; floribus evidentius at ut in toto genere distichis.

2. Spec. ad 15. JACQ., *H. schænbr.*, t. 6, 13; 16 (*Gladiolus*); *Id. rar.*, t. 229-232, 234, 235 (*Gladiolus*). — RED., *Lil.*, t. 11 (*Gladiolus*), 96, 198 (*Ixia*), 343, 399. — ANDR., *Bot. Rep.*, t. 56, 177 (*Ixia*), 192 (*Antholyza*), 335 (*Gladiolus*). — LODD., *Bot. Cab.*, t. 1577. — VAHL, *Enum.*, II, 96 (*Gladiolus*). — TRUMB., *Diss. Glad.*, n. 12 (*Gladiolus*). — LAMK., *Dict.*, II, 725 (*Gladiolus*). — HOUTT., *Handl.*, XII, t. 80, fig. 2 (*Phalangium*). — BURM., *Prodr.*, 2 (*Gladiolus*). — BAK., in *Trim. Journ.* (1876), 336. — *Bot. Mag.*, t. 418, 441 (*Antholyza*), 523, 533, 537; 553 (*Ixia*), 601, 608, 631, 1072, 1193-1195, 1408, 1530.

3. In *Mém. Acad. sc. Toul.* (1786); in *Journ. Phys.*, XXXV (1789), 425. — ENDL., *Gen.*, n. 1236. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 154. — B. H., *Gen.*, III, 705, n. 46. — PAX, *Pflanzenfam.*, 157. — *Peyrousia* SWEET, *Brit.*

fl. Gard., 499. — *Ovieda* SPRENG., *Syst.*, I, 147 (non L.). — KLATT, in *Linnaea*, XXXII, 776. — *Meristostigma* A. DIETR., *Sp. pl.*, II, 593. — *Anomatheca* KER, in *Kæn. et Sims Ann.*, I, 227. — KLATT, in *Linnaea*, XXXII, 774; *Erg. u. Ber.*, 21. — BAK., *loc. cit.*, 153. — *Anomaza* SALISB., in *Trans. Hort. Soc. lond.*, I, 323. — *Sophronia* LICHT., in *Rœm. et Sch. Syst.*, I, 482.

4. Nunc raro inæqualibus.

5. Parvis v. mediocribus, nunc speciosis, albis, flavidis, violaceis v. purpureis, nunc varie maculatis.

6. Spec. ad 20. JACQ., *Id. rar.*, t. 268-270 (*Gladiolus*), 288 (*Ixia*), 292 (*Galaxia*). — ANDR., *Bot. Rep.*, t. 35 (*Ixia*). — SWEET, *Brit. fl. Gard.*, t. 143; ser. II, t. 39. — BAK., in *Trans. Linn. Soc., Bot.*, I, 272, t. 36. — PET., *Reis. Moss. Bot.*, t. 58. — *Bot. Reg.*, t. 1903. — *Bot. Mag.*, t. 595, 606, 1246.

7. In *Linnaea*, XXXIV, 672 (non ECKL.), ex BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 163. — B. H., *Gen.*, III, 704, n. 45. — DUCHTR., in *Bull. Soc. hort. Fr.* (1891), 152, 215; (1892), 618. — PAX, *Pflanzenf.*, 157. — *Nymanina* O. K., *Revis.*, 701.

8. Pulchelli, sæpe suaveolentes, albidii.

curvo, basi attenuato; fauce longe campanulata; limbi sub-2-labiati lobis 6, nonnihil dissimilibus inæqualibusque. Stamina 6, tubo affixa; filamentis basi excepta liberis; antheris lineari-elongatis v. sagittatis; loculis connectivo lineari sejunctis, extrorsum rimosis. Germinis inferi loculi 3, ∞ -ovulati; ovulis 2-seriatim adscendentibus; stylo tenui stamina demum superante; ramis 3, 2-fidis; ramulis leviter dilatatis induplicatis, margine papillois. Fructus subsphæricus, ovoideus v. obovoideus loculicidus. Semina subsphærica v. angulata; raphe prominula v. aliformi. — Herbæ perennes, 2-morphe bulbosæ; foliis planis haud rigidis, supra caulis basin confertis; inflorescentia simplici v. parce ramosa; spathis 1-lateralibus; bracteola postica e foliolis 2, liberis inæqualibus ovatis brevibus rigidulis v. in spatham 2-carinatam coalitis constante. (*Africa austr.*¹)

49. *Ixia* L.² — Flores fere *Tritoniæ* (v. *Lapeyrousiæ*) regulares v. subregulares; perianthii rotati, subhypocriterimorpha v. subinfundibularis tubo cylindrico, brevi v. longo, ad faucem nunc (*Morphixia*³) turbinato; limbi lobis patentibus, 2-seriatim imbricatis. Stamina 3, summo tubo affixa; filamentis erectis brevibus, liberis v. plus minus alte 1-adelphis (*Eurydice*⁴); antheris elongatis, ad basin sagittatam affixis, extrorsum rimosis. Germen ∞ -ovulatum; styli erecti ramis linearibus v. subfalcatis compressis induplicatis adque margines papillois. Fructus obtusus loculicidus; seminibus sphæricis v. angulatis. — Herbæ perennes; bulborum tunicis paucis lævibus v. fibrosis; ramis aeriis erectis simplicibus v. parce ramosis. Folia basilaria conferta erecta, anguste ensiformia, rigidule nervosa; pauca minora altius inserta remotiora. Flores⁵ in spicam terminalem nunc parce ramosam dispositi; spathis sæpe secundis parvis latis membranaceo-scariosis, concavis v. carinatis, nunc 2-dentatis, 1-floris; bracteola postica 2-carinata, 2-dentata v. 2-loba. (*Africa austr.*⁶)

1. Spec. 2, 3. JACQ., *Ic. rar.*, t. 241 (*Gladiolus*). — RED., *Liliac.*, t. 124, 419 (*Gladiolus*). — KLATT, in *Reg. Gartenfl.*, t. 808. — KER, in *Kæn. et Sims Ann.*, I, 227 (*Tritonia*). — LODD., *Bot. Cab.*, t. 1820 (*Tritonia*). — HILL, in *Gardn. Chron.* (1888), 107.

2. *Gen.*, ed. I, n. 238; ed. VI, n. 56. — J., *Gen.*, 58. — ENDL., *Gen.*, n. 1243. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 90. — KLATT, in *Linnaea*, XXXIV, 635; *Erg. u. Ber.*, 61. — B. H., *Gen.*, III, 704, n. 44. — PAX, *Pflansensam.*, 154. — Wuerthea REG., *Gartenfl.*, II, t. 46.

3. KER, *Irid. Gen.*, 105. — BAK., *loc. cit.*, 96. — Hyalis SALISB., in *Trans. Hort. Soc. lond.*, I, 317.

4. PERS., *Syn.*, I, 48. — BAK., *loc. cit.*, 92. 5. Speciosi, sæpius mediocres, albi, cærulescentes, flavidi, viriduli v. varie purpurei.

6. Spec. 26-28. JACQ., *Ic. rar.*, t. 263 (*Gladiolus*), 275, 278, 281, 282; *H. schændr.*, t. 18-23. — RED., *Lil.*, t. 23, 29, 34, 50, 155, 159, 186, 196, 232, 256, 431, 432. — VENT., *Ch. de pl.*, t. 10; *Jard. Cels.*, t. 48. — ANDR., *Bot. Rep.*, t. 23, 25, 50, 155, 159, 186, 196, 203, 211, 213,

50. **Schizostylis** BACKH. et HARV.¹ — Flores fere *Ixiæ*; perianthii tubo brevissime obconico; limbi lobis ovato-oblongis patentibus æqualibus. Stamina libera ad faucem affixa; antheris lineari-elongatis sagittatis. Germen ∞ -ovulatum; styli tenuis ramis longioribus lineari-angustis arcte induplicatis; marginibus papillosis. Fructus vertice truncatus membranaceus loculicidus; seminibus angulatis ∞ . — Herbæ perennes; rhizomate repente; ramis aeriis fasciculatis, basi incrassatis; foliis lineari-ensiformibus; floribus² in spathis secundum axin simplicem dissitis solitariis; bracteola postica, 2-nervi, 2-carinata. (*Africa austr.*³)

51. **Geissorhiza** KER.⁴ — Flores (fere *Ixiæ*) subregulares; perianthii infundibularis tubo tenui; fauce breviter ampliata; limbi lobis 6, ovatis v. angustatis subæqualibus, demum patentibus. Stamina fauci affixa; antheris lineari-sagittatis, nunc demum tortis. Germen oblongum, obovoideum v. brevissimum subsphæricum, ∞ -ovulatum; styli gracilis elongati ramis linearibus complicatis; marginibus intus papillosis, demum recurvis v. revolutis. Fructus loculicidus cæteraque *Ixiæ*. — Herbæ perennes; bulbo varie tunicato; caule aereo simplici v. parce ramoso; foliis angustis v. linearibus ensiformibusve paucis; floribus⁵ secus axin dissitis, in spatha sæpe herbacea solitariis v. paucis sessilibus; bracteola parinervi scarioso-membranacea. (*Africa austr., Madagascaria*⁶.)

52. **Streptanthera** SWEET⁷. — Flores (fere *Ixiæ*) regulares; perianthii tubo brevissime campanulato; limbi lobis æqualibus rotato-patentibus. Stamina fauci affixa; filamentis brevibus erectis; antheris linearibus extrorsis, demum tortis. Germen ∞ -ovulatum; styli tenuis ramis stigmatosis cuneato-dilatatis, 2-lobis. Fructus subsphæricus

232, 250, 256, 392. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 15. — ECKL., *Verz.*, 30 (*Freesea*). — *Bot. Reg.*, t. 530. — *Bot. Mag.*, t. 128, 256, 522, 539, 549, 570, 589, 594, 607, 617, 623, 624, 629, 630, 789, 846, 1013, 1173, 1285, 1379, 1502, 1503 (*Tritionia*). — WALP., *Ann.*, VI, 49.

1. In *Bot. Mag.*, t. 5422. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 108. — KLATT, in *Linnaea*, XXXV, 380. — B. H., *Gen.*, III, 702, n. 39. — PAX, *Pflanzenfam.*, 153.

2. Rubris, majusculis speciosis.

3. Spec. 2. LEME, *Ill. hort.*, t. 394. — *Fl. serres*, t. 1637.

4. In *Xen. et Sims Ann.*, I, 223. — BAK., in

Journ. Linn. Soc., XVI, 93 (part.). — KLATT, in *Linnaea*, XXXIV, 650; *Erg. u. Ber.*, 56. — PAX, *Pflanzenfam.*, 154. — ROCHEA SALISB., in *Trans. Hort. Soc. lond.*, I, 322. — Weihea ECKL., *Verz.*, 22.

5. Sæpius parvis elegantibus.

6. Spec. 22, 23. ANDR., *Bot. Repos.*, t. 245 (*Ixia*). — SWEET, *Brit. fl. Gard.*, t. 138. — HEMSL., in *Journ. Linn. Soc.*, XX, *Rel.*, 137. — *Bot. Mag.*, t. 584, 597; 598 (*Ixia*), 672, 1255, 5877.

7. *Brit. fl. Gard.*, t. 209; ser. II, t. 122. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 92. — B. H., *Gen.*, III, 703, n. 43. — PAX, *Pflanzenf.*, 154.

loculicidus; seminibus subsphæricis. — Herbæ perennes bulbosæ humiles; foliis basilaribus erectis v. falcato-patentibus, lanceolatis v. ensiformibus; pedunculis ad folia superiora axillaribus paucis; spathis sessilibus 1-paucis spicatis membranaceo-scariosis et fusco-lineatis, apice dentatis lacerisve; floribus sessilibus ad axillam spathæ solitariis; bracteola postica 2-dentata. (*Africa austr.*¹⁾

53. **Hesperantha** KER.² — Flores fere *Ixiæ* (v. *Geissorhizæ*); perianthii tubo brevi v. longiusculo, recto v. arcuato; limbi lobis subæqualibus, demum patenti-reflexis; sepalis nunc rigidioribus. Stamina ad faucem affixa; antheris sagittatis inter lobos basifixis. Germen α -ovulatum; stylo erecto brevi v. brevissimo; ramis eo longioribus divergentibus subulatis conduplicatis, apice ad margines stigmatosis. — Herbæ perennes; bulbo parce tunicato; axi aërio sæpius simplici; foliis paucis basilaribus linearibus; bracteis secus axin spiciformem sessilibus quaquaversis, carinatis v. complicatis; floribus axillaribus solitariis sessilibus; bracteola postica parinervi 2-carinata. (*Africa trop. et austr.*³⁾

1. Spec. 2. LODD., *Bot. Cab.*, t. 1359. — PAXT., *Mag.*, I, 8, c. ic. — KLATT, in *Linnæa*, XXXV, 378 (*Sparaxis*).

2. In *Kæn. et Sims Ann.*, I, 224. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVI, 95. — KLATT, in *Linnæa*, XXXIV, 647; *Erg. u. Ber.*, 59. — B. H., *Gen.*, III, 702, n. 40. — PAX, *Pflanzenfam.*, 154.

3. Spec. ad 20. THUNB., *Diss.*, n. 5, 9, c. t. 2 (*Ixia*). — JACQ., *Ic. rar.*, t. 276, 279, 280 (*Ixia*). — RED., *Lil.*, t. 441 (*Ixia*). — ANDR., *Bot. Rep.*, t. 44, 59 (*Ixia*). — VAHL, *Enum.*, II, 58 (*Ixia*). — BAK., in *Trim. Journ.* (1876), 182, 239. — A. RICH., *Fl. abyss.*, II, 309 (*Ixia*). — *Bot. Mag.*, t. 566, 573, 790, 1054, 1254, 1379, 1475 (pleraq. sub *Ixia*).

CXXVI

TACCACÉES

Les fleurs des *Tacca*¹ (fig. 107-113) sont régulières et hermaphrodites, à réceptacle concave qui, au-dessus de l'ovaire infère, se prolonge en une coupe épaisse dont les bords donnent insertion au périanthe et à l'androcée. Le calice est formé de trois sépales verdâtres ou plus ou moins colorés, légèrement imbriqués dans le bouton. Les trois pétales alternes, plus étroitement imbriqués, sont égaux aux

Tacca leontopetaloides.

Fig. 109. Graine.

Fig. 108. Fruit.

Fig. 110. Graine, coupe longitudinale.

sépales ou plus grands ou moins épais qu'eux, colorés de même, et étalés ou réfléchis comme eux lors de l'anthèse. Les étamines, superposées chacune à une des folioles du périanthe, ont un large filet fortement dilaté et incurvé en un capuchon de forme variable; si bien que l'anthère, qui serait introrse si son filet demeurerait rectiligne, se trouve appliquée comme sessile contre la face regardant en dehors de la lèvre intérieure de la paroi du capuchon, et que la face

1. FORST., *Char. gen.*, 65 (1776). — SCOP., *Intr.*, 106. — J., *Gen.*, 56. — GAERTN., *Fruct.*, I, 43, t. 14, fig. 2. — LAMK., *Ill.*, t. 232. — POIR., *Dict.*, VII, 548; Suppl., V, 278. — ENDL., *Gen.*, n. 1204. — H. B., in *Adansonia*, VI, 243. — EICHL., in *Sitzb. Bot. Ver. Prov. Brandenburg.*, XXI (1879). — HANCE, in *Trim. Journ.*

(1881), 229. — B. H., *Gen.*, III, 741. — ARCHANG., in *Giorn. bot. ital.*, XI, 189. — PAX, in *Engl. u. Prantl Pflanzenfam.*, II, 3, p. 127, fig. 89, 90. — ATACCIA PAVOL., *Rel. Hønk.*, 149, not. — ENDL., *Gen.*, n. 1205. — K., *Enum.*, V, 484. — *Leontopetaloides* AMM., in *Comm. Ac. petrop.*, VIII, 211, t. 13. — O. K., *Revis.*, 704.

de cette anthère se trouve ainsi dirigée vers l'extérieur¹. Elle a d'ailleurs deux loges parallèles, profondément séparées l'une de l'autre, et qui s'ouvrent chacune par une fente longitudinale. Ces

Tacca leontopetaloides.

Fig. 107. Port.

loges peuvent être à peu près rectilignes. Mais assez souvent aussi elles s'arquent légèrement ou même beaucoup; de façon que l'anthère peut devenir très convexe du côté de sa face qui, dans d'autres cas,

1. Son extrémité inférieure, dépassant le bord inférieur de cette paroi, peut se recourber plus ou moins, comme il arrive dans le *T. leontopetaloides*. La base de l'étamine peut aussi

se développer en auricules latérales plus ou moins manifestes. Ailleurs, les décurrences des bords de deux filets staminaux voisins forment un angle ouvert, à sinus supérieur.

demeure à peu près plane. L'ovaire est uniloculaire, surmonté d'un style épais et court, à trois ou six angles saillants, avec trois larges divisions pétaloïdes, récurvées et bilobées, superposées aux sépales. Il y a aussi, dans certaines espèces, trois bandelettes ou languettes papilleuses réfléchies et plus ou moins unies au style dans l'intervalle des lobes précédents. Ceux-ci sont stigmatifères dans une dépression

Fig. 111. Inflorescence.

qui répond au fond du sinus de séparation des deux lobes¹ et qui conduit dans un canal de forme variable. Chacun des trois placentas pariétaux, superposés à un pétale, porte un nombre indéfini d'ovules anatropes², à raphé dorsal parfois épaissi. Le fruit, de forme variable, presque sphérique, obovoïde, turbiné ou allongé, à trois ou six côtes anguleuses, ou sans saillies, est presque sec, ou plus ou moins charnu et pulpeux, pouvant même devenir blet³, demeure

1. L'orifice, qui conduit par un canal à l'ovaire, est plus ou moins nettement limité par trois lobules : un médian, inférieur, et deux latéraux, garnis de papilles sur les bords. En dehors des papilles des lobules latéraux, il

y a parfois une surface blanchâtre subglanduleuse, assez régulièrement elliptique.

2. A double tégument.

3. Pouvant devenir à ce moment plus ou moins odorant, comme celui des Vanillees.

indéhiscents ou s'ouvre finalement plus ou moins nettement en trois valves loculicides¹. Les graines sont nombreuses, souvent ovoïdes, à téguments épais, striés en long, pourvues d'un albumen charnu, dur ou granuleux, et d'un petit embryon apical.

Les *Tacca* sont des herbes vivaces, à tubercule souvent épais, de forme et de longueur variables. Il porte des feuilles basilaires alternes, engainantes, pétiolées, penninerves ou digitinerves², entières, lobées ou décomposées-disséquées. Leurs fleurs³ sont disposées au sommet d'une hampe commune, parfois très longue, en deux cymes unipares-scorpioïdes. Chacune des cymes occupe l'aisselle d'une grande bractée foliacée⁴, souvent colorée, qui, dans le principe, alterne avec deux autres grandes bractées, mais se déplace ensuite pour se porter d'un même côté de l'inflorescence que sa congénère et s'y dresser en manière d'étendard. Sur les côtés de chaque cyme se disposent en outre des bractéoles florales qui s'allongent en filaments grêles et pendants. Au début, l'inflorescence totale peut être réfléchie sur son pédoncule. Ces plantes habitent, au nombre d'une dizaine d'espèces⁵, les régions tropicales des deux mondes.

La plupart des auteurs s'accordent à rapprocher les Taccacées des Amaryllidacées, dont elles ont l'inflorescence en ombelle de cymes. Elles s'en distinguent par leurs feuilles, la forme de leur périanthe, leur placentation pariétale⁶, la structure de leurs graines et celle de leur androcée, souvent comparé à celui des Burmanniacées⁷. Elles en diffèrent surtout par le mode d'organisation de leurs orifices stigmatiques, qui rappellent ceux des Orchidacées. Il nous a semblé que, par leur mode de placentation, les dilatations stylaires et les propriétés des fruits, les *Tacca* représentaient une forme régulière

1. La déhiscence étant même complète, en trois panneaux spongieux récurvés et séminifères sur la ligne médiane, dans l'espèce chinoise, à feuilles entières, dont HANCE a fait le genre *Schizocapsa* (in *Trim. Journ.* (1831), 292. — B. H., *Gen.*, III, 741, n. 2. — PAX, *Pflanzenfam.*, 130).

2. Celles du *T. leontopetaloides* ont une nervation principale digitée, et leurs divisions secondaires sont penninerves.

3. Verdâtres ou d'un pourpre vineux ou noirâtre, de taille moyenne.

4. Elliptique ou ovale, plus souvent oblongue-

subspathulée. Le nombre des grandes bractées et des cymes peut être plus considérable.

5. BUCH., *Dec.*, VI, t. 9; VII, t. 8. — K., *Enum.*, V, 458; 464 (*Ataccia*). — SEEM., *Fl. vil.*, 101. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 692. — ROXB., *Pl. corom.*, t. 257. — JACK, in *Mal. Misc.*, I, n. 23. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 578. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 286. — *Bot. Mag.*, t. 1488, 4589, 6124.

6. Qui cependant existe dans le *Leontochir*.

7. HANCE a relevé, dans l'article cité, tout ce que les auteurs antérieurs ont dit des affinités controversées de ces plantes.

des Orchidacées. Parmi les Dicotylédones, les *Asarum* ont été avec raison signalés comme les analogues des Taccacées. On sait qu'ils ont été eux-mêmes comparés aux *Trichopus* qui appartiennent à la série des Amaryllidacées-Dioscoréées.

On n'utilise¹, chez les *Tacca*, que les tubercules souterrains, riches en fécule alimentaire² et employés aux mêmes usages que les Aroïdées nommées *Taro*, notamment par les Polynésiens. Le plus connu est le *T. leontopetaloides*³ (fig. 107-110), cultivé en Océanie et dans l'Indo-Chine où il fournit le Salep ou Arrow-root d'Otahiti. Aux Moluques, le *T. Rumphii* SCHAU. donne également une sorte de fécule analeptique, et sert à préparer un pain particulier et divers mets. Le fruit blet de certaines espèces prend, comme nous l'avons vu, une odeur assez forte de vanille. Les propriétés alimentaires des tubercules farineux se retrouvent à Java dans le *T. palmata* BL.; à Amboine dans le *T. dubia* SCHULT.; en Indo-Chine dans le *T. integrifolia*⁴. Plusieurs de ces plantes bizarres et à fleurs de couleur sombre, notamment le *T. cristata*⁵ (fig. 111-113), sont cultivées comme ornementales dans nos serres⁶.

1. ENDL., *Enchirid.*, 93. — LINDL., *Veg. Kingd.*, 150. — ROSENTH., *Syn. pl. diaphor.*, 107, 1082.

2. Souvent amers et âpres à l'état sauvage.

3. O. K., *Revis.*, 704. — *T. pinnatifida* FORST., *Pl. esc.*, n. 28. — ROXB., *Fl. ind.*, II, 172. — BENTH., *Fl. austral.*, VI, 458. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 566. — TREVIR., *Symb.*, t. 54, 55. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 692. — REC., *Gartenfl.*, t. 582. — JARD., *Hist. nat. il. Marquis.*, 26. — PANCH., in *Cuz. Tahit.*, 240. — SEEM., *Fl. vit.*, 102. — DRAK., *Fl. Polyn. fr.*, 224. — HILLEBR., *Fl. haw.*, 337. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 287. — *T. pinnatifolia* GERTN., *Fruct.*, I, 43, t. 14. — *Leontice leontopetaloides* L. (Yowu, Haolan, Pia des Polynésiens). Sur son tubercule, QUEVA, in

C. rend. Assoc. fr. (1893), 237. A Madagascar, les *Tacca* sont usités comme aliments sous le nom de Tavoulou.

4. KER, in *Bot. Mag.*, t. 1488. — ROXB., *Pl. corom.*, t. 257. — *T. aspera* ROXB., *Fl. ind.*, II, 169. — *Ataccia integrifolia* PRESL. — *Fl. serres*, t. 860, 861.

5. JACK, in *Mal. Misc.*, I, V, 23. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 578. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 287. — *T. Rafflesiana* JACK. — *Ataccia cristata* K., *Enum.*, V, 466. — LEME, *Jard. fl.*, t. 186, 187. — *Fl. serres*, t. 860, 861. — *Bot. Mag.*, t. 4589.

6. Les Taïtiennes font, avec la hampe des *Tacca* qui a longtemps séjourné dans l'eau, des couronnes élégantes et certains autres ouvrages délicats de fine sparterie.

CXXVII

BURMANNIACÉES

I. SÉRIE DES BURMANNIA.

Les *Burmannia*¹ (fig. 114-117), qui ont donné leur nom à cette petite famille, n'en représentent cependant pas le type le plus parfait.

Burmannia bicolor.



Fig. 114. Port.

Fig. 115. Fleur.



Fig. 116. Diagramme.

Fig. 117. Fleur, coupe longitudinale.

Leurs fleurs, régulières et hermaphrodites, ont un réceptacle concave

¹ L., *Gen.*, ed. I, n. 284; ed. VI, n. 397. — J., *Gen.*, 50 (Broméliacées); in *Dict.*, V, Suppl., 84 (Iridées). — MICHX., in *Linn. Trans.*, XVIII, 4, p. 549. — ENGL., *Gen.*, n. 1219. —

SCHULT., *Syst.*, VII, 83 (not.). — B. H., *Gen.*, III, 457, n. 1. — ENGL., *Pflanzenfam.*, II, 6, p. 50, fig. 36, 39, H-M. — *Maburnia* DUR.-TA., *Gen. nov. madag.*, 4. — *Vogelia* GRUL., *Syst.*,

qui enveloppe l'ovaire infère, et dont les bords supportent un périanthe tubuleux, partagé seulement à son sommet en trois petits lobes triangulaires, valvaires-indupliqués. Sur le milieu de leur dos, ces lobes portent une aile verticale, plus ou moins développée, qui se continue sur le tube et sur le milieu du dos des loges de l'ovaire. Les pétales, au nombre de trois, insérés dans le sinus de séparation des sépales, sont bien plus petits qu'eux, ou très petits, ou même nuls : ils sont trop étroits pour arriver à se toucher dans le bouton. L'androcée est formé de trois étamines superposées aux pétales et insérées sur le tube un peu au-dessous d'eux. Elles ont un très court filet et une anthère basifixe, de configuration toute particulière. Le connectif, épais, plus ou moins parallélipipédique, aussi large ou plus large que haut, se prolonge supérieurement en une sorte de crête, simple ou double, variable de forme. Sur ses côtés s'insèrent plus ou moins loin l'une de l'autre, les deux loges d'une anthère qui s'ouvre latéralement en travers. L'ovaire infère a trois loges, le plus souvent complètes, alternipétales et multiovulées. Le style est dressé, inclus, dilaté supérieurement en une tête à trois lobes généralement épais, variables de forme¹, stigmatifères vers leur sommet. Le fruit est sec, surmonté du périanthe persistant. Il s'ouvre verticalement ou se déchire d'une façon variable entre ses trois ailes, c'est-à-dire en face des cloisons. Les graines, petites et nombreuses, presque sphériques ou plus ou moins allongées, sont striées ou réticulées². Elles renferment une masse charnue et d'apparence homogène³.

Les *Gonyanthes*⁴ sont des *Burmannia* de l'Inde et de l'Océanie tropicale, dont les lobes calycinaux sont plus petits que dans les plantes précédentes; les loges ovariennes parfois incomplètes; la paroi du péricarpe ouverte plus ou moins en travers à la complète maturité. C'est une section du genre assez peu nettement définie.

On compte dans l'ensemble du genre une vingtaine d'espèces⁵. Ce

11, 107. — *Tripterella* MICHX., *Fl. bor.-amer.*, I, 19, t. 3. — *Cryptonema* TURCZ., in *Bull. Mosc.* (1848), I, 590. — *Nephrocœlium* TURCZ., in *Bull. Mosc.* (1853), I, 287. — *Tripteranthus* WALL., *Cat. pl. ind.* — *Cyanotis* MIEERS, in *Cat. Wall.*, n. 9007. — *Tetraptera* MIEERS, in *Lindl. Veg. Kingd.*, 172.

1. Souvent pourvus d'une lame accessoire ou d'une crête médiane, de forme et de taille variables suivant les espèces.

2. C'est leur tégument extérieur qui présente ces caractères, le plus souvent appliqué contre les parties plus profondes. Mais parfois aussi il

devient lâche et s'étend même en haut et en bas de la semence, à la façon d'un sac aliforme.

3. Considéré longtemps comme un embryon, mais représentant plutôt un albumen (TREUB, in *Ann. Jard. Buitenz.* (1883), 120, 122, t. 18).

4. BL., *Cat. Gew. Buitenz.*, ex *Flora* (1825), 123; *Enum. pl. jav.*, 28. — MIEERS, in *Trans. Linn. Soc.*, XX, 379.

5. WALT., *Fl. carol.*, 68 (*Anonymos*). — ROXB., *Pl. corom.*, t. 242. — MART., *Nov. gen. et spec.*, I, 9, t. 5. — SEUB., in *Mart. Fl. bras.*, III, I, 55, t. 7. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, Suppl., 616. — GRIFF., *Sc. pl. asiat.*, t. 272. — BENTH.,

sont des herbes, souvent humbles, dressées et simples, rarement ramifiées. Elles peuvent être colorées, saprophytes ou (?) parasites, et ont alors des feuilles alternes réduites à de minimes écailles de même couleur que l'axe. Ailleurs, les feuilles plus développées sont vertes, basilaires; ou bien elles s'élèvent plus ou moins haut sur l'axe aérien. Les fleurs¹ peuvent être terminales et solitaires, ou en cymes pauciflores; ou bien la cyme se partage en deux branches sur lesquelles les fleurs, accompagnées de leurs bractées, simulent une grappe ou un épi. On a observé des *Burmannia* dans toutes les régions chaudes des deux mondes.

Très voisin des *Burmannia*, le *Campylosiphon*, du nord du Brésil, petite plante colorée, se distingue par son périanthe arqué, à petits lobes linéaires, et par son fruit étroit et dépourvu d'ailes.

Les *Apteria*, petites plantes des deux Amériques, ont aussi des fleurs de *Burmannia*, non ailées, mais avec un ovaire uniloculaire, à placentas pariétaux, et des étamines à filet pétaloïde et dilaté.

A peine distincts des *Apteria*, les *Dictyostega*, qui croissent en Amérique et aussi dans l'Afrique tropicale, ont des anthères à peu près sessiles, dont les loges subsphériques et subbilobées font saillie sur les côtés d'un connectif étroit; des pétales beaucoup plus petits que les divisions calycinales; des fleurs disposées en cyme terminale, ordinairement bifide, à divisions racémiformes.

Les *Gymnosiphon*, observés dans l'Amérique, l'Afrique et l'Océanie tropicales, ont aussi un tube floral dépourvu d'ailes, mais qui se détache circulairement après la floraison. Les anthères ont un connectif non appendiculé; et le fruit, surmonté de la base du tube floral, s'ouvre vers son sommet ou parfois en même temps sur ses côtés.

II. SÉRIE DES THISMIA.

Les fleurs régulières et hermaphrodites des *Thismia*² (fig. 118, 119) ont un réceptacle concave dans lequel est enchâssé l'ovaire infère,

Fl. austral., VI, 397. — BECC., *Males.*, I, 242, t. 14, 15. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, V, 664. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XX, 268. — RIDL., in *Trim. Journ.* (1891), 159. — OLIV., in *Hook. Icon.*, t. 1357. — WALP., *Ann.*, I, 812; VI, 42.

1. Bleues, pourprées, violacées, lilacées, blanches ou jaunâtres, ordinairement petites.

2. GRIFF., in *Trans. Linn. Soc.*, XIX, 341, t. 30. — B. H., *Gen.*, III, 459, n. 6. — ENGL., *Pflanzenfam.*, 48, fig. 38, A-K. — POULS., in *Rev. gén. Bot.*, I, 549. — F. MUELL., in *Act.*

au-dessus duquel il porte un périanthe de forme variable, campanulé, turbiné ou subinfundibuliforme, rétréci ou plus ou moins renflé à sa

Thismia (Geomitra) clavigera.

Fig. 118. Fleur.

Fig. 119. Fleur, coupe longitudinale.

base, large ou resserré à son orifice supérieur, que bordent six lobes

Roy. Soc. Tasman. (dec. 1890); in Victor. Nat. (dec. 1890). — *Sarcosiphon* BL., *Mus. lugd.-bul.*, I, 250, t. 10, 11. — *Ophiomeris* MIERA, in Trans. Linn. Soc., XX, 373, t. 15. — *Myosoma* MIERA, loc. cit., XXV, 474, t. 51. — *Dagnisia* BECC., *Males.*, I, 249, t. 12. — B. H., *Gen.*, III, 459, n. 7. — ENGL., *Pflanzenfam.*, 48, fig. 38, L-O. — *Geomitra* BECC., loc. cit., 250, t. 10, 11. — B. H., *Gen.*, III, 459, n. 8. — *Rodwaya* F. MUELL., loc. cit.

disposés sur deux verticilles qui répondent l'un au calice et l'autre à la corolle. Les sépales sont valvaires, plus ou moins rétrécis à leur base, souvent surmontés d'un appendice dorsal plus ou moins développé, finalement réfléchis ou bien rapprochés en une sorte de toit à trois pieds. Les pétales sont ordinairement beaucoup plus courts et se recourbent souvent en dehors. L'androcée, attaché à la gorge du périanthe, est formé de six étamines qui s'insèrent dans une fossette plus ou moins prononcée et s'infléchissent fortement dans le tube, de façon à porter leur sommet en bas. Elles ont chacune un filet court et une anthère à deux loges parallèles. Quand elles sont infléchies, la face de ces loges, déhiscente par une fente longitudinale, regarde en dehors. Mais, redressées, elles auraient des loges introrses, assez souvent surmontées d'un prolongement du connectif. L'ovaire est uniloculaire, avec trois placentas pariétaux oppositipétales et multi-ovulés; mais ces placentas peuvent s'avancer jusqu'à l'axe et s'y toucher finalement. Le style est court ou allongé, conique ou cylindrique, partagé supérieurement en trois branches stigmatifères souvent courtes, épaisses, entières, bilobulées ou bifides. Le fruit plus ou moins turbiné, surmonté d'une cupule que lui forme la base du périanthe circulairement détachée du reste du tube, est plus ou moins épais et charnu, polysperme. Les graines sont petites, sphériques, ovoïdes ou fusiformes, parfois rugueuses à la surface.

On connaît une douzaine de *Thismia*¹, originaires des régions tropicales de l'Amérique du Sud et surtout de l'Asie et de l'Australie ou de la Tasmanie. Ce sont de petites plantes parasites ou saprophytes, colorées, charnues, simples ou peu ramifiées, dont les feuilles sont réduites à des écailles, courtes et souvent peu nombreuses, alternes. Leurs fleurs sont terminales, solitaires ou en cymes pauciflores, racémiformes, accompagnées de bractées analogues aux feuilles.

III? SÉRIE DES CORSIA.

Les fleurs irrégulières des *Corsia*² (fig. 120, 121) sont hermaphrodites. Leur réceptacle allongé et tubuleux³ loge l'ovaire infère dans sa

1. Hook. F., in *Thw. En. pl. Zeyl.*, 325; *Fl. brit. ind.*, V, 666. — BECC., *Males.*, I, 251, t. 11, 12. — WALP., *Ann.*, III, 609 (*Ophiomeris*, *Sarcosiphon*).

2. BECC., *Males.*, I, 238, t. 9. — B. H., *Gen.*, III, 460, n. 9. — ENGL., *Pflanzenfam.*, 51, fig. 40, A-E.

3. A six côtes peu saillantes.

cavité et porte sur ses bords un calice de trois sépales fort dissimilables. Le médian représente une large lame membraneuse, cordée-subarrondie, subcrênelée, parcourue d'un riche réseau de nervures, doublé à sa base d'un épais disque aplati, à peu près de même forme et adhérent au sépale dans sa portion inférieure; tandis que les deux autres sépales ont la forme de longues languettes linéaires ou subulées,

Corsia ornata.

Fig. 120. Fleur.

Fig. 121. Fleur, coupe longitudinale.

étalées-réfléchies. Les pétales, alternes, sont pareils aux sépales linéaires et étalés comme eux. L'androcée est formé de six étamines épigynes et bisériées, bien plus courtes que les pièces du périanthe. Elles ont un filet court, épais, comprimé, récurvé, et une anthère terminale, courte, à loges parallèles et contiguës, déhiscentes en dehors par une fente longitudinale. L'ovaire, surmonté d'un style à trois branches stigmatifères courtes et épaisses, est presque complète-

ment partagé par trois placentas pariétaux bifides, dont les lobes portent de nombreux ovules fusiformes et obliquement descendants. Le fruit est une longue capsule cylindrique, que surmontent les restes du périanthe et de l'androcée. Elle s'ouvre en trois valves, et ses graines sont nombreuses, descendantes et fusiformes. On ne connaît qu'un *Corsia*¹, de la Nouvelle-Guinée : c'est une herbe colorée, dont les branches grêles, simples, s'élèvent d'un rhizome vivace et portent des écailles alternes. La fleur est solitaire et terminale.

A côté de ce genre on a placé l'*Arachnites*, du Chili, qui a des fleurs également très irrégulières, mais unisexuées, avec un grand sépale impair ovale-lancéolé, des étamines à filet dressé-infléchi et des placentas multiovulés peu saillants.

Cette petite famille a été établie en 1825 par SPRENGEL², qui y comprit à tort les *Sonerila*. BLUME lui donna en 1830 le nom qu'elle porte actuellement³. Avant ces auteurs, les *Burmannia*, seul type connu du groupe, avaient été rapportés aux Liliacées, aux Iridacées, aux Broméliacées ou même aux Hydrocharidacées. Les *Thismiées* furent rattachées comme tribu à la famille par MIERS en 1847. GRIFFITH avait décrit, en 1845, le *Thismia* comme genre intermédiaire aux Taccacées et aux Burmanniacées. Quant aux Corsiées, ce n'est qu'avec doute et provisoirement qu'il convient de les attribuer à cette même famille, qui se trouve de la sorte ainsi constituée :

I. BURMANNIÉES⁴. — Fleur régulière, à tube cylindrique ou en entonnoir, à trois angles ou à trois ailes. Étamines 3, presque sessiles à l'intérieur du tube. Ovaire à une ou trois loges. — Plantes feuillées et vertes ou plus souvent colorées et aphyllées. — 4 genres.

II. THISMIÉES⁵. — Fleur régulière, à tube oblong ou obovoïde, souvent resserré à la gorge. Étamines 6, à anthères défléchies dans l'intérieur du tube, rapprochées ou unies en partie. — Plantes charnues et colorées, aphyllées. — 1 genre.

1. *C. ornata* BECC.

2. *Syst.*, I, 125 (*Burmanniæ*).

3. *Burmanniaceæ* BL., *En. pl. jav.*, I, 27 (Ord.). — ENDL., *Gen.*, 163, Ord. 60. — LINDL., *Veg. Kingd.*, 171, Ord. 61. — B. H., *Gen.*, III, 455, Ord. 168. — ENGL., *Pflanzensfam.*, II, 6, p. 44.

4. REICHB., *Consp.*, 60 (*Narcisseæ*). — REICHB., *Nom.*, 45 (*Hæmodorearum* Subdiv.). — MIERS, in *Trans. Linn. Soc.*, XV, III, 549; in *Ann.*

and *Mag.*, ser. 2, I, 235 (Trib.). — *Euburmanniæ* B. H., *Gen.*, III, 456, 457 (Trib. 1). — ENGL., *Pflanzensfam.*, 48.

5. MIERS, in *Gardn. Chron.* (1847), n. 19; in *Bot. Zeit.* (1847), 735; in *Ann. and Mag.*, ser. 2, I, 235 (Trib.). — B. H., *Gen.*, III, 456, 459 (Trib. 2). — BECC., *Males.*, I, 247. — ENGL., *Pflanzensfam.*, 47. — *Thismiaceæ* MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 615 (Ord.). J.-E. PLANCHON leur a rapporté bien à tort le *Stenomeris*, en 1852.

III? **CORSIÉES**¹. — Fleur irrégulière, avec un des sépales bien plus développé que les autres, qui sont linéaires-subulés. Étamines 6. — Plantes colorées et aphyllées. — 2 genres.

Les deux dernières séries sont formées de petites plantes colorées, tandis que, parmi les Burmanniées, plusieurs espèces sont pourvues de chlorophylle. Il en résulte naturellement dans l'organisation des tissus des particularités plus ou moins notables. Distinctes des Liliacées proprement dites par leur ovaire nettement infère, les Burmanniacées sont comparables aux Amaryllidacées par leur androcée hexandre; et quand elles ont seulement, comme les Iridacées, trois étamines, celles-ci sont en face des pétales et non des sépales. Ces étamines se distinguent par une conformation particulière de celles des Amaryllidacées, et de celles des *Tacca* dont elles n'ont pas le filet en capuchon. On a comparé les Corsiées² aux Orchidacées, en faisant toutefois remarquer que le grand labelle des premières appartient au calice et non à la corolle. Les Hydrocharidacées, qu'on pourrait considérer comme une forme aquatique des Burmanniées, ont, de ce fait, des organes végétatifs tout particuliers et n'ont pas des étamines à conformation aussi exceptionnelle. Les Thismiées semblent représenter une forme inférovariée et syncarpellée des Triuridacées, principalement analogues de celles de ces dernières qui sont légèrement colorées et parasites ou saprophytes.

Les Burmanniacées, au nombre d'une soixantaine, sont des plantes des régions tropicales ou sous-tropicales des deux mondes. Leurs usages³ sont peu importants. Le *Burmannia cœrulea* et l'*Apteria setacea* NUTT. sont des herbes un peu âcres, amères, astringentes; on les a comparées de ce fait au thé vert.

1. B. H., *Gen.*, III, 456, 460, Trib. 3. — ENGL., *Pflanzenfam.*, 50. — *Corsiaceæ* BECC., *Males.*, I, 238.

2. Dont on ne connaît pas le fruit mûr.

3. ENDL., *Enchirid.*, 97. — LINDL., *Veg. Kingd.*, 172.

GENERA

I. BURMANNIÆ.

1. **Burmannia** L. — Flores hermaphroditi regulares; receptaculo sacciformi, concavitate germen inferum fovente perianthioque coronato. Tubus sæpius elongatus, 3-angulatus v. sæpius 3-pterus, alis ad sepalorum loculorumque dorsum productis. Lobi calycini 3, 3-angulares, intus concavi crassiusculi, induplicato-valvati. Petala sinubus affixa 3, minora, minuta v. 0'. Stamina 3, petalis opposita subque eis affixa; filamentis brevissimis v. 0; connectivo crasso lato, ultra loculos varie producto, 1, 2-cristato; antheræ loculis lateralibus, sub-2-lobis, transversim rimosis. Germen 3-loculare; styli inclusi erecti lobis stigmatosis 3, brevibus crassis, apice extus varie concavis. Ovula in placentis axilibus ∞ . Fructus perianthio persistente plus minus diu coronatus, inter alas plus minus evolutas varie ruptus. Semina ∞ , subsphærica v. oblonga, striata v. reticulata; integumento exteriori appresso v. laxo nuncque utrinque producto. Albumen semini conforme carnosum. — Herbæ erectæ simplices (virides v. coloratæ); foliis aut ad squamas reductis, aut basilaribus caulinisque majoribus confertis herbaceis; floribus in summo scapo solitariis v. paucis cymosis; axi nunc 2-furcato; ramis racemiformibus bracteatis. (*Orbis utriusque reg. omn. calid.*) — *Vid. p. 170.*

2. **Campylosiphon** BENTH.¹ — Flores fere *Burmanniæ*; perianthii tubo tenui arcuato exalato; limbi lobis 6, 2-seriatis, lineari-angustatis subæqualibus. Stamina 3, oppositipetala, sub apice tubi inserta; antherarum inclusarum subsessilium connectivo superne haud pro-

1. In *Hook. Icon.*, t. 1384; *Gen.*, III, 458, n. 2. — ENGL., *Pflanzenfam.*, 50, fig. 39, M, N.

ducto; loculis ad latera prominentibus transversimque superposite 2-valvibus. Germen inferum, 6-costatum, 3-loculare; placentis axilibus, ∞ -ovulatis; stylo incluso, ad apicem clavato, apice stigmatoso late 3-lobato. Fructus incurvus, perianthio marcescente coronatus, demum dehiscens (?); seminibus angulatis ∞ . — Herba tenuis carnosula; caule simplici v. apice 2-fida; foliis ad squamas alternas (coloratas) reductis; floribus in racemum terminalem simplicem v. 2-fidum dispositis; pedicellis brevibus. (*Brasilia bor.*¹)

3. **Apteria** NUTT.² — Flores fere *Burmanniæ*; tubo exalato, sub petalis plus minus conspicue sacculato. Calycis lobi concavi, 3-angulares subvalvati. Petala angustiora erecta. Stamina 3, oppositipetala; filamentis brevibus dilatatis; antherarum inclusarum connectivo lato, varie ciliato v. nunc lobulato; loculis lateralibus divaricatis, transversim rimosis, 2-lobis. Germen 1-loculare; styli inclusi lobis crassis divergentibus subglobosis, extus concavis. Placentæ parietales 3, ∞ -ovulatæ. Fructus subsphæricus v. obovoideus, perianthio marcescente diu coronatus, demum inæqui-ruptus v. sub-3-valvis. Semina ∞ , obovoidea reticulata; integumento laxo. — Herba tenera (colorata), simplex v. parce ramosa; squamis alternis concoloribus parvis; floribus terminalibus solitariis v. paucis subspicatis bracteatis nutantibus. (*America trop. et bor. calid.*³)

4? **Dictyostegia** MIERS⁴. — Flores fere *Apteriæ*⁵; perianthii tubo exalato; petalis calyce multo minoribus. Stamina oppositipetala 3; antherarum crassiuscularum subsessilium loculis lateralibus sub-2-lobis. Germen 1-loculare; placentis 3, ∞ -ovulatis; styli inclusi lobis stigmatosis crassis, extus concaviusculis. Fructus sub-3-valvis v. inæqui-ruptus. Semina ∞ , linearia; integumento laxo hyalino reticulato. — Herbæ saprophytæ (coloratæ) simplices v. parce ramosæ; squamis parvis; cyma terminali sæpius 2-fida; ramis plurifloris racemiformibus. (*America trop. utraque, Africa trop.*⁶)

1. Spec. 1. *C. purpurascens* BENTH.

2. In *Journ. Ac. sc. Philad.*, VII, 64, t. 9. — ENDL., *Gen.*, n. 1218¹. — MIERS, in *Trans. Linn. Soc.*, XVIII, 545, t. 38. — B. H., *Gen.*, III, 458, n. 5. — ENGL., *Pflanzenfam.*, 49, fig. 39, A-G. — *Stemoptera* MIERS, in *Proc. Linn. Soc.*, I, 62. — ENDL., *Gen.*, n. 1218¹.

3. Spec. variabilis 1. *A. setacea* NUTT. — BENTH., *Pl. Hartweg.*, 67. — CHAPM., *Fl. S. Un.-St.*, 452. — HOOK., *Icon.*, t. 660. —

GRISEB., *Fl. brit. W.-Ind.*, 606. — MIQ., *St. surin.*, 216, t. 65. — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 196. — *A. lilacina* MIERS. — *A. hymenanthera* MIERS. — WALP., *Ann.*, III, 606.

4. In *Trans. Linn. Soc.*, XVIII, 538, t. 37; in *Ann. Nat. Hist.*, V, 134. — ENDL., *Gen.*, n. 1218¹. — B. H., *Gen.*, III, 458, n. 4. — ENGL., *Pflanzenfam.*, 49, fig. 39, D-G.

5. Cujus sectio (?) inflorescentia magis ramosa.

6. Spec. ad 4. HOOK., *Icon.*, t. 254 (*Ap-*

5. *Gymnosiphon* BL.¹ — Flores fere *Burmanniæ*; perianthii exalati tubo elongato, mox plus minus alte circumcisso; limbi lobis 3, 3-angularibus, nunc basi connatis v. lateraliter lobulatis, induplicato-valvatis. Petala sinubus affixa 3, parva v. 0. Stamina 3, sub petalis affixa; filamentis brevissimis v. 0; antherarum loculis ad connectivum breve crassumque lateralibus, transversim rimosis. Germen 1-loculare; stylo gracili erecto; ramis mox in lobos² terminales stigmatiferos dilatatis; lobis nunc breviter v. longe 2-cornutis. Placentæ parietales 3, ∞-ovulatae. Fructus³ imo tubo coronatus oblongo-obovoides, clavatus v. subsphæricus, apice lateraliterque inæqui-ruptus v. rimosus; seminibus exappendiculatis rugosis exalbuminosis. — Herbæ teneræ (coloratæ v. hyalinæ) haud v. parce ramosæ; squamis alternis parvis; inflorescentia terminali varie cymosa, nunc contracta; ramis basi bracteatis, sæpe divergentibus et racemiformibus; floribus (parvis) nunc ebracteolatis⁴. (*America trop. utraque, Africa trop., Malaisia*⁵.)

II. THISMIEÆ.

6. *Thismia* GRIFF. — Flores hermaphroditi regulares; receptaculo concavo germen intus adnatum fovente. Perianthii superi varie campanulati, ovoideo-oblongi v. turbinati, ori plus minus v. vix constricti, lobis 6, 2-seriatis. Sepala forma varia, plus minus unguiculata, nunc in calyptram v. fornicem conniventia, valvata, demum nunc recurva, appendicibus variis subulatis v. acuminatis erectisque aucta. Petala aut subæqualia, aut sæpius multo minora dentiformia v. subnulla. Stamina 6, fauci affixa, in tubum deflexum conniventia; filamentis brevissimis v. subnullis; antheris 2-ocularibus; loculis linearibus parallelis distinctis rimosis; connectivis plus minus late membranaceo-dilatatis. Germen inferum, 1-loculare; placentis parie-

teria). — BENTH., in *Hook. Kew Journ.*, VII, 13; *Niger Fl.*, 528. — GRISEB., *Fl. brit. W.-Ind.*, 606. — KARST., in *Linnæa*, XXVIII, 421. — HENSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 196.

1. *Enum. pl. jav.*, 29. — ENDL., *Gen.*, n. 1217. — B. H., *Gen.*, III, 458, n. 3. — ENGL., *Pflanzenfam.*, 48. — *Ptychomeria* BENTH., in *Hook. Kew Journ.*, VII, 14. — *Benitsia* KARST., in *Linnæa*, XXVIII, 420.

2. Nunc aurantiacos.

3. Inæqui-refractus dicitur in *Cymbocarpa* MIERS, in *Trans. Linn. Soc.*, XVIII, 543, t. 38, fig. 4.

4. Cum ramulo elevatis.

5. Spec. ad 12. BECC., *Males.*, I, 240, t. 14. — BENTH., in *Hook. Niger Fl.*, 529 (? *Dictyotega*). — WALP., *Ann.*, VI, 38 (*Ptychomeria*), 41 (*Benitsia*).

talibus 3, oppositipetalis, ∞ -ovulatis, plus minus prominulis sæpeque demum a germinis pariete solutis columnaribus. Stylus brevis v. brevissimus, sæpe basi conicus; ramis stigmatosis 3, brevibus crassis, nunc emarginatis. Fructus turbinatus carnosus, perianthio circumcisso deciduo truncatus v. ejus basi annulari coronatus, apice sæpe cupulatus ibique nunc centro dehiscens. Semina ∞ , minuta sub-sphærica v. ovoidea; testa adnata lævi v. rugosa. — Herbæ humiles carnosæ (coloratæ) parasiticæ v. saprophytæ, sæpe simplices, nunc parce ramosæ; foliis ad squamas concolores reductis. Flos terminalis solitarius v. cymosi pauci racemiformes. (*Asia et Oceania trop.*) — *Vid. p. 172.*

III? CORSIÆ.

7. **Corsia** BECC. — Flores irregulares hermaphroditi; receptaculo tubuloso germen intus adnatum fovante. Perianthium superum; sepalis dissimilibus 3 : postico (?) late cordato-subrotundato maximo membranaceo dite venoso patente; anticis autem 2, longe lineari-subulatis reflexo-patentibus. Discus sepalo postico conformis eoque multo brevior subplanus, basi adnatus. Petala 3, sepalis anticis similia æqualiaque. Stamina epigyna 6; filamentis brevibus liberis crassiusculis compressis recurvo-patentibus; antheris terminalibus breviter ovatis; loculis parallelis contiguis, extrorsum rimosis. Germen inferum, sub-3-loculare; placentis parietalibus 3, valde intrusis, 2-fidis; styli ramis stigmatosis brevibus crassis. Ovula ∞ , oblique descendencia, breviter fusiformia. Fructus elongato-cylindraceus exuviis coronatus, 3-valvis; seminibus...? — Herba parasitica v. saprophyta (colorata); rhizomate brevi; caule erecto tenero simplici squamigero; flore terminali solitario. (*Nova Guinea.*) — *Vid. p. 174.*

8. **Arachnites** PHIL.¹ — « Flores irregulares, 4-sexuales; perianthii superi sepalis dissimilibus 3 : postico maximo ovato-lanceolato, ad imam costam glanduloso-incrassato; cæteris cum petalis 3 longe lineari-subulatis patentibus. Stamina 6; filamentis brevibus crassiusculis erecto-inflexis; antheris 1-rimosis. Germen rudimentarium;

1. In *Bot. Zeit.* (1864), 217; in *Verh. Zool.-bot. Ges. Wien*, XV, 517, t. 12. — B. H., *Gen.*, III, 460, n. 10. — ENGL., *Pflanzenfam.*, 51, fig. 40, F, G.

stylo ovoideo, 3-fisso. Staminodia in flore fœmineo minima. Germen inferum latum, 1-loculare; placentis parietalibus 3, ∞ -ovulatis; stylis 3, brevibus crassis, vertice stigmatosis. Fructus sphaericus cupularis, vertice dehiscens. Semina ∞ , minima; testa laxa reticulata, utrinque ultra nucleum parvum longe producta; embryone (?) homoganeo. — Herba parasitica saprophyta? (colorata¹), e rhizomate fasciculato-tuberoso erecta simplex tenuis; foliis ad squamas concolores reductis; flore terminali solitario. (*Chili*².) »

1. « Rubro-fuscata. »

2. Spec. 1. *A. uniflora* PHIL.

CXXVIII

HYDROCHARIDACÉES

1. SÉRIE DES MORÈNES.

Les Morènes (fig. 122-125) qui ont donné leur nom (*Hydrocharis*¹⁾)

Hydrocharis morsus-ranae.

Fig. 122. Fleur mâle.

Fig. 123. Fleur mâle, coupe longitudinale.




Fig. 125. Fleur femelle, coupe longitudinale

Fig. 124. Fleur mâle, diagramme.

à cette famille, ont les fleurs monoïques. Le réceptacle convexe des

¹ L., *Gen.*, ed. I, n. 757; ed. VI, n. 1126. — J., *Gen.*, 67. — LAMK., *III.*, t. 820. — L.-C. RICH., *Adans., Fem. des pl.*, II, 76 (Aristoloches). — in *Mém. Inst. Par.* (1811), 36, 67, t. 9. — TURP.,

mâles porte trois sépales herbacés, imbriqués ou tordus, et trois pétales alternes, bien plus grands, très fragiles, de couleur blanche, sessiles, corrugués et tordus ou imbriqués dans le bouton. L'androcée se compose de neuf étamines fertiles : trois superposées aux sépales; trois alternes; trois autres encore alternipétales. Les six premières ont une anthère extrorse, biloculaire, basifixe, déhiscence par deux fentes longitudinales; et les trois autres ont la déhiscence latérale, introrse ou extrorse. Il y a généralement, en outre, trois staminodes papilleux, entourant un rudiment de gynécée, masse charnue, supère, surmontée d'une, deux ou trois cornes stylaires¹. Dans la fleur femelle, le réceptacle devient un sac qui loge dans sa concavité l'ovaire infère et qui porte sur ses bords un double périanthe, semblable à celui de la fleur mâle; des staminodes épigynes, au nombre de trois, superposés aux sépales, simples ou dédoublés, et trois épaisses glandes qui répondent à la base des pétales. L'ovaire est surmonté de six branches stylaires bifides, et sa cavité est partagée par six placentas centripètes, non unis d'abord au centre, en six loges incomplètes, superposées aux sépales et aux pétales. Sur chaque placenta s'insèrent, de part et d'autre, un grand nombre d'ovules orthotropes, transversaux ou obliques². Le fruit est infère, charnu. Sa pulpe molle renferme des graines en nombre indéfini, orthotropes, à téguments épais, entourant un embryon charnu, subfusiforme, avec une fente latérale au fond de laquelle se trouve la gemmule. L'*H. Morsus-ranæ*³, seule espèce du genre, est une petite herbe vivace des eaux douces. Son rhizome porte des racines adventives et des stolons minces, avec des feuilles alternes, rapprochées, les unes parfaites et les autres réduites à une gaine membraneuse. Les premières ont un long pétiole et un limbe orbiculaire-cordé, entier, qui s'étale à la surface de l'eau. D'entre les feuilles se dégagent les hampes qui portent, ou une fleur⁴, comme il arrive normalement pour les femelles; ou plusieurs fleurs disposées en cyme unipare-scorpioïde; ce qui est souvent le cas des mâles. Celles-ci sont

in *Dict. sc. nat.*, Atl., M., t. 77. — NEES, *Gen. Fl. germ.*, Monoc., III, n. 52. — ENDL., *Gen.*, n. 1216. — B. H., *Gen.*, III, 452, n. 8. — ASCHERS. et GRAE, in *Engl. u. Prantl Pflanzensfam.*, II, 1, p. 258, fig. 191. — *Morsus-ranæ* T., in *Act. Acad. par.* (1705), 237.

1. Parfois très réduites ou nulles, souvent unies à leur base, simples ou bifurquées.

2. A funicule grêle et ascendant. Leur tégument est double.

3. L., *Spec.*, 1466. — REICHEB., *Ic. Fl. germ.*, t. 62. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, V, 662. — FR. et SAV., *En. pl. jap.*, II, 19. — BENTH., *Fl. austral.*, VI, 256. — BOISS., *Fl. or.*, V, 4. — DC., *Fl. fr.*, III, 266. — GREN. et GODR., *Fl. de Fr.*, III, 307. — DUB., *Bot. gall.*, 436. — BRANDZ., *Prodr. Fl. rom.*, 461. — WILLK. et LGE, *Prodr. Fl. hisp.*, I, 161 (*Morène commune*, *Morsus ranæ*, *M. diaboli* off.).

4. Blanche, légèrement odorante.

enveloppées de deux bractées qui se recouvrent l'une l'autre, ou, quand il s'agit de la fleur femelle, d'une seule bractée compliquée. La plante habite l'Europe et l'Asie moyenne; on l'a observée à Madagascar et en Australie où on la suppose introduite.

A côté des Morènes se placent les *Limnobium* et *Hydromystria*, plantes également d'eau douce, américaines, qui ont aussi un double périanthe, de trois à neuf étamines et un ovaire infère, surmonté de trois branches stylaires. Leurs spathes unisexuées et formées de deux folioles, enveloppent ou une fleur femelle, ou bien d'une à trois fleurs mâles.

Le *Stratiotes aloides*, herbe européenne, vivace et submergée, donne son nom à une sous-série (*Stratiotées*). Ses feuilles sont dentées en scie; et ses fleurs unisexuées, à double périanthe, ont de grands pétales blancs. Le nombre des étamines est indéfini dans les mâles en cyme; et les femelles solitaires ont un ovaire infère, multiovulé, surmonté d'un style à six branches simples ou bifurquées, qu'entourent des staminodes en nombre indéfini. Les *Boottia*, de l'Asie et l'Afrique tropicales, ont aussi des fleurs unisexuées et des inflorescences mâles à fleurs nombreuses, en cyme ombelliforme, émergeant d'une sorte d'involucre sacciforme; tandis que les *Ottelia*, asiatiques, africains, océaniens et américains, sont en réalité plus parfaits, puisque leur fleur, solitaire dans sa spathe costée ou ailée, au sommet d'une hampe simple, est normalement hermaphrodite.

Les *Vallisneria*¹ (fig. 126-131), type d'un groupe (*Vallisnériées*) souvent élevé au rang de tribu, ont des fleurs dioïques. Dans les mâles, le réceptacle est convexe et porte un petit calice à trois divisions valvaires. A ces divisions se superposent un même nombre d'étamines, ou deux, ou une seule. Elles peuvent être toutes fertiles, formées d'un filet épais, à insertion centrale, et d'une anthère basifixe, à quatre lobes obtus, qui s'étalent en panneaux irréguliers pour laisser sortir le pollen. Ou bien il y a une, plus rarement deux de ces étamines, qui sont réduites à un staminode en forme de baguette. Souvent, en outre, à deux étamines fertiles s'interpose un appendice

1. MICHEL, *Nov. pl. gen.* (1729), 12, t. 10. — L., *Gen.*, ed. I, n. 741; ed. VI, n. 1097. — J., *Gen.*, 67. — LAMK, *Ill.*, t. 799. — ADANS., *Fam. des pl.*, II, 76 (Aristoloches). — L.-C. RICH., in *Mém. Inst. Par.* (1811), 12, 62, t. 3. — TURP., in *Dict. sc. nat.*, Atl., t. 78, 79. — NEES, *Gen. Fl. germ.*, *Monoc.*, III, n. 50. —

ENDL., *Gen.*, n. 1209. — A. CHAT., *Mém. Vallisn.* (1855). — B. H., *Gen.*, III, 451, n. 4. — J.-F. MUELL., *Entw. v. Vallisn.*, in *Hanst. Bot. Abh.*, III (1878), 31, t. 6-9. — H. BN, in *Adanson*, XII, 256, t. 8, fig. 18-25. — ASCHERS. et GRKE, *Pflanzenfam.*, 251, fig. 184, G, H. — *Physcium* LOUR., *Fl. cochinch.*, 662.

conique ou subulé et alternisépale. Dans la fleur femelle, le réceptacle prend la forme d'un long tube cylindrique qui enveloppe l'ovaire

Vallinaria spiralis.




Fig. 130. Fleur femelle.

Fig. 127. Plante mâle.



Fig. 127. Inflorescence mâle.

Fig. 129. Plante femelle.

Fig. 131. Fleur femelle, coupe longitudinale.

Fig. 128. Fleur mâle.

infère et dont les bords portent trois sépales valvaires, avec un, deux ou trois staminodes alternes, entiers, bifides ou même nuls. Le style,

très épais et très court, se partage immédiatement en trois lobes stigmatifères oppositisépales, simples ou bilobulés, chargés de papilles stigmatiques. Dans la loge unique de l'ovaire proéminent faiblement trois placentas pariétaux, alternisépales, chargés d'ovules ascendants, orthotropes, supportés par un funicule et à micropyle supérieur¹. Le fruit est cylindrique, linéaire, membraneux; il renferme de nombreuses graines atténuées à leur base, et dont les téguments membraneux recouvrent un embryon charnu, à très petite gemmule cachée dans une fente latérale peu visible.

Le *V. spiralis*² est, pour bien des auteurs, la seule espèce du genre, avec plusieurs variétés. C'est une petite herbe submergée³, à rhizome court, portant des racines adventives et assez souvent des stolons. Les feuilles, longuement et étroitement linéaires, molles, se dilatent à leur base en une courte gaine; elles sont alternes et très rapprochées les unes des autres. Entre elles s'élèvent des hampes qui, dans le pied mâle, sont courtes et dressées, terminées par plusieurs cymes unipares de fleurs pédicellées, et dont le pédicelle grêle se rompt, au moment de l'anthèse, sous le bouton qui s'élève vers la surface de l'eau. Dans le pied femelle, les hampes sont très longues et spiralées, de façon à porter, en se déroulant, la fleur jusqu'à la surface du liquide. Après la fécondation, les tours de la spirale se rapprochent et ramènent au fond de l'eau le fruit qui doit y mûrir⁴. Sous la fleur femelle, comme sous l'inflorescence mâle, le pédoncule porte un involucre ou spathe. C'est un sac membraneux, gamophylle, ovoïde dans le pied mâle, cylindrique dans le pied femelle où il entoure étroitement l'ovaire, puis le fruit, et qui est formé de deux ou trois bractées, distinctes seulement d'abord à leur extrême sommet. On a observé la plante dans presque toutes les régions chaudes et tempérées des deux mondes.

Mais on a encore adjoint aux Vallisnères, comme sous-genre, le *Nechamandra*⁵, dont le type, des eaux douces asiatiques et africaines, est le *Vallisneria alternifolia* ROXB.⁶, parfois aussi uni aux *Lagaro-*

1. A double tégument.

2. L., *Spec.*, 1441. — HOOK. F., *Fl. tasm.*, II, 37; *Fl. brit. Ind.*, VI, 660. — FR. et SAV., *En. pl. jap.*, II, 18. — BENTH., *Fl. austral.*, VI, 258. — RIDL., in *Journ. Linn. Soc.*, XXII, 236. — BOISS., *Fl. or.*, V, 3. — WILLK. et LGE., *Prodr. Fl. hisp.*, I, 160. — REICHB., *Ic. Fl. germ.*, t. 62. — DC., *Fl. fr.*, III, 267. — GREN. et GODR., *Fl. de Fr.*, III, 308. — *V. nana* R. BR., *Prodr.*, 345. — *Physicum natans* LOUR.

3. Dans les eaux douces, et aussi, dit-on, dans les eaux salées du golfe du Mexique.

4. Sur l'accroissement de la hampe, A.-W. BENN., in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I, 133; in *Trim. Journ.* (1877), 243.

5. J.-E. PL., in *Ann. sc. nat.*, sér. 3, XI, 78 (part.). — THW., *En. pl. Zeyl.*, 332.

6. *Fl. ind.*, III, 750. — WIGHT, in *Hook. Bot. Misc.*, III, 344; *Suppl.*, t. 11. — HAM., in *Edinb. Journ. sc.*, I, 34.

*siphon*¹, et qui a les feuilles inférieures opposées, serrulées; la spathe mâle axillaire et sessile; des pétales plus courts que les sépales ou même nuls, et un bec aigu à l'ovaire et au fruit. Ses anthères sont souvent au nombre de deux. Ses tiges grêles portent des feuilles aiguës, souvent tordues.

Elodea canadensis.

Les *Blyxa*, de l'Asie tropicale, des îles Mascareignes et de Madagascar, sont voisins des Vallisnères par leurs spathes uni-

Halophila ovalis.



Fig. 132. Fleur femelle.

sexuées : les femelles uniflores et les mâles pluriflores. Leur pédoncule femelle ne s'enroule pas en spirale. Ces plantes ont de trois à neuf étamines, un calice et une corolle dans les fleurs des deux sexes; et leurs styles à trois branches stigmatiques longues et grêles existent aussi dans les unes et les autres.

Avec de plus grandes dimensions que les Vallisnères, les *Enallus*, asiatiques et océaniens, ont tout à fait la même organisation fondamentale. Ils ont aussi des fleurs femelles à style de Stratiotées, solitaires au bout d'une grande hampe qui peut se dérouler et porter la fleur au-dessus de l'eau, tandis que les mâles, en grand nombre dans leur spathe, au sommet d'un pédoncule court, se détachent pour venir flotter à la surface. Mais ce sont des plantes marines, à grandes feuilles linéaires (*Thalassières*). A côté de ce genre se placent les *Thalassia*, des mers chaudes de l'ancien monde, dont les fleurs sont apétales et dont le fruit mûr est partagé en lanières



Fig. 133. Rambeau florifère femelle.

par des fentes longitudinales interplacentaires. Les *Halophila*

1. *L. Roxburghii* BENTH. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, V, 659. — BALF. F., *Bot. Socot.*, 284.

(fig. 132), des mêmes mers, sont plus réduits encore : leurs fleurs des deux sexes, très petites, solitaires dans leur spathe, n'ont qu'un calice court, trois étamines ou un ovaire à long bec, avec des placentas pariétaux pluriovulés. Leurs petites spathes diphylls sont solitaires au niveau des feuilles courtes, sur des axes stolonifères grêles et radicants.

Les *Hydrilla*, plantes submergées des eaux douces de l'Asie et de l'Océanie, donnent leur nom à une sous-série (*Hydrillées*), formée d'herbes délicates, ramifiées, à branches feuillées longues et grêles. Les fleurs des deux sexes sont axillaires et solitaires, sessiles, enveloppées d'une spathe formée de deux folioles; et l'ovaire infère n'a qu'une loge, avec des placentas pariétaux, peu saillants, pluriovulés. Le style est partagé en trois branches papilleuses, et les ovules sont anatropes, tandis qu'ils sont orthotropes dans les deux genres voisins *Elodea* (fig. 133) et *Lagarosiphon*; ce dernier à feuilles alternes, tandis que dans les deux autres genres du groupe, elles sont ou opposées, ou plus généralement verticillées.

Cette petite famille fut établie en 1789 par A.-L. DE JUSSIEU¹; mais il y comprenait les Nymphæacées et les *Nepenthes*. SPRENGEL² alla plus loin, y faisant en outre rentrer les Alismacées et plusieurs Onagrariacées aquatiques. Les Hydrocharidées de L.-C. RICHARD³ furent bien plus nettement délimitées, et LINDLEY qui, en 1847, leur donna leur nom actuel⁴, n'y admit, comme lui, que des Monocotylédones aquatiques à ovaire infère. Ces plantes représentent donc la forme aquatique⁵ des Amaryllidacées, Broméliacées, Burmanniacées et Iridacées, en même temps que la forme à ovaire infère des Pontédériées, Naiadées et Alismacées. Les quatorze genres qu'on y con-

1. *Gen.*, 67, Ord. 4 (*Hydrocharides*).

2. *Anleit.*, II, 1, 262, Fam. 21 (1817).

3. In *Mém. Inst. Par.* (1811). — B. H., *Gen.*, III, 448, Ord. 167. — ENDL., *Gen.*, 160, Ord. 59.

4. *Hydrocharidaceæ* LINDL., *Veg. Kingd.*, 141 (*Hydrallium* Ord.). — *Hydrocharitaceæ* ASCH. et GRKE, *Pflanzenfam.*, 238. — *Vallisneriaceæ* LINK. — *Stratiotææ* LINK, *Handb.*, I, 281. — *Anacharideæ* ENDL., *Gen.*, 161. — *Hydrilleæ* CASP., in *Mon. Berl. Akad.* (1858), 39. — *Stratiotææ* REICHB., *Consp.*, 45.

5. Elles doivent à leur station des particularités organographiques et anatomiques remar-

quables (voy. SCHENCK, *Vergl. Anat. d. submerg. Gew.* (1886). — NOLTE, *Bot. Bem. Stratiotes u. Sagittaria* (1825). — H. DE VRIESE, in *Ned. Kruidk. Arch.* (1872), I, 203. — ASCHERS., in *Monatsb. Nat. Freund.* (1875), 101; in *Sitzungsber. Bot. Ver. Prov. Brandenb.* (1875), 80. — HOLM, in *K. Svensk. Vet.-Akad. Handling.* (1885), et les recherches spéciales de M. A. CHATIN, dans la première partie de son *Anatomie comparée des végétaux*; puis celles relatives à l'histologie des tiges, feuilles, etc., de M. SAUVAGEAU, dans le *Journal de Morot* (1890), 269 et seq. pass.

serve renferment une cinquantaine d'espèces, qui habitent¹ les eaux douces ou salées des régions chaudes et tempérées des deux mondes. Trois d'entre eux seulement appartiennent à l'Amérique.

Ce sont des plantes peu utilisées². Toutes celles qui habitent la mer et ressemblent aux Zostères par leurs feuilles, peuvent être employées aux mêmes usages économiques. On cite comme plantes comestibles l'*Enalus acoroides*³, l'*Ottelia alismoides*⁴, le *Boottia cordata*⁵ et quelques autres, dont on consomme soit les fruits, soit les rhizomes. L'*Hydrocharis Morsus-ranæ*⁶ (fig. 122-125), probablement fort peu actif, passe, dans nos campagnes, pour mucilagineux et légèrement astringent. Sous le nom de *Jangi*, on utilise dans l'Inde, pour raffiner le sucre, des *Vallisneria* et des *Hydrilla*⁷. Les phénomènes qui accompagnent la fécondation et la maturation des fruits des Vallisnères ont beaucoup occupé les naturalistes et même les poètes. On observe absolument les mêmes faits, dans les bas-fonds maritimes de l'Asie et de l'Océanie, chez l'*Enalus acoroides*.

1. Voy. ASCHERS., in *Neumay. Anl. Wiss. Berb. Reis.* (1888), 191.

2. ENDL., *Enchir.*, 96. — LINDL., *Veg. Kingd.*, 141. — ROSENTH., *Syn. pl. diaphor.*, 107, 1082.

3. Voy. p. 196, not. 4.

4. PERS., *Syn.*, I, 400. — *Damasonium indicum* W. — ROXB., *Pl. corom.*, II, t. 85. — *Stratiotes alismoides* L., *Spec.*, 526.

5. WALL., *Pl. as. rar.*, I, 51, t. 65. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 238. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 662.

6. Voy. p. 184, not. 3.

7. Ce sont, dit-on, l'*Hydrilla verticillata*, α *Roxburghii* CASP. et le *Vallisneria alternifolia* ROXB. On a considéré leur rôle comme purement mécanique.

GENERA

1. **Hydrocharis** L. — Flores regulares diœci; masculorum receptaculo breviter convexo. Sepala 3, membranacea subherbacea imbricata. Petala 3, alterna, multo longiora latioraque tenuiter membranacea (colorata) imbricata v. torta corrugata. Stamina sæpius 12, quorum oppositisepala 6 totidemque oppositipetala; filamentis 6, 2-fidis, quorum 9 antherifera; 3 autem sæpe sterilia; antheris basifixis brevibus; loculis adnatis, lateraliter, introrsum v. extrorsum rimosis. Gynœcei rudimentum centrale varium. Floris fœminei receptaculum oblongo-ovoideum germenque intus adnatum fovens, perianthium (marium) margini insertum ferens. Glandulæ oppositipetalæ 3. Staminodia intra corollam numero varia, linearia. Styli rami stigmatosi 6, lineares, 2-fidi. Placentæ parietales 6, valde intrusæ, intus fere contiguæ. Ovula ∞ , placentis inserta, in pulpa mucosa nidulantia, orthotropa; funiculo tenui. Fructus carnosus, intus pulposus, spurie 6-locularis. Semina ∞ , nidulantia; embryone carnosio conformi; gemmula intra fissuram lateralem tenuem recondita. — Herba perennis fluitans stolonifera; radicibus evolutis; foliis ad nodos fasciculatis petiolatis; perfectorum limbo cordato-orbiculato natante. Scapi inter folia erecti, spatham 1, 2-phyllam sub inflorescentia gerentes; bractea exteriori interiorem amplectente; floribus masculis ∞ , intra spatham 1-pari-cymosis; fœmineo autem plerumque solitario. (*Europa et Asia media.*) — *Vid. p. 183.*

2. **Limnobium** L.-C. RICH.¹ — Flores (fere *Hydrocharidis*) monœci; sepalis 3 petalisque totidem alternis tenuioribus imbricatis. Stamina 9-12; fertilium antheris basifixis linearibus; locu-

1. In *Mém. Inst. Par.* (1811), 32, 66, t. 8. — XII, 4. — B. H., *Gen.*, III, 452, n. 7 (part.).
 ENDL., *Gen.*, n. 1215. — SPACH, *Suit. à Buff.*, — ASCHERS. et GRKE, *Pflanzenfam.*, 258.

lis connectivum marginantibus. Gynæcei rudimentum varium; ramis sæpius 3, setiformibus. Floris fœminei receptaculum supra germen tubulosum; perianthio marium. Staminodia 3-6. Germen inferum, imperfecte 6-loculare; placentis valde prominentibus, ∞ -ovulatis. Ovula orthotropa; funiculo tenui. Styli rami sæpius 6, subulati simplices v. sæpius 2-fidi. Fructus baccatus, ∞ -spermus; embryone exalbuminoso ceterisque *Hydrocharidis*. — Herba perennis aquatica; foliis¹ in rhizomate basilaribus petiolatis orbiculato-reniformibus cordatis, subtus spongioso-reticulatis; floribus cymosis ad 10; fœmineorum pedicello longiore, demum cernuo. (*America bor. et austr. extratrop.*²)

3. **Hydromystria** G.-F. MEY.³ — Flores (fere *Limnobia*) monœci v. diœci; sepalis 3, imbricatis. Petala 3, imbricata v. torta. Stamina 6-12. Staminodia in flore fœmineo 3-6, conico-subulata. Germen inferum cylindraceum, 1-loculare; placentis parietalibus parum prominulis, ∞ -ovulatis. Ovula orthotropa⁴. Styli rami 6, simplices v. sæpius 2-furcati subulati. Fructus baccatus cæteraque *Limnobia*. — Herbæ aquaticæ perennes; rhizomate sæpius brevi radiceifero v. stolonifero; foliis ovatis v. orbiculatis; floribus⁵ in spatha 2-folia paucis (1-3). (*America calid. et temp. utraque*⁶.)

4. **Stratiotes** L.⁷ — Flores diœci; masculorum receptaculo convexo parvo. Sepala 3, herbacea, dorso carinata, imbricata. Petala 3⁸, alterna, longiora (tenuiter membranacea), imbricata v. torta corrugata. Stamina ∞ ; exteriora ∞ ad staminodia subulata reducta; interiora autem fertilia 9-15; filamentis brevibus erectis; antheris lineari-elongatis basifixis; loculis linearibus, lateraliter v. subextrorsum rimosis. Floris fœminei receptaculum lageniforme; perianthio (marium) ori inserto. Staminodia epigyna subulata ∞ . Germen inferum oblongum longe rostratum, sub-6-loculare; pla-

1. Et habitu *Hydrocharidis*.

2. Spec. 1. *L. Spongia*. — *L. Bosci* L.-C. RICH. — GRISEB., *Symb. Fl. argent.*, 281. — *Hydrocharis Spongia* BOSCH, in *Ann. Mus.*, IX, t. 30.

3. *Prim. Fl. essequib.*, 152. — ASCH. et GRKE, *Pflanzenfam.*, 257. — *Jalambicea* LL. et LEX., *Nov. veg. Desc.*, II, 12. — Trianea KARST., in *Linnaea*, XXVIII, 424.

4. Integumento duplici.

5. Minimis, albidis v. viridulis.

6. Spec. 2, 3. BENTH., *Gen.*, III, 452 (*Limnobium*, part.). — GRISEB., *Fl. brit. W.-Ind.*, 506 (*Limnobium*, part.). — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 196.

7. *Gen.*, ed. I, n. 454; ed. VI, n. 685. — J., *Gen.*, 67. — LAMK., *Ill.*, t. 489. — RICH., in *Mém. Inst. Par.* (1811), II, 64. — NEES, *Gen. Fl. germ., Monoc.*, III, n. 51. — ENDL., *Gen.*, n. 1211. — B. H., *Gen.*, III, 454, n. 11. — ASCH. et GRKE, *Pflanzenfam.*, 255.

8. Alba, majuscula.

centis intus nunc contiguis; styli ramis 6, subulatis canaliculatis, sæpe 2-fidis. Ovula ∞ , adscendentia anatropa; micropyle introrsum infera. Fructus¹ ovoideus acuminatus baccatus, mox exsertus recurvusque. Semina in muco gummoso nidulantia; integumentis crassiusculis; embryonis conformis carnosus gemmula intra fissuram lateralem recondita. — Herba submersa perennis; caule brevi stolonifero; foliis basilaribus crebris confertis lineari-lanceolatis argute serratis. Scapi axillares, sub floribus 2-bracteati; bracteis rigidis acutis; extima complicata intimam amplectente; flore fœmineo solitario; masculis autem cymosis 2- ∞ ; singulis bractea membranacea complicata stipatis; omnibus sub anthesi supra aquam exsertis. (*Europæ temp. aquæ dulces*².)

5. *Boottia* WALL.³ — Flores (fere *Stratiotis*) monœci; masculorum sepalis 3, oblongis v. linearibus. Petala 3, multo majora obovato-oblonga tenuiter membranacea imbricata. Stamina 6-12; antheris erectis oblongis, ad margines rimosis. Gynœcei rudimentum pulvinatum carnosum; stylis 3, longe petaloideis, 2-fidis. Floris fœminei perianthium (marium) summo tubo insertum. Staminodia parva ∞ . Germen inferum; stylis 6-15, lineari-filiformibus, 2-fidis; loculis totidem subcompletis; placentis valde intrusis in centro conniventibus. Ovula ∞ , septa spuria undique obtegentia. Fructus carnosus. Semina ∞ ; integumentis crassiusculis pulpa mucosa indutis; embryo carnosus. — Herbæ submersæ perennes; rhizomate nunc crasso in limo radicante; foliis confertis petiolatis, ovato-oblongis v. late cordatis. Spathæ 1-sexuales tubulosæ v. demum lageniformes v. subfusiformes, ∞ -costatæ, breviter 2-fidæ; costis lateralibus 2 nunc magis prominentibus nec alatis. Flores masculi in spatha plures cymosi pedicellati; fœmineus autem intra spatham sessilis 1. (*Asia et Africa trop.*⁴)

6. *Ottelia* PERS.⁵ — Flores (fere *Boottia*) hermaphroditi; recep-

1. GÆRTN., *Fruct.*, I, t. 14, fig. 8.

2. Spec. 1. *S. aloides* L., *Spec.*, 754. — DC., *Fl. fr.*, III, 266. — NOLTE, *Bem. ub. Strat. u. Sagitt.* (in-4), t. 1. — REICHB., *lc. Fl. germ.*, t. 61. — GREN. et GODR., *Fl. de Fr.*, III, 307. — T. IRM., *Beitr. Strat.*, in *Flora* (1865), 81, t. 1. — *Aloides* BOERH.

3. *Pl. as. rar.*, I, 51, t. 65. — ENDL., *Gen.*, n. 1214. — B. H., *Gen.*, III, 453, n. 10. — ASCH. et GRKE, *Pflanzenfam.*, 255, fig. 189.

4. Spec. 8, 9. SPACH, *Suit. à Buff.*, XII, 4. — PL., in *Ann. sc. nat.*, sér. 3, XI, 81 (*Damasonium*). — BAK., in *Trans. Linn. Soc.*, XXIX, 151 (*Ottelia*). — RIDL., in *Journ. Linn. Soc.*, XXII, 239, t. 13. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, V, 662. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 238.

5. *Syn.*, I, 400. — L.-C. RICH., in *Mém. Inst. Par.* (1811), 27, 65, t. 7. — J., in *Dict.*, XXII, 121. — ENDL., *Gen.*, n. 1213. — B. H., *Gen.*, III, 453, n. 9. — ASCH. et GRKE, *Pflan-*

taculo germen fere totum fovente. Sepala 3, margini inserta, oblonga v. linearia membranacea rigidula. Petala 3, alterna, multo majora obovata, appendiculis obovoideis carnosis basi instructa. Stamina 6- ∞ , epigyna; filamentis plus minus dilatatis; antheris linearibus v. oblongis erectis, ad margines rimosis. Germen inferum, apice rostratum; styli ramis 6, linearibus, sub-2-fidis. Placentæ parietales 6, valde intrusæ atque germinis ad centrum conniventes; ovulis ∞ , placentas undique obtegentibus. Fructus inferus, ovoideo-oblongus, spatha inclusus; pericarpio crassiusculo, apice attenuato. Semina ∞ , in pulpa viscosa nidulantia oblonga; embryonis conformis carnosus gemmula intra fissuram brevem laterali. — Herbæ perennes; caule brevi; foliis basilaribus confertis, aut submersis breviterque petiolatis, aut natantibus limboque lato ovato, oblongo, cordato v. reniformi petioloque longo donatis; floribus¹ in summo scapo longo solitariis; spatha herbacea tubulosa, 2-fida v. 2-dentata, ∞ -nervi v. nunc 2-pluricostata v. alata, florem demum emersum involucrante; alis sæpius inæqualibus undulatis. (*Asia, Oceania, Africa cont. et ins. trop., Brasilia*².)

7. Vallisneria L. — Flores diœci; masculorum receptaculo minuto convexo. Sepala 3, valvata. Stamina totidem opposita centralia, v. 1, 2; filamento crasso; anthera basifixæ, obtuse 4-loba irregulariter dehiscente; nunc ad staminodia reducta. Appendicula nunc alternisepala 1, subulato-conica. Floris fœminei masculo multo majoris receptaculum tubulosum germen intus adnatum fovens marginique perianthium (marium) staminodiaque 1-3 gerens. Stylus brevissimus crassissimusque; lobis stigmatiferis brevibus, simplicibus v. 2-lobulatis. Placentæ in germine parietales 3; ovulis ∞ , adscendentibus orthotropis; micropyle supera; funiculo tenui. Fructus cylindræus membranaceus; seminibus ∞ , basi attenuatis; embryone conformi carnosus; gemmula in fissura laterali recondita. — Herbæ submersæ perennes; rhizomate brevi, nunc stolonifero. Folia basilaria conferta longissime angustèque linearia, basi bre-

zenfam., 257, fig. 190. — *Damasonium* SCHREB., *Gen.*, 242 (non J.).

1. *Albis, majusculis.*

2. *Spec. 8, 9. SM., Exot. Fl.*, t. 15 (*Stratiotes*). — HEDW., *Gen.*, 255. — ROXB., *Pl. corom.*, t. 185 (*Damasonium*). — MIQ., in *Ann. Mus. lugd.-bat.*, II, 271. — PL., in *Ann. sc. nat.*,

sér. 3, XI, 81 (*Damasonium*). — BENTH., *Fl. austral.*, VI, 256. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, V, 662. — FR. et SAV., *En. pl. jap.*, II, 19. — RIDL., in *Journ. Linn. Soc.*, XXII, 237. — A. RICH., *Fl. abyss.*, II, 280, t. 95. — BOISS., *Fl. or.*, V, 5. — *Bot. Mag.*, t. 1201 (*Damasonium*). — WALP., *Ann.*, III, 510.

viter vaginantia. Scapi masculi breves recti floribusque dense 1-paricymosis terminati; spatha sub floribus ovoidea, breviter 2, 3-fida. Scapi fœminei longissime filiformes cylindranei spirales flore unico terminati; spatha circa florem cylindranea, breviter 2, 3-fida fructumque involvente. (*Orbis utriusque regionum calid. et temp. aque dulces et (?) « salsæ ».*) — *Vid. p. 185.*

8. **Blyxa** DUP.-TH.⁴. — Flores (fere *Vallisneriæ*) 1-sexuales. Masculorum perianthium duplex; sepalis oblongis 3. Petala 3, multo angustiora longioraque, nunc subfiliformia. Stamina 3 (*Diplosiphon*²), v. 6-9; filamentis brevibus; antheris erectis lineari-oblongis, 2-rimosis (in staminibus nunc 1 v. paucis effœtis v. rudimentariis sterilibus). Germen rudimentarium centrale; stylis 3, basi nunc dilatatis, cæterum linearibus. Floris fœminei perianthium tubi ori longissimi insertum superum, ei marium simile. Staminodia epigyna pauca minuta v. 0. Germinen inferum valde elongatum lineare, apice longe attenuato-rostratum, 1-loculare; placentis parietalibus 3; styli ramis simplicibus lineari-filiformibus 3. Ovula in placentis singulis ∞. Fructus inferus longe linearis membranaceus, spatha inclusus. Semina ∞, oblonga, pulpa mucosa extus induta. — Herbæ submersæ; radicibus fasciculatis; caule brevissimo. Folia conferta longe lineari-subulata; scapis inter folia brevibus immersis v. valde elongatis, spathiferis. Spatha 1-sexualis, apice 2-fida³; floribus masculis in ea pluribus stipitatis; fœminea autem florem sessilem 1 fovente. (*Asiæ trop., Australiæ et Africæ orient. insul. aque dulces*⁴.)

9. **Enallus** L.-C. RICH.⁵ — Flores diœci; masculorum minimorum receptaculo minuto convexo. Sepala 3, ovato-ellipsoidea petalaeque totidem subsimilia tenuiora. Stamina 3, oppositisepala; antheris subsessilibus ovatis erectis, ad margines rimosis. Floris fœminei masculo multo majoris receptaculum lageniforme sessile,

1. *Gen. nov. madag.*, 4. — L.-C. RICH., in *Mém. Inst. Par.* (1811), II, 63, t. 4, 5. — ENDL., *Gen.*, n. 1210. — B. H., *Gen.*, III, 451, n. 5. — ASCH. et GRKE, *Pflanzenfam.*, 252, fig. 186, 187. — *Saivala* WALL., herb.

2. DCNE, in *Jacquem. Voy. Bot.*, 166, t. 167. — *Hydrotrophus* C.-B. CLKE, in *Journ. Linn. Soc.*, XIV, 8, t. 1. — B. H., *Gen.*, III, 452, n. 6.

3. Nunc raro echinata.

4. Spec. ad 6. ROXB., *Pl. corom.*, t. 165 (*Val-*

limeria). — BENTH., *Fl. austral.*, VI, 258. — THW., *En. pl. Zeyl.*, 332. — RIDL., in *Journ. Linn. Soc.*, XXII, 236, t. 14. — JON., in *As. Res.*, IV, 275. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, V, 660. — BOISS., *Fl. or.*, V, 4.

5. In *Mém. Inst. Par.* (1811), 64 (*Enhalus*). — ENDL., *Gen.*, n. 1212. — MEISSN., *Gen.*, 365 (273). — GRIFF., *Notul.*, III, 175; *lc. pl. as.*, t. 249, 250. — B. H., *Gen.*, III, 454, n. 12. — ASCH. et GRKE, *Pflanzenfam.*, 254.

extus aculeatum, superne in collum rostriforme productum. Sepala 3, supera oblonga, imbricata v. subvalvata. Petala 3, alterna longiora angustioraque tenuiora, plicato-corrugata demumque ex parte exserta. Germen inferum, 1-loculare; placentis parietalibus ad 6, inferne ovuligeris; stylis 6-15, lineari-subulatis¹. Ovula in placentis singulis pauca adscendentia subsessilia anatropa; micropyle infera. Fructus ovoideus carnosus, ob placentas accretas² sub-6-locularis. Semina pauca adscendentia³; integumento exteriori celluloso. Embryo conformis; cotyledone subconica exserta laterali, 2-labiata; gemmula magna recondita polyphylla; foliolo extimo a basi lineari, apice serrulato. — Herba submersa marina; rhizomate crasso repente, foliorum detritorum fibris dense crinito. Folia longissime linearia plana angusta, per 2-5 folio brevi ad vaginam reducto stipata, ad margines crassiora apiceque obtuso denticulata. Scapi masculi inter folia breves compressi, apice ∞ -flori; floribus creberrimis 1-pari-cymosis, a pedicello tenui sub anthesi solutis superficiemque aquæ petentibus. Scapi fœminei multo longiores rigiduli rugosi erecti floremque unicum terminalem super aquam producentes, post anthesin spiraliter contracti; flore tunc submerso; maturitate autem fructum iterum emersum elevantes. Spatha sub flore fœmineo et sub inflorescentia mascula 2-phylla; bractea extima intimam subæqualem amplexante. (*Asia et Oceania calid.*⁴)

10. **Thalassia** SOLAND.⁵ — Flores (fere *Enali*) 1-sexuales; masculorum calycis foliolis 3, 4, lineari-elongatis tenuiter membranaceis⁶, reflexis revolutisque; præfloratione imbricata. Stamina 6-9; antheris subsessilibus erectis, lineari-elongatis, apiculatis, 2-locularibus, extrorsum v. ad margines rimosis. Floris fœminei receptaculum longe lageniforme germen inferum concavitate fovens inque collum longe attenuatum. Perianthium (masculorum) receptaculi ori insertum; styli ramis subulatis numero variis, simplicibus v. 2-fidis. Ovula in placentis parietalibus pauca adscendentia. Fruc-

1. An exteriores staminodia referentes?

2. Demum farinoso-carnosus.

3. Mucilagine induta.

4. Spec. 1. *E. acoroides* STEUD. — ZOLL., *Verz.*, II, 69. — BOISS., *Fl. or.*, V, 6. — ASCH., in *N. Giorn. bot. ital.*, III, 299; in *Linnaea*, XXXV, 158. — *E. Kœnigii* L.-C. RICH. — HOOK. f., *Fl. brit. Ind.*, V, 663. — *E. marinus* GRIFF. — *Stratiotes acoroides* L. FIL., *Suppl.*, 268. —

POIR., *Dict.*, VII, 465. — *Acorus marinus* RUMPH., *Herb. amboin.*, VI, 191, t. 75, fig. 2.

5. In *Kœn. et Sims Ann. bot.*, II, 96. — ENDL., *Gen.*, n. 1658. — ASCH., in *Neum. Anl. Wiss. Berb.*, 361; *Pflanzenfam.*, 254, fig. 181, 188. — B. H., *Gen.*, III, 455, n. 13. — *Schizotheca* EHRENB. et SCHWEINF., *Beitr. Fl. æthiop.*, 293.

6. Tenuiter purpureo-lineatis.

tus receptaculo lævi v. varie echinato inclusus, demum inter placentas ab apice fissus stellatimque patens; valvis inæqualibus 3-∞. Semina pauca v. ∞, pulpa induta, adscendentia; embryone demum valde accreto¹, apice plus minus attenuato. — Herbæ marinæ² submersæ perennes; rhizomate in limo longe repente annulato; ramis ad nodos brevibus erectis foliiferis. Folia alterna conferta longe lineari-loriformia, vaginis exterioribus paucis scariosis basi cincta. Flores in summo scapo erecto compresso solitarii; spatha sub flore tubulosa e bracteis connatis membranaceis 2, sub anthesi ab apice solutis, confecta. (*Mariu Rubrum*, *Indicum*, *Oceania*³.)

11. *Halophila* DUP.-TH.⁴ — Flores diœci; masculorum receptaculo minuto convexo. Sepala 3, ovata concava membranaceo-subherbacea imbricata. Stamina alterna 3; antheris centralibus subsessilibus linearibus erectis, extrorsum rimosis. Floris fœminæ receptaculum lageniforme; collo tenui elongato, apice perianthium minutum 3-merum gerente. Germen inferum receptaculo inclusum, 1-loculare; stylis 3 perlongis lineari-subulatis tenuissimis, undique minute stigmatoso-papillosis. Placentæ parietales 3, vix prominulæ, pluriovulatæ; ovulis anatropis, 2-seriatim adscendentibus; micropyle extrorsum infera. Fructus subsphæricus, receptaculi tubo coronatus membranaceus. Semina subsphærica, breviter funiculata; integumento tenui subreticulato; embryonis carnosus granulosis gemula cum cotyledone vaginante in fossula apicali prominente arcuata v. spiraliter parce torta. — Herbæ mari submersæ tenues; caulibus gracilibus repentibus ad nodos foliatis radicanibusque. Folia perfecta petiolata ovato-oblonga penninervia ad nodum quemque 2-na; rudimentaria tertia exteriori ad squamam hyalinam caulemque amplectentem reducta; floribus⁵ in spatha e bracteis 2 circa fructum persistentibus constante solitariis; masculo pedunculato. (*Maria Rubrum*, *Pacificum*, *India or.*, *China*, *Africa trop.*, *Oceania trop.*⁶)

1. Carnoso, albido, bulbiformi.

2. *Cymodoceæ* fere habitu.

3. Spec. 2. POIR., *Suppl.*, V, 94. — SOLMS, in *Schweinf. Beitr. Fl. æthiop.*, 194, 246 (*Schizotheca*). — EHRENB., in *Abh. Berl. Akad.* (1832), I, 429. — MAGN., in *Sitzb. Naturf. Fr. Berl.* (1870), 86. — BOISS., *Fl. or.*, V, 7.

4. *Gen. nov. madag.*, 2. — GAUDICH., in *Freycin. Voy. Bot.*, 429, t. 40, fig. 1. — ENDL., *Gen.*, n. 1837. — ASCHERS., in *N. Giorn. bot.*

ital., III, 300; in *Neum. Anl. Wiss. Beob.*, 367; *Pflanzensam.*, 247, fig. 182. — BALF. F., in *Trans. Bot. Soc. Edinb.*, XIII, 290, t. 8-11, 16. — B. H., *Gen.*, III, 455, n. 14. — *Barkania* EHRENB. et HEMPR., in *Abh. Berl. Akad.* (1832), I, 429.

5. Minutis; masculis fugacibus.

6. Spec. 3, 4. FORSK., *Fl. æg.-arab.*, 158 (*Zosteria*). — R. BR., *Prodr.*, 339 (*Caulinia*). — GRIFF., *lc. pl. as.*, t. 161, C, fig. 2 (*Diplan-*

12. *Hydrilla* L.-C. RICH.¹ — Flores monœci v. diœci; masculorum receptaculo brevi convexo. Sepala 3, ovata, elliptica v. obovata, membranacea, imbricata. Petala 3, alterna sepalis æquilonga angustiora imbricata. Stamina 3, centralia, alternipetala; filamentis brevibus crassiusculis; antheris ovatis v. ellipticis, 2-locularibus. Floris fœminei receptaculum elongatum supra germen inferum inclusum adnatumque valde angustato-lageniforme; perianthio (marium) ori inserto. Germen 1-loculare; placentis 2, 3, parum prominulis pauciovulatis. Ovula anatropa. Styli rami 2, 3, lineares simplices dense stigmatoso-papilloso. Fructus angustus; pericarpio tenui; seminibus paucis mucosae immersis; integumento extimo utrinque producto; embryone exalbuminoso carnosus. — Herbæ submersæ tenues ramosæ; caule ramisque gracilibus elongatis undique foliosis. Folia opposita v. sæpius 3, 4-natim verticillata breviter membranacea. Flores axillares solitarii spatha 2-folia inclusi; masculorum spatha subsphærica tenuiter membranacea plus minus muricata subque anthesi inæquiu-rupta; fœmineorum autem tubulosa, ore 2-dentata, demum fructum includente. (*Asiæ et Oceanicæ trop. aquæ dulces*².)

13. *Elodea* MICHX.³ — Flores (fere *Hydrillæ*) diœci v. polygami; masculorum receptaculo brevi perianthiumque duplex ferente. Sepala 3 (v. rarius 2), subpetaloidea imbricata. Petala alterna 3, tenuiora nuncque latiora imbricata. Stamina 3, alternipetala (v. 6-9); antheris oblongis erectis, ad margines 2-rimosis. Floris hermaphroditi v. fœminei receptaculum sacciforme oblongum germen inferum cavitate fovens ultraque illud in tubum gracilem perlongum productum, fauce perianthium (marium) ferens cum stami-

thera). — BENTH., *Fl. austral.*, VII, 182. — BOISS., *Fl. or.*, V, 2. — KOEN., *Ann. bot.*, II, 97 (*Thalassia*). — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 236 (*Thalassia*). — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, V, 663.

1. In *Mém. Inst. Par.* (1811), 9, 61, t. 2. — ENDL., *Gen.*, n. 1208. — CASP., in *Pringsh. Jahrb.*, I, 493; in *Vers. deutsch. Naturf. Kœn.*, t. 4-7 (1860), 298; in *Ann. sc. nat.*, sér. 4, IX, 325, fig. 1-21. — B. H., *Gen.*, III, 450, n. 1. — ASCH. et GRKE, *Pflanzenfam.*, 249, fig. 184, A, B. — *Epigynanthus* BL., in *Flora* (1825), 679; in *Hassk. Cat. H. bogor.*, 53. — *Hydrospondylus* HASSK., in *Flora* (1842), II, Beibl., 33. — *Leptanthus* WIGHT, herb.

2. Spec. 1, 2. ROXB., *Pl. corom.*, t. 164 (*Sericula*). — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, V, 659. — BOISS., *Fl. or.*, V, 8. — FR. et SAV., *En. pl. jap.*,

II, 17. — BENTH., *Fl. austral.*, VI, 259. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 239.

3. *Fl. bor.-amer.*, I, 20. — L.-C. RICH., in *Mém. Inst. Par.* (1811), 4, 60, t. 1. — ENDL., *Gen.*, n. 1206. — CASP., in *Pringsh. Jahrb.*, I, 497; in *Ann. sc. nat.*, sér. 4, IX, 334, fig. 22-28. — H. BN., in *Adansonie*, XII, 255, t. 8, fig. 1-17. — B. H., *Gen.*, III, 450, n. 2. — ENGL., *Pflanzenfam.*, 250, fig. 184, C-F. — *Udora* NUTT., *Gen. n.-amer. pl.*, II, 242. — *Anacharis* L.-C. RICH., *loc. cit.*, 7, 61, t. 2. — BAB. et PL., in *Trans. Bot. Soc. Edinb.*, III, 27, t. 2; in *Ann. Nat. Hist.*, sér. 2, I, 81, t. 8. — *Apalanthe* BAB. et PL., *loc. cit.* — PL., in *Ann. sc. nat.*, sér. 3, XI, 75. — *Egeria* PL., in *Ann. sc. nat.*, sér. 3, XI, 79. — *Philotria* RAFIN., in *Amer. Monthl. Mag.* (1819) (ex ENDL.).

nibus alternipetalis 3, fertilibus (marium) v. ad filamenta subulata reductis cumque styli ramis linearibus papillois oppositipetalis, integris v. breviter longeve 2-fidis. Ovula basilaria pauca (3¹) v. 4-∞, placentis parietalibus affixa orthotropa; micropyle supera². Fructus oblongus, spatha inclusus v. lateraliter exsertus. Semina 1-∞, oblonga, pulpa immersa; embryonis conformis gemmula inclusa. — Herbæ submersæ valde ramosæ cum ramis radicantibus undique foliosæ. Folia 3, 4-natim verticillata, v. inferiora opposita, sessilia. Flores³ in ramulo axillari, aut brevissimo (subsessiles), aut longiore bracteifero, terminales; bracteis lateralibus 2 in spatham tubulosam apiceque 2-dentatam fructumque cingentem connatis. (*America calid. et temp.*⁴)

14. **Lagaresiphon** HARV.⁵ — Flores (fere *Hydrillæ*) diœci; masculorum sepalis petaloideis 3, petalisque totidem alternis sæpe minoribus. Stamina fertilia 3, alternipetala; filamentis brevibus; antheris ovatis; additis nunc staminodiis 3, 2. Floris fœminei germen inferum oblongum, 1-loculare; perianthio (fere marium) supero. Staminodia parva v. 0. Styli rami stigmatosi intra perianthium 3, integri, emarginati v. 2-furcati. Placentæ parietales 3, 1-pauci-ovulatæ; ovulis orthotropis suberectis; micropyle supera. Fructus ovoideo-oblongus v. linearis membranaceus. Semina pauca pulpa mucosa immersa orthotropa; funiculo recto; exostomio breviter tubuloso papilloso; embryone carnosio conformi. — Herbæ submersæ; ramis elongatis gracilibus foliosis. Folia alterna, linearia v. setacea, integra, ciliata v. serrulata. Flores axillares: masculi in spatha sessili, apice 2-fida, ∞, minute pedicellati; fœminei in spatha axillari⁶ oblonga angusta, hinc fissa, solitarii. (*Indiæ, Africa trop. cont. et insul. aque dulces*⁷.)

1. Cum placentis vix prominulis (viridibus) alternantia.

2. Integumento duplici.

3. Pallide rosei, parvi.

4. Spec. 7, 8. REICH., *lc. Fl. germ.*, t. 59 (*Udora*). — BAB. et PL., in *Ann. sc. nat.*, sér. 3, XI, 69 (*Anacharis*), 75 (*Apalanthe*), t. 1. — MICX., *Fl. bor.-amer.*, I, 20. — H. B., *Pl. æquin.*, II, 150.

5. In *Hook. Journ. Bot.*, IV, 230, t. 22. —

CASP., in *Bot. Zeit.* (1870), 88; in *Pringsh. Jahrb.*, I, 503; in *Schweinf. Beitr. Fl. æthiop.*, 200, t. 4; in *Abh. Naturw. Ver. Brem.*, VII, 252, t. 18. — B. H., *Gen.*, III, 450, n. 3 (part.). — ASCH. et GRKE, *Pflansensam.*, 251, fig. 184, C, H.

6. Spathæ nunc 2-natæ.

7. Spec. 8, 9. HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, V, 659. — RIDL., in *Journ. Linn. Soc.*, XXII, 233. Genus *Hydrillam* cum *Euvallineriis* nonnihil connectens.

CXXIX

COMMELINACÉES

I. SÉRIE DES ÉPHÉMÉRINES.

Les Éphémérines (*Tradescantia*¹) (fig. 134-138) représentent le type le plus complet de cette famille. Leurs fleurs, hermaphrodites et régulières, ont un réceptacle convexe qui porte un double périanthe : trois sépales imbriqués, herbacés ou pétaloïdes, et trois pétales alternes, d'un tissu délicat, également imbriqués dans le bouton. L'un d'eux est quelquefois un peu inégal aux deux autres. Les étamines sont au nombre de six, disposées sur deux verticilles, et celles qui sont superposées aux pétales sont généralement les plus grandes. Toutes ont un filet libre, souvent chargé de poils moniliformes², et une anthère qui s'attache sur le sommet du filet et par la base d'un connectif épais, ordinairement large et court, dont les bords portent deux loges déhiscentes par des fentes marginales ou légèrement introrses et pouvant se rapprocher beaucoup l'une de l'autre quand les loges se portent parallèlement en dedans³. Le gynécée se compose d'un ovaire supère, à trois loges alternipétales, surmonté d'un style d'abord arqué, dont le sommet stigmatifère est tronqué ou légèrement renflé ; et l'angle interne de chaque loge donne insertion à deux ovules, finalement superposés, orthotropes ou à peu près, à axe horizontal, à micropyle regardant directement en dehors⁴. Le fruit est une capsule loculicide, dont les graines, au nombre d'une ou deux, superposées dans chaque loge, ont une conformation et une organisation particu-

1. L., *Gen.*, ed. I, n. 277. — J., *Gen.*, 45. — GÆRTN., *Fruct.*, I, t. 15. — TURP., in *Dict. sc. nat.*, Atl., t. 167. — ENDL., *Gen.*, n. 1031. — K., *Enum.*, IV, 80. — C.-B. CLKE, *Comm.*, 287. — PATER, *Organog.*, t. 140. — B. H., *Gen.*, III, 853, n. 17. — SCHÖENL., *Pflanzenfam.*, 68, fig. 29, 30, C; 36, D, F. — *Ephemerum* T., *Inst.*, 367, t. 193, fig. 1. — *Gonatanandra* SCHLCRTL., in *Linnaea*, XXIV, 659. — *Descantaria* SCHLCRTL., in *Linnaea*, XXVI, 140. — *Heterachthia* Kze., in *Bot. Zeit.* (1850), 1.

— *Mandonia* HASSK., in *Flora* (1871), 260. — *Skofitzia* HASSK. et KAN., in *Estr. Bot. Zeit.* (1872), 147. — *Knowlesia* HASSK., *Comm. ind.*, 5. — KN. et WESTC., *Fl. Cab.*, III, 133, t. 124. — *Disgrega* HASSK., *Comm. ind.*, 6.

2. Souvent signalés dans les traités classiques pour l'étude des courants protoplasmiques.

3. Par inflexion du connectif. Le pollen est ellipsoïde, avec un pli longitudinal. Mouillé, il devient ovale, avec une bande ponctuée.

4. Le tégument est double.

lière qui se retrouve avec des modifications de détail dans la famille entière. La ligule qui s'étend de leur base organique à leur sommet

Tradescantia virginica.

Fig. 134. Port.



Fig. 137. Graine.



Fig. 135. Fleur.

Fig. 136. Fleur, coupe longitudinale.

Fig. 138. Graine, coupe longitudinale.

micropylaire, est horizontale, et le micropyle se trouve latéralement situé en dehors. Là les téguments sont couronnés par un petit

opercule nommé embryotège, qui se détache circulairement, à la façon d'une soupape, lors de la germination, pour laisser sortir l'embryon situé au-dessous de lui dans la portion supérieure de l'albumen. Des bords de l'embryotège partent en rayonnant des sillons et des lignes saillantes alternatives qui se dirigent vers le hile. Celui-ci est ventral, linéaire. En outre, la graine est lisse ou rugueuse, fovéolée. L'albumen est dur, épais, et l'axe de l'embryon trochléaire est horizontal.

Il y a des Éphémérines dans lesquelles les anthères des petites étamines ne sont pas conformes à celles des grandes. Dans beaucoup d'espèces, les filets ne portent pas de poils, ou bien le connectif prend la forme d'une grande lame pétaloïde sur les côtés de laquelle s'insèrent les loges disjointes. Le nombre des ovules dans chaque loge peut s'élever quelquefois jusqu'à cinq ou six.

Ce sont des herbes américaines, vivaces, dont la souche radicante porte des rameaux aériens, à feuilles alternes, à limbe rectinerve, avec ou sans pétiole, et à base plus ou moins dilatée en une gaine qui entoure les axes. Dans le *T. fuscata*, dont on a fait un genre *Pyrrheima*¹, la tige est presque nulle, et les feuilles développées sont hérissées de poils bruns. Les fleurs², souvent entourées de feuilles modifiées, bractéiformes ou spathiformes, sont disposées en cymes unipares-scorpioïdes, de configuration variable, souvent réduites à quelques fleurs, parfois même à une seule, comme il arrive dans le *T. nana*³. L'inflorescence générale, plus ou moins composée, est d'ailleurs tantôt terminale et tantôt axillaire. On connaît environ trente-six espèces⁴ de ce genre.

Les *Tinantia*, de l'Amérique tropicale, sont très voisins des Éphémérines; ils en ont le périanthe et jusqu'à cinq ovules dans chaque loge. Leurs étamines sont de deux sortes: trois plus grandes d'un côté de la fleur, et trois plus petites de l'autre. Leurs fleurs sont portées

1. HASSK., in *Flora* (1869), 366; *Comm. ind.*, 171. — C.-B. CLKE, *Comm.*, 271.

2. Blanches, jaunes, roses, bleuâtres ou violacées, souvent élégantes.

3. MART. et GAL., *En. pl. mex.*, 3. — C.-B. CLKE, *Comm.*, 308 (§ *Monantha*).

4. RED., *Lil.*, t. 94, 95. — CAV., *lc.*, t. 75. — JACQ., *lc. rar.*, t. 355. — VENT., *Jard. Cels*, t. 24. — H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, t. 672, 673. — BART., *Fl. n.-amer.*, t. 41. — R. et PAV., *Fl. per. et chil.*, t. 272. — LEHM., in *N. Act. nat. cur.*, XIV, t. 48. — VELL., *Fl. flum.*, Atl.,

III, t. 152-154. — MART., *Ausw. Merk. Pl.*, t. 7. — SEUB., in *Mart. Fl. bras.*, III, 1, t. 34. — LINK et OTT., *lc. pl. rar.*, t. 7. — SCHUCHT., *H. hall.*, t. 11. — HOOK., *lc.*, t. 654, 665. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 374, 1513, 1560. — ORTG., in *Reg. Gartenfl.*, t. 901. — GRISEB., *Fl. brit. W.-Ind.*, 523. — TH. MOR., in *Bull. Torr. Bot. Club* (1893), 470. — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 390, t. 95, fig. 12-21. — *Bot. Reg.*, t. 1055; (1840), t. 34, 42. — *Bot. Mag.*, t. 105, 1507, 1598, 2935, 3291, 3501, 3546, 4849, 5079, 5188. — WALP., *Ann.*, III, 659; VI, 162.

par un pédoncule terminal dressé, du sommet duquel divergent deux ou plus rarement trois cymes scorpioïdes.

Les *Stickmannia*, de l'Amérique tropicale, ont les mêmes fleurs que les *Tradescantia*, avec six étamines fertiles, mais à anthère allongée et s'ouvrant par un pore au sommet des deux loges contiguës.

Dans les *Floscopa*, herbes des deux mondes, l'inflorescence terminale est courte et contractée, et l'ovaire a deux loges uniovulées. Le fruit capsulaire est à une ou deux loges.

Les *Forrestia* ont des cymes groupées en faux-capitules axillaires, sortant des gaines foliaires. Ils sont asiatiques et africains. Les *Buforrestia*, qui en sont très voisins, sont de la Guyane et de l'Afrique tropicale occidentale. Le mode d'inflorescence est encore le même dans les *Coleotrype*, africains et malgaches; mais leurs pétales sont inférieurement unis en un tube étroit.

Dans les *Cyanotis*, asiatiques et africains, les étamines sont unies à la corolle atténuée inférieurement en tube; elles ont des filets barbus, et le fruit a des loges dispermes : l'une des graines ascendante et l'autre descendante. Les cymes scorpioïdes sont pourvues de bractées insymétriques, latérales, bisériées.

Dans les *Cartonema*, tous australiens, l'inflorescence est spiciforme; et les six étamines égales, à loges courtes et contiguës, ont un filet court, dressé et glabre. Les loges ovariennes sont biovulées.

Le *Streptolirion*, de l'Inde, est une liane à feuilles cordées et longuement pétiolées. Ses fleurs, disposées en grappes de cymes, sont d'ailleurs à peu près celles des *Tradescantia*, à six étamines fertiles, pourvues d'un large connectif. L'ovaire est à trois loges biovulées.

Dans les genres américains *Spironema* (fig. 139, 140), *Callisia*, *Campelia* et *Sauvallea*, les loges ovariennes sont aussi biovulées, et le fruit loculicide. Les premiers ont de nombreuses cymes contractées et capituliformes. Leurs six étamines ont un large connectif membraneux des bords duquel pendent les loges de l'anthère. Les *Callisia* ont les mêmes étamines, mais au nombre de trois (ou seulement une ou deux, rarement quatre), sans staminodes interposés. Leurs inflorescences sont ou lâches, ou contractées. Les *Campelia* ont des inflorescences latérales, en cymes contractées. Leurs six étamines ont un connectif bifide, et leur fruit capsulaire est induvié du calice devenu plus ou moins charnu. Le *Sauvallea* est une petite herbe à fleurs solitaires, enfermées dans une bractée compliquée. Les loges de ses anthères sont oblongues et divariquées, et son ovaire est biloculaire.

Dans les *Rhæo* et *Leptorhæo*, américains aussi, il n'y a plus qu'un ovule dans chaque loge. Le premier a de grandes feuilles, des cymes

Spironema fragrans.

contractées, des filets staminaux barbus. Le dernier a des feuilles petites et distantes, des cymes florales grêles et lâches et des étamines glabres.

Les *Zebrina* et *Weldenia*, plantes américaines, ont des loges ovariennes uniovulées et une corolle atténuée en tube à sa base. L'un d'eux a des fleurs très petites, presque sessiles entre deux feuilles extrêmes d'un rameau. L'autre a des fleurs axillaires et solitaires, de

Fig. 139. Fleur. Fig. 140. Fleur, coupe longitudinale.

plus grande taille, et à tube du périanthe bien plus long, qui se dégagent latéralement par une fente de la gaine foliaire axillante.

II. SÉRIE DES COMMELINES.

Dans cette série et en particulier dans les *Commelina*¹ (fig. 141-143), la fleur est irrégulière, par le périanthe d'abord, puis surtout par l'androcée; elle l'est souvent même par le gynécée. Les sépales sont au nombre de trois et dissemblables. Le médian est plus petit, vert ou moins coloré que les deux autres, par lui recouverts dans la préfloraison imbriquée. Ces deux autres, parfois connés à la base, sont un peu irréguliers, symétriques l'un de l'autre et plus souvent subpéta-loïdes. Les trois folioles intérieures du périanthe, alternes avec les précédentes, sont plus grandes et colorées, imbriquées. L'une d'elles est régulière et diffère des deux autres qui sont aussi symétriques l'une de l'autre et souvent ongiculées. Des six étamines, il y en a trois fertiles. L'une d'elles, située sur la ligne médiane, est superposée à

1. PLUM. — L., *Gen.*, ed. I, n. 30; ed. VI, n. 62. — ADANS., *Fam. des pl.*, II, 47. — J., *Gen.*, 45 (Joncées). — GÆRTN., *Fruct.*, t. 15. — K., *Syn.*, I, 267; *Enum.*, IV, 35. — ENDL., *Gen.*, n. 1028 (*Commelyna*). — C.-B. CLKE, *Comm.*, 138. — B. H., *Gen.*, III, 847, n. 4. — SCHREIBL., *Pflanzenfam.*, 63, fig. 30, B; 32, A-H. — ERZEBIA MEDIC. — Hedwigia MEDIC., in

Ræm. et Ust. Mag., X, 124. — *Ananthopus* RAFIN., *Fl. lud.*, 20. — ? *Lechea* LOUR., *Fl. cochinch.*, 60 (ex K.). — *Heterocarpus* WIGHT, *lc.*, t. 2067. — *Diascocarpus* HASSK., in *Flora* (1866), 211. — *Trithyrocarpus* HASSK., *loc. cit.* — *Spathodithyros* HASSK., *loc. cit.* — *Omphalotheca* HASSK., in *Bull. Congr. bot.* (1865) 12.

l'un des pétales; les deux autres, aux deux sépales voisins. Elles ont toutes des filets recourbés et des anthères biloculaires, un peu différentes dans les latérales et dans la médiane, qui a le connectif souvent plus large, compliqué, et les deux loges marginales, à déhiscence latérale ou extrorse, tandis que les latérales ont les loges souvent introrses et rapprochées l'une de l'autre. Les trois autres étamines sont stériles; l'une d'elles, qui fait parfois défaut, est superposée au sépale médian et peut être réduite à un filet, glanduleux ou non à son sommet; elle peut aussi

être à peu près semblable aux deux autres, superposées chacune à un pétale et formées d'un filet et d'une anthère stérile, 4-6-lobée et cruciforme. Le gynécée supère est formé d'un ovaire à trois loges superposées aux sépales, et surmonté d'un style arqué dans le bouton, dont la convexité répond au pétale médian, et dont l'extrémité stigmatifère est peu renflée et obtusément trilobulée.

L'une des loges, l'antérieure, est souvent peu spacieuse, uniovulée, vide

ou même à peu près complètement disparue. Les deux autres, plus développées, sont rarement vides et renferment d'ordinaire un ou deux ovules. Ceux-ci sont orthotropes ou plus moins incomplètement anatropes¹. Le fruit est une capsule loculicide, dont la loge antérieure, assez souvent nulle ou stérile, peut se séparer des deux autres suivant les cloisons. Les postérieures renferment une ou deux graines, orthotropes ou à peu près, plus ou moins comprimées, hémisphériques ou coniques, à hile vertical linéaire et à micropyle extérieur et latéral, plus ou moins écarté du hile. Sa surface est glabre, rugueuse,

Commelina tuberosa.



Fig. 141. Branche florifère.

1. A double légument. Le hile n'est pas toujours diamétralement opposé au micropyle.

réticulée ou fovéolée; et le sommet de son albumen est occupé par un embryon latéral, horizontal, que recouvre un embryotège.

Le genre renferme une centaine d'espèces¹. Ce sont des herbes rameuses, à tige épaisse, ou plus souvent grêles, noueuses, dressées, couchées ou rampantes. Les feuilles alternes sont ovales, lancéolées ou linéaires, avec ou sans pétiole, et à gaine lâche. Les fleurs² sont, dans l'aisselle des feuilles supérieures, soutenues par un pédoncule qui porte une bractée spathiforme, acuminée, turbinée ou cucullée, dans

Commelina tuberosa.




Fig. 142. Fleur, coupe longitudinale.

Fig. 143. Staminode.

laquelle est d'abord logé un groupe de cymes unipares, à disposition variée. Souvent l'une des cymes est réduite à un axe stérile. Souvent aussi les fleurs deviennent mâles par avortement du gynécée. Ces plantes appartiennent aux régions chaudes des deux mondes.

Près des *Commelina* se rangent trois genres :

Les *Aneilema*, des deux mondes, qui ont normalement deux ou trois staminodes, et dont les cymes, fasciculées ou portées sur les divisions d'une grappe composée, n'ont pas de bractées spathacées;

1. R. et Pav., *Fl. per. et chil.*, t. 72, 73 a. — W., *H. berol.*, t. 87. — Jacq., *lc. rar.*, t. 293, 294. — Red., *Lil.*, t. 206, 207, 359, 390. — Wight, *lc.*, t. 2065, 2066. — Wedd., *Phyt. canar.*, t. 238, 239. — Seub., in Mart., *Fl. bras.*, III, t. 36, 37. — Schlichtl., *H. hal.*, t. 6. — Link, Kl. et Ott., *lc. pl. rar.*, t. 30. — Lodd., *Bot. Cab.*, t. 1553. — Sweet, *Brit. fl. Gard.*, t. 3. — C.-B. Clarke, *Comm. et Cyrt. beng.*, t. 1-13. — Reichs., *lc. exot.*, t. 142-144, 151. — Saund., *Ref. bot.*, t. 166. — Rec., *Gartenfl.*, t. 101, 592.

— Andr., *Bot. Rep.*, t. 399. — Griseb., *Fl. brit. W.-Ind.*, 524; *Symb. Fl. argent.*, 284. — Th. Mor., in *Bull. Torr. Bot. Club*, XX, 469. — Fr. et Sav., *En. pl. jap.*, II, 93. — Miq., *Fl. ind. bat.*, III, 531. — Hook. f., *Fl. brit. Ind.*, VI, 368. — Benth., *Fl. austral.*, VII, 82. — Hemsl., *Bot. centr.-amer.*, III, 386. — Boiss., *Fl. or.*, V, 345. — *Bot. Mag.*, t. 1431, 2644, 3047.

2. Blanchées, jaunes, bleues ou roses, petites ou moyennes.

Le *Polyspatha*, de l'Afrique tropicale occidentale, dont les fleurs ont deux ou trois staminodes et sont groupées en glomérules sessiles, disposés sur les branches d'une grande inflorescence, dans des spathes compliquées;

Le *Cochliostema*, grande plante de l'Équateur, qui a de larges et belles fleurs irrégulières, disposées en cymes sur les branches d'une vaste grappe composée, avec des sépales pétaloïdes, des pétales ciliés; trois étamines, dont une médiane, à filet chargé de poils jaunes, et deux oppositipétales; le connectif dilaté en une large lame pétaloïde cucullée et involutée. Les loges de l'anthere sont fortement enroulées en spirale, et l'ovaire a trois loges pluriovulées.

III. SÉRIE DES POLLIA.

Les fleurs régulières des *Pollia*¹, fort analogues à celles des Éphémérines, ont, sur un court réceptacle convexe, trois sépales membraneux imbriqués et trois pétales alternes, imbriqués, un peu plus petits. L'androcée est formé de deux verticilles d'étamines hypogynes; les alternipétales parfois plus petites, stériles ou nulles². Les filets sont grêles et nus; et les anthères, elliptiques ou ovales, ont deux loges parallèles qui s'ouvrent vers les bords ou un peu en dehors. L'ovaire à trois loges alternipétales est surmonté d'un style à sommet stigmatifère parfois recourbé, et il renferme, dans chacune de ses loges, deux séries verticales d'ovules orthotropes, construits, de même que les semences, comme ceux des Éphémérines; chaque série pouvant être réduite à un ou deux ovules. Le fruit est une baie, à péricarpe finalement à peu près sec, mince et fragile, mais réellement indéhiscents. Il renferme une ou plusieurs graines orthotropes, plus ou moins anguleuses, aplaties sur le dos, lisses, albuminées, avec un embryon situé sous un embryotège à peu près opposé à l'ombilic. Ce sont des herbes vivaces, des régions chaudes de l'Afrique, de l'Océanie et de l'Asie austro-orientale. Leurs branches aériennes, souvent couchées à leur base, puis redressées, portent des feuilles alternes, munies d'une gaine à la base. L'inflorescence est termi-

1. TRUMB., *Gen. nov.*, I, 11. — J., *Gen.*, 45. — ENDL., *Gen.*, n. 1029. — C.-B. CLKE, *Comm.*, 121. — B. H., *Gen.*, III, 846, n. 1. — SCHÖENL., *Pflanzenfam.*, 62. — *Lamprocarpus* BL., in

Schult. f. Syst., VII, 1615, 1726. — *Actisia* E. MEY., in *Presl Rel. Hænk.*, I, 138.

2. Dans les *Actisia* et les espèces de la section *Phæncarpa* C.-B. CLKE, *loc. cit.*, 129.

nale : c'est une grappe composée, lâche ou dense. Son axe porte des cymes unipares-scorpioïdes alternes, à bractées petites ou nulles.

Palisota Barteri.

Sous l'inflorescence se trouvent parfois des bractées plus grandes, formant une sorte d'involucre. Le genre comprend au moins une douzaine d'espèces¹.

Fig. 144. Fruit, coupe longitudinale.

A côté des *Pollia* se rangent les *Palisota* (fig. 144), de l'Afrique tropicale, qui ont les cymes scorpioïdes disposées en grappe composée lâche ou très contractée, et dont la baie renferme une pulpe abondante dans laquelle sont nichées les semences; et les *Athyrocarpus*, de l'Amérique tropicale, dont les cymes bifides sont enfermées dans une spathe compliquée, et dont les fruits sont, comme ceux des *Pollia*, crustacés, fragiles, mais capsulaires, avec une pulpe peu abondante. Les fleurs sont d'ailleurs légèrement irrégulières.

Cette petite famille a été distinguée par BATSCH² dès 1802, sous le nom de *Ephemeræ*. R. BROWN³ lui appliqua le nom de Commelinées en 1810; et REICHENBACH⁴, celui de Commelinacées en 1828. ADANSON⁵ avait bien vu que ce sont des Liliacées, exceptionnelles, sans doute, par l'orthotropie de leurs ovules et les caractères de leurs semences pourvues d'un embryotège⁶. Mais le type floral est au fond le même. Nous verrons d'ailleurs quelles sont les étroites affinités du groupe avec les Phylidracées, Mayacacées, Xyridacées et Rapatéacées. Les feuilles ont en général un caractère particulier, grâce à la largeur relative de leur limbe, avec ou sans pétiole, et à la dilatation de leur gaine qui embrasse les axes et que les inflorescences doivent parfois

1. BAUER, *Ill. pl. N. Holl.*, t. 6 (*Ancilema*). — K., *Enum.*, IV, 74 (*Aclisia*). — WIGHT, *lc.*, t. 2068 (*Aclisia*). — C.-B. CLKE, *Comm. et Cyrt. beng.*, t. 29 (*Aclisia*), 32, 33. — FR. et SAV., *En. pl. jap.*, II, 94. — HOOK. f., *Fl. brit. Ind.*, VI, 367. — HASSK., *Comm. ind.*, 44; 53 (*Aclisia*); in *Pl. Jungh.*, 150; *Pl. jav. rar.*, 97 (*Aclisia*). — MIG., *Fl. ind. bat.*, III, 541. — BENTH., *Fl. austral.*, VII, 89. — C.-B. CLKE, in *Journ. Linn. Soc.*, XI, 451.

2. *Tab. affn.*, 125 (Fam.).

3. *Prodr.*, 268 (Ord.). — RICH., in *H. B. K. Nov. gen. et spec.*, I (1815), 258 (Ord.). — J., in *Dict.*, X, 121 (Fam.).

4. *Consp.*, 57 (part.). — BARTL., *Ord.* (1830), 39 (*Juncinarum* Gen.). — LINDL., *Nat. Syst.*, ed. II, 354. — ENDL., *Gen.*, 124, Ord. 48. — C.-B. CLKE, in *DC. Mon. Phaner.*, III, 113 (1881). — B. H., *Gen.*, III, 844, Ord. 183. — SCHORNLE., in *Engl. u. Franzl. Pflanzenfam.*, II, 4, p. 60.

5. *Fam. des pl.*, II, 47.

6. « *Enantioblastæ*. »

perforer quand elles sont axillaires¹. Ailleurs, c'est le limbe conduit, plié et plus ou moins modifié qui joue relativement aux fleurs le rôle d'une sorte de spathe. Dans cette famille, qui a été pour lui l'objet d'une étude remarquable et des plus approfondies, M. C.-B. CLARKE a admis les trois séries suivantes, séparées par des caractères qui seraient ailleurs de valeur secondaire :

I. TRADESCANTIÉES². — Fleurs à 5, 6 étamines, toutes fertiles. Fruit capsulaire et loculicide, à 1-3 valves. — 18 genres.

II. COMMELINÉES³. — Fleurs à 2, 3 étamines fertiles, avec 1-4 staminodes de forme variable. Fruit capsulaire et loculicide, à 2, 3 valves. — 4 genres.

III. POLLIÉES⁴. — Fleurs à 3-6 étamines fertiles. Fruit charnu ou crustacé, indéhiscent. — 3 genres.

Les vingt-cinq genres admis comprennent un peu plus de trois cents espèces. Ce sont des herbes des régions chaudes⁵, surtout des stations humides, ordinairement charnues et fragiles, parfois grimpantes, comme les *Streptolirion*, lesquels, par la forme et la nervation de leur limbe, sont ici les analogues des Discoréées parmi les Liliacées ; ce qui doit aussi nécessairement influencer sur leur structure anatomique.

Leurs usages⁶ ne sont ni nombreux, ni importants. Leurs portions souterraines, notamment leurs racines quand elles deviennent charnues, sont riches en fécule et en mucilage. De là l'emploi en Asie des *Commelina tuberosa*⁷, *cælestis*, *striata* et *angustifolia* comme herbes potagères. Le *C. Rumphii*⁸ passe dans l'Inde pour emménagogue. L'*Aneilema scapiflorum*⁹ sert aussi dans la médecine indochinoise. Le *Cyanotis axillaris*¹⁰ est cité dans l'Inde comme remède

1. D'où quelques particularités anatomiques peu tranchées : DE BARY, *Vergl. Anat.*, 279. — SCHÖENL., *loc. cit.*, 60.

2. MEISSN., *Gen.*, 406 (Trib.). — C.-B. CLKE, *loc. cit.*, 119, Trib. 3. — B. H., *Gen.*, III, 845, Trib. 3. — SCHÖENL., *loc. cit.*, 65 (III).

3. MART., in *N. Act. Ac. Leop.*, XVII, I, 172. — MEISSN., *Gen.*, 407 (Trib.). — C.-B. CLKE, *loc. cit.*, 119, Trib. 2. — B. H., *Gen.*, III, 845, Trib. 2. — SCHÖENL., *loc. cit.*, 63 (II).

4. C.-B. CLKE, *loc. cit.*, 118, Trib. 1. — B. H., *Gen.*, III, 844, Trib. 1. — SCHÖENL., *loc. cit.*, 62 (I).

5. M. C.-B. CLARKE donne, à la page 118 de sa Monographie, un tableau complet et instructif de la distribution géographique de toutes les Commelinacées connues.

6. ENDL., *Enchirid.*, 71. — LINDL., *Veg. Kingd.*, 188. — ROSENTH., *Syn. pl. diaphor.*, 78.

7. L., *Spec.*, 61. — LAMK., *Ill.*, t. 35, fig. 2. — ANDR., *Bot. Rep.*, t. 399. — SCHNIZL., *Icon.*, t. 48, fig. 1-4. — *C. parviflora* REICHB., *Icon. exot.*, t. 142. — *C. undulata* LODD., *Bot. Cab.*, t. 1553.

8. LINDL., *Veg. Kingd.*, 188. — C.-B. CLKE, *Comm.*, 194.

9. WIGHT, *Icon.*, t. 2073. — C.-B. CLKE, *Comm. beng.*, t. 14. — *A. tuberosum* HAM. — *Commelina scapiflora* ROXB., *Fl. ind.*, I, 175. — *Murdannia tuberosa* ROYL., *Ill. himal.*, t. 95. — *Tradescantia aphylla* HEYN.

10. RÖEM. et SCH. F., *Syst.*, VII, 1154. — C.-B. CLKE, *Comm. beng.*, t. 35. — *Commelina axillaris* L. — *Zygomenes axillaris* SALISB.

des tympanites; et l'*Aneilema nudiflorum*¹, bouilli dans l'huile, sert au traitement de la gale et de la lèpre. En Chine, l'*Aneilema medica* R. BR. passe pour guérir les cas de bronchite, d'asthme, de pleurésie, de dysurie. On indique au Brésil un *Tradescantia diuretica* MART., qui aurait les mêmes vertus, et dont les feuilles et les tiges émollientes se donneraient, en bains, en lotions et en lavements, contre les douleurs rhumatismales et les rétentions d'urine dues à un état spasmodique de la vessie. Au Mexique, le *Tinantia fugax*² porte le nom de Plante à l'hémorrhagie. En Amérique, on mange le fruit du *Campelia Zanon* RICH. Le *Tradescantia virginica*³ (fig. 134-138), si communément cultivé dans nos jardins, peut, dit-on à la Jamaïque, servir de remède contre la morsure des araignées venimeuses. Aucune de ces espèces n'est employée en Europe, où l'on cultive seulement comme plantes ornementales quelques Éphémérines et Commelines, des *Dichorisandra*, des *Zebrina*, le *Spirocnema*, le *Rhæo discolor* et le magnifique *Cochliostema odoratissima*. Les fleurs sont de peu de durée, presque toujours de petite taille et souvent même sans éclat. Mais les feuilles, panachées de vert, de pourpre ou de blanc de plusieurs espèces, à tige flexible ou presque sarmenteuse, font rechercher ces plantes pour l'ornementation des serres ou même des appartements.

1. R. BR., *Prodr.*, 271. — C.-B. CLKE, *Comm. beng.*, t. 21. — *A. radicans* DON. — *A. dianthum* HAM. — *A. minutum* K. — *Commelina nudiflora* L. — *Prionostachys terminalis* HASSK. (RHEEDE, *H. malab.*, IX, t. 63; X, t. 19).

2. Voy. p. 212, not. 3. On lui donne le nom vulgaire d'Herbe à poulets; elle est assez souvent cultivée chez nous.

3. L., *Spec.*, 411. — GÆRTN., *Fruct.*, I, t. 15, p. 2. — *Bot. Mag.*, t. 3501. — C.-B. CLKE,

Comm., 290, n. 1. — *T. ciliata* K., *Enum.*, IV, 81. — *T. subaspera* KER, in *Bot. Mag.*, t. 1597. — *T. caricifolia* Hook., in *Bot. Mag.*, t. 3546. — *T. cristata* WALT. — *T. cirrifera* MART. — *T. elata* LODD., *Bot. Cab.*, t. 1513. — *T. ohioensis* RAFIN. — *T. barbata* RAFIN. — *T. splendens* KOCH et BOUCH. — *Ephemerum confestum* MOENCH, *H. marb.*, 238 (Éphémérine, Éphémère de Virginie, Moly de Virginie, Fleur d'un Jour).

GENERA

I. TRADESCANTIEÆ.

1. **Tradescantia** L. — Flores hermaphroditi v. raro polygami; receptaculo parvo convexo. Sepala 3, subæqualia concava (viridia v. colorata) plus minus late imbricata, raro subvalvata. Petala alterna 3, majora, obovata v. orbicularia, tenuiter membranacea (colorata) marcescentia imbricata, sæpe corrugata. Stamina 6, hypogyna, aut subæqualia, aut oppositipetala majora; filamentis nudis v. varie barbatis (pilis moniliformibus); antherarum loculis plerumque connectivo lato sejunctis, ad margines obliquis v. arcuatis, nunc demum ob connectivum intus plicatum approximatis, ad margines rimosis. Antheræ nunc heteromorphæ. Germen liberum, 3-loculare; loculis alternipetalis; stylo brevi v. elongato subulato, apice minuto stigmatoso truncato, capitellato v. obscure 3-lobo, nunc plus minus arcuato. Ovula in loculis 2, angulo interno superposite inserta (nunc raro 3-8), sessilia orthotropa; micropyle apicali extrorsum laterali. Fructus capsularis, 3-locularis, loculicidus. Semina in loculo quoque 1, 2, superposita (raro ultra); hilo ventrali lineari; integumento (fuscato) reticulato, rugoso, foveolato v. ab embryostega extus laterali radiatim sulcato; albumine carnoso v. duro; embryone apicali, hilo opposito subque embryostega horizontali trochleari. — Herbæ perennes, sæpe basi radicales; radicibus crebris nunc tuberosis; ramis aeriis erectis v. diffusis adscendentibus, simplicibus v. superne ramosis; foliis variis alternis vaginatis; petiolo brevi v. 0; floribus in cymas 1-paras umbelliformes secus rachin brevissimam congestis; cymis aut axillaribus, aut in racemum terminalem plus minus compositum dispositis; pedicellis variis v. subnullis, nunc raro in cyma quaque solitariis. (*America trop. et calid. utraque.*) — *Vid. p. 200.*

2. **Timantia** SCHEIDW.¹ — Flores fere *Tradescantiæ*; staminibus 6, quorum 1-lateralia 3 majora², 3 autem minora; nonnullorum filamentis barbatis; antheris ellipsoideis versatilibus, ad margines rimosis. Germen longiusculum; loculis superposite 2-5-ovulatis; stylo primum arcuato. Fructus loculicidus; seminibus 1-seriatis, scabris v. rugosis; embryone sub embryostega extus laterali carnosio horizontali. — Herbæ erectæ; foliis, habitu cæterisque *Tradescantiæ*; cymis scorpioideis in summo pedunculo terminali 2, 3. (*America trop.*³)

3. **Stickmannia** NECK.⁴ — Flores fere *Tradescantiæ*; sepalis (petaloideis v. viridibus) imbricatis. Petala tenuiora sæpiusque latiora imbricata. Stamina 6, v. rarius 5; alternipetalis brevioribus; filamentis erectis; antheris anguste oblongis; loculis parallelis, apice poricidis; rimis longitudinalibus conspicuis, sæpius nihilominus haud solutis. Germen sessile; loculis 3; ovulis in loculo quoque 4- ∞ , 2-seriatim transversis, orthotropis v. incomplete anatropis. Fructus loculicidus; pericarpio pulposo, demum sicco. Semina in loculo pauca- ∞ , pulpa involuta, subsphærica v. angulata; hilo lineari; embryone sub embryostega laterali. — Herbæ perennes; caule erecto v. adscendente; foliis vaginatis; limbo nunc amplo sessili v. petiolato; vaginis nunc caulem obtegentibus; floribus⁵ in cymas 1-paras dispositis; cymis secus ramos racemi compositi insertis; racemo terminali, laterali v. scapum basilarem aphyllum terminante. (*America trop.*⁶)

4. **Floscopa** LOUR.⁷ — Flores fere *Tradescantiæ*; sepalis brevibus concavis⁸. Petala sessilia v. breviter unguiculata tenuiter membra-

1. In *Allgem. Gartenseit.* (1839), 365. — C.-B. CLKE, *Comm.*, 285. — B. H., *Gen.*, III, 853, n. 16. — SCHÖENL., *Pflansenfam.*, 68.

2. Quorum oppositisepala 2; altero autem intermedio oppositipetalo.

3. Spec. ad 3. CAV., *lc.*, t. 74. — JACQ., *Coll.*, IV, 113; *lc. rar.*, t. 354. — R. et PAV., *Fl. per. et chil.*, t. 272, a. — RED., *Lil.*, t. 239. — TORR., *Bot. Un.-St. et Mexic. Bound.*, 225. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 1300. — *Bot. Reg.*, t. 1403. — *Bot. Mag.*, t. 1340. — WALP., *Ann.*, VI, 154 (pleraq. sub *Tradescantia*). Spec. vulgaris 1, in India et Angola inquilina.

4. *Elem.*, III, 171 (1790). — *Dichorisandra* MIK., *Del. fl. et faun. bras.*, t. 3. — ENDL., *Gen.*, n. 1034. — RØM. et SCH. F., *Syst.*, VII, 1181. — K., *Enum.*, IV, 109. — C.-B. CLKE, *Comm.*, 272. — B. H., *Gen.*, III, 853, n. 15. — H. BN,

in *Bull. Soc. Linn. Par.*, 489. — SCHÖENL., *Pflansenfam.*, 68, fig. 30, A.

5. Albis, violaceis v. cæruleis, sæpe pulchris.

6. Spec. ad 28. AUBL., *Pl. Guian.*, t. 12 (*Commelina*). — VAHL, *Ecl.*, I, 34 (*Tradescantia*). — NEES et MART., in *N. Act. nat. cur.*, XI, t. 1. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 1196, 1440. — SEUB., in *Mart. Fl. bras.*, III, I, t. 32, 33. — REG., *Gartenfl.*, t. 569, 593. — *Fl. serres*, t. 1711. — PRESL, in *Rel. Hænk.*, I, 140. — GRISEB., *Fl. brit. W.-Ind.*, 523. — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 389. — *Bot. Mag.*, t. 2721, 4733, 4760, 6165 (pleraq. sub *Dichorisandra*).

7. *Fl. cochinch.*, 192. — C.-B. CLKE, *Comm.*, 265. — B. H., *Gen.*, III, 852, n. 14. — SCHÖENL., *Pflansenfam.*, 68. — *Dithyocarpus* K., *Enum.*, IV, 76.

8. Nunc demum plus minus rubentibus.

nacea imbricata. Stamina 6, v. raro 5; filamentis hypogynis gracilibus glabris; antheris brevibus; loculis parallelis contiguis¹ rimosis. Germen stipitatum, 2-loculare; stylo gracili simplici; ovulis in loculo solitariis orthotropis; micropyle extrorsum laterali. Fructus plus minus longe graciliterque stipitatus, aut 2-dymus, 2-ocularis; aut (loculo altero abortiente) hinc valde gibbus; pericarpio crustaceo glabro. Semina hemisphærica v. ovoidea oblonga; integumento lævi v. ab embryostega laterali radiato-striato; embryone extrorsa horizontali. — Herbæ perennes, basi radicales; ramis aeriis simplicibus; foliis variis vaginatis; floribus² in racemum terminalem compositum densum sæpeque villosum dispositis; cymis 1-paris ad ramulos nunc breves insertis. (*Orbis utriusq. reg. calid.*³)

5. **Forrestia** LESS. et A. RICH.⁴ — Flores *Tradescantiæ*; sepalis ovato-lanceolatis membranaceis (subherbaceis v. coloratis), nunc carinatis. Petala subæquilonga obovata imbricata. Stamina perfecta 6; filamentis filiformibus, superne sæpius barbatis, nunc demum valde corrugato-elongatis; antheris ovoideis; loculis contiguis rimosis. Germen sessile; stylo apice capitellato; loculis 2-ovulatis, v. postico 1-ovulato. Fructus oblongus v. subsphæricus membranaceus loculicidus. Semina in loculo 1, 2, oblonga rugosa; hilo lineari; embryone sub embryostega apicali laterali horizontali. — Herbæ sæpe robustæ, basi repentes, mox erectæ, glabræ v. varie villosæ, nunc vaginatæ. Folia alterna; vaginis post limbi lapsum persistentibus. Flores in glomerulos densos 1-paros dispositi spurieque ad axillas capitati. (*Asia, Oceania et Africa trop.*⁵)

6. **Buforrestia** C.-B. CLKE⁶. — Flores fere *Forrestia*; sepalis lanceolatis rigidulis striatis persistentibus. Petala libera obovata tenuiter membranacea imbricata. Stamina perfecta 6; filamentis gra-

1. Nunc (SEUB.) « connectivo lato sejunctis ».

2. Albis, flavis, roseis v. purpureo-cæruleis, minutis, crebris.

3. Spec. 10, 11. P.-BEAUV., *Fl. owar. et ben.*, t. 93 (*Aneilema*). — ROXB., *Pl. corom.*, t. 109 (*Tradescantia*). — WIGHT, *Jc.*, t. 2079, 2080 (*Dithyrocarpus*). — SPACH, *Suit. à Buff.*, XIII, 122. — K., *Enum.*, IV, 116. — SEUB., in *Mart. Fl. bras.*, III, I, t. 35 (*Dithyrocarpus*). — C.-B. CLKE, *Comm. et Cyrt. beng.*, t. 34. — HOOK. f., *Fl. brit. Ind.*, VI, 390. — HASSK., in *Flora* (1863), 389 (*Lamprodithyros*); *Comm. ind.*, 165. — BENTH., *Fl. austral.*, VII, 88.

— BL., *Enum. pl. jav.*, I, 4. — DON, *Prodr. Fl. nepal.*, 45 (*Aneilema*).

4. *Sert. Astrol.*, I, t. 1. — B. H., *Gen.*, III, 850, n. 9. — SCHÖENL., *Pflanzenfam.*, 67. — C.-B. CLKE, *Comm.*, 235. — *Amisotolotype* HASSK., in *Flora* (1865), 391.

5. Spec. ad 7. BL., *En. pl. jav.*, I, 7 (*Campelia*). — K., *Enum.*, IV, 109 (*Campelia*). — HASSK., in *Flora* (1864), 625. — HOOK. f., *Fl. brit. Ind.*, VI, 383. — *Bot. Mag.*, t. 5425. — O. K., *Revis.*, 720.

6. *Comm.*, 233, t. 6, 7. — B. H., *Gen.*, III, 850, n. 8. — SCHÖENL., *Pflanzenfam.*, 67.

cilibus glabris; antheris ovoideis v. subsphæricis; loculis contiguis parallelis. Germen sessile oblongum; loculis ∞ -ovulatis. Fructus oblongus acutus membranaceus loculicidus, ∞ -spermus. Semina ∞ , 1-seriata quadrata, lævia v. tuberculata; embryone sub embryostega horizontali hilo contrario. — Herbæ robustæ, basi radicales; ramis erectis simplicibus vaginatis. Folia elliptico-lanceolata. Inflorescentiæ axillares; pedunculo vaginam ad basin perforante cymigero simplici v. parce ramoso; floribus¹ pedicellatis intra bracteas parvas solitariis v. cymosis paucis. (*Africa trop. occid.*, *Guiana*².)

7. **Colcotrype** C.-B. CLKE³. — Flores fere *Forrestiæ*; sepalis 3, lanceolatis, plus minus carinatis. Corollæ tubus tenuis calyci æqualis v. longior; limbi lobis 3, obovatis, imbricatis, demum patentibus. Stamina 6, fauci affixa, 2-seriata; filamentis gracilibus barbatis; antheræ ovoideæ loculis distinctis marginantibus, arcuatis v. sygmoideis, rimosis. Germen sessile, stylo tenui; loculis 1, 2-ovulatis. Fructus ovoideus v. oblongus, 3-queter, loculicidus; seminibus in loculo 1, v. superpositis 2, oblongis; hilo basilari. — Herbæ basi repentes; ramis aeriis adscendentibus simplicibus; foliis varie vaginatis; floribus pedicellatis in cymas axillares 1-paras dispositis; cymis sessilibus e vaginarum basi erumpentibus; bracteis sæpe flores æquantibus. (*Africa austro-or.*, *Madagascaria*⁴.)

8. **Tonningia** NECK.⁵ — Flores fere *Tradescantiæ*; sepalis lanceolatis, liberis v. basi connatis, nunc carinatis. Petala æqualia v. subæqualia plus minus alte in tubum connata v. raro exungiculata aque basi distincta (*Belosynapsis*⁶); lobis obtusis imbricatis demumque patentibus. Stamina perfecta 6, nunc petalorum unguibus adnata; filamentis sæpe barbatis; antheris obovali-oblongis, nunc truncatis; loculis parallelis adnatis rimosis. Germen sessile, 3-loculare. Ovula in loculo 2; altero descendente; altero autem adscendente. Fructus loculicidus. Semina in loculo 1, v. sæpius 2; altero descendente juxta

1. Majusculis, albidis, roseis v. violaceis, nunc purpureo-venosis.

2. Spec. 3.

3. *Comm.*, III, 238, t. 8. — B. H., *Gen.*, III, 851, n. 10. — SCHOENL., *Pflanzenfam.*, 67, fig. 36, B.

4. Spec. 3.

5. *Elem.*, III, 165 (1790). — O. K., *Revis.*, 721. — *Zygomenes* SALISB., in *Trans. Roy.*

Hort. Soc. lond., I, 271 (1812). — *Cyanotis* DON, *Prodr. Fl. nepal.*, 45 (1825). — SPACH, *Suit. à Buff.*, XII, 122. — ENDL., *Gen.*, n. 1032. — C.-B. CLKE, *Comm.*, 240. — SCHOENL., *Pflanzenfam.*, 6, 7, fig. 36, A. — *Dalsellia* HASSK., in *Flora* (1865), 593. — *Cyanopogon* WELW., herb. (ex C.-B. CLKE).

6. HASSK., in *Flora* (1871), 259. — *Erythrotis* HOOK. F., *Bot. Mag.*, t. 6150.

apicem affixo; altero autem adscendente juxta basin affixo; integumento lævi v. sæpius rugoso foveolatove; embryone ab hilo remoto horizontali. — Herbæ ramosæ repentes v. adscendentes; foliis variis; floribus in cymas 1-paras dispositis; cymis densis terminalibus v. axillaribus, subsessilibus v. stipitatis. (*Orb. vet. reg. calid.*¹)

9. **Cartonema** R. BR.² — Flores regulares; sepalis 3, lanceolatis cuspidatis imbricatis. Petala 3, alterna late orbiculata v. obovata³ corrugata arcte imbricata. Stamina 6, hypogyna; filamentis erectis brevibus subulatis; antherarum ad basin dorsifixarum erectarum oblongarum loculis parallelis, introrsum superne v. gradatim usque ad basin rimosis. Germen sessile; stylo longe conico; ovulis orthotropis in loculo 2. Fructus loculicidus. Semina superposita laxiuscule reticulata; embryone sub embryostega laterali hiloque contrario. — Herbæ perennes, varie indutæ; rhizomate brevi crasso; foliis basilaribus confertis longe linearibus; caulinis minoribus alternis. Flores in racemum spiciformem terminalem simplicem v. parce ramosum dispositi, dissiti v. approximati; bractea lanceolata-cuspidata sub flore quoque 1, sepalis simili; bracteola in pedicello brevissimo minore 1. (*Australia*⁴.)

10. **Streptolirion** EDGEW.⁵ — Flores fere *Tradescantiæ*; sepalis oblongis navicularibus (subpetaloideis), demum parum auctis. Petala subæquilonga sublinearia angusta. Stamina fertilia 6; filamentis hypogynis plus minus barbatis; antheris subelliptico-transversis; loculis connectivum medio leviter constrictum marginantibus rimosis. Germen 3-loculare; ovulis in loculo quoque superpositis 2. Fructus membranaceus loculicidus. Semina superposita contigua 2; hilo laterali; embryone sub embryostega lateraliter horizontali. — Herba⁶ alte scandens ramosa; foliis petiolatis cordato-ovatis acuminatis;

1. Spec. ad 30. WIGHT, *lc.*, t. 2082-2089. — A. RICH., *Fl. abyss.*, t. 98. — JACQ., *H. vindob.*, t. 137. — KOTSCH., *Pl. Tinn.*, t. 22 (*Zygomenes*). — DALZ., in *Hook. Journ. Bot.* (1851), 226. — HASSE., *Comm. ind.*, 96. — ROEM. et SCH., *Syst.*, VII, 1150. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 384. — BAK., *Fl. maurit.*, 324. — C.-B. CLKE, *Comm. beng.*, t. 35-39. — BENTH., *Fl. austral.*, VII, 82. — *Bot. Mag.*, t. 1435, 5471 (pleraque sub *Tradescantia* v. *Cyanotide*).

2. *Prodr.*, 271. — ENDL., *Gen.*, n. 1035. — C.-B. CLKE, *Comm.*, 262. — SCHOENL., *Pflanzenfam.*, 67.

3. Nunc minute apiculata cumque sepalis purpureo-lineata, demum arcte involuta marcescentia.

4. Spec. 4, 5. SCHULT. F., *Syst.*, VII, 1192. — F. MUELL., *Fragm. phyt. Austral.*, I, 62. — BENTH., *Fl. austral.*, VII, 90. — HASSE., in *Flora* (1869), 365. — ENDL., in *Lehm. Pl. Preiss.*, II, 55. — BAUER, *Ill. Fl. N. Holl.*, t. 7.

5. In *Trans. Linn. Soc.*, XX, 90, t. 2. — C.-B. CLKE, *Comm.*, 261. — B. H., *Gen.*, III, 852, n. 12. — SCHOENL., *Pflanzenfam.*, 67.

6. *Dioscorearum* nonnullarum v. *Stemonarum* habitu, nunc cirrhifera.

floribus¹ in racemum compositum ad apices ramulorum dispositis; cymis secus axin in axilla bracteæ simplicibus scorpioideo-4-paris; pedicellis brevibus¹. (*India mont.*²)

11. **Spironema** LINDL.³ — Flores fere *Tradescantiæ*; sepalis oblongo-lanceolatis membranaceis v. subscariosis. Petala late oblonga tenuiora. Stamina perfecta 6; filamentis gracillimis flexuosis, demum exsertis; antherarum connectivo late petaloideo cordato-3-angulari; auriculis basalibus loculos inferiores rimosos gerentibus. Germen sessile; stylo apice stigmatoso aspergilliformi-papilloso; ovulis in loculo quoque orthotropis superpositis 2. Fructus membranaceus loculicidus. — Herba perennis; rhizomate repente, nunc stolonifero; ramis aeriis brevibus crassis foliatis; foliis oblongo-lanceolatis vaginatis. Flores⁴ in racemum elatum amplum rigidum compositum dispositi; ramis dissite cymigeris; cymis contractis, ∞ -floris; bracteis paleaceis; bracteolis scariosis. (*Mexicum*⁵.)

12. **Callisia** L.⁶ — Flores fere *Spironematis*; sepalis oblongis v. subellipticis, membranaceis, subscariosis v. viridulis. Petala 3, oblonga v. obovata imbricata. Stamina perfecta 1-3; filamentis gracilibus glabris; antherarum loculis contiguis parallelis (*Leptocallisia*⁷) v. connectivum latum membranaceum marginantibus (*Hapalanthus*⁸). Germen sessile, 2, 3-loculare; ovulis in loculo 2. Fructus 2-dymus v. 3-queter, loculicidus. Semina angulato-3-gona rugosa v. lævia, nunc ab embryostega hilo contraria radiatim striata. — Herbæ repentes teneræ; ramis aeriis gracilibus simplicibus v. superne ramulosis; floribus cymosis v. glomerulatis; cymis pedunculatis et in racemum laxum exsertum dispositis v. (*Hapalanthus*) inter folia floralia complicata sessilibus. (*America trop.*⁹)

1. Cum bracteis roseis.

2. Spec. 1. *S. cordifolium* O. K., *Revis.*, 722. — *S. volubile* EDGEW. — WIGHT, *lc.*, t. 2081. — HASSEK., *Comm. ind.*, 6. — C.-B. CLKE, *Comm. beng.*, t. 40. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 389. — *S. Griffithii* KURZ. — *Tradescantia cordifolia* GRIFF., *Priv. Journ.*, 208.

3. In *Bot. Reg.* (1840), *Misc.*, 26, t. 47. — C.-B. CLKE, *Comm.*, 313.

4. Minuti creberrimi, suaveolentes.

5. Spec. 1. *S. fragrans* LINDL. — HASSEK., *Comm. ind.*, 4. — *S. orthandrum* LINDB., in *Act. Soc. fenn.*, X, 127, t. 4.

6. In *Læfl. It.*, 305; *Gen.*, ed. VI, n. 63. — J., *Gen.*, 45. — LAMK., *Ill.*, t. 35. — ENDL., *Gen.*, n. 1030. — C.-B. CLKE, *Comm.*, 309. — SCHÖENL., *Pflanzenfam.*, 69.

7. B. H., *Gen.*, 854, Sect. 2.

8. JACQ., *St. amer.*, 11, t. 11.

9. Spec. 3, 4. R. et PAV., *Fl. per. et chil.*, t. 73, b. — ROEM. et SCH. F., *Syst.*, I, 346, 527. — GRISEB., *Fl. brif. W.-Ind.*, 524. — SW., *Fl. ind. occid.*, I, 603 (*Tradescantia*). — SAUV., *Fl. cub.*, 158 (*Spironema*). — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 395, t. 95, fig. 12-21. — *Bot. Mag.*, t. 4849 (*Tradescantia*).

13. **Campellia** L.-C. RICH.¹ — Flores fere *Tradescantiæ*; sepalis in pedicellum plus minus incrassatum decurrentibus; extimo sæpe carinato. Petala suborbiculata 3. Stamina 6; connectivi angulati segmentis cylindraceis oblique descendentibus, apice loculiferis. Germinis loculi 2, 3; ovulis orthotropis in quoque 2. Stylus apice stigmatoso capitatus. Fructus calyce oblique aucto carnosulo (colorato) induvius pedicelloque arcuato carnosus fultus; pericarpio membranaceo loculicido; seminibus 1-paucis, subhemisphæricis; hilo lineari; embryone sub embryostega laterali horizontali. — Herba robusta; foliis oblongo-lanceolatis acuminatis; floribus in summo pedunculo e foliorum inferiorum v. delapsorum vagina emerso pauciramocymosis. Bractæ ad apicem pedunculi sub cymis contractis 1-paris 2, herbacæ patentēs v. reflexæ, complicatæ. (*America trop.*²)

14? **Sauvallea** WRIGHT.³ — « Sepala subæqualia; inferius carinatum. Petala subæqualia. Stamina 6, æqualia; filamentis barbatis; antheris connectivi arcuati apici oblique affixis, longitudinaliter rimosis. Germen 2-loculare; ovulis in loculo 2; altero adscendente; altero descendente. Stylus longus exsertus, apice capitato-2-lobus. — Herba debilis; caulibus ramosis ad nodos radicantibus; foliis sessilibus ovatis subpetiolatis; floribus⁴ solitariis e spatha terminali solitaria vix exsertis. (*Cuba*⁵). »

15. **Rheo** HANCE⁶. — Flores *Tradescantiæ*; sepalis petaloideis⁷ imbricatis. Petala paulo majora, imbricata v. torta. Stamina perfecta 6; oppositipetala longiora; filamentis hypogynis subulatis barbatis, primum incurvis; antheris latis; connectivo subsemiorbiculari, apice concavo, paulo supra basin dorsifixo; loculis linearibus marginantibus, longitudinaliter rimosis. Germen sessile; stylo subulato, apice stigmatoso minuto obtuse 3-gono. Ovulum in loculis 1,

1. *Anal. fruit*, 46. — ENDL., *Gen.*, n. 1033. — C.-B. CLKE, *Comm.*, III, 314. — B. H., *Gen.*, III, 855, n. 20. — SCHÖENL., *Pflanzenfam.*, 69. — *Zanonia* CRAM., *En.*, 75 (non L.).

2. *Spec. 1*, variabilis. *C. Zanonia* H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, I, 264. — SEUB., in *Mart. Fl. bras.*, III, I, 246. — GRISEB., *Fl. brit. W.-Ind.*, 523. — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 396. — *C. bibracteata* PR. MAX. WIED. — *C. Boucheana* ROEM. et SCH. F. — *C. Pseudozanonia* K. — *C. mexicana* MART. — *C. Fendleri* HASSK. — *C. Hoffmanni* HASSK. — *Commelina Zanonia* L. — *Tradescantia Zanonia* Sw. — *T. Gona-*

landra SCHLCHTL. — *Zanonia bibracteata* CRAM. — *Gonatandra tradescantioides* SCHLCHTL., in *Linnaea* (1851), 659.

3. In *Sauv. Fl. cub.*, 156. — C.-B. CLKE, *Comm.*, 315. — B. H., *Gen.*, III, 855, n. 21. — SCHÖENL., *Pflanzenfam.*, 69.

4. *Albis*, minutis.

5. *Spec. 1. S. Blainii* WRIGHT. — HASSK., *Comm. ind.*, 61.

6. In *Walp. Ann.*, III, 659. — C.-B. CLKE, *Comm.*, 316. — B. H., *Gen.*, III, 855, n. 22. — SCHÖENL., *Pflanzenfam.*, 69.

7. *Albis*; floribus pulchellis.

orthotropum sessile; micropyle dorsali. Fructus perianthio marcescente stipatus, loculicidus. Semina 1-3, hemisphærica; hilo lineari; embryostega laterali dorsali; cæteris *Tradescantiæ*. — Herba perennis; caulibus brevibus robustis; foliis¹ elongatis confertis; inflorescentia axillari pedunculata, vaginis late bracteiformibus complicatis subcymbiformibus stipata; cymis in summo pedunculo sæpius 2, scorpioideo-1-paris, lateraliter bracteolatis; pedicellis demum recurvis. (*America centr.*²)

16. **Leptorhæco** HEMSL.³ — Flores *Tradescantiæ*; sepalis ovatis herbaceis. Petala paulo majora libera ovato-elliptica tenuissima imbricata. Stamina perfecta 6, hypogyna; filamentis gracilibus nudis; antherarum loculis distinctis brevibus connectivum latiusculum marginantibus. Germen sessile; loculis 3, 1-ovulatis. Fructus breviter ovoideus, calyce cinctus, membranaceus loculicidus; seminibus a dorso compressis inæqui-4-dratis rugosis; hilo ventrali; embryone sub embryostega dorsali minuto ellipsoideo. — Herba tenera ramosa; foliis parvis lanceolatis; floribus⁴ in cymas laxas terminales axillaresque dispositis; pedicellis gracilibus; bractea sub cyma nunc complicata spathiformi, sæpius autem parva. (*America trop. utraque*⁵.)

17. **Zebrina** SCHNITZL.⁶ — Flores fere *Tradescantiæ*; calyce gamophyllo, hinc patulo; lobis 2, 3 (pallide viridibus); carinato 1. Corollæ gamopetalæ tubus tenuis; limbi lobis 3, ovatis patentibus subæqualibus. Stamina 6, fauci affixa; oppositipetala majora; filamentis omnium v. nonnullorum barbatis; antherarum connectivo transverso loriformi, nunc medio apiculato, utrinque loculum brevem rimosum gerente. Germen 3-loculare; ovulis in loculo 2 (*Tradescantiæ*). Fructus sphærico-3-quetor loculicidus, in summo stipite recurvo e perianthio lateraliter exsertus; seminibus in loculo 1, 2, subhemisphæricis rugosis; embryone sub embryostega laterali. — Herbæ laxæ ramosæ, de-

1. Subtus sæpius violaceis.

2. Spec. 1. *R. discolor* HANCE. — *Tradescantia discolor* LHER., *Sert. angl.* (1786), t. 12. — RED., *Lil.*, t. 168. — *Bot. Mag.*, t. 1192, 5078. — SAUND., *Ref. bot.*, t. 48. — *T. spathacea* SW. (1788). — *Ephemerum bicolor* MÖENCH, *H. marb.*, Suppl., 78 (1794).

3. Ex C.-B. CLKE, *Comm.*, 317. — B. H., *Gen.*, III, 856, n. 23. — SCHOENL., *Pflanzenfam.*, 69.

4. Cæruleis, minutis.

5. Spec. 1. *L. floribunda*. — *L. filiformis* C.-B. CLKE, in *Hemsl. Diagn. pl. nov.* (1880). — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 396, t. 96, fig. 1-11. — *Tradescantia filiformis* MART. et GAL., in *Bull. Acad. Brux.* (1842), II, 376. — *Aneilema floribundum* HOOK. et ARN., *Beech. Voy. Bot.*, 311. — BENTH., *Sulph. Dot.* 177.

6. In *Bot. Zeit.* (1849), 870. — C.-B. CLKE, *Comm.*, 317. — SCHOENL., *Pflanzenfam.*, 69.

cumbentes, pendulæ v. scandentes; foliis ovato-lanceolatis¹; floribus in summo pedunculo terminali intra spathas complicatas latiusculas 2 involucentes 1-pari-cymosis, paucis v. ∞ , raro quoque axillaribus. (*Reg. mexicano-texana*².)

18. *Weldenia* SCHULT. F.³—Flores subregulares; α calyce tubuloso, hinc superne subspathaceo fisso; limbo 3-fido. Corollæ tubus elongato-linearis, calyce longior; limbi lobis ovatis patentibus 3. Stamina æqualia 6, tubi parti superiori affixa; filamentis linearibus nudis; antheræ loculis oblongis parallélis contiguïs. Germen sessile ovoideum, 3-loculare; stylo filiformi, apice stigmatoso penicillato exserto. Ovula in loculo quoque ad 6, 2-seriatim superposita. Fructus...⁴ — Herba erecta parum pubescens; rhizomate tuberoso; foliis oblongis integris ad apicem caulis brevis confertis; inferioribus ad vaginas reductis; superioribus cymas florales densissimas subsessiles involucentibus (*Mexicum, America centr.*⁵) »

II. COMMELINEÆ.

19. *Commelina* L. — Flores hermaphroditi v. rarius polygami sepalis 3, inæqualibus imbricatis; extimo sæpius minore crassiore viridiore; intimis latoribus tenuioribus (plus minus coloratis). Petala majora tenuiora (colorata) imbricata v. torta; postico sessili v. anterioribus brevius unguiculato. Stamina hypogyna 6, quorum perfecta sæpius 3, postica; oppositipetalo 1; alternipetalis 2; filamentis gracilibus hinc deflexis; antheris oblongis; postica sæpe majore arcuata subextrorsa; loculis parallélis, in staminibus alternipetalis ad margines v. subintrorsum rimosis. Staminodia antica 3, quorum oppositisepalum 1, sæpe minus v. 0; antheris sterilibus v. parce polliniferis heteromorphis; loculorum lobis sæpe distinctis sphæricis v. glandu-

1. In hortis sæpe 2, 3-coloribus.

2. Spec. 2. LINDL., in *Journ. Hort. Soc. lond.*, V, 139 (*Cyanotis*). — DCNE, in *Rev. hort.* (1855), 141, c. ic. — NEES, *Del. sem. H. wrat.* (1830) (*Cyanotis*). — HENSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 397.

3. In *Flora* (1829), 3, t. 1, A. — C.-B. CLKE, *Comm.*, 319. — B. H., *Gen.*, III, 856, n. 25. — SCHÖENL., *Pflanzenfam.*, 69. — Lampra BENTH., *Pl. Hartweg.*, 95; in *Hook. Icon.*, t. 1236.

4. « Verisimiliter capsularis » (BENTH.).

5. Spec. 1. *W. candida* SCH. F. — ROEM. et SCH. F., *Syst.*, VII, 1136. — HASSK., *Comm. ind.*, 3. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XVII, 454. — HENSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 397. — *W. Schultesii* SCHLCHTL. — *Lampra volcanica* BENTH. — *Rugendalia majalis* ENRENB. (ex C.-B. CLKE). Corollæ albæ tubus dicitur 5 cent. longus et 1 mill. latus, lobi 10-12 mill. longi.

liformibus. Germen sæpius 3-loculare; stylo arcuato, apice stigmatoso; loculis posticis 1, 2-ovulatis; antico autem 1-ovulato, vacuo v. deficiente. Ovula orthotropa v. subhemitropa; micropyle extrorsum laterali. Fructus capsularis loculicidus; loculo antico sæpe vacuo indehiscente v. septicide secedente, nunc omnino abortivo. Semina in loculis fertilibus 1, 2, aut ellipsoidea, aut superposita mutuaque pressione tunc plana, lævia, rugosa, foveolata v. reticulata; hilo lineari; embryo sub embryostega laterali horizontali. — Herbæ ramosæ, erectæ v. varie repentes ascendentesve; foliis ovatis, lanceolatis v. lineari-angustatis, in vagina varia sessilibus v. breviter petiolatis. Inflorescentiæ cymosæ variæ spathacæ; cymis scorpioideis, nunc ad flores paucos v. 1 reductis; pedicellis sæpe post anthesin recurvis fructumque intra spatham maturescentibus. (*Orbis utriusque reg. calid.*) — *Vid. p. 204.*

20. **Anellema** R. BR.¹ — Flores fere *Commelinæ*; sepalis 3, viridibus v. petaloideis, imbricatis; extimo nunc cæteris latiore. Petala 3, obovata inæqui-longe unguiculata imbricata. Stamina 2, 3; filamentis gracilibus glabris v. barbatis; antheris ovatis v. oblongis nunc inæqualibus, 2-rimosis. Staminodia 3, v. rarius 4; antheris difformibus sterilibus (raro polliniferis). Germen 2, 3-loculare; stylo vario; loculis 1, 2- v. ∞ -ovulatis. Fructus loculicidus; seminibus in loculo 1, 2, v. ∞ , 1, 2-seriatim superpositis; testa crassa v. ossea, rugosa v. foveolata; embryo horizontali hilo contrario. — Herbæ perennes, robustæ v. debiles; ramis aeriis erectis v. adscendentibus, simplicibus v. ramulosis; floribus in cymas 1-paras secus axin simplicem v. ramosum, terminalem v. ad folia superiora axillarem, dispositis; inflorescentia bracteisque forma valde variis. (*Orbis utriusq. reg. calid.*²)

21. **Polyspatha** BENTH.³ — Flores fere *Commelinæ*; sepalis 3, na-

1. *Prodr.*, 270. — ENDL., *Gen.*, n. 1028 b. — C.-B. CLKE, *Comm.*, 195. — B. H., *Gen.*, III, 849, n. 6. — SCHÖENL., *Pflanzenfam.*, 64, fig. 32, J-L. — Aphyllæ SALISB., in *Trans. Hort. Soc. lond.*, I, 271. — Anilema K., *Enum.*, IV, 64. — Murdannia ROYL., *Ill. himal.*, 403, t. 95, fig. 3. — *Dichaspermum* WIGHT, *Jc.*, VI, 31, t. 2078. — *Dictyospermum* WIGHT, *loc. cit.*, t. 2069-2071. — *Rhopalephora* HASSK., in *Bot. Zeit.* (1864), 58. — *Piletocarpus* HASSK., in *Flora* (1866), 212. — *Lamprodithyros* HASSK., in *Pet. Moss. Bot.*, 523. — *Dauschia* SEUB., in *Vid. Medd. Nat. Foren. Kjob.* (1872), 123. — *Prio-*

nostachys HASSK., in *Flora, loc. cit.* — *Amelina* C.-B. CLKE, *Comm. beng.*, t. 26.

2. Spec. ad 60. WIGHT, *Jc.*, t. 2072-2077. — REICHB., *Jc. exot.*, t. 136 (*Commelina*). — Hook., *Exot. Fl.*, t. 204. — SEEM., *Fl. vit.*, t. 96. — PAL-BEAUV., *Fl. owar. et ben.*, t. 38, 87 (*Commelina*). — R. BR., *Prodr.*, 270 (part.). — BENTH., *Fl. austral.*, VII, 85. — FR. et SAV., *En. pl. jap.*, II, 94. — Hook. f., *Fl. brit. Ind.*, VI, 374.

3. In Hook. *Niger Fl.*, 543. — C.-B. CLKE, *Comm.*, 194, t. 3. — B. H., *Gen.*, III, 849, n. 5. — SCHÖENL., *Pflanzenfam.*, 64.

vicularibus; extimo majore. Petala longiora inæqui-unguiculata imbricata. Stamina perfecta 3; filamentis gracillimis; antherarum æqualium v. inæqualium loculis contiguis parallelis; 3 autem ad staminodia filiformia reducta; antheris sterilibus minutis. Germen sessile, 2-loculare; stylo longo gracili; ovulis in loculo solitariis orthotropis. Fructus ellipsoideus obtusus compressiusculus nitidus, 2-locularis, loculicidus. Semina¹ elliptica, intus subplana; hilo lineari; embryone sub embryostega extrorsum laterali; integumento ab embryostega radiatim sulcato. — Herba debilis; ramis basi reptantibus moxque erectis simplicibus; foliis majusculis vaginatis breviter petiolatis. Inflorescentia terminalis parce ramosa; cymis subsessilibus secundum ramos elongatos numerosis dissitis contractis, 1-paris, arcte reflexis; bracteis parvis latis. (*Africa trop. occid.*²)

22. **Cochlostema** LEME³. — Flores irregulares; sepalis 3, petaloideis, imbricatis. Petala 3, alterna, fimbriato-ciliata, imbricata. Stamina fertilia 3, quorum 1, sepalo medio superpositum; filamentum brevi incurvo, basi extus pilis flavis aucto; 2 autem (verticilli interioris) petalis superposita; connectivo in laminam petaloideam elongatam involutam basiue cucullatam dilatato; antheris omnium 2-locularibus; loculis spiraliter pluries tortis. Staminodia 2, oppositisepala breviter, penicillio pilorum moniliformium coalita. Germen 3-loculare; stylo longe subulato, apice integro minute stigmatoso. Ovula in loculis 8-14, 2-seriata, incomplete hemitropa; micropyle extrorsa. Fructus anguste oblongus capsularis, loculicide 3-valvis. Semina ∞ , 2-seriatim superposita quadrata; embryone sub embryostega laterali parvo. — Herba subacaulis robusta; foliis rosulatis amplis oblongo-lanceolatis vaginantibus; floribus⁴ in racemos cymigeros dispositis; bracteis amplis coloratis 2-4, verticillatis; cymis 1-paris; flore terminali sæpe sterili bracteiformi sulcato. (*Ecuadoria andin.*⁵)

1. « Albidis. »

2. Spec. 1. *P. paniculata* BENTH.

3. *Ill. hort.*, VI (1859), *Misc.*, 70, t. 217. — C.-B. CLKE, *Comm.*, 231. — B. H., *Gen.*, III, 850, n. 7. — SCHÖENL., *Pflanzenfam.*, 65, fig. 34, 35.

4. Roseis; corolla cærulescente.

5. Spec. 1. *C. odoratissimum* LEME. — *Bot. Mag.*, t. 5705. — *C. Jacobianum* K. KOCH et LIND., in *Wochenschr.* (1867), 322. — MAST., in *Gardn. Chron.* (1868), 265, 323, c. tab.; in *Journ. Linn. Soc.*, XIII, 204, t. 4. — *Fl. serres*, XVIII, 33, t. 1837-1839.

III. POLLIEÆ.

23. **Pollia** THUNB. — Flores hermaphroditi; sepalis 3, membranaceis latiusculis imbricatis persistentibus. Petala 3, minora obovata subæqualia imbricata. Stamina 3-6, aut fertilia omnia; filamentis declinatis gracilibus glabris; antherarum ovatarum loculis parallelis rimosis; aut 3 ad staminodia antica reducta; filamentis brevioribus anthera parva sterili terminatis. Germen liberum, 3-loculare; stylo simplici, apico stigmatoso; ovulis orthotropis in loculo quoque 2-∞. Fructus sphaericus v. ovoideus siccus indehiscens, intus parce pulposus; pericarpio fragili (sæpius cyanescente) nitido. Semina 1-∞, angulata, dorso plana, lævia (fuscata) albuminosa; embryone subembryostega laterali hilo subcontrario. — Herbæ perennes; rhizomate brevi; ramis aeriis e basi repente adscendentibus v. erectis, sæpe robustis; foliis majusculis vaginatis; floribus in racemum terminalem laxè compositum v. brevem compactum contractumque dispositis; ramis cymigeris; cymis 1-paris sparsis, subsessilibus v. stipitatis, demum rectis; pedicellis brevibus; bracteis parvis v. 0, sub cymis nunc majoribus subfoliaceis. (*Asia et Oceania calid.*) — *Vid. p. 207.*

24. **Pollisota** REICHB.¹ — Flores fere *Pollieæ*; sepalis subæqualibus petaloideis imbricatis; extimo nunc paulo majore. Petala subsimilia imbricato-conniventia, sæpius demum patentia. Stamina antherigera 3, oppositipetala; filamentis linearibus nudis; antheris inæqualibus, quarum angustiores 2, nunc steriles; majore autem tertia petalo extimo opposita; filamentis sub medio dorsifixis; loculis introrsum rimosis. Staminodia alternipetala 3, v. nunc 2; antheris minimis v. 0; filamento pilis longis moniliformibus instructo. Germeu sessile; styli ramis brevibus v. lobis stigmatosis 3; loculis germinis 3 (quorum minor v. vacuus anticus 1). Ovula in loculo quoque 2-8, suborthotropa. Fructus ovoideus, baccatus v. carnosulus. Semina pauca, 1, 2-seriatim superposita, quadrata v. subpyramidata, lævia v. rugosa; embryone (Ordinis) horizontali. — Herbæ perennes; caule brevi v. elongato valido; foliis confertis vaginantibus imbricatis; floribus² in

1. *Consp.*, 59. — SPACH, *Suit. à Buff.*, XIII, 122. — MEISSN., *Gen.*, 407 (311). — ENDL., *Gen.*, 125. — C.-B. CLKE, *Comm.*, 130, t. 5,

fig. 3, 4. — B. H., *Gen.*, III, 847, n. 2. — SCHOENL., *Pflanzenfam.*, 62, fig. 31.

2. Albis, viridulis v. rarius cæruleis.

racemum terminalem densum, cylindraceum, anguste oblongum v. pyramidatum, dispositis; bracteis alternis; cymis ad bracteas axillaribus scorpioideis; pedicellis gracilibus longiusculis v. subnullis. (*Africa trop.*¹)

25? **Athyrocarpus** SCHLCHTL². — Flores (fere *Commelinæ*) irregulares; sepalis ovatis (viridibus) patentibus imbricatis; extimo sæpius latiore. Petala majora tenuiora late obovata imbricata; majoribus 2, longius unguiculatis. Stamina perfecta oppositipetala 3; filamentis gracilibus; antheris oblongis; loculis subparallelis; intermedia autem majore; loculis basi liberis. Staminodia 2, 3; antheris sterilibus hastatis. Germen 3-loculare; loculis posticis 2-ovulatis; antico autem 1-ovulato. Fructus³ subsphæricus; pericarpio indehiscente fragili nitido, intus parce pulposo. Semina rugosa v. foveolata; embryone hilo subcontrario extrorsum subembryostega laterali. — Herbæ ramosæ debiles; cymis scorpioideis intra spatham complicatam 2-fidis; inflorescentia cæterisque *Commelinæ*⁴. (*America trop. utraque*⁵.)

1. Spec. ad 8. P.-BEAUV., *Fl. owar. et ben.*, t. 15 (*Commelina*). — BENTH., *Niger Fl.*, 544. — MAST., in *Gardn. Chron.* (1878), 527. — *Bot. Mag.*, t. 5318. — WALP., *Ann.*, III, 658.

2. In *Linnaea*, XXVI, 454 (1853). — B. H., *Gen.*, III, 847, n. 3. — *Phæospherion* HASSE., in *Flora* (1866), 212. — C.-B. CLKE, *Comm.*, 135. — SCHOENL., *Pflanzensam.*, 63.

3. Cyanei, albidii v. purpurascens.

4. A qua genus pericarpium indehiscentis indolis solum differt.

5. Spec. 4. RED., *Lil.*, t. 479 (*Commelina*). — BENTH., *Sulph. Bot.*, 176 (*Commelina*). — GRISEB., *Fl. brit. W.-Ind.*, 525 (*Commelina*). — SAUV., *Fl. cub.*, 157 (*Commelina*). — SCHLCHTL., in *Linnaea*, XXVI, 454 (*Commelina*?). — HASSE., *Comm. ind.*, 2 (*Phæospherion*). — MEISSN., in *Vid. Medd. Kjob.* (1872), 125 (*Commelina*). — KL., in *Schomb. Faun. et fl. guian.*, 1064, 1117 (*Commelina*). — SEUB., in *Mart. Fl. bras.*, III, 1, 262 (*Commelina*). — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 385, t. 95, fig. 1-11.

CXXX

XYRIDACÉES

Le genre *Xyris*¹ (fig. 145-150) est caractérisé par des fleurs herma-

Xyris indica.

Fig. 148. Fruit déhiscent.



Fig. 145. Port.

Fig. 149. Graine. Fig. 150. Graine, coupe longitudinale.

phrodites, à court réceptacle convexe. Sa base porte un double

1. L., *Gen.*, ed. I, n. 31; ed. VI, n. 64. — J., *Gen.*, 44. — GENTH., *Fruct.*, I, t. 15. — LAMK., *Ill.*, t. 36. — TURP., in *Dict. sc. nat.*, All., t. 189. — ENDL., *Gen.*, n. 1025; *Iconogr.*, t. 13. — K., *Enum.*, IV, 2. — B. H., *Gen.*, III, 842, n. 1. — ENCL., *Pflansenfam.*, II, 4, p. 20, fig. 7-10. — Schismazon STEUD., in *Bot. Zeit.* (1856), 391. — Kotyiletiti ADANS., *Fam. des pl.*, II, 544.

périanthe : un calice irrégulier, qui a deux folioles postéro-latérales, relativement assez épaisses, rigides, carénées ou même ailées sur leur ligne médiane dorsale¹; et une troisième², antérieure, enveloppée dans la préfloraison par les précédentes, membraneuse, pétaloïde, enveloppant d'abord elle-même la majeure partie de la corolle. Celle-ci est gamopétale, plus ou moins irrégulière, à tube court ou allongé,

Xyris indica.



Fig. 146. Fleur, coupe longitudinale.

Fig. 147. Diagramme.

parfois très étroit, et à limbe membraneux, d'une grande délicatesse, partagé en trois lobes égaux ou peu inégaux, obtus, subvalvaires ou un peu imbriqués dans la préfloraison, parfois un peu corrugués. Deux d'entre eux sont antérieurs. A la gorge de la corolle s'insèrent six étamines, dont trois oppositipétales, fertiles, plus courtes que la corolle. Elles ont un filet court, grêle ou subulé, et une anthère oblongue, insérée sur le filet par la portion inférieure du dos du connectif, avec deux loges parallèles, plus ou moins larges, parfois libres en bas, déhiscentes par des fentes longitudinales extrorses³. Les étamines alternipétales sont stériles et peuvent manquer; elles ont un filet dressé et une anthère sans pollen, à deux lobes membraneux, courts ou plus ou moins saillants, ou réduits à l'état de pinceau.

1. Souvent considérées comme des bractées latérales et rappelant l'appendice parinerve postérieur des Cypéracées, Iridacées, etc.

2. Souvent regardée comme une bractée.

3. Le connectif peut s'élargir horizontale-

ment, de façon à ressembler, comme dans plusieurs Commelinacées, à la barre transversale d'un T, avec une loge courte à chacune de ses extrémités. Le pollen est aussi semblable à celui des Commelinacées.

Le gynécée sessile a un ovaire à trois loges alternipétales, complètes ou incomplètes, qui est surmonté d'un style entier ou partagé plus ou moins profondément en trois branches dont le sommet stigmatifère se dilate d'une façon variable. Chaque placenta porte de nombreux ovules, bisériés, obliquement ascendants, orthotropes; le micropyle supérieur. Le fruit est enveloppé du périanthe plus ou moins marcescent; il est capsulaire, loculicide; et les graines, ovoïdes ou allongées-fusiformes, ont un hile basilaire, un sommet souvent un peu renflé, un tégument extérieur strié de côtes longitudinales saillantes, un albumen ordinairement farineux, et un petit embryon apical, surmontant l'albumen, largement turbiné ou lenticulaire, aplati.

Les *Xyris* habitent les régions chaudes des deux mondes. Ce sont des herbes vivaces ou rarement annuelles. Elles ont souvent un rhizome qui peut porter plusieurs sortes d'axes aériens¹ : les uns à feuilles; les autres à fleurs; d'autres encore à la fois foliifères et florifères. Les feuilles sont basilaires, souvent distiques, linéaires ou étroitement lancéolées, entières et rigides. Les fleurs² sont portées au sommet d'une hampe dressée : elles y forment un capitule sphérique ou ovoïde, rarement cylindrique, insérées chacune dans l'aiselle d'une bractée coriace ou rigide, imbriquée, sous laquelle se trouve finalement caché le fruit mûr. On compte actuellement plus de cent espèces³ de *Xyris*.

Les *Abolboda*, de l'Amérique tropicale, sont à peine distincts des *Xyris*. Ils n'ont pas de sépale antérieur; et leur style à sommet stigmatifère trilobé et frangé, est pourvu un peu au-dessus de sa base de trois appendices analogues à ceux des *Pauridia* et des *Dupatya*, linéaires, récurvés ou réfléchis.

C'est SALISBURY qui a créé en 1812 un Ordre des Xyridées⁴, nommées Xyridacées⁵ par LINDLEY en 1836. C'étaient pour B. DE JUSSIEU

1. A. NILLS., in *Kgl. Svensk. Vet. Akad. Handl.* (1892), XXIV. — TH. HOLM, in *Bot. Gaz.*, XVIII, 313.

2. Bleues, blanches, jaunes ou purpurines, moyennes ou souvent petites, fugaces.

3. W., *Phytogr.*, t. 1. — LABILL., *Pl. N. Holl.*, t. 10. — R. et PAV., *Fl. per. et chil.*, t. 71. — RUDGE, in *Trans. Linn. Soc.*, X, 15. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 205. — SEUB., in *Mart. Fl. bras.*, III, 1, 211, t. 22-29. — STEUD., *Syn. pl. glum.*, II, 284. — A. NILLS., *loc. cit.*, 25, t. 1-6. — R. BR., *Prodr.*, 256. — F. MUELL., *Fragm.*

phyt. Austral., VIII, 203. — ENDL., in *Pl. Preiss.*, II, 55. — BERTH., *Fl. austral.*, VII, 76. — HOOK. F., *Fl. tasm.*, II, 61; *Fl. brit. Ind.*, VI, 364. — O. K., *Revis.*, 719.

4. In *Trans. Roy. Hort. Soc. lond.*, I, 326. — K., *Enum.*, IV, 1. — DESVX, in *Ann. sc. nat.*, sér. 1, XIII, 49 (Fam.). — LINDL., *Nat. Syst. Clav.* (1830); *Nix. pl.*, 36 (*Glumacearum* Ord.). — ENDL., *Gen.*, 123, Ord. 47. — B. H., *Gen.*, III, 837, Ord. 181.

5. *Nat. Syst.*, ed. II, 288; *Veg. Kingd.*, 187, Ord. 55. — ENGL., *Pflanzenfam.*, 18.

des Juncées; et A.-L. DE JUSSIEU ne savait si elles se rapprochaient plus des Cypéracées que des Iridacées auxquelles ADANSON les avait unies¹, sans tenir compte de la situation supère de leur ovaire. Par celui-ci elles sont voisines des Commelinacées dont elles ont à peu près la corolle et les ovules orthotropes, plus allongés. Mais, par leurs organes végétatifs² et leur inflorescence, elles sont plutôt les analogues des Restiacées et des Juncées³ qui n'ont pas leur corolle gamopétale à texture si délicate. Elles sont originaires des régions les plus chaudes des deux mondes⁴ et sont bien peu usitées⁵. On cite seulement le *X. indica*⁶ (fig. 145-150) et les *X. americana* VAHL et *vaginata* SPRENG. comme remèdes des affections cutanées, notamment de la lèpre, supprimant promptement, à ce qu'on assure, l'inflammation et le prurit les plus intenses⁷.

1. *Fam. des pl.*, II, 58, 60.

2. Sur leur structure, A. NILLS., *loc. cit.*, 6.
— POULS., in *Vid. Medd. Kjob.* (1892), c. tab. 2.
— V. TIEGH., in *Journ. Morot*, I, 305.

3. Les organes végétatifs et l'ovaire infère distinguent complètement les Hydrocharidacées.

4. Sur leur distribution géographique, détaillée, A. NILLS., *loc. cit.*, 19.

5. MART., *Fl. bras.*, fasc. XV, 209.

6. L., *Spec.*, 62. — ROXB., *Fl. ind.*, I, 179.

— MART., in *Wall. Pl. as. rar.*, III, 30. — RHEEDE, *H. malab.*, IX, t. 7.

7. Voy. Pis., *Hist. nat. Bras.* (1648), 119 (*Jupicai*, *Erva d'Empigen*). On emploie généralement ces plantes en applications topiques, acidifiées avec du vinaigre ou cuites dans l'huile. On attribue leurs propriétés à une essence résidant dans le rhizome.

GENERA

1. **Xyris** L. — Flores hermaphroditi parum irregulares; receptaculo minute convexo. Sepala 3, libera, quorum postica 2, bractei-formia rigida carinata v. anguste alata; antico multo latiore petaloideo corollam primum involvente et a posticis operto. Corolla gamopetala; tubo brevi v. elongato, latiusculo v. tenui; limbi lobis subæqualibus tenuissime membranaceis, subvalvatis v. leviter imbricatis, nunc leviter corrugatis. Stamina 6, fauci inserta, quorum oppositipetala 3, fertilia, perianthio breviora; filamentis erectis brevibus, gracilibus v. subulatis; antheris longioribus ad basin dorsifixis, oblongis erectis; loculis contiguis linearibus, nunc basi liberis, extrorsum rimosis, rarius ob connectivum transverse elongatum valde distantibus. Staminodia alternipetala 3, 2, v. 0; filamentis brevibus; anthera sterili plus minus dilatata, 2-loba, v. lobis linearibus penicillatis. Germen sessile liberum; stylo terminali simplici v. sæpius plus minus longe 3-ramoso; ramis apice stigmatoso varie dilatatis. Ovula in loculis plus minus completis ∞ , orthotropa obliqua; micropyle supera. Fructus capsularis loculicidus. Semina ovoidea v. oblongo-fusiformia, extus longitudinaliter costata; hilo basilari; apice tuberculata; albumine farinaceo; embryone apicali late turbinato v. lenticulari. — Herbæ annuæ v. sæpius perennes; rhizomate brevi; foliis basilaribus ensatis rigidis, linearibus v. anguste lanceolatis; floribus in summo scapo capitatis; capitulis sphæricis, ovoideis v. raro cylindræis; bracteis rigidis v. coriaceis imbricatis, 1-floris, fructum demum occultantibus. (*Orbis utriusque reg. calid.*) — *Vid. p. 224.*

2. **Abolboda** H. B.¹ — Flores² fere *Xyridis*; sepalo antico 0.

1. *Pl. æquin.*, II, 109, t. 114. — K., *Syn.*, I, 265; *Enum.*, IV, 25. — ENDL., *Gen.*, n. 1026. — B. H., *Gen.*, III, 842, n. 2. — ENGL., *Pflan-*

zenfam., 19. — *Chloarum* W., ex LINK, in *Spr. Jahrb.*, III, 74.

2. Nunc sæpius cærulei, parvi.

Corollæ tubus tenuis; lobi ovati v. elliptici¹. Staminodia inter lobos 3, tenuiter filiformia glabra, v. sæpius 0. Stamina fertilia 3. Germen² apice acutiusculum v. cupulato-6-dentatum; stylo longo, supra basin appendiculis linearibus reflexis v. recurvis 3 instructo, apice stigmatoso fimbriato-3-lobo. Placentæ 3, parietales v. extus ab apice plus minus alte solutæ liberæ adscendentes. Ovula orthotropa ∞ , fructus, semina cæteraque *Xyridis*. — Herbæ perennes; foliis basilaribus scapisque *Xyridis*, nunc basi 1-foliatis v. altius 2-6-vaginat; vaginis per paria suboppositis; capitulis brevibus v. angustis; bracteis 1-floris laxè imbricatis v. appressis. (*America trop.*³)

1. Imbricati v. torti; ut videtur, cærulei.

2. Ubi notum oblongo-3-quetrum.

3. Spec. ad 7. SEUB., in *Mart. Fl. bras.*, III, 1, 222, t. 30. — NILS., *loc. cit.*, 62.

CXXXI

MAYACACÉES

Dans le genre *Mayaca*¹ (fig. 151-156), le seul de cette petite famille, les fleurs sont régulières, hermaphrodites, à réceptacle convexe et à verticilles trimères. Les sépales sont libres et subvalvaires; l'un d'eux est antérieur. Les pétales, alternes et plus grands, sont d'un tissu beaucoup plus délicat, atténués à la base, orbiculaires ou obovales,

Mayaca fluviatilis.

Fig. 152. Fleur.

Fig. 153. Fleur, coupe longitudinale.



Fig. 151. Port.

Fig. 154. Fruit.

Fig. 155.
Graine.

Fig. 156. Graine, coupe
longitudinale.

tordus dans la préfloraison. L'androcée est formé de trois étamines alternipétales et hypogynes, à filet dressé, court ou allongé; à anthère basifixe, biloculaire; les sillons de déhiscence, presque marginaux, présentant une solution de continuité irrégulière ou tardive, en même

¹ AUBL., *Pl. Guian.*, I, 42, t. 15. — J., *Gen.*, 45 (Joncees). — LAMK., *Ill.*, t. 36. — SCHOTT et ENDL., *Melet.*, 23, t. 3. — ENDL., *Gen.*, n. 1027. — K., in *Ber. Berl. Akad.* (1841), 113; *Enum.*, IV, 31. — STEUD., *Pl. glum.*, II, 289. — SPACH,

Suit. a Buff., XIII, 122. — B. H., *Gen.*, III, 843. — ERGL., *Pflanzenfam.*, II, 4, p. 18, fig. 6. — SYENASCHREB., *Gen.*, 39. — BRASLIA VAND., *Fl. lus. et bras. Spec.*, 4, t. 1, fig. 2. — COLLETTA VELL., *Fl. flum.*, 32; *Alt.*, I, t. 79 (non COMM.)

temps que le pollen s'échappe souvent par un tube court, simple ou double, à orifice oblique ou tronqué, qui surmonte l'anthère. L'ovaire, supère et à large base sessile, est surmonté d'un style simple, grêle, à sommet stigmatifère entier ou découpé de trois dents obtuses. Il y a dans l'ovaire trois placentas pariétaux, oppositipétales, chargés d'ovules orthotropes, d'abord bisériés, horizontaux ou obliques. Le fruit est une capsule entourée du péricarpe et de l'androcée desséchés. Elle s'ouvre plus ou moins nettement en valves membraneuses, placentifères sur leur ligne médiane. Les graines, ovoïdes ou sphériques, ont un hile basilaire et un bec apical plus ou moins prononcé. Elles renferment, sous d'épais téguments striés ou tuberculeux, un abondant albumen charnu et plus ou moins farineux, qui entoure un embryon turbiné ou lenticulaire, voisin du micropyle.

Les *Mayaca* sont d'humbles herbes, comparées souvent à des Mousses aquatiques, des régions chaudes des deux Amériques. Leurs tiges¹ grêles et ramifiées, rampantes sur la vase ou flottant dans l'eau, portent des racines adventives et des feuilles alternes, petites, nombreuses, linéaires-filiformes, pressées en spirale sur les axes. Les fleurs², petites et délicates, occupent solitaires l'aisselle de certaines feuilles ou forment au sommet des axes une petite cyme capituliforme. La base de leur pédicelle grêle est accompagnée d'une bractée membraneuse, translucide, plus large que deux bractéoles de même consistance qui se trouvent sur ses côtés. On en distingue une demi-douzaine d'espèces³.

Cette famille a été comparée aux Commelinacées et Xyridacées, à cause de ses ovules orthotropes. Elle rappelle bien les premières par les caractères de son péricarpe. Mais ses étamines et ses organes de végétation sont tout particuliers. Elle n'a rien de l'inflorescence des Xyridacées, ni de l'irrégularité de leur péricarpe. Nous ne voyons pas bien les ressemblances qu'on lui a supposées⁴ avec les Hydrocharidacées, plantes à réceptacle floral concave et à ovaire infère; il n'y a là que des analogies végétatives, et qui, vraisemblablement, sont principalement dues à la station.

1. Sur leur structure, POULSEN, in *K. Dansk. Vid. Selsk. Forh. Kjob.* (1886). — SCHLEID., ex ENGL., *loc. cit.*, 17.

2. Roses ou lilacées.

3. SEUB., in *Mart. Fl. bras.*, III, I, 227, t. 21.

4. ENGL., *loc. cit.*, 18.

CXXXII

PHILYDRACÉES

Nous n'admettons dans cette petite famille que le genre *Philydrum*¹ (fig. 157-163), dont les fleurs irrégulières sont hermaphrodites, à

Philydrum (Hetæria) pygmaeum.



Fig. 157. Port.

Fig. 158. Fleur.



Fig. 159. Diagramme.

réceptacle convexe. Il porte deux sépales indépendants, dont un anté-

¹ BANKS, ex GÆRTN., *Fruct.*, I, 62, t. 16, fig. 10. — LAMK, *Ill.*, I, 4. — ENDL., *Gen.*, n. 1061. — B. H., *Gen.*, III, 840, n. 1. —

SCHNIEL., *Iconogr.*, I, t. 52. — CAR., *Philydr.*, in DC. *Mon. Phaner.*, III (1881), 2. — ENGL., *Pflanzenfam.*, II, 4, p. 75, fig. 41.

rieur, enveloppé par le postérieur¹ dans le bouton. En dedans d'eux se voient deux pétales, plus petits, plus délicats de tissu et antéro-latéraux, se rapprochant l'un de l'autre ou s'unissant en avant sur la ligne médiane de la fleur. Là, s'insère, en dedans d'eux, une étamine antérieure, formée d'un filet aplati et d'une anthère introrse, biloculaire et déhiscente par deux fentes longitudinales, rectiligne, arquée ou contournée en spirale, suivant les espèces. L'ovaire supère a trois loges complètes ou incomplètes, dont une antérieure; il est trigone, surmonté d'un style droit ou arqué, à sommet stigmatifère renflé. Les ovules sont nombreux sur chaque placenta, orthotropes². Le fruit est sec, loculicide, plus ou moins nettement trivalve ou irrégulièrement déchiré. Les graines nombreuses, sessiles, ont plus ou moins nettement la forme d'un barillet, surmonté d'un petit appendice³ et inséré par un pied circulaire et concave. Le tégument extérieur est strié en spirale. L'albumen, charnu, plus ou moins farineux, entoure un embryon axile, cylindrique, à radicule tournée vers le micropyle.

On connaît quatre espèces de ce genre, asiatiques et océaniques. Ce sont des herbes vivaces, humbles ou élevées, à rhizome chargé de racines adventives. Les branches aériennes, glabres ou laineuses, portent des feuilles alternes, distiques, rapprochées en rosette et plus grandes à la base, linéaires ou ensiformes, rectinerves. Les inflorescences sont simples ou ramifiées; elles représentent des épis dont les bractées spathiformes sont uniflores.

Dans le *P. lanuginosum* (fig. 160-163), l'étamine a un filet libre et une anthère deux fois contournée sur elle-même en spirale. Les loges ovariennes sont incomplètes; les feuilles, ensiformes; l'inflorescence, longue et simple. Ce sont là les caractères d'une section *Garciana*⁴.

Dans le *P. pygmaeum* (fig. 157-159), australien, type d'une section *Pritzelia*⁵, les feuilles sont petites, peu nombreuses, linéaires; l'épi simple est pauciflore; l'anthère, fortement arquée; le filet, uni aux deux pétales qui occupent ses côtés; l'ovaire et le fruit, à loges complètes.

Dans la section *Helmholtzia*⁶, les feuilles sont ensiformes; l'inflorescence est composée; l'anthère est à peu près rectiligne.

1. Représentant deux folioles.

2. A double tégument.

3. De nature arillaire?

4. LOUR., *Fl. cochinch.*, 14 (antér.?).

5. F. MUELL., *Descr. pap. pl.*, 1, 13. — B. H., *Gen.*, III, 840, n. 2. — ENGL., *Pflanzenfam.*,

76. — *Heteraria* ENGL., *Gen.*, 138 (non BL.). — K., *Enum.*, III, 380. — *Phytidrella* CAR., in *N. Giorn. bot. ital.*, X, 91; *Philydr.*, 4.

6. F. MUELL., *Fragm. phyt. Austral.*, V, 202. — CAR., *Philydr.*, 5. — B. H., *Gen.*, III, 841, n. 3. — ENGL., *Pflanzenfam.*, 76.

Ainsi composé¹, le genre est formé de plantes terrestres ou sub-aquatiques², petites ou grandes, glabres ou velues, qui habitent les régions chaudes de l'Asie et de l'Océanie.

. On peut dire qu'elles représentent une forme amoindrie des Comelinacées, notamment par les *Cartonema*, qui ont la même inflores-

Phylidrum (Garciana) lanuginosum.



Fig. 160. Pétales et étamine.

Fig. 161. Fruit déhiscent.

Fig. 162. Graine.

Fig. 163. Graine, coupe longitudinale.

cence. L'ovule et la graine orthotropes sont, en somme, analogues dans les deux groupes, quoique ayant ici le grand axe plus long, et l'embryon plus développé, par suite plus engagé dans l'axe de l'albumen. Le port de certains *Phylidrum* rappelle assez bien celui de quelques Iridacées, et l'irrégularité de la fleur monandre a fait songer à une affinité avec les Orchidacées; mais il n'y a pas ici de véritable labelle en face de l'étamine unique; et le fruit supère est totalement différent, soit par le péricarpe, soit par les semences³. Ces différences sont déjà très nettement indiquées dans l'ovaire, surtout quand ses loges sont complètes.

1. *Phylidrum* { 1. *Garciana* (LOUR).
2. *Pritzelia* (F. MUELL.)
3. *Helinchothisia* (F. MUELL.).
2. R. BR., *Gen. Rem. terr. austr.*, 378;
Prodr., 265. — GRIFF., *lc. pl. asiat.*, t. 269,
270; *Notul.*, III, 230. — GUILLEM., *lc. pl. aus-*

tral., t. 5. — K., *Enum.*, III, 380. — ENDL.,
in *Lehm. Pl. Preiss.*, II, 45. — BENTH., *Fl.*
austral., VII, 73, 74 (*Pritzelia*), 75 (*Helinchothisia*).
— *Bot. Mag.*, t. 783, 6056.
3. Voy. SCHLEID. et VOC., in *Nov. Act. nat.*
cur., XX, t. 10, fig. 4-6.

CXXXIII

RAPATÉACÉES

I. SÉRIE DES SPATHANTHUS.

Le *Spathanthus*¹ *unilateralis* (fig. 164-170), seule espèce de ce genre, est une plante à fleurs régulières, dont le court réceptacle

Spathanthus unilateralis.

Fig. 165. Bouton, entouré
de ses bractées.

Fig. 167. Fleur, coupe
longitudinale.

Fig. 170. Graine,
coupe
longitudinale.

Fig. 164. Inflorescence.

Fig. 166. Fleur.

Fig. 168. Fruit.

Fig. 169. Graine.

porte trois sépales allongés, scarieux, tordus ou imbriqués dans le

1. DESVX, in *Ann. sc. nat.*, sér. 1, XIII, 45,
t. 4. — ENDL., *Gen.*, n. 1053. — K., *Enum.*, III,
368. — ROB. SCHOMB., *Rapat. Frid.-Aug.* u.

Saxo-Frid. — KUNCKE, in *Linnaea*, XXXVII
488, t. 1, fig. 30-35. — B. H., *Gen.*, III, 850,
n. 6. — ENGL., *Pflanzenfam.*, 31, fig. 15, H-J.

bouton. La corolle est gamopétale, à tube court et cylindrique, avec trois lobes alternisépales, membraneux, très minces, translucides, généralement tordus dans la préfloraison. A la gorge de la corolle s'insèrent six étamines, superposées, trois à ses lobes, et trois aux sépales. Elles ont un filet court et une anthère basifixe, étroite, allongée, biloculaire, introrse, déhiscente par un pore oblique près de son sommet obtus. Le gynécée est formé de trois carpelles alternipétales, libres dans une grande portion de leur région ovarienne, unis seulement tout à fait en bas. Au fond des échancrures qui séparent leurs lobes, s'insère un style presque gynobasique, linéaire, à sommet stigmatifère indivis. Dans l'angle interne de chaque ovaire, tout près de la base, s'attachent deux ovules ascendants, collatéraux, anatropes, à micropyle inférieur et extérieur. Le fruit n'est plus formé que d'un seul carpelle fertile; les autres avortent. Il est sec, membraneux et ne s'ouvre que tardivement suivant sa longueur. Il renferme une graine ovoïde-oblongue, dont les téguments, finement striés, enveloppent un abondant albumen farineux, avec un petit embryon déprimé, lenticulaire, appliqué à la base de l'albumen.

C'est une grande herbe vivace¹, des forêts marécageuses de la Guyane. Son rhizome porte de longues feuilles basilaires, distiques, coriaces et rectinerves, atténuées à la base en un pétiole qui se dilate bientôt en une longue gaine compliquée. D'entre les feuilles se dégage une hampe qui supporte une inflorescence rappelant extérieurement celle des Aracées, avec une spathe longuement acuminée. Son épaisse côte porte un grand nombre de fleurs sessiles, dont l'ensemble simule un épi unilatéral, en partie inclus. Chaque fleur est accompagnée de nombreuses bractéoles linéaires, inégales, plus ou moins imbriquées, à peu près de la longueur du périanthe.

II. SÉRIE DES RAPATES.

Les *Rapatea*² (fig. 171-173) se distinguent avant tout de la série précédente par la non-indépendance de leurs carpelles. Ils ont des

1. SEUB., in *Mart. Fl. bras.*, III, I, t. 18, fig. 2. — SPACH, *Suit. à Buff.*, XIII, 134. — STEUD., *Syn. pl. glum.*, II, 313. — *R. unilateralis* ROEM. et SCH., *Syst.*, VII, 1149. — *Mnasisium unilaterale* RUDG., *Pl. Guian.*, I, 12, t. 11.

2. AUBL., *Pl. Guian.*, I, 305, t. 118. — J., *Gen.*, 44 (Joucs). — DESVX, in *Ann. sc. nat.*, sér. I, XIII, t. 4. — BARTL., *Ord.*, 40 (Commelinacées). — LINDL., *Veg. Kingd.*, 187 (Xyridacées). — K., *Enum.*, III, 366. — ENDL.,

fleurs régulières, à trois sépales scarieux, lancéolés, concaves, tordus ou imbriqués. La corolle a un tube large et court, hyalin et d'un tissu très délicat, comme ses trois lobes obtus, veinés, un peu corrugués, tordus ou imbriqués, marcescents. Sa gorge porte six étamines, superposées trois aux sépales et trois aux divisions de la corolle. Elles ont un filet court, dressé, et une anthère dressée, allongée, introrse, avec deux loges que parcourent des sillons longitudinaux. La déhiscence se produit en haut et en dedans de ces loges, et l'ouverture oblique se trouve au-dessous d'un appendice à col rétréci et géniculé à sa base. L'ovaire, supère et sessile, obtus ou un peu déprimé

Rapates paludosa.

Fig. 171. Fleur.

Fig. 173. Fruit
déhiscent.

Fig. 172. Fleur, coupe
longitudinale.

à son sommet, a trois loges, complètes ou non, superposées aux sépales, et il est surmonté d'un style long, grêle et indivis. Dans chaque loge, un ovule s'attache à la base de l'angle interne, anatrophe, à micropyle dirigé en bas et en dehors. Le fruit est obovoïde ou courtement claviforme, capsulaire, et s'ouvre, jusqu'à la moitié de sa hauteur ou même plus bas, en trois valves septifères en dedans. Les graines dressées sont ovoïdes-oblongues, finement striées en travers, sans appendice, à albumen farineux abondant, avec un très petit embryon lenticulaire et basilare.

Ce sont des herbes vivaces, courtes ou élevées; elles ont un rhizome épais, chargé de racines adventives qui s'enfoncent dans la vase des bois marécageux. Les feuilles basilaires, alternes, rapprochées sur de courts axes aériens, sont allongées ou lancéolées, subfalciformes quelquefois au sommet, pétiolées ou dilatées en gaine compliquée. Les fleurs sont portées au sommet d'une hampe nue, anguleuse, dont le

Gen., n. 1053. — K., Enum., III, 366. — *Linnaea*, XXXVII, 461, t. 1, fig. 15-17. — ENGL., B. H., Gen., III, 858, n. 2. — KUNCKE, in *Pflanzenfam.*, 31, fig. 14; 15, A-G.

sommet un peu dilaté porte un groupe ombelliforme de cymes unipares, entouré de deux grandes bractées herbacées, cordées et longuement acuminées. Les fleurs ont un pédicelle assez long ou très court. Sous le périanthe se voit un nombre indéfini de bractées imbriquées-apprimées, rigides, d'autant plus grandes qu'elles sont situées plus haut. Les six espèces¹ connues du genre sont originaires du Brésil septentrional, de la Guiane et du Vénézuëla.

Les quatre genres américains *Saxofridericia*, *Stegolepis*, ?*Schæncephalum* et *Cephalostemon*, très voisins des *Rapatea*, ne s'en distinguent que par des caractères tout à fait secondaires : la forme et le mode de déhiscence des anthères ; le nombre des ovules dans chaque loge ; la forme, la consistance et le degré de développement des deux grandes bractées involucrales ; la forme de la graine et la présence ou l'absence à sa surface d'un petit arille de la région chalazique.

III? SÉRIE DES MNASIUM.

Rapportés avec doute à une autre famille, les *Mnasium*² (fig. 174) ont des fleurs régulières et hermaphrodites, à réceptacle convexe et à double périanthe. Ses six folioles sont égales ou inégales, membraneuses, linéaires ou claviformes, uninerves, sans éclat, imbriquées et persistantes. En dedans de chacune d'elles se trouve une étamine hypogyne, libre ou un peu unie à la foliole correspondante du périanthe, à filet long, exsert, comprimé et flexueux ; à anthère basifixe, linéaire-allongée ; les deux loges adnées et déhiscentes par une fente marginale. L'ovaire supère, allongé et étroit, a trois loges alternipétales, complètes ou incomplètes, et s'atténue supérieurement en un style à trois branches grêles, obtuses, récurvées, stigmatifères en dedans. Dans chaque loge se voient un ou deux, trois ovules superposés, ascendants, anatropes, à micropyle extérieur et inférieur. Le fruit est une capsule allongée, surmontée du style persistant, loculicide. Chacun de ses panneaux membraneux entoure plus ou moins

1. STEUD., *Syn. pl. glum.*, II, 312. — ROEM. et SCH. F., *Syst.*, VII, n. 544. — ROB. SCHOMB., *Rapat. Frid.-Aug. u. Saxo-Frid.*, 11, t. 1. — SEUB., in *Mart. Fl. bras.*, III, I, 127, t. 17. — WAWR., *Bot. Reis. Maxim.*, 168. — W., *Spec.*, II, 22 (*Mnasium*). — WALP., *Ann.*, I, 880.

2. RUDG., *Pl. Guian. rar.* (1805), 12 (part.), t. 12 (non SCHREB.). — SPRENG, *Anl.*, II, I, 342; *Syst.*, II, 27 (part.). — *Thurnia* HOOK. F., in *Hook. Icon.*, t. 1407, 1408; *Gen.*, III, 862, n. 14 (*Juncaceæ*). — BUCHEN., *Mon. Junc.*, 5, 461.

complètement une graine ascendante, pourvue d'un funicule, fusiforme et trigone. Son tégument extérieur, coriace et rigide, déhiscent en dedans, s'atténue en bas et surtout en haut en une pointe hispide, dont la cavité renferme un tégument interne, libre, sauf dans sa région chalazienne, et enveloppant un albumen farineux, à la base duquel se voit un embryon axile, cylindrique ou fusiforme, entouré seulement dans sa portion supérieure par l'albumen.

Mnasium Jenmani.

Les deux *Mnasium* connus¹ sont de grandes herbes glabres et rigides, de la Guiane, qui ont de longues feuilles basilaires de Cypéracée ou de Broméliacée, coriaces, entières ou serrées sur les bords, à large gaine embrassante. Les fleurs sont portées à l'extrémité d'une longue hampe trigone, disposées en faux capitule sphérique ou ovoïde, à nombreuses bractées imbriquées, dont les inférieures, plus longues et inégales, foliiformes, réfléchies, forment une sorte d'involucre irrégulier. Quant aux bractées fertiles, bien plus courtes et moins épaisses, assez semblables aux sépales, elles ont chacune dans leur aisselle une fleur sessile ou supportée par un court et épais pédicelle spongieux.

Fig. 174. Fleur, coupe longitudinale.

Cette petite famille n'a pas grande valeur, et il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'on la fît, un jour ou l'autre, rentrer, à titre de série, dans le vaste groupe des Liliacées ou des Commelinacées. Aussi jadis l'avait-on rangée parmi les Joncées. Ses graines rappellent celles des Flagellariées; mais les Rapatéacées diffèrent par leur port, leur mode de végétation, leur inflorescence capituliforme et l'organi-

1. Ce sont le *M. sphærocephalum* RUDG. et le *M. Jenmani* (*Thurnia Jenmani* HOOK. F.).

sation de leur corolle. Celle-ci se rapproche de celle des Xyridacées¹ et de certaines Commelinacées. Mais les Rapatéacées ont des ovules anatropes, un albumen généralement farineux et un embryon très surbaissé, placé à l'extrémité de l'albumen². Par leur inflorescence amentiforme, adnée à une sorte de spathe unilatérale, les *Spathanthus* présentent une certaine analogie avec les Cyclanthées, les Pandanacées, les Aroidacées et même les Palmiers, surtout ceux de petite taille, qui croissent, comme eux, dans les localités marécageuses des bois tropicaux de l'Amérique.

C'est DESVAUX³ qui le premier a distingué ce groupe, en le laissant toutefois parmi les Joncinées. On lui a appliqué en 1829 le nom de Rapatéacées⁴, et en 1837 celui de Rapatéées⁵. Il renferme une vingtaine d'espèces, qui sont toutes du Vénézuëla, des Guianes ou du Brésil. Les sept genres sont répartis dans trois séries :

I. SPATHANTHÉES. — Inflorescence allongée et unilatérale, adnée à la nervure médiane d'une grande bractée spathacée, acuminée et compliquée. Corolle gamopétale. Ovaires indépendants, à loge biovulée et style gynobasique, simple. Fruit unicarpellé et uniloculaire. — 1 genre.

II. RAPATÉÉES. — Inflorescence régulière, capituliforme, formée de cymes unipares et involuquée de deux bractées foliacées, rarement peu développées ou nulles. Corolle gamopétale. Ovaires triloculaires, à loges 1- ∞ -ovulées. Style simple, terminal. Fruits loculicides. — 5 genres.

III? MNASIÉES. — Inflorescence régulière, capituliforme, involuquée de bractées foliiformes réfléchies. Corolle dialypétale, à folioles linéaires, rigides et persistantes. Loges ovariennes à 1-3 ovules ascendants. Style terminal à trois branches stigmatifères. Fruits loculicides. Embryon cylindrique. — 1 genre.

1. Auxquelles LINDLEY (*Veg. Kingd.*, 187) a adjoint les Rapatéacées.

2. Sauf dans le *Mnasion*.

3. In *Ann. sc. nat.*, sér. 1, XIII, 41, 44.

4. DUMORT., *Anal. fam.*, 60, 62, *Juncariacearum* Fam.). — SEUB., in *Mart. Fl. bras.* (1817). —

KRUCKE, *Mon. Rapat.*, in *Linnaea*, XXXVII, 417 (1873). — B. H., *Gen.*, III, 857, Ord. 184. — ENGL., *Pflanzenfam.*, 19.

5. ENDL., *Gen.* (1837), 131 (*Genera Juncaceis affinia*). — K., *Enum.*, III, 366, 599. — STEUD., *Syn. pl. glum.*, II, 312 (*Juncacearum* Fam.).

GENERA

I. SPATHANTHÆ.

1. *Spathanthus* DESVX. — Flores hermaphroditi regulares v. subregulares; receptaculo minute convexo. Sepala 3, libera v. ima basi connata, late lanceolata, squarrosa, imbricata v. torta. Corollæ tubus cylindraceus latiusculus tenuiter membranaceus; limbi lobis longioribus late ovatis, tortis v. imbricatis subcorrugatis, demum patentibus. Stamina 6, erecta; filamentis brevibus fauci insertis; antheris elongato-angustis, superne nunc incurvis, inappendiculatis, introrsum sulcatis demumque apice poro obliquo hiantes dehiscen-
tibus. Germinis carpella 3, alternipetala, libera v. sublibera adscen-
dentia; stylo inter lobos gynobasico erecto gracili, apice simplici stigmatoso. Ovula in carpello quoque 2, adscendentia anatropa; micropyle extrorsum infera. Fructus carpellum fertile 1; cæteris abortivis; styli vestigio basilari; pericarpio membranaceo, ab apice demum 2-valvi. Semen suberectum oblongum obtusum teres, extus tenuissime ruguloso-striatellum; albumine copioso farinaceo; embryone basilari extrario depresso lenticulari. — Herba magna; rhizomate perenni in limo radicante; foliis basilaribus elongatis coriaceis distichis; petiolo basi in vaginam complicatam dilatato. Inflorescentia pedunculata spadiceformis; spatha erecta lanceolata acuminata complicata; floribus dense glomeratis confertis; glomerulis in spicam spuriam 1-lateralem secus costam spathæ intus insertis; singulorum pedicello brevissimo bracteis crebris linearibus calyci subæqualibus onusto. (*Guiana.*) — *Vid. p. 235.*

II. RAPATEEÆ.

2. **Rapatea** AUBL. — Flores regulares hermaphroditæ; sepalis 3, lanceolatis acutis rigide paleaceis, imbricatis v. tortis, basi in tubum brevem tenuiter membranaceum connatis. Corollæ tubus cylindræus latiusculus brevis tenuiter membranaceus; limbi lobis 3, latis, imbricatis v. tortis. Stamina 6; filamentis erectis brevibus fauci insertis; antheris elongatis basifixis, introrsum 2-sulcatis, apice ultra loculos in collum geniculatum productis; collo appendice erecta cochleata superato; loculis poro unico communi ad basin appendiculæ introrsum dehiscentibus. Germen superum sessile; loculis 3, alternipetalis, completis v. incompletis, 1-ovulatis. Ovulum ab anguli interni basi suberectum anatropum; micropyle extrorsum infera. Stylus terminalis, apice integro v. vix diviso stigmatosus. Fructus capsularis subsphæricus, obovoideus v. clavatus, ab apice usque ad medium v. fere ad basin loculicidus; valvis 3 intus septiferis patulis. Semina 1-3, oblonga obtusa subteretia inappendiculata, tenuiter striata; albumine farinaceo; embryone basilari depresso lenticulari. — Herbæ perennes robustæ v. humiles; rhizomate crasso in limo radicante; foliis basilaribus elongatis v. lanceolatis petiolatis, basi in vaginam complicatam dilatatis. Flores in summo scapo brevi v. longo spurie capitati; glomerulis 1-paris crebris v. cymis intra bractæas involu- crantes 2, herbaceas, basi lata cordatas longeque acuminatas, congestis; pedicello quoque longiusculo v. brevissimo bracteolis crebris imbricatis appressis ab infimis gradatim longioribus stipato. (*Brasilia, Guiana, Venezuela.*) — *Vid. p. 236.*

3? **Saxofridericia** SCHOMB.¹ — Flores *Rapatee*²; antheris haud v. vix ultra loculos appendiculatis. Germinis loculi perfecti v. incompleti; ovulis in quoque 2-8, placentæ lateraliter affixis, 2-seriatis. — Herbæ elatæ robustæ; rhizomate crasso; foliis basilaribus longis vaginatis; petiolo vario v. 0; scapo elato, sæpius apice sensim dilatato; floribus sessilibus glomeratis (spurie capitatis); bracteis 2, capitulum involucrentibus magnis membranaceis subherbaceis, basi

1. *Rapat. Fried.-Aug. u. Saxo-Frid. reg.* (1845), 13, t. 2. — KRNCKE, in *Linnaea*, XXXVII, 452, t. 1, fig. 13, 14. — B. H., *Gen.*, III, 858,

n. 3. — ENGL., *Pflanzenfam.*, 31. — *Acrotheca* KRNCKE, *loc. cit.*, 456 (subgen.).

2. Cujus forte melius sectio.

dilatatis¹, apice longe acuminatis v. demum facile fissis; bracteis circa florem quemque crebris imbricatis, ab infimis ad supremas majoribus. (*Guiana, Brasilia bor.*²)

4. **Stegolepis** KL.³ — Flores fere *Rapateæ*; calycis lobis rigidis. Antheræ oblongo-subulatæ inappendiculatæ, apice intus foramine obovato obliquo introrso dehiscentes. Germen obovoideum v. sub-sphæricum; ovulis in loculo quoque 2-8, adscendentibus anatropis. Fructus membranaceus loculicidus. — Herbæ perennes; foliis basilaribus longis, basi nunc in vaginam latam conduplicatam dilatatis; vagina nunc angustiore. Flores in summo scapo longo sphærico-capitati; singuli bracteis crebris appressis imbricatis coriaceis ab infimis ovalis gradatim ad supremas longioribus pedicelloque brevi insertis stipati. Involucri bractæ 2, membranaceæ, mox evanescentes v. nunc 0. (*Guiana*⁴.)

5? **Schænocephalum** SEUB.⁵ — Flores fere *Rapateæ*; antheris linearibus, apice cuneato haud appendiculatis, poro obliquo 1 dehiscentibus. Germen obconicum; stylo apice fimbriato; ovulis in loculo 2. Fructus 3-valvis; seminibus in loculo quoque 2, exappendiculatis v. appendice pugioniformi obliqua instructis. — Herbæ perennes; foliis basilaribus distichis linearibus v. lanceolatis; vagina conduplicata. Flores in capitulo spurio sphærico sessiles; bracteolis in pedicello ∞ , imbricatis. Involucri bractæ 2, deflexæ subque floribus pro maxima parte occultæ. (*Brasilia bor.*⁶)

6. **Cephalostemon** SCHOMB.⁷ — Flores fere *Rapateæ*; calycis tubo tenuiter hyalino; lobis paleaceis 3. Corollæ tubus late cylindraceus hyalinus; lobis latiusculis. Stamina fertilia 6; antheris erectis introrsis inappendiculatis; loculorum dimidio postico ultra anticum producto ibique ab apice rimoso⁸. Germen sessile, 3-loculare, apice obtusum v. retusum; stylo erecto cylindraceo tubuloso. Ovula in

1. *Rapateæ paludosa*.

2. Spec. 5. STEUD., *Syn. pl. glum.*, II, 313. — WALP., *Ann.*, I, 880. Stylus apice stigmatoso simplex « articulatus » dicitur.

3. KL., ex KRNCKE, in *Linnæa*, XXXVII, 480, t. 1, fig. 22-25. — B. H., *Gen.*, III, 859, n. 4. — ENGL., *Pflanzenfam.*, 30. — *Monotrema* KRNCKE, loc. cit., 475, fig. 20, 21.

4. Spec. 2, 3. K., *Enum.*, III, 367 (*Rapateæ*).

5. In *Mart. Fl. bras.*, III, I, 130, t. 18, 19. — KRNCKE, in *Linnæa*, XXXVII, 483, t. 1, fig. 26-29.

6. Spec. 2. STEUD., *Syn. pl. glum.*, II, 313. — WALP., *Ann.*, I, 880.

7. *Rapat. Fried.-Aug. u. Saxo-Frid.*, 9. — KRNCKE, in *Linnæa*, XXXVII, 443, t. 1-12. — ENGL., *Pflanzenfam.*, 31, fig. 14, K, L.

8. Rima nunc fere usque ad basin producta.

loculis solitaria erecta anatropa; micropyle extrorsa. Fructus membranaceus, ab apice fere ad basin loculicidus. Semina 1-3, ovoidea v. obovoidea compressa; chalaza in arillum submitriformem spongioso-cellulosum producta. — Herbæ perennes; foliis basilaribus longe linearibus v. gramineis; floribus ad summum scapum, nunc basi vaginatum, spurie capitatis glomerulatis; pedicello brevissimo bracteis variis crebris imbricatis apiceque subulatis, setaceo-acuminatis v. pungentibus, stipato. Bractæ sub inflorescentia tota involucentes 2, foliaceæ, lineari- v. ovato-lanceolatae. (*Brasilia, Guiana*¹.)

III? MNASIEÆ.

7. **Mnastium** RUDGE. — Flores hermaphroditi regulares; receptaculo convexo. Sepala 3, æqualia v. leviter inæqualia membranacea linearia v. claviformia (haud colorata), 1-nervia, imbricata, persistentia. Petala 3, conformia. Stamina 6, hypogyna, perianthio longiora ejusque foliolis opposita, ima basi eorum affixa; filamentis gracilibus compressis; antheris basifixis erectis linearibus; loculis adnatis ad margines rimosis. Germen angustum elongatum, apice attenuatum; styli ramis 3, gracilibus recurvis, apice obtusis, intus stigmatosis; loculis 3, completis v. incompletis alternipetalis, 1-pauciovulatis; ovulis adscendentibus anatropis; micropyle extrorsum infera. Fructus capsularis elongato-oblancheolatus stylo coronatus loculicidus; valvis demum semina involventibus. Semina adscendentia; funiculo fusiformi-3-gono; integumento extimo coriaceo, intus dehiscente, utrinque acuminato-cuspidato; integumento intimo nisi ad chalazam libero; albumine farinaceo; embryo axili ex parte intrario, cylindræo v. fusiformi. — Herbæ robustæ glabræ; rhizomate perenni; foliis basilaribus elongatis coriaceis, basi vaginantibus, integris v. spinoso-serrulatis; floribus in summo scapo erecto obtuse-3-gono spurie capitatis, glomerulatis, bracteolatis; pedicellis crassis spongiosis; bracteis sub inflorescentia tota majusculis foliiformibus inæqualibus involucrentibus, demum reflexis. (*Guiana*.) — *Vid. p. 238.*

1. Spoc. 4. K., *Enum.*, III, 367, 599 (*Rapatea*). — STEUD., *Syn. pl. glum.*, II, 313 (*Rapatea*). — PÆPP. et ENDL., *Nov. gen. et*

spec., II, 51, t. 168. — SEUS., in *Mart. Fl. bras.*, III, I, 128 (*Rapatea*). Genus forte melius ad *Rapateæ* sectionem reducendum.

CXXXIV

PALMIERS

I. SÉRIE DES CORYPHA.

L'étude de cette série peut être commencée par l'analyse des *Chamærops*¹ (fig. 175-182) qui existent en Europe et donnent souvent dans nos jardins leurs fleurs hermaphrodites ou polygames. Dans

Chamærops humilis.



Fig. 177.
Diagramme.



Fig. 175. Port.



Fig. 176. Fleurs mâles. Fig. 179. Fruit, coupe longitudinale. Fig. 178. Fleurs femelles.

les premières, le réceptacle convexe a un calice de trois sépales, libres ou plus souvent unis inférieurement, ordinairement étroits et

1. L., *Gen.*, ed. I, n. 887; ed. VI, n. 1210. — ADAMS., *Fam. des pl.*, II, 25. — J., *Gen.*, 39. — LAMK., *Ill.*, t. 900. — K., *Syn.*, I, 303; *Enum.*, III, 248. — NEES, *Gen. Fl. germ.*, *Monoc.*, III, n. 36. — MART., *Hist. nat. Palm.*,

248 (part.). — ENDL., *Gen.*, n. 1759. — B. H., *Gen.*, III, 924, n. 86. — DRUDE, in *Engl. u. Prantl Pflanzenfam.*, Lief. 1, II, 3, p. 31, fig. 24, D. — *Chamæripes* PORTER., *Anthol.*, 147, t. 8, 10. — GERTN., *Fruct.*, I, 26, t. 9.

aigus. L'un d'eux est antérieur. Les pétales, plus grands et alternes, sont libres ou à peine unis à leur base, valvaires ou légèrement imbriqués dans le bouton¹. Les étamines, parfois stériles, sont au nombre de six², superposées trois aux sépales, et trois aux pétales. Leurs filets, monadelphes vers la base, sont à ce niveau plus ou moins unis à la corolle. Leur portion libre, triangulaire, supporte une anthère basifixe, introrse, à deux loges indépendantes dans leur portion inférieure et déhiscentes en dedans par une fente longitudinale³. Le gynécée, rudimentaire dans les fleurs mâles, est formé de trois carpelles oppositisépales. Chacun d'eux a un ovaire libre, uniloculaire, à paroi épaisse, surmonté d'un petit style arqué et réfléchi, papilleux sur les deux lèvres de sa face interne. Vers la base

Chamaerops humilis.



Fig. 180. Fleur.

Fig. 181. Fleur, coupe longitudinale.

Fig. 182. Fleur, le péricarpe enlevé.

de l'ovaire s'insère un ovule ascendant, anatrophe, dont le micropyle se dirige en bas et en dehors⁴ et se trouve en partie appliqué contre un petit obturateur formé par une dilatation extérieure du pied épaissi de l'ovule. Le fruit se compose d'un, deux ou trois carpelles ovoïdes ou sphériques, aplatis ou anguleux en dedans quand il y en a plus d'un, couronnés des restes du style, à péricarpe charnu, fibreux dans ses couches profondes. La graine est sphérique, ellipsoïde ou oblongue, dressée. De son hile basilaire part un raphé peu distinct qui se partage en branches lâches et irrégulières. Sous les téguments se voit un albumen dur, corné, irrégulièrement ruminé; et dans un point variable du dos de la semence, au-dessous de son milieu, l'embryon excentrique⁵ est enchâssé dans une logette presque cylindrique.

On distingue deux *Chamaerops*, de la région Méditerranéenne

1. Le péricarpe ne s'accroît pas ou à peine après l'anthèse.

2. Parfois aussi de neuf ou plus.

3. Le pollen est ellipsoïde, avec un sillon longitudinal et une bande ponctuée, dans le

C. humilis (H. MONT, in *Ann. sc. nat.*, sér. 2, III, 310). Sur le pollen des Palmiers en général, DAUDET, *loc. cit.*, 20.

4. Le tégument ovulaire est double.

5. Sa situation varie d'une graine à l'autre.

occidentale: le *C. humilis* L. et le *C. macrocarpa* Guss.¹ Ce sont des arbres inermes, qui vivent généralement en groupes; à tige souvent courte, exceptionnellement élevée, cespiteuse, divisée dès la base, chargée des gaines d'anciennes feuilles détruites. Leurs feuilles forment un grand bouquet terminal, rapprochées, mais alternes; le limbe en éventail, presque semi-orbiculaire ou atténué en coin à la base. Ses divisions profondes sont étroites, rigides, bifides, plissées-indupliquées. Le pétiole, que termine une courte pointe nommée ligule, est grêle, convexe sur ses deux faces, avec des bords lisses ou dentés-épineux. Il se dilate inférieurement en une gaine qui finit par se partager en un réseau de fibres tenaces. Entre les feuilles, dans l'aisselle de quelques-unes d'entre elles, se développent au printemps les inflorescences dites spadices, dressées, courtes et comprimées, denses, dont le pédoncule aplati porte des bractées alternes. Leurs branches axillaires, pressées et ramifiées, sont entraînées au-dessus de ces bractées sur l'axe principal; et leurs divisions portent les fleurs à pédicelle court ou très court, accompagnées parfois d'une ou deux bractéoles irrégulièrement disposées. L'ensemble de l'inflorescence est primitivement enclos dans de larges feuilles alternes modifiées et qu'on appelle les spathes, grandes bractées dont le nombre varie de deux à quatre et qui deviennent plus ou moins coriaces. La supérieure est complète, et les inférieures se fendent à un certain moment pour laisser sortir les axes chargés de fleurs². Quand celles-ci sont unisexuées, elles se trouvent disposées, ou dans une même inflorescence, ou dans des spadices différents.

Si maintenant nous comparons au genre précédent les Dattiers³ (fig. 183-189) dont on a souvent donné le nom à une tribu (*Phœnicées*), nous verrons que leurs fleurs mâles ont un court calice gamosépale à trois dents, et trois pétales bien plus longs, épais et rigides, obliquement oblongs-lancéolés, à bords valvaires ou coupés en biseau et chevauchant un peu les uns sur les autres. En dehors d'eux et sur un même court renflement du réceptacle s'insèrent six étamines

1. Peut-être variété du précédent. CAV., *l.c.*, II, t. 115 (*Phœnix*). — WENDL. F., in *Bull. Soc. bot. Fr.*, VIII, 429. — ANDR., *Bot. Rep.*, t. 599. — LAMB., in *Trans. Linn. Soc.*, X, t. 8. — NEES, *Gen. Fl. germ., Monoc.*, III, n. 36. — DR., in *Bot. Zeit.* (1877), 698, t. 6, fig. 34, 35. — BOISS., *Fl. or.*, V, 46. — *Bot. Mag.*, t. 2152. — WALP., *Ann.*, V, 818 (part.).

2. Jaunes, petites.

3. L., *Gen.*, ed. I, n. 886; ed. VI, n. 1224. —

J., *Gen.*, 38. — GÆRTN., *Fruct.*, I, t. 9. — LAMK., *Ill.*, t. 893. — TURP., in *Dict. sc. nat.*, *Atl.*, t. 154, 155. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 257, 320, t. 120, 124, 136, 164. — ENDL., *Gen.*, n. 1763. — B. H., *Gen.*, III, 921, n. 80. — BECC., *Males.*, III, 345, t. 43. — DR., *Pflanzenfam.*, 28, fig. 22, 23. — ELATE L., *Musa Cliff.*, 12. — *Phoniphora* NECK., *Elem.*, III, 303. — *Fulchironia* LÉSCH., in *Desf. Cat. H. par.* (1829), 29. — ? *Dachel* ADANS., *Fam. des pl.*, II, 25.

(rarement trois ou neuf), qui ont des filets courts, dressés, subulés, unis à leur base par un empâtement commun, et des anthères dressées, allongées, dorsifixes vers leur base, déhiscentes longitudinalement suivant le bord des loges ou un peu en dehors. Au centre

Phœnix dactylifera.




Fig. 183. Fleur mâle, coupe longitudinale.



Fig. 184. Fleur femelle, coupe longitudinale.



Fig. 185. Graine.



Fig. 186. Graine, coupe longitudinale.

Fig. 187. Embryon (E).

Fig. 188. Embryon; le cotylédon détaché.

Fig. 189. Germination.

du réceptacle se trouve assez souvent un petit rudiment de gynécée, de forme variable, et qui peut même faire complètement défaut. La fleur femelle est presque sphérique, à réceptacle convexe peu proéminent. Son calice gamosépale a la forme d'un sac assez profond,

dont les bords sont découpés de trois courtes dents ; deux d'entre elles postérieures. La corolle est formée de trois pétales hypogynes, larges, concaves, obtus, fortement imbriqués. En dedans d'eux se voient six staminodes, ou trois seulement, alternipétales, courts et aigus. Le gynécée supère consiste en trois carpelles alternipétales, dont les ovaires indépendants se touchent largement par deux faces obliques formant en dedans par leur rencontre un angle dièdre net ; ils sont surmontés d'une zone stigmatifère oncinée. Vers la base de son angle interne, chaque ovaire donne insertion à un ovule ascendant, anatrope, à micropyle extérieur et inférieur¹. Le fruit² n'est le plus souvent représenté que par un seul des carpelles bien développé ; les deux autres s'étant fréquemment arrêtés dans leur développement ou ayant disparu. Ils sont, suivant les variétés, ovoïdes ou oblongs, charnus, avec un épicarpe et un mésocarpe membraneux. La graine dressée est plus ou moins allongée-fusiforme. Son bord ventral est creusé d'un profond sillon longitudinal, rugueux, et ses téguments recouvrent un albumen corné, très dur. Celui-ci, dans une cavité dorsale, loge un petit embryon subcylindrique³, souvent aussi plus ou moins rapproché de la base de la semence.

Le genre habite les régions chaudes de l'Afrique et de l'Asie. Il est formé d'arbres inermes, subacaules ou à stipe robuste ou grêle, unique ou fasciculé, dressé ou incliné et chargé dans sa portion supérieure de bases foliaires persistantes. Les feuilles forment un grand bouquet terminal : elles sont arquées et étalées, composées d'un limbe irrégulièrement penné, dont les divisions sont également ou inégalement distantes, ensiformes ou lancéolées, rigides, acuminées, à base assez large et à bords entiers, qui s'indupliquent dans toute leur étendue ou seulement vers leur base ; d'un pétiole épais, plan-convexe, souvent garni de pointes latérales rigides⁴ ; d'une gaine courte et finalement partagée en faisceaux de fibres sur ses bords. Les fleurs, ordinairement dioïques⁵, sont disposées sur les branches d'un ou plusieurs spadices interfoliaires, primitivement dressés, puis penchés ou pendants, qui sont d'abord enveloppés par une longue spathe complète, comprimée, coriace, s'ouvrant en long par le ventre, puis par le dos. Les fleurs⁶ sont alternes et sessiles sur les divisions plus ou moins

1. Le tégument est double.

2. Jaune, rouge ou brun.

3. Ou turbiné. Sa gemmule est entourée par la base d'un épais cotylédon subcylindrique.

4. Représentant (?) des pinnules avortées.

5. Exceptionnellement monoïques ou parfois polygames.

6. Généralement d'un jaune pâle, petites.

sinueuses de l'axe, et accompagnées chacune d'une petite bractée qui peut complètement manquer.

On a distingué beaucoup d'espèces très variables dans le genre

Livistona australis.



Fig. 190. Fleur ($\frac{2}{3}$).

Fig. 192. Cynécée.

Fig. 191. Fleur, coupe longitudinale.

Dattier : il n'y en a probablement qu'une dizaine¹.

Par ce qui précède, on voit que les *Phœnix* se distinguent surtout des *Chamærops* par les feuilles, pennées dans les premiers, digitées dans les derniers; par des étamines à peu près indépendantes et par un albumen non ruminé. Ce sont des différences que nous

verrons assez souvent exister dans des genres qu'on n'hésite pas à laisser indivis dans d'autres groupes naturels de la même famille.

Très voisins également des *Chamærops* et des *Phœnix* sont les *Trachycarpus*, de l'Asie tempérée, et les *Livistona* (fig. 190-192), de l'Asie et de l'Océanie tropicales, qui ont des fleurs : les premiers polygames-monoïques, et les derniers hermaphrodites, avec des étamines qui ne se dégagent qu'assez haut du péricarpe épaissi à sa base.

Le *Nannorhops*, beau palmier de l'Orient, très analogue aux *Chamærops* et possédant, comme eux, des feuilles digitinerves et une corolle valvaire, a des carpelles qui prennent un si grand développement par leur région dorsale dans la période de maturation, que leur style devient

basilaire ou à peu près. Il est, au contraire, terminal dans les *Rhapi-*

Rhapis flabelliformis.

Fig. 193. Port ($\frac{1}{16}$).

¹ W., *Spec.*, IV, 730. — K., *Enum.*, III, 254. — JACQ., *Coll.*, Suppl., t. 15; *Fragm.*, t. 24. — TURP., in *Mem. Mus.*, III, t. 15. — ROXB., *Pl. corom.*, I, t. 74; III, t. 273. — GRIFF., in *Calc. Journ. Nat. Hist.*, V, 344; *Palms*

brut. Ind., 126, t. 128; 128, A; 129 A, B. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 62; *Palm. Arch. ind.*, 14, 26. — BRAND., *For. Fl.*, 553. — DEL., *Fl. Egypt.*, t. 82. — T. ANDERS., in *Journ. Linn. Soc.*, XI, 13. — DR., in *Bot. Zeit.* (1877), 638,

dophyllum, des portions les plus chaudes de l'Amérique du Nord, qui ont la corolle imbriquée, et des feuilles digitinerves, de même que tous les genres suivants.

Les *Acanthorhiza*, de l'Amérique centrale, ont aussi des pétales imbriqués dans leurs fleurs polygames-dioïques. Leurs styles indépendants sont allongés, et les branches de leur spadice sont situées dans l'aisselle de bractées spathacées.

Les *Rhapis* (fig. 193), de la Chine et du Japon, sont d'humbles

Sabal Adansonii.

Fig. 194. Port.

Fig. 195. Base du stipe, coupe longitudinale.

palmiers à feuilles digitées et à fleurs dioïques, construites à peu près comme celles des *Chamærops*, mais avec une corolle gamopétale, tridentée, et six étamines dont l'anthère est extrorse.

Les *Corypha*, de l'Asie tropicale, sont, au contraire, de grande taille, à larges feuilles orbiculaires en éventail; mais ils sont mono-

t. 6, fig. 27-33. — BOISS., *Fl. or.*, V, 47. — 298. — BECC., *Males.*, III, 347; in *Hook. f. Fl. Rich.*, *Fl. abyss.*, 348. — BALF. F., *Bot. Soc.*, *brit. Ind.*, VI, 424. — WALP., *Ann.*, V, 819, 844.

carpiens et se terminent par une grande inflorescence très ramifiée. Leurs petites fleurs sont hermaphrodites, à corolle légèrement imbri-

Sabal Adansonii.

Fig. 196. Fleur.

Fig. 197. Fleur, coupe longitudinale.

quée; et leurs carpelles indépendants renferment à la maturité une graine dont l'albumen est homogène, avec un embryon terminal.

Sabal umbraculifera.

Dans les *Sabal* (fig. 194-198), les fleurs sont aussi hermaphrodites; les feuilles, digitées; les ovaires, indépendants et contigus, surmontés de styles qui se collent les uns aux autres à un certain âge et forment ainsi une épaisse colonne conique, en apparence unique. La graine a un albumen homogène, avec une profonde cavité basilaire et un embryon dorsal. Ce sont des palmiers peu élevés, de l'Amérique tempérée et tropicale, dont le stipe, tronqué à sa base, se relève souvent en croc pour porter au dehors du sol son extrémité inférieure avec les racines adventives qu'elle émet.

Fig. 198. Inflorescence.

Le *Teysmannia altifrons* est un beau palmier malais, qui a des feuilles digitées, des fleurs hermaphrodites, à styles collés les uns aux autres en une courte colonne; un fruit chargé en dehors de verrues pyramidales; des graines à albumen ruminé et à embryon basilaire.

Le *Serenea*, des mêmes régions que les *Rhapidophyllum*, en ont presque tous les caractères. Mais leurs fleurs sont hermaphrodites, à corolle valvaire, à ovaires libres, avec de longs styles dressés; et le rachis de leur spadice est pourvu d'une longue gaine foliaire.

Le *Colpothrinax*, de Cuba, a des fleurs hermaphrodites, analogues à celles du genre précédent; mais leurs styles se collent les uns aux

Thrinax radiata.

Fig. 199. Port.

autres; le rachis du spadice est nu, non engainé; et l'embryon, à peu près basilaire dans le *Serenæa*, est ici nettement dorsal.

Le *Cryosophila*, du Mexique, imparfaitement connu, est un petit palmier épineux, qui avait été primitivement rapporté au genre *Corypha* et qui se distingue surtout par la longueur de ses étamines.

Les *Brahea*, plantes des parties méridionales de l'Amérique du Nord, ont des fleurs hermaphrodites, à corolle valvaire, à styles rappro-

chés en une courte colonne trigone; des graines à albumen profondément excavé à la face ventrale, et à embryon dorsal. Les branches de leur spadice sont dépourvues de gaines. Celles-ci existent dans les *Erythea*, de Californie, qui ont l'embryon rapproché de la base de la graine et qui ne sont peut-être pas génériquement assez distincts.

Les *Thrinax* (fig. 199), des Antilles et de la Floride, sont des palmiers souvent peu élevés, qui, avec les caractères généraux des types précédents, ont un périanthe gamophylle très réduit ou presque nul. Leur ovaire est réduit à une loge uniovulée, et leur style se dilate à son sommet en une sorte d'entonnoir. Leur albumen est homogène ou légèrement ruminé, et leur embryon est subapical.

Les *Trithrinax*, de l'Amérique du Sud, d'abord confondus avec le genre précédent, ont, au contraire, trois carpelles distincts; une corolle plus développée, imbriquée, et des étamines monadelphes. Par là, ils se rapprochent des *Copernicia*, grands palmiers à cire de l'Amérique tropicale, qui ont des fleurs hermaphrodites, à corolle valvaire, et des semences à albumen ruminé.

Les *Pritchardia*, qui ont été observés dans l'Océan Pacifique et au sud-ouest de l'Amérique du Nord, ont des fleurs hermaphrodites, à corolle gamopétale, dont le tube persiste après la chute du limbe valvaire. Leur style est allongé et pyramidal.

Les *Licuala*, petits palmiers frutescents, de l'Asie et l'Océanie tropicales, ont des fleurs hermaphrodites, dont le calice a inférieurement

Nipa fruticans.

la forme d'une cupule ou d'un tube. La corolle valvaire est trilobée; et à sa gorge s'insèrent les étamines dont les filets courts s'unissent en un anneau circulaire. Au fond du tube se voient les carpelles, dont les ovaires ont le sommet tronqué ou concave, et dont le style est partagé à son sommet en trois dents stigmatifères. Les spadices, ordinairement grêles, ont un

Fig. 200. Fleur mâle.

Fig. 201. Carpelle mûr, coupe transversale ($\frac{1}{2}$).

rhachis engainé; et les spathes multiples qui les accompagnent, sont tubuleuses, à orifice oblique et bifide, ordinairement persistantes.

Le *Nipa fruticans* (fig. 200, 201), autrefois rapporté à une famille spéciale, peut être considéré comme représentant une sous-série anormale (*Nipées*) des Coryphées. C'est un humble palmier de l'Asie et de l'Océanie tropicales, qui a des fleurs mâles à trois étamines unies en une colonne centrale, et des fleurs femelles à périanthe hexamère rudimentaire. Leur gynécée est formé de trois carpelles indépendants, uniovulés; et le fruit composé représente un gros syncarpe sphérique, formé de carpelles durs, hexagonaux, à sommet pyramidal. Les feuilles sont longuement pinnatiséquées, à segments lancéolés; et les fleurs mâles, placées au-dessous des femelles dans une même inflorescence générale, sont là disposées en chatons cylindriques.

II. SÉRIE DES RONDIERES.

Le Rondier, seule espèce du genre *Borassus*¹ (fig. 202-204), est un grand palmier à fleurs dioïques. Dans les mâles, dont le bouton est claviforme, il y a trois sépales membraneux et glumacés, qui sont cunéiformes, imbriqués, obtus et comme tronqués à leur sommet légèrement infléchi. Au-dessus d'eux, le réceptacle prend la forme d'un étroit cône renversé, dont la base, supérieure, porte la corolle, l'androcée et le gynécée rudimentaire. Les pétales sont assez longuement obovales, imbriqués, puis étalés. En dedans d'eux se voient six étamines, plus courtes, à court filet subulé et à anthère oblongue, attachée par la base du connectif au-dessous de laquelle se prolongent les deux loges, libres inférieurement et déhiscentes en dedans par des fentes longitudinales. Le rudiment de gynécée est central, formé d'une petite masse pleine que surmontent trois branches courtes ou allongées et sétiformes, et qui peut faire totalement défaut. Dans la fleur femelle, qui est très volumineuse relativement aux mâles, et à peu près sphérique, le réceptacle court et convexe porte trois sépales épais, courts et larges, obtus, fortement concaves en dedans et étroitement imbriqués dans le bouton. Avec eux alternent autant de pétales de même forme, souvent plus courts, fortement imbriqués ou tordus. En

¹ L., *Gen.*, ed. I, n. 890; ed. VI, n. 1220.
— LAMK., *Ill.*, t. 898. — ENDL., *Gen.*, n. 1745.
— K., *Enum.*, III, 221. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 219, 318, t. 108, 121, 162. —

B. H., *Gen.*, III, 939, n. 116. — DR., in *Bot. Zeit.* (1877), 635, t. 5, fig. 6-9; *Pflanzenfam.*, 40, fig. 28-30. — *Lontarus* GÆRTN., *Fruct.*, I, 21, t. 8. — J., *Gen.*, 39.

dedans de leur base s'insèrent sur eux quelques staminodes, souvent inégaux. Le gynécée se compose d'un ovaire presque sphérique, ou un peu anguleux, creusé de trois loges alternipétales (plus rarement de deux ou de quatre loges), qui peuvent devenir bien distinctes dans leur portion supérieure. Un style très court, qui surmonte l'ovaire,

Borassus flabellifer.




Fig. 203. Portion d'inflorescence mâle, coupe longitudinale.

Fig. 202. Rameau
de l'inflorescence mâle.

Fig. 204. Fleur femelle.

se partage presque immédiatement en autant de lobes recurvés et stigmatifères qu'il y a de loges à l'ovaire. Dans chacune des loges se voit un ovule anatrope qui s'insère à la base de l'angle interne et dirige son micropyle en bas et en dehors. Le fruit est gros, sphérique ou à peu près, surmonté des restes du style. Son exocarpe charnu, de médiocre épaisseur, renferme un ou quelques noyaux osseux, fibreux en dehors, comprimés de dehors en dedans et à peu près obcordés. Leur sommet est perforé, et leur paroi interne présente deux saillies

rentrantes qui peuvent se mouler sur la face ventrale de la graine. Celle-ci, plus ou moins profondément trilobée en haut, adhère par son tégument extérieur à l'endocarpe. Elle contient un albumen homogène, corné et creux, vers la partie supérieure duquel se trouve l'embryon peu volumineux.

Le *B. flabellifer*¹ a un épais et long stipe, chargé des cicatrices annulaires des feuilles tombées. Il est d'ailleurs inerme et souvent plus ou moins renflé vers le milieu de sa hauteur. Ses énormes feuilles forment une large cime au sommet de la tige. Elles ont un grand limbe digitinerve et en éventail, multifide, plissé, à divisions indupliquées et bifides au sommet; les bords lisses. Le court rhachis dont partent ces segments est prolongé en une ligule rigide. Le pétiole, épais et spinescent sur ses bords, se dilate inférieurement en une courte gaine. Les inflorescences se développent dans l'intervalle des feuilles. Ce sont de grands spadices, simplement ramifiés, qui portent de larges et épaisses bractées, entourant l'axe et formant avec les bractéoles plus petites de nombreuses fossettes dans lesquelles sont logés les petits groupes floraux mâles, c'est-à-dire des cymes scorpioïdes contractées, dont les petites fleurs sortent à tour de rôle de l'intervalle des bractées pour venir s'épanouir au dehors. Les fleurs femelles, peu nombreuses, sont solitaires ou géminées dans l'aisselle de leur bractée, distante de la bractée suivante qui, comme elle et comme le périanthe femelle, s'accroît pendant la maturation autour des fruits en partie enchâssés dans l'axe épais et les appendices persistants qu'il porte. La patrie de ce palmier est probablement l'Afrique tropicale; il se retrouve, peut-être spontané, vers l'embouchure de l'Indus, et il est fréquemment cultivé dans les régions tropicales de l'Asie et de l'Océanie.

Très voisins des *Borassus* sont les quatre genres *Lodoicea*, *Latania*, *Chamæraphes* et *Medemia*, tous de l'ancien continent:

Le *Lodoicea* des Seychelles a, comme le Rondier, des cymes mâles pluriflores et unipares, logées dans les alvéoles de l'axe du spadice. Mais ses fleurs sont polyandres, et son fruit volumineux est bilobé.

1. L., *Spec.*, 1187. — BECC., in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 482. — *B. flabelliformis* MURR., *Syst.*, ed. XIII, 827. — ROXB., *Pl. corom.*, I, 50, t. 71, 72; *Fl. ind.*, III, 790. — GRIFF., *Notul.*, III, 167. — THW., *En. pl. Zeyl.*, 329. — KURZ, *For. Fl.*, II, 329. — BRAND., *For. Fl.*, 544. — BL., *Rumphia*, II, 88. — MIQ., *Fl.*

ind. bat., III, 45. — BALF. F., *Bot. Soc.*, 299. — *B. æthiopum* MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 220, 318. — *B. dichotomus* WR., in *Grah. Cat. Bomb.*, 226. — *Lontarus domestica* RUMPH., *Herb. amboin.*, I, t. 10. — BUCH., *Dec.*, IV, t. 1. — HAM., in *Mem. Wern. Soc.*, V, 314. L'espèce est figurée par RHEEDE, *H. malab.*, I, t. 9, 10.

Les *Latania*, des îles Mascareignes, n'ont plus qu'une fleur polyandre dans chaque alvéole, et leur fruit est entier.

Les *Chamæripes*, de l'Afrique tropicale et de Madagascar, ont les fleurs solitaires ou gémées dans les alvéoles; mais elles sont hexandres. Leurs fruits sont à un, deux ou trois lobes.

Les *Medemia*, de l'Afrique tropicale orientale et de Madagascar, diffèrent peu des *Chamæripes*, dont ils ont les fleurs. Mais leur ovaire trimère devient d'ordinaire un fruit uniloculaire, avec deux carpelles généralement rudimentaires; leur péricarpe subéreux ou spongieux est lisse ou rugueux; et leur graine est plus ou moins profondément ruminée, avec un embryon à situation variable.

Les *Pholidocarpus* forment une sous-série anormale (*Pholidocarpees*), qui a été attribuée par certains auteurs à la série précédente et se rapproche en même temps des Rotangées. Ce sont des palmiers de l'Asie et l'Océanie tropicales, qui ont le port et le feuillage des Rondiers, un pétiole épineux, un fruit mucroné, à péricarpe dur et tesselé en dehors, avec des graines à insertion latérale, et un abondant albumen dur et ruminé. Leur embryon charnu est basilair.

III. SÉRIE DES ROTANGS.

Les fleurs des *Rotang*⁴ (fig. 205-208) sont unisexuées ou polygames, monoïques ou dioïques. Le réceptacle de leur fleur mâle porte près de sa base un petit calice gamosépale, à trois divisions plus ou moins profondes, parfois imbriquées. Au-dessus de lui, il se dilate plus ou moins en une masse qui peut devenir charnue et qui, plus haut, porte la corolle et l'androcée. Les pétales, alternes avec les divisions du calice, sont libres ou unis à la base, valvaires dans le bouton. Les étamines, généralement au nombre de six, superposées trois aux divisions de la corolle, et trois à celles du calice, sont ordinairement monadelphes à la base de leurs filets subulés, et ont une anthère dorsifixée, oblongue, linéaire ou sagittée; les deux loges déhiscentes en dedans suivant leur longueur. Au centre se voit souvent un rudiment

1. L., *Fl. zeyl.*, 209 (1747). — ADANS., *Fam. des pl.*, II, 24. — CALAMUS L., *Spec.*, I, 325 (1753); *Syst.*, ed. X, n. 395; ed. XII, n. 439; *Gen.*, ed. VI, n. 436. — MURR., *Syst.* (1774), n. 279. — J., *Gen.*, 37. — LAMK., *Ill.*, t. 770. — GÆRTN., *Fruct.*, II, 267, t. 139. — ENDL., *Gen.*, n. 1736. — K., *Enum.*, III, 204. — MART.,

Hist. nat. Palm., III, 207, 331, t. 112, 113, 116, 128, 160, 175, 176. — BL., *Rumphia*, III, 28, t. 146-154, 163; 163, B. — DR., in *Bot. Zeit.* (1877), 637, t. 5, fig. 1, 2; *Pflanzenfam.*, 41, fig. 41. — B. H., *Gen.*, III, 931, n. 102. — *Palmijuncus* RUMPH., *Herb. amboin.*, V (1747), 97 (nom. vix gener.). — O. K., *Revis.*, 731.

de gynécée. Dans les fleurs femelles, il y a même périanthe et même réceptacle, plus ou moins épaissi, que dans les mâles. Les étamines sont stériles, avec ou sans rudiment d'anthère. Le gynécée est libre, à ovaire surmonté d'un style épais ou allongé, à trois branches entières, stigmatifères en dedans. Les loges oppositisépales de l'ovaire sont très incomplètes, ou parfois même il devient nettement uniloculaire. Il y a, en face des sépales, trois ovules basilaires, dressés et anatropes, à micropyle inférieur et extérieur¹.

Sur l'ovaire se développent à un certain âge des poils squamiformes dont la tête dilatée et réfléchie, aplatie et ciliée, grandit

Rotang (Calamus) ciliaris.



Fig. 205. Fleur mâle, coupe longitudinale.

Fig. 206.

Fleurs femelles.

Fig. 207. Fleur femelle, coupe longitudinale.

Fig. 208.

Gynécée.

rapidement² et s'abaisse sur la tête des squames voisines pour former des séries régulières³ de plaques finalement imbriquées, lisses et dures, recouvrant un péricarpe charnu, mince ou finalement sec, apiculé des restes du style. Dans sa cavité il n'y a le plus souvent qu'une graine, lisse ou parcourue de sillons sinueux, à tégument souvent un peu charnu, avec un large corps chalazique, intérieur et latéral, recouvert d'un albumen en forme de calotte hémisphérique, dur, continu ou légèrement ruminé. Vers son point le plus convexe ou plus bas se trouve l'embryon, dont les téguments embrassent le sommet et présentent à ce niveau comme une petite calotte circulaire.

1. À double enveloppe, l'endostome tubuleux.

2. Beaucoup plus par le bas qu'en haut.

3. Survant lesquelles le développement de ces écailles spirales se fait de haut en bas.

Les Rotangs sont des palmiers rarement dressés. Bien plus souvent grêles et flexibles, ils s'accrochent et grimpent sur les arbres voisins¹. Leurs tiges et leurs branches, armées d'aiguillons nombreux et puissants, sont ordinairement grêles, longues, avec des cicatrices annulaires distantes. Les feuilles sont alternes, pinnatiséquées. Leurs divisions, linéaires, lancéolées, ensiformes ou elliptiques, entières au sommet, ont leurs nervures et leurs bords souvent chargés de soies. Leur rhachis se prolonge souvent en une baguette ou un cordon rigide, sans folioles, tout chargé d'aiguillons qui servent à accrocher la plante. Le pétiole, long ou court, trigone, se dilate en une gaine chargée d'aiguillons, parfois prolongée en ligule ou en ocrea. Les inflorescences sont des spadices, courts ou longs, disposés en grappe plus ou moins ramifiée, avec des divisions courtes ou longues, droites ou arquées, enroulées en crosse et portant des fleurs sessiles, articulées, souvent gémées. Dans ce cas, il n'est pas rare que l'une d'elles soit femelle ou hermaphrodite, et l'autre mâle. Chacune d'elles occupe l'aisselle d'une bractée qui peut être très courte, orbiculaire ou à peu près. Il y a d'ailleurs d'autres bractées ou spathes en dehors de la base des diverses divisions de l'inflorescence; et l'axe principal de celle-ci peut se prolonger, comme les feuilles, en un cordon rigide et armé d'aiguillons servant aussi à soutenir et à accrocher la plante.

Des auteurs très compétents ont séparé du genre Rotang les *Dæmonorops*², que d'autres y laissent à titre de section, parce que les spathes extérieures y sont cymbiformes, enveloppent d'abord les intérieures, et se détachent de bonne heure; en même temps que les fleurs sont ordinairement plus longuement pédicellées. Dans tout un groupe de Rotangs, les spadices sont contractés; et les spathes, qui persistent toutes lors de l'anthèse, sont aplaties, avec des gaines peu développées ou nulles (*Platyspathæ*). Dans deux autres sections du genre, les spadices sont plus lâches et étalés (*Coleospathæ* et *Piptospathæ*). La dernière n'a qu'une ou deux spathes inférieures qui persistent; et les spatheilles de la base des divisions de l'inflorescence se détachent à la floraison; tandis que dans la précédente, toutes les spathes persistent,

1. Sur la façon dont s'accrochent et grimpent les Rotangs et les *Dæmonorops*, TREUB, in *Ann. Jard. Bot. Buitenz.*, III, 172, 175. Les aiguillons jouent ici un rôle analogue à celui des crocs des *Ouroparia*, *Strychnos*, *Hugonia*, etc.

2. BL., in *Schult. f. Syst.*, II, 1333. — ENDL., *Gen.*, n. 1740. — K., *Enum.*, III, 201. — MEISSN., *Gen.*, 254 (265). — SPACH, *Suit. à*

Buff., XII, 61. — MART., *Hist. nat. Palm.*, 198, t. 117, 125. — *Dæmonorops* HASSK., *Cat. Hort. bogor. alt.*, 64. — BECC., in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 462. — *Dæmonorophus* LEME, in *Dict. d'Orb.*, IV, 575. Le type du prétendu genre était le *Calamus niger* W. (*Palmijuncus niger* RUMPH., *Herb. amboin.*, V, 101, t. 52. — BUCH., *Dec.*, V, t. 2).

et toutes sont tubuleuses, avec un limbe peu développé ou nul. Mais il y a de nombreux intermédiaires entre ces diverses sections.

Ainsi conçu, le genre renferme au moins deux cents espèces¹ qui sont originaires des régions les plus chaudes de l'Asie, de l'Océanie et de l'Afrique.

Les organes végétatifs sont analogues à ceux des Rotangs dans un petit groupe auquel ils donnent leur nom (*Eurotangées*), et qui comprend les genres asiatiques et océaniens *Plectocomia*, *Plectocomiopsis*, ? *Myrialepis*, *Ceratolobus* et *Korthalsia*; tandis que la tige dressée se termine par une couronne de grandes feuilles dans les Sagoutiers (*Metroxylon*), qui forment un autre petit groupe (*Metroxylées*) avec les *Pigafetta* et les *Zalacca*; tous ayant d'ailleurs la même organisation fondamentale des fleurs, avec des fruits écailleux, et tous étant originaires de l'Asie et de l'Océanie tropicales.

Les *Eugeissona* ont à peu près les mêmes organes de végétation que les Sagoutiers; mais ils se séparent des trois genres précédents en ce qu'ils sont cespiteux, monocarpiens, avec des spadices terminaux, dressés, longuement pédonculés, solitaires ou en petit nombre, étroits quoique composés, avec une seule gaine ou de très peu nombreuses gaines à la base du spadice, et de petites gaines secondaires presque distiques et fortement imbriquées autour des rameaux sur lesquelles elles passent graduellement à l'état de simples bractées; d'où résulte un aspect tout particulier de l'inflorescence totale (*Eugeissonées*).

Dans la sous-série à laquelle donnent leur nom les *Raphia* (fig. 209, 210), les fleurs sont polygames-dioïques; ou bien les mâles et les femelles sont placées dans une même inflorescence. Les rameaux du spadice sont échelonnés sur

Raphia Ruffa.

Fig. 209. Fleur mâle.

Fig. 210. Fruit.

1. GRAY., in *Calc. Journ. Nat. Hist.*, V, 26, c. ic.; *Palms brit. Ind.*, 33, t. 185-216, C; 216, B (*Demonorops*); App., XX. — BL., *Rumphia*, II, t. 131-137; III, 2, 28, t. 138-154, 163; 163, B. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 81, 103, 749; Suppl., 90, 255, 592; *Palm. Arch. ind.*, 17. — THW., *En. pl. Zeyl.*, 330, 431. — KUNZ, *For. Fl.*, 515. — BENTH., *Fl. austral.*, VII, 134. —

MAHN et WENDL. F., in *Trans. Linn. Soc.*, XXIV, 429, 436, t. 38, B-D; 44, F; 43, B-E. — WENDL. F., in *Bot. Zeit.* (1859), 158. — T. ANDERS., in *Journ. Linn. Soc.*, XI, 8. — DR., in *Bot. Zeit.* (1877), 637, t. 5, fig. 1, 2. — BECC., *Males.*, I, 87 (*Demonorops*), 88; III, 59; in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 436. — WALP., *Ann.*, V, 829, 856 (pleraque sub *Calamo*).

l'axe principal qui les porte suivant une disposition pectinée, et les graines albuminées ont un embryon à peu près horizontal.

Les *Raphia* sont monocarpiens; mais à cette sous-série (*Raphiées*) se rapportent encore trois genres voisins, polycarpiens, de l'ancien continent : les *Oncocalamus*, *Ancistrophyllum* et *Eremospathe*, qui ont à peu près le mode de végétation des Rotangs et des feuilles à rhachis prolongé.

Mauritia aculeata.

Dans une petite sous-série américaine, formée du seul genre *Mauritia*, les fleurs sont monoïques, dioïques ou polygames. Le calice peut être entier ou denté. Le fruit rappelle beaucoup celui des genres précédents, avec des graines lisses, à embryon ventral ou situé plus bas. Les tiges sont dressées, polycarpiennes, souvent chargées d'aiguillons (fig. 211), comme dans les *Raphia*; les feuilles sont en éventail ou pennées-flabelliformes. Les

Fig. 211. Tronçon de tige.

grands spadices, composés-distiques ou subdistiques, ont des ramules florifères cylindriques, amentiformes, ou courts et comprimés, avec les fleurs unilatérales, bifariées ou pressées en spirale, accompagnées de spatheles en entonnoir ou en hélice; les bractéoles souvent unies en une cupule biaillée ou bicarénée (*Mauritiées*).

IV. SÉRIE DES ARÉQUIERS.

Le plus usité des *Areca*¹, l'*A. Catechu* (fig. 212-216), a des fleurs monoïques et régulières. Les mâles ont, sur un court réceptacle conique, trois sépales très petits, souvent inégaux, libres ou quelque peu unis à la base, parfois légèrement imbriqués. Avec eux alternent trois pétales beaucoup plus grands et plus épais, ovales-aigus, valvaires ou à peine imbriqués dans leur portion inférieure². Sur le

1. L., *Spec.*, II, 1189 (1753); *Gen.*, ed. VI, n. 1225. — ADANS., *Fam. des pl.*, II, 25. — J., *Gen.*, 38. — GERTN., *Fruct.*, I, 19, t. 7. — LAMX., III, t. 895. — MART., *Hist. nat. Palm.*, 160, 311 (part.), t. 102, 149. — ENDL., *Gen.*, n. 1278 (part.). — BL., in *Ann. sc. nat.*, sér. 2, X, 371; *Rumphia*, II, 64, t. 98. — K., *Enum.*,

III, 183, 637 (part.). — WENDL. F. et DR., in *Linnaea*, XXXIX, 175, t. 1, fig. 1. — DR., in *Bot. Zeit.* (1877), t. 6, fig. 16, 17; *Pflanzenfam.*, 76, fig. 42. — B. H., *Gen.*, III, 883, n. 1. — BECC., *Males.*, I, 17, 97 (part.).

2. Ils sont ordinairement à ce niveau légèrement coupés en biseau.

réceptacle, plus ou moins dilaté en écailles peu nettes, s'insèrent plus haut six étamines, dont trois oppositipétales souvent un peu plus grandes. Toutes ont un filet subulé, qui s'attache à la base du connectif d'une anthère sagittée, à loges linéaires, libres dans leur moitié inférieure ou à peu près, déhiscentes en dehors ou vers les bords par une fente longitudinale. Au centre, un gynécée, rudimentaire et supère, se présente sous forme d'une courte colonne bientôt partagée en trois

Areca Catechu.

Fig. 216. Graine.

Fig. 213. Fleur femelle,
coupe longitudinale.

Fig. 214. Fruit ($\frac{1}{2}$).

Fig. 215. Fruit, coupe
longitudinale.

Fig. 212. Fleur mâle, coupe
longitudinale.

longues branches coniques et charnues. Dans la fleur femelle, bien plus grande que la fleur mâle, le réceptacle convexe porte six folioles du périanthe, bisériées, orbiculaires, concaves, étroitement imbriquées et un peu accrescentes après la floraison. En dedans d'elles se trouve une courte collerette hypogyne, découpée de six dentelures obtuses et représentant un androcée rudimentaire. L'ovaire libre est ovoïde, surmonté de trois branches stylaires stigmatifères épaisses. Dans sa loge ordinairement unique, un placenta basilaire sup- porte un ovule horizontal, allongé en travers et déprimé, dont le

sommet présente en dessous un micropyle peu visible, qui regarde le plancher de l'ovaire¹. Le fruit ovoïde, entouré du périanthe durci, est couronné des restes du style ou de leur cicatrice. Son péricarpe est épais, coriace et fibreux², embrassant une graine dressée, hémisphérique, à ombilic basilaire et à tégument chargé des branches ascendantes et ramifiées-réticulées du raphé. L'albumen est dur, profondément ruminé, et loge inférieurement un petit embryon presque cylindrique, plus ou moins excentrique et oblique.

Les Aréquiers sont des arbres élevés ou humbles, des régions les plus chaudes de l'Asie et de l'Océanie. On en connaît une quinzaine d'espèces. Leurs stipes inermes sont solitaires ou cespiteux, portant des cicatrices annulaires de feuilles. Celles-ci forment un large bouquet terminal et sont pinnatiséquées, à segments à peu près égaux, lancéolés, acuminés et plissés; les bords récurvés à leur base. Souvent les segments terminaux sont confluent et, par suite, bifides ou plurifides, ou tronqués. Le rhachis a une coupe transversale triangulaire, convexe sur le dos, anguleuse et aiguë sur la face dans sa partie supérieure; tandis qu'en bas elle présente une gouttière qui se prolonge sur le pétiole, souvent épais, dilaté inférieurement en une longue gaine. Les fleurs, petites quand elles sont mâles, beaucoup plus grosses si elles sont femelles, sont monoïques, disposées sur un même spadice qui est dit infrafoliaire; ce qui signifie que la feuille dans l'aisselle de laquelle il s'était développé, s'est détachée de bonne heure de la tige. Ce spadice est large ou contracté, suivant les espèces. Son pédoncule, souvent épais, se divise en une grappe simple ou composée, portant des bractées très petites ou à peu près nulles, plus rapprochées d'un côté de l'axe que de l'autre. Les fleurs femelles sont en petit nombre ou solitaires vers la base des axes; et les mâles, beaucoup plus nombreuses, s'échelonnent sur la portion supérieure des mêmes rameaux, solitaires ou géminées, distiques ou unilatérales. Le spadice est primitivement enveloppé de spathes de taille variable, au nombre de trois ou plus, caduques. L'inférieure est complète; et les supérieures, de plus en plus petites, sont souvent bractéiformes.

Il y a des Aréquiers qui, au lieu de six étamines, n'en ont que trois, oppositipétales. L'axe principal de leur inflorescence ne s'épaissit pas, et les fleurs femelles sont éloignées les unes des autres. Ce sont les caractères d'une section *Euareca*. Dans une autre section qui a été

1. Son tégument très épais est double.

2. Criblé de raphides grêles et rigides.

nommée *Axonianthe* et *Balanocarpus*, l'inflorescence n'est qu'une fois ramifiée; son axe principal s'épaissit beaucoup, et les fleurs femelles sont bien plus rapprochées les unes des autres.

Tout à côté des Aréquiers se placent les trois genres *Pinanga*, *Cyphophœnix* et *Miscophlæus*, des régions tropicales de l'Asie ou de l'Océanie, qui ont l'ovule disposé de même et ne diffèrent les uns des autres que par leur albumen, tantôt ruminé et tantôt continu, ou par la disposition sur les axes du spadice de leurs fleurs monoïques groupées en glomérules dont une fleur femelle occupe le centre; les latérales étant mâles. Les *Cyphophœnix* ont six étamines; les *Miscophlæus* en ont neuf; et les *Pinanga*, un nombre indéfini; variations que nous retrouverons d'ailleurs en passant d'un genre à l'autre dans la plupart des groupes secondaires de la série des Arécées.

Les *Kentia*, de l'ancien monde, jadis confondus avec les *Areca*, en ont presque tous les caractères: monoïques, à glomérules triflores; les fleurs mâles insymétriques, hexandres; les femelles, à périanthe imbriqué, avec des staminodes; l'ovaire uniloculaire, surmonté d'un style à trois branches et contenant un ovule basilaire. Le genre est voisin des suivants (*Kentiées*), dont les caractères distinctifs, généralement de valeur minime, seront énumérés au *Genera*. Ce sont les *Exorrhiza*, *Carpentaria*, *Gulubia*, *Cyphokentia*, *Hydriastele*, *Vitiphœnix*, *Ptychandra*, de l'ancien continent; les *Ænocarpus* et *Euterpe*, américains. A l'ancien monde aussi appartiennent les *Oncosperma*, *Acanthophœnix*, *Deckenia*, *Phœnicophorium*, *Verschaffeltia*, *Nephrosperma*, *Roscheria*; à l'Amérique, les *Jessenia*. Viennent ensuite les *Clinostigma*, *Heterospatha*, *Iguanura*, *Somniera*, *Calyptrocalyx*, *Linospadix* (*Bacularia*), *Gigliola*, *Howea*, *Oreodoxa*, *Nenga*, *Nengella*, *Gronophyllum*, *Leptophœnix*, *Archontophœnix*, *Dictyosperma*, *Ptychoraphis*, *Rhopaloblaste*, *Actinorhytis*, *Loxococcus*, *Ptychosperma*, *Coleospadix*, *Balaka*, *Normanbya*, *Ptychococcus*, *Drymophlæus*, *Cyrtostachys*, *Veitchia*, *Kentiopsis*, *Hyospathe*, *Prestoea*, *Dypsis*, *Trichodypsis*, *Haplodypsis*, *Haplophloga*, *Neodypsis*, *Dypsidium*, *Neophloga*, *Phlogella*, *Phlogidium*, *Phloga* et *Ravenea*.

Les *Caryota* (fig. 217-221), beaux arbres monocarpiens, asiatiques et océaniens, ont des fleurs monoïques; chaque spadice contenant des fleurs des deux sexes ou d'un seul. Les mâles, symétriques, ont une corolle valvaire et un nombre indéfini d'étamines, sans rudiment de gynécée. Les corolles sont valvaires aussi dans la fleur femelle. Le genre donne son nom à une sous-série (*Caryotées*) dans laquelle

L'ovaire trilobulaire a un style terminal ou excentrique. Toutes les

Caryota urens.

Fig. 218. Bouton
femelle ($\frac{1}{2}$).

Fig. 220. Fleur
femelle.

Fig. 217. Rameau
du spadice.

Fig. 219. Fleur mâle.

Fig. 221. Fleur femelle,
coupe longitudinale.

plantes du groupe sont inermes, à segments foliaires obliquement ou

Saguerus Gomutus.




Fig. 222. Fleur mâle, coupe longitudinale ($\frac{1}{2}$).

Fig. 223. Fruit, coupe longitudinale.

abruptement prémordus. Les spathes sont nombreuses dans les *Caryota* eux-mêmes, les *Saguerus* (fig. 222, 223) et les *Didymosperma*,

qui ont tous des étamines nombreuses et le style terminal; tandis qu'avec le même style, les *Wallichia* sont hexandres. Dans les *Orania*, la fleur mâle a de même six étamines; mais son périanthe est insymétrique; et dans la fleur femelle, le style est finalement basilaire.

Les *Chamædorea* (fig. 224-226), palmiers de l'Amérique tropicale occidentale, abondants surtout au Mexique, inermes, dressés ou couchés à terre, peu élevés ou rarement grimpants à l'aide des divisions modifiées de leurs feuilles, ont des fleurs presque toujours dioïques, à petit calice cupuliforme et à pétales valvaires ou imbriqués, libres ou unis. Leurs six étamines sont légèrement unies à la base de la corolle; et celle-ci est plus nettement gamopétale dans la fleur femelle, avec ou sans staminodes. Dans le fruit, peu volumineux et formé d'un, deux ou trois carpelles sphériques ou oblongs, les restes du style sont finalement basilaires. Ces plantes ont des feuilles simples, bifides au sommet, ou pinnatiséquées. Leurs spadices, simples ou composés, interfoliaires ou quelquefois infrafoliaires, sont pourvus de trois petites spathes ou plus, membraneuses ou coriaces.

A côté de ce genre et dans une même sous-série (*Chamædorées*) se rangent les types en général très voisins *Nunnezhara*, *Kunthia*, *Gaussia*, *Hyophorbe*, *Pseudophœnix*, *Synechanthus* et *Reinhardtia*, genres américains, sauf toutefois les *Hyophorbe*, qui appartiennent aux îles Mascareignes.

Les *Ceroxylon* (fig. 227-229) sont des palmiers de grande taille, qui croissent dans les Andes de la Colombie et du Vénézuëla, et dont les fleurs sont monoïques ou polygames, articulées. Elles ont un calice gamosépale et une corolle gamopétale, à lobes valvaires. Les étamines sont le plus souvent au nombre de neuf, ou plus; les alternipétales insérées dans le sinus qui sépare les pièces du périanthe, à

Chamædorea elegans.



Fig. 225. Fleur mâle, coupe longitudinale (½).

Fig. 224. Rameau du spadice mâle.

Fig. 226. Fleur femelle.

fillet renflé à sa base, et à grosses loges de l'anthere profondément séparées. L'ovaire, quand il est bien développé, est profondément trilobé, et un ou deux de ses lobes sont stériles. Le style devient basilaire dans le fruit qui est simple ou double et dans lequel les graines sont ascendantes, comme étaient les ovules. Les feuilles sont :

Ceroxylon andicola.



Fig. 227. Fleur mâle ($\frac{1}{2}$).

Fig 229. Diagramme.

Fig. 228. Fleur mâle, coupe longitudinale.

grandes et pinnatiséquées; et les spadices, très longs et très composés, sont interfoliaires.

Dans cette même série (*Ceroxylées*) se placent les genres très analogues *Juania*, *Wettinia*, *Iriarteia* et *Catoblastus*. Ils ont l'ovaire plus ou moins profondément lobé, sauf dans les *Juania*, dont le style est inséré près du sommet du fruit, et dans les *Iriarteia*; et presque toujours les étamines sont en nombre supérieur à six. Ce sont aussi des plantes américaines, à grandes feuilles pinnatiséquées.

Geonoma stricta.



Fig. 230. Gynécée; les staminodes soulevés ensemble sur le style.

Dans les *Geonoma* (fig. 230), les fleurs monoïques ou dioïques ont une corolle glumacée. Les mâles, plus ou moins insymétriques, ont les pétales valvaires et les étamines monadelphes, unies, ainsi que les staminodes de la fleur femelle, en une coupe ou en un tube exsert. Les fleurs femelles ont la corolle gamopétale, imbriquée, et un ovaire à trois loges. Mais d'eux d'entre elles avortent; si bien que le style devient comme gynobasique, avec trois branches stig-

matifères exsertes et finalement révolutes. Ce sont des palmiers grêles, à tige arundinée et à feuilles alternes ou rapprochées du sommet des branches, entières, bifides ou plus ou moins irrégulièrement pinnatiséquées. Ils sont nombreux dans l'Amérique tropicale.

Dans la sous-série à laquelle ils donnent leur nom (*Géonomées*), on range les genres voisins *Asterogyne*, *Calyptrogyne*, *Welfia*, américains, de même que les *Manicaria*, dont le fruit (fig. 231), souvent tricoque, est chargé de verrues pyramidales plus ou moins proéminentes; les *Leopoldinia*, du Brésil; les *Bentinckia*, asiatiques; les *Podococcus* (fig. 232) et *Sclerosperma*, de l'Afrique tropicale occidentale, peu élevés : les premiers à spadice simple, avec un fruit stipité, allongé, souvent accompagné de deux loges stériles plus ou moins développées, et atténué à sa base en un pied défilé; les derniers à spadice également simple, mais épais et fusiforme, dont les fleurs mâles sont polyandres, occupant seules le sommet de l'inflorescence ou, dans sa portion inférieure, insérées l'une à droite et l'autre à gauche d'une fleur femelle.

Manicaria saccifera.

Fig. 231. Fruit.

Les Cocotiers (fig. 233-236), dont on a fait le type d'une tribu (*Cocoinées*), ont les fleurs monoïques. Dans la portion inférieure des

Podococcus
Berteri.

Fig. 232. Fruit,
coupe
longitudinale.

branches du spadice, on voit souvent des fleurs femelles accompagnées d'une, deux ou trois fleurs mâles latérales. Plus haut, sur les mêmes axes, il n'y a plus que des fleurs mâles géminées ou même solitaires. Le court réceptacle de la fleur mâle porte un petit calice de trois folioles, indépendantes, lancéolées ou triangulaires, aiguës, valvaires ou cessant de bonne heure de se toucher. La corolle, plus grande de beaucoup, est à peu près régulière ou insymétrique. Ses folioles, coriaces, dressées, oblongues-aiguës, sont valvaires; puis elles se séparent pour s'étaler en dehors. Les étamines, au nombre de six, s'insèrent sous un petit rudiment de gynécée, simple ou trilobé, qui peut même faire totalement défaut.

Chacune d'elles a un filet subulé et une anthère oblongue ou linéaire. Ses deux loges sont indépendantes l'une de l'autre au-dessous de l'insertion du filet qui s'unit à la base du connectif vers le milieu ou à peu près de la hauteur de l'anthère, et elles s'ouvrent en dedans par une fente longitudinale. Dans la fleur femelle, plus volumineuse que les mâles, les trois sépales et les pétales alternes

sont larges, concaves, coriaces et imbriqués, plus ou moins aigus au sommet. L'androcée est réduit à une courte collerette membraneuse, entière ou dentée; et l'ovaire libre, ovoïde ou sphérique, est creusé de trois loges alternipétales et surmonté d'un style partagé en trois branches dressées, puis étalées, aiguës et stigmatifères sur leurs bords qui se replient étroitement en dedans l'un sur l'autre. Dans chaque loge il y a un ovule ascendant ou presque basilaire, anatrope, à micropyle extérieur et inférieur. Souvent deux de ces ovules s'arrêtent de bonne heure dans leur développement. Le fruit, petit ou très gros, ellipsoïde ou ovoïde, arrondi ou à trois angles obtus, a un

Cocos (Glaziosa) pulchra.

Fig. 233. Fleur mâle, coupe longitudinale.

Fig. 234. Glomérule triflore.

Fig. 235. Fleur femelle, coupe longitudinale.

sommet obtus, intrus ou rostré. Son épais exocarpe est fibreux; et son endocarpe osseux, très dur, fibreux en dehors, est perforé vers la base de trois trous qui conduisent dans une cavité monosperme. La graine a une enveloppe brune, parcourue d'un réseau formé par les ramifications du raphé. L'albumen est homogène, plein et fibreux dans une direction radiante, ou bien creux et rempli d'un liquide laiteux. L'embryon excentrique se trouve placé en face d'un des trois trous du noyau.

Ce sont des arbres ou arbustes, énormes ou d'humble taille, inermes, à tige grêle ou très épaisse, annelée en travers et souvent chargée de bases foliaires persistantes. Les feuilles, souvent grandes, réunies au sommet du tronc, sont pinnatiséquées, avec des segments

lancéolés ou ensiformes. Leurs bords sont lisses et récurvés, parfois dentés ou plus ou moins profondément découpés en haut d'un côté; ils ont une ou plusieurs nervures. Le pétiole est concave en dedans, inerme ou épineux sur ses bords; il se continue avec une côte aiguë au sommet, obtusément trigone; et la gaine est courte, fibreuse, ouverte. Les spadices interfoliaires, dressés d'abord, puis penchés, ont les divisions de leur axe dressées ou pendantes. Leur spathe inférieure est courte, fendue au sommet; la supérieure, plus grande, fusiforme ou claviforme, coriace ou ligneuse. Les fleurs sont petites et nombreuses sur les divisions du rhachis.

Cocos botryophora.

Il y a un Cocotier bien connu qui croît sur toutes les plages tropicales des deux mondes, le *Cocos nucifera* L. Les autres espèces sont de l'Amérique tropicale et sous-tropicale; on en a décrit une trentaine.

Fig. 236. Endocarpe.

Les trois genres américains *Barbosa*, *Rhyticoccus* et *Arikuryroba*, mal connus, ne paraissent différer des *Cocos* que par quelques caractères secondaires tirés de leur fruit.

Près d'eux se placent aussi les *Allagoptera*, du Brésil et de la Bolivie, qui ont des spadices simples et des étamines nombreuses; le *Jubæa*, à fleurs polyandres et à endocarpe percé de trois trous situés vers le milieu de sa hauteur; les *Attalea*, qui ont de six à vingt-quatre étamines et des pétales lancéolés, étroits ou très petits; les *Orbignya*, qui ont de nombreuses étamines à loges d'anthère longues et tordues, avec un nombre de loges ovariennes qui varie de deux à sept. Tous ces genres sont également originaires de l'Amérique méridionale.

Les *Elæis*, qui habitent l'Afrique tropicale et le nord-est de l'Amérique du Sud, donnent aussi leur nom à une sous-série (*Elæidées*). Ce sont des palmiers à feuilles pinnatiséquées, qui ont des fleurs mâles hexandres plongées dans les axes du spadice; les filets staminaux libres ou monadelphes. Les fleurs femelles ont les pétales libres, tordus ou imbriqués; des staminodes unis en cupule et un style à trois grandes branches stigmatifères révolutées. Le fruit a un endocarpe percé de trois trous situés dans son hémisphère supérieur. Le *Barcella odorata*, du Brésil, très voisin des *Elæis* auxquels on l'avait jadis rapporté, ne s'en distingue guère que par un spadice à long

pédoncule et à branches lâches, avec une spathe intérieure ligneuse. C'est un palmier subacaule et à segments foliaires flasques.

Les *Bactris* (fig. 237, 238) sont le type d'une sous-série très particulière (*Bactridées*) dans laquelle la corolle est gamopétale. Celle de la fleur femelle du genre *Bactris* peut même l'être dans toute l'étendue de sa hauteur. Le fruit a un endocarpe osseux, monosperme, percé de trois trous situés vers le milieu de sa hauteur ou plus haut. Les fleurs mâles sont plus petites que les femelles; et les feuilles

pinnatiséquées, groupées au sommet des axes, ont leurs divisions pennées, acuminées.

Avec les caractères des *Bactris*, les *Atitara* ont des fleurs femelles plus petites que les mâles; des fruits à endocarpe mince; une tige grimpante, allongée, soutenue par des épines que porte l'extrémité de leurs feuilles latérales, étirée comme il arrive dans certain Rotangs.

Bactris bolanophora.



Fig. 237. Fleur femelle (♀).

Fig. 238. Fleur femelle, coupe longitudinale.

Les *Astrocaryum* ont les fleurs mâles des *Bactris*, mais plongées dans les alvéoles des axes du spadice. Leur tige est dressée, et leurs feuilles terminales ont les segments prémordus. Leurs fruits ont un noyau dur, assez semblable à celui des *Bactris*.

Dans les *Martinezia*, la corolle valvaire de la fleur femelle n'est plus gamopétale qu'à sa base. Les fleurs mâles, non plongées dans des alvéoles du spadice, ont six anthères incluses; et les segments des feuilles sont semblables à ceux des *Astrocaryum*.

Les *Acrocomia*, dont la corolle de la fleur femelle est construite comme celle des *Martinezia*, mais imbriquée, ont des étamines à grandes anthères exsertes et des fleurs mâles plongées dans des alvéoles des divisions du rhachis de l'inflorescence. Les divisions de leurs feuilles sont aiguës ou acuminées.

Tous ces genres de Bactridées appartiennent aux régions chaudes ou tempérées des deux Amériques.

V. SÉRIE DES PHYTELEPHAS.

Les palmiers exceptionnels qu'on nomme *Phytelephas*¹ (fig. 239-242) ont des fleurs dioïques. Les mâles, à peu près régulières ou légèrement irrégulières, ont, sur un réceptacle peu élevé, un petit

Phytelephas macrocarpa.




Fig. 239. Inflorescence mâle.

Fig. 241. Fleur femelle.

Fig. 242. Fleur femelle, coupe longitudinale.

Fig. 240. Inflorescence femelle, coupe longitudinale.

péricarpe cupuliforme, dont les bords sont découpés de dents inégales en nombre indéterminé, cessant de bonne heure de se toucher. En dedans se voient de très nombreuses étamines, dont les filets sont

1. R. et Pav., *Fl. per. Syst.*, 299. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 306. — ENDL., *Gen.*, n. 1716. — K., *Enum.*, III, 109. — GAUDICH.,

Voy. Bonite Bot., t. 14-16, 29, 30. — B. H., *Gen.*, III, 921, n. 79. — DA., *Pflanzenfam.*, 86, fig. 62-64. — *Elephantusia* W., *Spec.*, IV, 1158.

libres, dressés, grêles, subulés, et s'attachant à la base ou un peu au-dessus d'une anthère linéaire, étroite et longue, souvent apiculée-mucronée, à deux loges parallèles unies jusqu'en bas, ou à ce niveau indépendantes dans une très courte étendue, et là égales ou inégales, déhiscentes chacune par une fente longitudinale. Dans les fleurs femelles, bien plus grandes que les mâles, le périanthe est beaucoup plus développé, composé de trois sépales triangulaires, acuminés, imbriqués, et de six à douze pétales linéaires-oblongs, un peu charnus, acuminés et imbriqués. L'androcée est représenté par de nombreux staminodes à anthère stérile. Au centre se voit un ovaire libre, obovoïde ou presque sphérique, charnu, qui, dans sa portion inférieure, est creusé d'un nombre de loges qui varie de trois à neuf, et que surmonte un long style cylindrique, partagé supérieurement en autant de branches stigmatiques, divergentes et subulées, qu'il y a de loges à l'ovaire. Dans l'angle interne de chacune de celles-ci s'insère un ovule presque horizontal ou plus ou moins obliquement ascendant, anatrophe, à micropyle inférieur. Le fruit est formé de nombreuses baies obpyramidales, cortiquées et rapprochées en tête, qui sont surmontées du style et recouvertes de tubercules à facettes, inégalement proéminents. L'endocarpe est crustacé, fragile; et chacune des loges, variables en nombre, renferme une graine ascendante. Celle-ci, presque sphérique ou obovoïde, avec des angles inégaux et obtus, présente vers le bas un large hile, et sa surface extérieure est parcourue des branches du raphé. L'albumen homogène a la consistance et la couleur de l'ivoire; il renferme tout près du hile un petit embryon.

Les *Phytalephas* habitent le Pérou et la Colombie. Ils ont une tige épaisse, courte et couchée, radicante, ou plus rarement assez longue et dressée. Leurs grandes feuilles terminales sont pinnatiséquées, à segments alternes, fasciculés ou fastigiés, linéaires-lancéolés et acuminés; les bords récurvés à leur base. Les fleurs sont disposées en épis à pédoncule squamigère : les mâles pendants, cylindriques ou sphériques; et les femelles dressés, plus épais. Les fleurs sont pourvues de petites bractées, et l'inflorescence est protégée par deux spathes allongées, complètes, coriaces ou ligneuses et à déhiscence ventrale. On en a jusqu'ici distingué trois ou quatre espèces¹.

1. H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, I, 83. — MART., *Consp.*, 5. — Hook., *Kew Journ.*, I, 204, t. 6, 7; in *Bot. Mag.*, t. 4913, 4914. — SPACH, *Swit. à Buff.*, XII, 29. — *Fl. serres*, t. 496, 497. — SEEM., in *Kew Journ.*, III, 303;

Bot. Her., 205, t. 45-47; in *Bonplandia* (1855), 270, t. 1, 2. — KARST., in *Linnaea*, XXVIII, 275; *Fl. columb.*, I, 165, t. 82. — SPRUCE, in *Journ. Linn. Soc.*, IV, 186. — WALP., *Ann.*, III, 494. — *Bot. Mag.*, t. 4913, 4914.

Les plus anciens auteurs considéraient les Palmiers comme formant un groupe bien distinct. En 1737, LINNÉ¹ en décrivait déjà six genres : *Phœnix*, *Chamærops*, *Corypha*, *Coccus*, *Borassus* et *Caryota*, auxquels il ajoutait, seize ans plus tard, les *Areca* et *Elate*. En 1763, ADANSON² en énumérait onze genres. Malheureusement, en 1764, LINNÉ³ réunissait dans un même Ordre les Palmiers et les Hydrocharidacées. En 1841, KUNTH⁴ divisa la famille en cinq tribus, conservées par la plupart des auteurs qui suivirent. En 1824, le grand monographe des Palmiers, PH. DE MARTIUS, au début⁵ de ses études approfondies sur cet admirable groupe des *Principes*, y établissait six séries : des Sabalinées, Coryphinées, Lépidocaryées, Borassées, Arécinées et Cocoïnées. Il avait commencé l'année précédente la publication de son ouvrage capital : *Historia naturalis Palmarum*⁶, qui ne fut terminé qu'en 1850, et dans lequel H. MOHL traita de l'anatomie⁷, et UNGER de la paléontologie de ces plantes. En 1847, leur étude fut pour ainsi dire complétée dans le *Palmetum Orbignianum*⁸. Parmi les spécialistes qui ont perfectionné l'œuvre en décrivant un grand nombre de genres et d'espèces, la plupart cultivées dans nos serres, il faut particulièrement citer BLUME⁹, GRIF-FITH¹⁰, MM. H. WENDLAND¹¹, DRUDE¹² et BECCARI¹³, aux travaux si remarquables desquels doivent forcément recourir tous les auteurs qui veulent aujourd'hui étudier de près et décrire cette famille¹⁴.

1. *Meth. sex.*, 22; *Gen.*, 886.

2. *Fam. des pl.*, II, 22, Fam. 6.

3. *Ord. nat.*, Ord. 1.

4. *Enum.*, III, 168.

5. *Palm. Fam.*, 3.

6. « Opus tripartitum.... Vol. I : de Palmis generatim; II, III : Expositio Palmarum systematica. »

7. Naturellement toute spéciale et étudiée par un grand nombre d'auteurs : H. MOHL, *Verm. Schrift.*, 129. — WENDL., in *Bot. Zeit.* (1879), 145. — KARST., in *Berl. Akad.* (1847), 73. — EICHL., in *Abh. d. Preuss. Akad.* (1885), 28. — KNY, in *Abh. bot. Ver. prov. Brand.* (1881), 94. — DR., in *Bot. Zeit.* (1877), n. 38-40; *Pflanzensam.*, 8. — PFITZ., in *Ber. deutsch. bot. Ges.* (1885), 32. — SOLL., in *Giorn. bot. ital.* (1884), 50.

8. In *d'Orbigny Voy. Amér. mérid.*, VII.

9. *Comm. Palm. Ind. or. (Rumphia)*.

10. *Palms of british India*.

11. *Ind. Palmarum... quæ in hort. europ. coluntur* (1864). — WENDL. F. et DR., in *Linnaea*, XXXIV, 153 (1875). — WENDL. F. et MANN, in *Trans. Linn. Soc.*, XXIV, 421.

12. In *Mart. Fl. bras.*, III, II; in *Engl. u. Prantl Pflanzensam.*, II, 3, p. 1 (1887).

13. *Malesia*, I-III; in *Ann. Jard. Buitens.*, II, 77; in *Giorn. bot. ital.*, XX, 177; in *Malpighia*, I; in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 405.

14. Ce que nous avons fait nous-même dans les cas trop nombreux où des matériaux suffisants n'étaient pas à notre disposition pour l'étude des caractères génériques. L'opinion énoncée par plusieurs auteurs, que les genres ont été trop multipliés, notamment parmi les Arécées, et distingués par des caractères de trop peu d'importance, est peut-être fondée; mais, en général, nous avons accepté ces genres dont les spécialistes reconnaissent la nécessité dans leurs ouvrages, surtout alors que la vérification matérielle des faits nous était impossible. Dans la pratique, il paraît que ces genres sont justifiés, ne fût-ce que par l'examen des organes végétatifs, ainsi que l'a établi M. O. DE KERCHOVE DE DUNTERCHEM, dans son livre de vulgarisation intitulé : *Les Palmiers* (1878). Plusieurs ouvrages analogues, destinés aux horticulteurs ou aux gens du monde, ont été publiés, notamment : SEEMANN, *Hist. of the*

Elle comprend actuellement environ un millier d'espèces, réparties entre 149 genres, eux-mêmes groupés ici en cinq séries :

I. CORYPHÉES¹. — Spadices interfoliaires, à spathes 1-∞. Fleurs hermaphrodites, polygames ou dioïques, parfois nues (*Nipées*) ; les carpelles indépendants, à ovules ascendants. Fruit à 1-3 carpelles ; le style terminal ou basilaire. — Arbres à feuilles rarement pinnatiséquées (*Phaenicees*), ordinairement orbiculaires ou semi-orbiculaires, cunéiformes à la base, digitinerves et plissées ; les segments indupliqués en estivation. — 21 genres.

II. BORASSÉES². — Spadices interfoliaires, à spathes ∞. Fleurs dioïques : les mâles disposées sur des axes amentiformes, cylindriques, plongées dans des fossettes interposées aux bractées, où elles sont solitaires ou 2-∞, en cyme unipare. Ovaire à trois loges, surmonté du style. Fruit à 1-3 noyaux ; les graines ordinairement adhérentes au péricarpe. — Arbres à feuilles digitées-flabelliformes. — 6 genres.

III. ROTANGÉES³. — Spadices terminaux ou axillaires, à spathes ∞, distiques, incomplètes et vaginiformes, rarement 1 ou en petit nombre. Fleurs hermaphrodites ou unisexuées. Ovaire à 1-3 loges, complètes ou incomplètes, à style terminal ; les ovules ascendants. Fruit chargé de poils dilatés en écaille et s'imbriquant régulièrement, tessellé-loriqué. Graines libres, ombiliquées. — Arbres ou lianes grimpant à l'aide de crocs du sommet des feuilles, qui sont pennées ou flabelliformes. — 15 genres.

IV. ARÉCÉES⁴. — Fleurs monoïques ou dioïques, souvent en glomérules 3-flores ; la médiane femelle. Carpelles libres ou bien plus souvent unis en un ovaire à 1-3-∞ loges, entier ou lobé. Style terminal ou basilaire. Ovule dressé, ascendant, transversal ou descendant, à micropyle généralement inférieur. Fruit à 1-∞ graines,

Palms and their allies (1856). — BOLLE, *Die Palmen* (1857). — M.-MASTERS, in *Gardn. Chron.* (1884-85). Dans les *Kew Garden's Reports* ont aussi paru des listes des Palmiers cultivés dans ce grand établissement (1882).

1. SPRENG., *Anleit.*, II, I, 203 (Ord.). — B. H., *Gen.*, III, 879, Trib. 3. — *Coryphinae* H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, I, 298 (Sect.). — MART., *Palm. Fam.*, 7 (Ser.). — DR., *Pflanzenfam.*, 28, Unterfam. 1. — *Phaeniceae* SPRENG., *loc. cit.*, 198 (Ord.). — B. H., *Gen.*, III, 879, Trib. 2. — *Phaenicinae* MART. — ENDL., *Gen.*, 253. — *Nipaceae* AD. BR., *Enum. gen.*, 15 (Fam.).

2. MART., *Palm. Fam.*, 7. — B. H., *Gen.*, III, 881, Trib. 5. — *Borassinae* MART. — ENDL.,

Gen., 250 (Trib.). — DR., *Pflanzenfam.*, 38 (Unterfam. 2).

3. *Calameae* H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, I, 310 (Sect.). — K., *Enum.*, III, 200 (Trib.). — *Lepidocarya* MART., *Palm. Fam.*, 7 (Ser.). — *Lepidocaryinae* MART. — ENDL. — *Lepidocaryeae* B. H., *Gen.*, III, 880, Trib. 4. — *Lepidocaryinae* DR., *Pflanzenfam.*, 41 (Unterfam. 3).

4. LINDL., *Veg. Kingd.*, 138 (Trib.). — B. H., *Gen.*, III, 883, Trib. 1. — *Arecinae* MART., *Palm. Fam.*, 7 (Ser.). — ENDL., *Gen.*, 245 (Trib.). — *Arecaceae* REICHB., *Consp.*, 72 (Trib.). — *Ceroxylinae* DR., *Pflanzenfam.*, 53 (Unterfam. 4). — *Cocoinae* H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, I, 301 (Sect.). — MART., *Palm. Fam.*, 7 (Ser. 6). — B. H., *Gen.*, III, 881, Trib. 6.

libres ou adhérentes à l'endocarpe ; le hile variable ; l'embryon assez souvent (*Cocoinées*) opposé à un pertuis de l'endocarpe. — Arbres ou rarement lianes, à feuilles pinnatiséquées. — 104 genres.

V. PHYTELÉPHASIÉES¹. — Spadices dioïques, interfoliaires, amen-tiformes, allongés ou capités. Fleurs mâles à périanthe court ou 0, ∞ -andres. Fleurs femelles à 5-10 pétales, à staminodes ∞ . Fruit 4- ∞ -loculaire, à long style terminal. Fruits unis en un gros syncarpe, charnus et cortiqués. Graine à albumen éburné et plein. — Arbres peu élevés, à grandes feuilles pinnatiséquées. — 1 genre.

On voit que ces divisions sont basées sur des caractères souvent spéciaux à la famille et qui d'ailleurs ne nuisent guère, dans leurs variations, à son homogénéité. Avec des fleurs qui sont, en somme, construites sur le type liliacé, les Palmiers ont un port et des organes de végétation tout particuliers et que tout le monde connaît. Ce sont des arbres ou arbustes de longue durée, ou plus rarement des végétaux monocarpiens qui ont une inflorescence terminale une seule fois développée, ou dont les inflorescences axillaires s'épanouissent successivement de haut en bas. La racine principale est parfois, par exception parmi les Monocotylédones, un long pivot (fig. 189) qui persiste assez longtemps. Ailleurs, suivant la règle, il se détruit de bonne heure, et des racines adventives se développent sur le bas de la tige. Quelquefois elles sont aériennes et jouent le rôle de haubans qui soutiennent le stipe, comme dans les *Iriarteas* ; ou bien, comme dans les *Acanthophœnix*, elles se développent en épines ramifiées qui sont des organes de défense. Parfois, comme dans certains *Sabal* (fig. 193, 194) ou l'*Howea Belmoreana*, la base de la tige prend, par suite d'accroissements inégaux, la forme d'un croc et ramène au niveau du sol ou au-dessus de lui la cicatrice qui siège à sa partie inférieure et à laquelle correspondait d'abord la base de la racine principale. Cette portion développe des racines adventives qui peuvent être en partie aériennes. La tige, assez fréquemment sobolifère, est dressée ou couchée, souvent renversée par les vents à cause du peu de solidité que lui donnent des racines trop faibles. Parfois aussi elle est grêle, sarmenteuse, d'une longueur démesurée, et elle se fixe aux arbres voisins à l'aide de crocs ou de pointes qui représentent des folioles modifiées. Exceptionnellement, comme dans le *Chamæriphes thebaica*, le stipe se divise dichotomiquement². Sa surface peut être

1. AD. BR., *Enum. gen.*, 15 (Fam.). — *Phytelephantinæ* DR., *Pflanzenfam.*, 86 (part.).
Phytelephantæ MART., *Consp.*, 5. — *Phy-* 2. Le Dattier peut (DYBOWSKI) se ramifier.

glabre et lisse. Souvent cependant, elle est annelée des cicatrices foliaires, et, dans l'intervalle de celles-ci, chargée d'aiguillons de forme et de dimensions variables (fig. 211). Les feuilles¹ sont alternes; mais le plus souvent elles se détruisent de bas en haut, sauf quelquefois leur base qui persiste sur le tronc. Les supérieures seules forment au sommet de la tige un bouquet terminal dont les dimensions peuvent être énormes. Les premières feuilles sont ordinairement entières et rectinerves, avec une sorte de glande terminale, appareil excréteur dont l'existence est passagère. Bientôt les feuilles se découpent, suivant leur mode de nervation, tantôt penné et tantôt digité; disposition à laquelle on a attaché une assez grande importance pour la classification. Rarement la feuille est bipinnée, comme dans les *Caryota*. Les divisions plus ou moins profondes de la feuille et qu'on nomme ses segments, sont souvent longues et étroites, linéaires ou lancéolées, aiguës ou obtuses, assez fréquemment acuminées, piquantes même. Ou bien leur sommet est bifide, inégalement prémordu ou lacinié; surtout quand la foliole est trapézoïde, avec un bord plus large que les autres et des veines plus ou moins divergentes en éventail. La disposition des nervures est ainsi flabellée dans les feuilles digitées; auquel cas le pétiole se termine, non loin de la base du limbe, par une saillie plus ou moins accentuée, qu'on a nommée *ligule*. Quant aux segments foliaires, ils ont leurs bords indupliqués ou rédupliqués dans la préfoliation, et l'on retrouve longtemps la trace de ce mode de disposition dans la portion qui avoisine leur base. Quelquefois la feuille ne présente, en fait de découpures, qu'un profond sinus apical, et plus souvent les segments supérieurs sont confluent en nombre variable. La côte (*rhachis*) ou nervure médiane des feuilles pinnatiséquées est ordinairement convexe en dehors, et carénée ou en tout cas plus aiguë en dedans. Le pétiole, souvent très long, qui lui fait suite, est variable de forme; si bien que sa section transversale représente un cercle ou un demi-cercle, ou porte une échancrure plus ou moins profonde en dessus, alors que sa face est canaliculée. Ses bords sont entiers ou découpés de dents épineuses, ou dissociables en fibres longitudinales. Inférieurement il se dilate en une gaine quelquefois très longue, fermée ou ouverte, dont les bords ou même toute la largeur peuvent se dissocier en une toile fibreuse longtemps persistante. Le sommet de cette gaine proémine parfois en

1. EICHBL., in K. Abh. Akad. Wissensch. Berl. (1885). — DR., *Pflanzenfam.*, 9, 12, fig. 9-11

ocrea aigu. Les inflorescences¹ sont des *spadices*. Nés à l'aisselle d'une feuille, ils demeurent intrafoliaires quand cette feuille persiste à l'époque de la floraison. Si, au contraire, elle s'est alors détachée, le spadice n'occupe plus que l'aisselle d'une cicatrice; et, extérieur aux feuilles sus-jacentes, il prend le nom d'infrafoliaire. Il est subsessile ou porté par un pédoncule de longueur variable, souvent pendant; et de même la portion de son axe principal, qui se divise plus ou moins, est de longueur très variable; si bien que l'axe composé ou décomposé a les divisions éloignées les unes des autres ou, au contraire, très rapprochées et comme flabellées. Les spadices sont protégés par des bractées spéciales, souvent très développées, qui sont des *spathes*. Quelquefois très nombreuses et plus petites, moins épaisses, elles occupent les bases de toutes les divisions des axes principal et autres des spadices, formant à ces bases une sorte de gaine tubuleuse. Bien plus souvent, une seule de ces spathes ou quelques-unes occupent la base de l'inflorescence totale, autour de laquelle elles prennent la forme d'une grande enveloppe naviculaire, épaisse, coriace, glabre ou chargée d'aiguillons, uni- ou bicarénée, déhiscente suivant son bord ventral, entière ou bipartite et persistant plus ou moins longtemps au-dessous des fleurs épanouies. Celles-ci sont souvent articulées avec les axes des spadices qui les supportent; elles en occupent, fréquemment reportées d'un seul côté, ou la surface, ou des fossettes creusées dans l'axe ou formées de bractées rapprochées les unes des autres. Au niveau d'une fossette, la fleur peut être solitaire, ou gémée; ou bien trois fleurs sont rapprochées en un glomérule dans lequel la médiane est femelle, et les latérales mâles. Ailleurs il n'y a de fleurs femelles que dans la portion inférieure des axes; et les mâles, bien plus nombreuses, sont supérieures. Assez souvent, les spadices sont unisexués; les fleurs étant monoïques ou dioïques. Souvent aussi elles sont polygames-dioïques ou monoïques, ou bien hermaphrodites. Des glomérules unipares-scorpioïdes au niveau de chaque bractée se présentent rarement, soit pauciflores (*Chamæriphes*), soit multiflores (*Borassus*). Une fleur ou un glomérule floral est ordinairement axillaire d'une bractée, avec deux bractéoles latérales qui peuvent être très réduites ou même disparaître, indépendantes l'une de l'autre ou unies en cupule. Le périanthe est ordinairement double, trimère. Trois sépales, dont un antérieur, libres ou unis, sont valvaires ou

1. Sur la disposition des inflorescences en général, voy. DR., *Pflanzenfam.*, 15, fig. 14-18.

plus souvent imbriqués. Les trois pétales alternes, ordinairement plus grands, très exceptionnellement plus petits (*Nenga*), sont valvaires, tordus, imbriqués, ou imbriqués dans leur portion inférieure dilatée et valvaires vers le sommet atténué. Très souvent leur tissu est épais et coriace. La corolle peut être dialypétale, plus rarement gamopétale. Ses pièces sont régulières ou plus ou moins irrégulières; ce qui rend la fleur insymétrique. Les étamines sont hypogynes ou plus ou moins unies à la corolle, portées parfois par sa gorge. Elles peuvent être réduites à un verticille oppositisépale ou oppositipétale. Plus ordinairement l'androcée est diplostémoné; trois étamines oppositipétales sont généralement les plus grandes. L'anthère, variable de forme, est biloculaire, presque toujours introrse; et presque constamment aussi ses deux loges sont indépendantes l'une de l'autre dans leur portion inférieure. Les filets sont libres ou monadelphes. Le nombre d'étamines peut devenir considérable dans la fleur mâle. Dans la fleur femelle, elles sont souvent réduites à l'état de staminodes, décrits parfois comme des disques dans le cas de monadelphie. Le gynécée est normalement tricarpellé; rarement les carpelles sont en nombre supérieur. Les ovaires peuvent être libres, avec des styles terminaux ou gynobasiques. Plus souvent ils sont unis en une masse uni- ou pluriloculaire. Le style, ordinairement à trois divisions, présente de grandes variétés de forme, rarement long et grêle (*Pritchardia*), souvent trapu et à lobes stigmatifères épais. Il n'y a normalement qu'un ovule par loge ou par feuille carpellaire, à double enveloppe et à micropyle inférieur; si bien que les ovules anatropes ou hémitropes sont dressés ou ascendants, et que les ovules descendants peuvent être orthotropes. Toutes ces variations se retrouvent dans le fruit qui est plus ou moins charnu ou fibreux, avec souvent un endocarpe très dur, perforé de trois trous dans une couple de groupes secondaires, notamment dans les Coccinées. Les graines varient beaucoup d'un genre à un autre quant à la situation de leur hile, à la nervation de leur raphé, à la nature de leur albumen dur ou charnu, plein ou creux, continu ou ruminé; à la situation et à la direction de leur embryon¹. Outre la disposition des écailles du fruit des Rotangées, dont il a déjà été question, le fruit peut être muriqué

1. Sur la forme des embryons, H. MICHEELS, in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* (1892), 174. Sur les jeunes palmiers, le même, in *Mém. Acad. sc. Brux.* (1890). Sur le fruit et la graine en

général, DR., *Pflanzenfam.*, 21, fig. 19-21, 29, 31, 32, 36, 38, 55, 62, 63, 65, etc. Sur la valeur des organes pour la classification, le même, in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 255, 270.

d'une façon variable dans plusieurs autres genres de séries différentes (*Manicaria*, *Sommiera*, *Teysmannia*, *Phytelephas*) ou chargé d'aiguillons (*Bactris*, *Astrocaryum*, etc.).

La plupart de ces caractères font défaut dans les familles qu'on a le plus rapprochées des Palmiers, c'est-à-dire les Pandanacées, les Cyclanthacées, secondairement les Aracées, certaines Liliacées, Graminées et Rapatéacées. Les Pandanacées sont ligneuses, mais à tige ramifiée et émettant des racines adventives aériennes. Leurs feuilles carénées sont indivises, généralement serrulées, rectinerves. Leur périanthe est nul; leurs étamines, en nombre indéfini, à anthère allongée et dressée. Leur ovaire uniloculaire est uni avec les ovaires voisins en groupes variables. Leurs ovules peuvent être solitaires et subbasilaires dans chaque ovaire; mais leur nombre peut être indéfini. Le fruit forme un syncarpe épais, comme dans les *Nipa* et les *Phytelephas* qui servent de transition entre les Palmiers et les Pandanacées, mais qui ont les feuilles des premiers. Les Cyclanthacées, également intermédiaires aux Pandanacées et aux Palmiers, sont des herbes vivaces ou des arbustes inermes. Leurs feuilles sont en éventail, ou entières ou bipartites, à nervures parallèles; elles sont condupliquées dans l'estivation. Leurs fleurs sont disposées en cercles parallèles ou sur une spire continue; les mâles nues ou périanthées et polyandres; les femelles à ovaire plus ou moins infère, avec des placentas pariétaux et pluriovulés. Leur fruit est formé de baies distinctes ou confluentes. Les Aracées n'ont été comparées aux Palmiers qu'en qualité de « spathiflores ». Leur spathe est unique, et leur spadice est simple, épais et continu. Leurs feuilles et leurs fruits n'ont d'ailleurs rien de commun avec ceux des Palmiers.

Parmi les Graminées, les seules Bambusées ont pu être considérées comme les analogues des Palmiers, à cause de leur tige dure et souvent élevée; mais cette tige est un chaume; les feuilles ligulées sont entières; les fleurs ont des glumelles, des glumes et des glumelules caractéristiques, et le fruit est souvent un caryopse. Parmi les Liliacées, les Flagellariées et les Lomandrées se rapprochent, d'après R. BROWN, des Palmiers. Mais les *Flagellaria*, qui rappellent un peu les Rotangs, ont des feuilles simples terminées en vrille; des ovules anatropes et descendants, une drupe à noyau uni- ou biloculaire, et une graine à albumen farineux et à embryon lenticulaire, voisin du hile. Les *Hanguana*, qui ont le port d'un petit palmier dressé, mais à feuilles entières, ont les fleurs, les fruits et les graines des *Flagel-*

laria; mais leur petit fruit est une baie. Les Rapatéacées sont des herbes à feuilles simples; et parmi elles, les *Spathanthus* ont une spathe que l'on peut comparer à celle des Aracées et des Palmiers; mais leurs cymes florales sont portées sur la nervure médiane de cette spathe; leur corolle gamopétale est délicate et plissée; leur fruit réduit à un carpelle est finalement déhiscent, et leur graine a un embryon lenticulaire et apical, analogue à celui des Flagellariées. Dans la pratique, il est, en somme, toujours très facile de distinguer un palmier de quelque autre Monocotylédone ligneuse que ce soit.

La distribution des Palmiers à la surface du globe a été l'objet de nombreuses recherches¹. Ce sont, d'une manière générale, des plantes des régions tropicales et de toutes les parties du monde, abondantes en Amérique, en Asie et en Océanie, plus nombreuses qu'on ne l'avait longtemps cru en Afrique et à Madagascar ou aux autres îles de la côte orientale. Les exceptions les plus frappantes quant à la distribution de ces plantes dans les zones extratropicales sont celles des *Chamærops* et des *Rhopalostylis* qui atteignent le 44° degré de latitude, les uns en Europe, les autres à la Nouvelle-Zélande. Les Dattiers, qui ne mûrissent pas leurs fruits dans le midi de la France, descendent en Afrique jusqu'au 34° degré sud. En Asie, le *Nannorhops Ritchieana* s'élève au nord jusqu'au même degré. Dans l'Amérique du Nord, quelques Sabalées s'avancent jusqu'à 35 et 36 degrés; et la limite méridionale du *Jubæa spectabilis* est, au Chili, le 37° degré. Toutes les Rotangées vraies sont des régions les plus chaudes de l'ancien monde, tandis que les Mauritiées sont américaines et que les Raphiées sont de l'Afrique tropicale, sauf une espèce de *Raphia* qui se retrouve du Nicaragua à l'embouchure de l'Amazone. Toutes les Borassées sont africaines, soit continentales, soit des îles voisines de la côte orientale. Par contre, on ne rencontre qu'en Amérique les Cocoïnées proprement dites, les Bactridées et une couple des trois ou quatre Élæidées connues. Parmi les Coryphées, on observe dans l'Amérique centrale des *Acanthorhiza*, *Copernicia*, *Brahea*, *Thrinax*; et, dans les régions les plus chaudes de l'Amérique du Nord, des

1. R. BR., in *Flind. Voy.*, 577. — MART., *Die geogr. Verhältn. d. Palm.*, in *Münch. gel. Anzeig.*, VI (1838), 627; VIII (1839), 958. — ENDL., *Enchirid.*, 136. — LINDL., *Veg. Kingd.*,

135. — DR., *Dei geogr. Verbreit. d. Palm.*, in *Peterm. geogr. Mitteil.*, XXIV (1878), 15, 94; in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 269-282, 565, 574; *Pflanzenfam.*, 24.

Sabal, *Pritchardia*, *Rhapidophyllum*, *Cryosophila*, *Serenæa*, *Erythæa* et *Thrinax*. D'autres *Pritchardia* sont océaniens, de même que certains *Livistona* et *Licuala*. Mais la plupart des espèces de ces deux derniers genres sont asiatiques. Les *Rhapis* et *Trachycarpus* sont chinois, japonais ou des montagnes de l'Inde. Les *Corypha* appartiennent tous à l'Asie tropicale, comme les *Teysmannia* et plusieurs *Licuala*. Le *Nipa fruticans* s'étend des bouches du Gange à Ceylan, aux Philippines, à la Nouvelle-Guinée et au nord de l'Australie. Les *Colpothrinax* et certains *Thrinax* habitent les Antilles. Enfin, les vrais *Chamærops* sont tous de la région Méditerranéenne, et les Dattiers fructifient bien dans l'Asie et dans l'Afrique tropicales et sous-tropicales. Les *Phytelephas* sont tous péruviens et colombiens. En dehors des Cocoïnées, les palmiers sont bien plus nombreux dans l'ancien monde que dans le nouveau. A celui-ci appartiennent exclusivement les *Euterpe*, *Cenocarpus*, *Jessenia*, *Hyospathe*, *Prestoea*, *Oreodoxa*, *Iriarteia*, *Catoblastus*, *Dictyocaryum*, *Wettinia*, *Ceroxylon*, *Juania*, *Pseudophœnix*, *Synechanthus*, *Reinhardtia*, *Chamædorea*, *Kunthia*, *Nunnezharia*, *Gaussia*, *Geonoma*, *Asterogyne*, *Welfia*, *Calypstrogyne*, *Manicaria* et *Leopoldinia*. Toutes les Euarécées et Ptychospermées sont des tropiques de l'ancien monde, de même que les Iguanurées, les Linospadicées, les Caryotées. A l'Australie et aux îles voisines appartiennent, outre les *Howea* et *Archontophœnix*, des *Kentia*, *Hydriastele*, *Caryota*, *Arenga*, *Cyphokentia*, *Ptychosperma*, *Clinostigma*. Madagascar possède en propre les *Phloga*, *Phlogella*, *Neodypsis*, *Haplophloga*, *Haplodypsis* et *Dypsis*. Maurice et les Seychelles sont la patrie des *Acanthophœnix*, *Deckenia*, *Dyctiosperma*, *Nephrosperma*, *Roscheria*, *Hyophorbe*, *Phœnicophorium* et *Verschaffeltia*. Dans l'Afrique tropicale occidentale croissent les *Sclerosperma* et les *Podococcus*. Les *Cyphokentia* sont néo-calédoniens, de même que les *Kentiopsis* et les *Cyphophœnix*. Toutes les autres Arécées appartiennent aux portions les plus chaudes de l'Océanie et de l'Asie.

USAGES¹. — Cette question si intéressante remplirait des volumes. Nous nous bornerons, bien entendu, à des indications sommaires. Tous les organes de ces belles plantes peuvent être utilisés. Les fruits

1. ENDL., *Enchirid.*, 156. — LINDL., *Veg. Kingd.*, 136. — GUIB., *Drog. simpl.*, éd. 7, II, 126. — ROSENTH., *Syn. pl. diaphor.*, 147, 1091. — DR., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 581; *Pflanzensfam.*, 25. — H. BN, *Tr. Bot. méd. phané.*, 1109.

de plusieurs espèces célèbres servent à l'alimentation. Les dattes, fruits du *Phœnix dactylifera*¹ (fig. 183-189), sont « un des plus riches présents faits à l'homme ». Il y en a beaucoup de variétés, qui, en certaines saisons, forment la base de l'alimentation de plusieurs peuplades africaines et asiatiques. Leur chair est nutritive, stomachique, émolliente, pectorale. Elle sert à préparer des gâteaux, une pâte alimentaire, des sirops, des électuaires. On en retire une sorte de vin, une eau-de-vie, du sucre. La graine ramollie et pilée se donne comme aliment au bétail; et les fleurs mâles elles-mêmes se consomment en Algérie comme analeptiques, aphrodisiaques et proliques. Quelques autres *Phœnix* sont, comme le précédent, utiles par leur bois, leurs feuilles qui servent aux constructions, et par leurs fibres dont on confectionne des tissus grossiers. Les principaux sont le *P. sylvestris*², qui, dans l'Inde, produit un sucre assez estimé; le *P. spinosa* THONN.³, de l'Afrique tropicale occidentale, dont on extrait une sorte de sagou; le *P. reclinata* JACQ.⁴, qui, en Afrique, fournit un fruit alimentaire, une graine substituée parfois au café, un bourgeon terminal comestible, des tiges employées à confectionner des cannes. Dans l'Indo-Chine, le *P. farinifera*⁵ est surtout un arbre à fécule et, par suite, à liqueurs alcooliques. Les Cocotiers sont plus célèbres encore que les Dattiers comme arbres à fruits utiles, attendu qu'ils ont été transportés sur les plages maritimes de presque tous les tropiques⁶. Nous voulons surtout parler du *Cocos nucifera*⁷, que les anciens ont probablement connu, et dont les gros fruits s'appelaient *Noces des Indes* et étaient aussi nommés *Chicorins*. C'est une espèce dont les variétés et les formes sont nombreuses. On emploie son bois à mille usages. On mange son bourgeon terminal, cru ou

1. L., *Spec.*, 1658. — MICHX., in *Journ. Phys.*, LII. — DESF., *Sur la culture et les usages du Palmier-Dattier*, in *Obs. phys.*, XXXIII, 381; *Fl. atl.*, II, 438. — LESS., *Description et propriétés du Palmier-Dattier*, in *Ann. marit.* (1821), 463. — CHARD., *Voy.*, III, 339. — MÉR. et DEL., *Dict. Mat. méd.*, V, 268. — DYBOWSKI, in *Ann. agron.*, XV (1889). — *Fl. méd.*, III, fig. 148, 148 bis.

2. ROXB., *Hort. beng.*, 73; *Fl. ind.*, III, 787. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, t. 136. — BRAND., *For. Fl.*, 554. — BECC., *Males.*, III, 347, 364, t. 43, fig. 3; in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 425. — *Elate sylvestris* L., *Spec.*, 1189 (part.). — KALON-INDAL HAM. GRIFFITH semble douter, à cause des dimensions du fruit, que les planches 22, 25 de RHEEDE (*Hort. malab.*, III) représentent cette espèce.

3. *P. leonensis* LODD.

4. BECC., *Males.*, III, 346, 366.

5. ROXB., *Pl. corom.*, I, 55, t. 74; *Hort. beng.*, 73; *Fl. ind.*, III, 785. — BECC., *Males.*, III, t. 44, fig. 28-37. (*Voy.* p. 291, not. 3.)

6. CH. RÉGNAUD, *Hist. nat., hyg. et écon. du Cocotier* (thès. Fac. méd. Par., 1856), donne (p. 64) un aperçu complet de la Distribution géographique du *Cocos nucifera*.

7. L., *Spec.*, 1118. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 123, t. 62, 75, 88. — K., *Enum.*, III, 285. — ROXB., *Fl. ind.*, III, 614. — BRAND., *For. Fl.*, 556. — KURZ, *For. Fl.*, II, 540. — BL., *Rumphia*, III, 82. — HOOK., *Journ. Bot.* (1870), t. 1. — BECC., in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 481 (*Tingra*, *Narala*, *Nalikerā*, *Kobri*, *Siraphala*, *Nériula*, *Narcol*, *Nior*, *Bahiou*, *Nazi*, *Polyhaha*, *Kaluku*, *Kalupa*, etc.).

cuit, comme chou-palmiste¹. On fait de nombreux tissus avec les fibres de sa gaine foliaire. Sa sève fermentée constitue un des *Toddy*² les plus estimés. De sa tige s'extraît un sucre de Jagre³ d'un prix peu élevé. Son *caire*, c'est-à-dire le brou de sa drupe, sert à fabriquer des cordages. L'endocarpe, gratté et poli, s'emploie à la confection d'une foule d'ustensiles de ménage ou de fantaisie. Alors que son exocarpe est encore vert, son albumen est à l'état d'une crème blanche, sucrée et rafraîchissante. Plus tard, l'amande durcie dans ses couches extérieures est encore un aliment agréable et plus nourrissant. Les couches profondes, encore liquides, constituent l'eau ou le lait de coco, boisson qu'on dit délicieuse quand le fruit est bien frais, et qui passe pour extrêmement saine. En vieillissant, elle rancit et peut fournir une sorte de vinaigre. L'huile ou beurre de Coco se retire aussi des amandes; nouvelle, elle sert aux usages culinaires; mais elle est surtout brûlée pour l'éclairage dans presque tous les pays intertropicaux. Elle sert encore comme médicament et à mille usages domestiques et industriels. Le tourteau s'emploie à l'alimentation des animaux, et les pauvres s'en nourrissent même en temps de disette. Du bois et des feuilles incinérées du *C. nucifera* on peut extraire des sels alcalins en quantité. L'endocarpe est, dans l'Inde, considéré comme un combustible de premier ordre; et, dans les îles de l'Océan Indien, son charbon passe pour valoir la houille pour le travail des forges et des usines. C'est bien aussi, en un mot, « l'arbre béni » qui suffit à tous les besoins de l'homme et « le plus beau présent qu'ait pu lui faire la divinité ». Pour les Indiens de l'Amérique tropicale, le même rôle providentiel appartient à de nombreuses espèces du même genre. Le *C. Yatay* MART.⁴ est recherché, dans les forêts brésiliennes, pour son bois; ses feuilles, textiles quand elles sont adultes, comestibles quand elles sont jeunes et tendres; son fruit alimentaire. Pour cette espèce, comme pour beaucoup d'autres, les migrations d'une peuplade sauvage sont souvent expliquées par ce fait qu'elle abandonne des localités où elle a peu à peu détruit toutes les forêts de *Cocos*. Le *C. coronata* MART.⁵ a une moelle qui peut servir à préparer un pain insipide. Le bois lui-même, réduit en fragments ténus, fournit une pâte alimentaire encore plus particu-

1. Nous verrons que ce nom est donné au gros bourgeon terminal, employé comme légume, d'un grand nombre de palmiers divers.

2. Nom des sèves sucrées et fermentescibles, alcooliques, des palmiers en général.

3. Non commun à tous les sucres de palmiers, d'origine également très diverse.

4. DR., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 421.

5. DR., *loc. cit.*, 417 (*Aricuri, Urcari, Coqueiro cabeçado*).

lière. Les fibres servent à faire des nattes, des cordes et des vêtements. Les feuilles s'emploient à recouvrir les huttes. Les fruits exprimés fournissent une huile qui sert à des usages variés. Le *C. oleracea* MART.¹ se cuit comme légume vert. Le fruit du *C. Datil* MART.² est alimentaire. Le *C. schizophylla* MART.³ a des feuilles qui se tressent en nattes, et des fruits qui passent pour un médicament tonique et astringent. Ceux du *C. capitata* MART.⁴ sont considérés comme un aliment sain. On engraisse le bétail avec ceux du *C. aequatorialis* BARB.-RODR.⁵ Les piliers des cases, les chevrons des toitures et un grand nombre d'outils domestiques, d'armes, d'ustensiles de pêche, sont fabriqués avec le bois, les pétioles du *C. botryophora* MART.⁶ et de bien d'autres espèces⁷ dont les feuilles servent de tuiles, de litières. Dans plusieurs pays de l'Amérique tropicale, l'endocarpe très dur des *Cocos* et d'un certain nombre de palmiers d'autres genres sert à fabriquer des coupes qui peuvent être artistiquement polies ou sculptées, des pièces d'armes et d'ornements, des colliers, des bracelets. C'est souvent dans des récipients en cocotier qu'on conserve les huiles économiques ou la sève sucrée des *Oenocarpus*, *Astrocaryum*, *Acrocomia*, *Elæis*. Les diverses préparations que subit la fécule du Manioc avant d'être bonne à manger s'opèrent souvent dans des récipients d'écorce d'*Atitara*, laquelle a la réputation de résister à l'action destructive de la portion âcre de ces fécules. Dans ces régions, les Européens eux-mêmes ne dédaignent pas les fruits en partie charnus de certains palmiers, tels que le *Cocos nucifera* et le *Bactris speciosa*, assez souvent cultivés dans ce but. La chair des *C. Yatay* et *Datil* peut être mangée; celle des fruits des *Euterpe edulis* et *oleracea* fournit par expression une liqueur agréable, épaisse, acidule. Sur les bords de l'Orénoque, on a dit, non sans raison, que le seul *Mauritia flexuosa*⁸, pour ne prendre qu'un exemple, pouvait

1. DR., loc. cit., 416 (*Quariroba*, *Coqueiro amargoso*).

2. DR., loc. cit., 417 (*Datil*).

3. DR., loc. cit., 422 (*Ariri*, *Alicur*, *Aricuri*).

4. DR., loc. cit., 424 (*Cabeçado*, *Guarirova do campo*).

5. En. Palm. nov., 38. — *C. Inajai* TRAIL, in Trim. Journ. (1877), 79.

6. DR., loc. cit., 408 (*Pati*, *Patioha*).

7. Notamment les *C. campestris* MART. (*Acumio*); *Geriba* BARB.-RODR. — *C. Martiana* DR. et GLAZ. (*Gariba*, *Palmito amargoso*, *Baba de boi*); *Mikaniana* MART. (*Pati*, *Cocos amargoso*, *C. verde*, *Guariroba*); *Syagrus* DR., loc.

cit., 406 (*Jata*, *Jata-uva*, *Piririma*); *acromioides* DR. (*Giraba*, *Giriuva*); *comosa* MART. (*Guariroba do campo*); *Weddellii* DR.; *macrocarpa* BARB.-RODR. — *C. Procopiana* GLAZ. (*Maria Rosa*); *orinocensis* SPR. — DR., loc. cit., 127 (*Corosilo*); *speciosa* BARB.-RODR. (*Pupuntarara*); *pityrophylla* MART. — DR., loc. cit., 428 (*Palma real*); *petraea* MART. — DR., loc. cit., 425 (*Acumara*); *leiospatha* BARB.-RODR. — DR., loc. cit., 425 (*Mocuma*, *Coquinho do campo*, *Coqueiro do campo*), etc.

8. L. F., Suppl., 454. — G.-F.-W. MEY., Prim., Fl. esseq., 283. — MART., Palm. bras., 44, t. 40. — WALL., Palm.-tr. Amaz., 37, t. 2, fig. 2; t. 17. — DR., Fl. bras., III, II, 290,

suffire à fournir aux tribus indiennes tout ce qui est nécessaire à l'existence : des fruits qu'elles peuvent manger frais ou dont elles peuvent extraire une sorte de farine alimentaire ; un liquide sucré ou fermenté retiré du péricarpe ; des feuilles très larges qui servent à couvrir les huttes ; des solives pour les soutenir et qui sont empruntées au stipe ; les pétioles dont on fait des arcs flexibles, et les gaines fibreuses dont on fabrique des cordes, des vêtements, des nattes, des hamacs. L'arbre même tout entier sert aux familles de refuge à l'époque des crues subites des cours d'eau et des marais.

L'huile d'un grand nombre de palmiers est alimentaire ou peut servir à divers usages économiques. Le plus souvent cité est l'arbre à l'huile de palme¹, qui abonde sur la côte occidentale de l'Afrique tropicale et qui se retrouve au Brésil, où il a peut-être été transporté. Sa graine, à téguments très durs, donne une matière grasse, sorte de beurre qui est propre aux usages culinaires, mais qui généralement est, dit-on, consommé sur place par les habitants ; tandis qu'on extrait surtout de la portion charnue et rouge du péricarpe l'huile qui s'obtient par expression et ébullition dans l'eau. Fraîche, elle a une odeur agréable et sert aussi à faire la cuisine. Mais, épaissie avec l'âge et plus ou moins rance, elle sert encore à oindre les membres, à traiter les maladies, aux usages industriels et principalement à la fabrication des savons. Le bourgeon terminal de ce palmier est, comme celui de tant d'autres, comestible, et son bois sert de combustible. Dans l'Amérique tropicale, il y a une autre espèce du même genre, l'*E. melanococca*², qui sert exactement aux mêmes usages et dont le fruit est riche en matière grasse. On cite encore comme

t. 62, fig. 2 ; 63, fig. 1 ; 64, fig. 2 ; 65, fig. 1 ; 67, fig. 2 ; tab. phys., 41. Au Brésil, le *M. armata* MART., *Palm. bras.*, 45, t. 41-43 ; *Palm. Orbign.*, 20, t. 14, 21, a des fruits comestibles et produit des bois de construction (*Ruriti bravo*). Le *M. aculeata* H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, 1, 311. — *M. gracilis* WALL. — *M. linnophylla* BARR.-RODR. (ex DR., *Fl. bras.*, t. 62, fig. 4 ; 63, fig. 2 ; 64, fig. 1) a des fruits qui deviennent agréables quand on les fait macérer dans l'eau (*Ullia do Baré, Cahuaia, Caranai*). Le *M. Martiana* SPRUCE. — *M. aculeata* MART., *Palm. bras.*, t. 39, 44, a de larges feuilles qui servent à couvrir les cases (*Caronás*). Les espèces de la section *Lepidocaryum* ont des usages analogues.

1. *Elæis guineensis* L., *Mantiss.*, 137. — JACQ., *Amer.*, 280, t. 172 ; *ed. pict.*, 136, t. 257. — GÆRTN., *Fruct.*, 1, 17, t. 6. — MART., *Palm.*

bras., 68, t. 54, 56 ; in *Munch. Gell. Anz.*, IX (1839), 379 ; *Palm. Orbign.*, 91. — DR., *Fl. bras.*, III, II, 457, t. 105, fig. 1. — DESCOURT., *Fl. Ant.*, t. 408. — GUIB., *Drog. simpl.*, éd. 7, II, 132. — HANAUSEK, in *Just Jahrb.* (1882), 615 (*Avoira de Guinée, Coco de dente*).

2. GÆRTN., *Fruct.*, I, 18, t. 6. — MART., *Palm. bras.*, 64, t. 33, 55. — KARST., in *Linnaea* (1856), 241. — DR., *Fl. bras.*, III, II, 458, t. 105. — *Alfonsea oleifera* H. B. K. (*Noli, Caiavé*), qui donne de même par son péricarpe et ses graines des huiles très usitées, et dont une laine dite de *Noli*, récoltée dans l'aisselle des feuilles, est employée en médecine. Le fruit fait, dit-on, partie de la *Chicha* des Colombiens. Le *Barcella odora* TRAIL, in *Trim. Journ.* (1877), 81. — DR., *Fl. bras.*, 400, t. 106, est le *Piaçaba brava* des Brésiliens et donne des fibres rudes de qualité secondaire.

palmiers à huile l'*Euterpe oleracea*¹, dont le chou-palmiste est le plus célèbre de tous; plusieurs *Acrocomia*, *Astrocaryum* et *Allagoptera* (*Diplothemium*).

La cire est un des produits les plus intéressants de certains palmiers américains, notamment du *Ceroxylon andicola* H. B.² (fig. 227-229). Dans les Andes du Pérou, cette cire, mélangée d'une sorte de résine, exsude des feuilles et du stipe, principalement au niveau des cicatrices foliaires. On la récolte en grattant ces surfaces; puis on la purifie par fusion: elle sert aux mêmes usages que la cire d'origine animale. Le *Copernicia cerifera*³ est un autre arbre américain qui, au Brésil, donne la cire dite de *Carnauba*⁴. Elle recouvre la surface des feuilles, dont l'épiderme l'a excrétée⁵; on la détache en les secouant fortement. La poudre qui s'en sépare est fondue en une masse jaunâtre, à cassure lisse et non grenue: c'est une cire extrêmement analogue par toutes ses propriétés à celle des abeilles.

La sève sucrée des palmiers est en général fermentescible; on en retire à volonté, suivant les pays, du sucre ou des boissons alcooliques, généralement connues dans l'Inde et les régions voisines sous le nom de *Toddy*. Les sucres reçoivent ceux de *Jagre*, *Jaggery*. On extrait, dans l'Inde, aux Maldives, aux Moluques, une sève sucrée ou *Callou* du *Cocos nucifera*. En lui ajoutant de la chaux, on prévient le développement des acides et la fermentation. La sève étant obtenue de la section du jeune spadice; et, dans un sol favorable, il peut s'en écouler toute l'année, surtout si l'on bat la surface de la spathe avec

1. MART., *Palm. bras.*, 29, t. 28-30. — WALL., *Palm. Amas.*, 23, t. 7. — GRISEB., *Fl. brit. W.-Ind.*, 517. — DR., *Fl. bras.*, III, II, 462, t. 107 (*Palmito*, *Joçara*, *Juissara*, *Pina*). Ses fruits servent à préparer d'excellentes confitures. L'E. *edulis* MART., *Palm. bras.*, 33, t. 32 (*Palmito inal-pullem*, *Cão-sy*) sert aux mêmes usages. L'E. *catunga* WALL., *Palm. Amaz.*, 27, t. 8 (*Assai de catunga*) et sa variété *aurantiaca* ont aussi des fruits à conserves délicieuses. On emploie de même le fruit de l'E. *precatória* MART., *Palm. Orbign.*, 10, t. 8, fig. 12; t. 18, fig. A. — E. *mollissima* SPRUCE? (*Palmito molle*, *Guasai*, *Assai-miri*, *Palm-tr. de Rosario*) dont le chou est bon et qui sert, à Matogrosso, à la fabrication d'une sorte de vin.

2. *Pl. æquin.*, 1, t. 1, 1 b. — H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, I, 307 (*Iriarteia*). — WENDL., in *Bonplandia*, VIII (1860), 69. — DR., in *Gött. Nachricht.* (jan. 1878); in *Bot. Zeit.* (1878), 184; in *Mart. fl. bras.*, III, II, 545. — GUIB., *Drog. simpl.*, éd. 7, II, 134. — H. BN, *Tr. Bot.*

méd. phanér., 1414. Les *Klopstochia*, qui sont congénères, donnent aussi, dans les Andes de Colombie, une cire exploitée. Ce sont les *C. Klopstochia* MART. (*K. cerifera* KARST., *Fl. columb.*, I, 1, t. 1), *utile*, *interruptum* et *quin-diense* KARST. (*Palma de cera*).

3. MART., *Palm. Orbign.*, 41, t. 1, fig. 3, t. 24; *Hist. nat. Palm.*, III, 242. — M.-A. DE MACEDO, *Notice sur le Palmier Carnauba* (1867). — DR., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 547, t. 128; *Pflanzenfam.*, fig. 7, 48, J. — *Corypha cerifera* MART., *Palm. bras.*, 56, t. 49, 50; t. suppl. 50, A; 51, fig. 5.

4. *Caruahyba*, *Caronda*. Les usages de ce palmier sont d'ailleurs multiples. Ses racines sont employées en médecine. Son bois sert à construire des habitations et des navires. Avec ses feuilles on couvre des toitures. Ses fibres servent à faire des cordages. Ses spadices et ses fruits sont alimentaires. Ses feuilles déchiquetées fournissent une sorte de Pitte.

5. H. BN, *Anat. et phys. végét.*, 45, fig. 61.

une baguette; on reçoit le *callou* dans un vase fixé au-dessous de l'inflorescence. Si on le laissait fermenter, on obtiendrait du *toddy*. Mais en l'évaporant en consistance sirupeuse, on coule le liquide dans des endocarpes de Cocotier. Par le refroidissement, il s'y prend en masses ou pains ronds de *jagre*, dont le poids représente environ un cinquième de celui du *callou*. Quand le sucre est bien séché, on l'enveloppe de feuilles et on le livre au commerce. Dans les pays où la sève du Cocotier est de préférence employée à la préparation des liqueurs alcooliques, on tire souvent le *jagre* du Rondier (*Borassus flagellifer*¹) (fig. 201-203). Celui que préparent les indigènes est un sirop épais, jaunâtre et gluant², qui rappelle certaines mélasses. Mais les procédés de fabrication européenne permettent à plusieurs usines établies à la côte de Coromandel et ailleurs, de livrer chaque année au commerce chacune plusieurs milliers de tonneaux d'un sucre de *Borassus* solide, blanc et de belle qualité. On extrait aussi, dans l'Inde française, beaucoup de *jagre* de la sève du Dattier. Ce sucre³ est de qualité supérieure, facile à obtenir et laisse moins de déchet que celui du Rondier. A Travancore et à Ceylan, on fabrique aussi du *jagre*, mais en petite quantité, avec la sève du *Caryota urens* (fig. 217-221), que nous verrons de préférence exploité pour la production de la fécule. A Java, le sucre de palmier le plus estimé est celui du *Nipa fruticans*⁴ (fig. 199, 200). Ce petit palmier donne cependant un *jagre* brun, grasseux et en grande partie incristallisable, qui a un arrière-goût salé : ce qui vient de ce que la plante, vivant dans des criques à eau saumâtre, est souvent inondée par la mer montante. On coupe les bourgeons à fleurs en travers, et l'on adapte au-dessous de la section un vase de terre où s'accumulent souvent en une nuit un ou deux litres de sève sucrée qui rend moitié de son poids de sucre; celui-ci s'obtient par évaporation dans une bassine jusqu'à consistance sirupeuse; le sucre est alors coulé dans des petits paniers et livré tel à la consommation. Le *Saguerus Gomutus*⁵,

1. Voy. p. 257, not. 1.

2. En tamoul, le *Pana'm karkandu*.

3. En tamoul, le *Peris'u vellam*.

4. Voy. p. 257, not. 1.

5. *Borassus Gomutus* LOUR., *Fl. cochinch.*, 759 (1790). — *Arenga saccharifera* LABILL., in *Mém. Inst. Fr.*, IV, 209 (1804). — MART., *Hist. nat. Palm.*, 191, t. 108; 161, fig. 4. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 35. — GRIFF., in *Calc. Journ. Nat. Hist.*, V, 472; *Palms brit. Ind.*, 164, t. 135, A. — KURZ, *For. Fl.*, II, 534. — BECC.,

in Hook. f. *Fl. brit. Ind.*, VI, 421. — H. BN, *Tr. Bot. méd. phanér.*, 1413. — A. Griffithii SEEM. — WENDL. F., in *Kerch. Palm.*, 232. — *Gomutus saccharifer* SPRENG., *Syst.*, II, 622. — *Saguerus Rumphii* ROXB., *Fl. ind.*, III, 626. — *S. pinnatus saccharifer* WURMB. (1779), ex *Verh. Bat. Gen.*, I, 350 (nom. haud specif.). — *S. saccharifer* BL., *Rumphia*, II, 128, t. 123, 124 (*Ejow, Ejuh*). Le *S. obtusifolius* — *Arenga obtusifolia* MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 191, t. 147, 148, 161. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III,

Les *Raphia* sont, dans les deux mondes, des arbres dont les usages sont aussi multiples que ceux des Cocotiers. A Madagascar, le *R. Ruffia*¹ (fig. 209, 210) est peu usité comme bois de construction. De ses feuilles on fait des tissus, des vêtements, des cordages, des nattes. Sa graine est employée comme médicament, et son péricarpe écailleux donne un charbon utile. Le *R. vinifera*² est exploité dans l'Afrique tropicale occidentale pour la production de boissons sucrées et alcooliques³. C'est une forme de la même espèce qui, dans l'Amérique du Sud, sous les noms de *R. tædigera*⁴ et de *R. nicaraguensis*⁵, sert à faire des charpentes et des toitures de hutte, tirées de son bois et de son feuillage. Les pétioles épais et résistants, séchés, puis fendus, s'emploient à de nombreux usages domestiques et industriels. Le *Mauritia vinifera*⁶ joue, au Brésil, à peu près le même rôle économique que les Sagoutiers dans la Malaisie. Sa sève fermentée constitue une sorte de vin. La portion charnue de son fruit s'emploie à la préparation d'un aliment qu'on dit fort agréable, et les fibres de ses fruits sont utilisées dans un grand nombre de cas divers.

Les palmiers peuvent contenir des sucres astringents, dont le plus anciennement célèbre est celui des Rotangs, désigné sous le nom de *Sang-dragon* de palmier⁷. Sous la zone dure et écailleuse qui enveloppe le fruit du *Rotang Draco*⁸ se trouve une couche charnue qui n'a pas grande épaisseur et est imprégnée de cette substance résinoïde rouge. Celle-ci peut même passer en dehors des squames; et

1. MART., *Hist. nat. Palm.*, 217. — K., *Enum.*, III, 217. — JOHNST., *Dendr.* (1768), I, 160. — H. BN, *Tr. Bot. méd. phanér.*, fig. 3445 (sph. *Metroxylon*). — *R. lyciosa* COMMERS. — *R. polymitra* COMMERS. (ex MART.). — *R. pedunculata* PAL.-BEAUV., in *Journ. Bot.*, II, 87; *Fl. owar. et ben.*, I, t. 44, fig. 2; 46, fig. 2. — *Sagus Ruffia* JACQ., *Fragm.*, 7, t. 4, fig. 2. — *S. farinifera* GÆRTN., *Fruct.*, II, t. 120, fig. 3. — TURP., in *Dict. sc. nat.*, All., t. 159, 160. — *S. pedunculatus* POIR., *Dict.*, V, 524. — *S. pedunculata* POIR., *Suppl.*, IV, 13; *Ill.*, t. 771, fig. 2. — *S. Poilei* MÉR. et DEL., *Dict. Mat. méd.*, VI, 159. — *Metroxylon Ruffia* SPRENG., *Syst.*, II, 139. — *Rafia* BORY, *Voy.*, I, 178. — *Canna textoria* DUP.-TH., *Prodr. phyt.*, 2.

2. PAL.-BEAUV., *Fl. owar. et ben.*, I, 75, t. 44-46. — DR., in *Bot. Zeit.* (1876), 804; *Fl. bras.*, III, II, 287, t. 61, fig. 1; 62, fig. 1, B-D (*Jubati, Jupati*).

3. On les nomme *Bourdon*. Le fruit, dépouillé de ses écailles et fermenté, donne aussi une sorte de piquette à saveur butyreuse.

4. MART., *Palm. bras.*, 54, t. 45-48; *Hist. nat. Palm.*, III, 246. — WALL., *Palm.-tr. Amas.*, 43, t. 2, fig. 1; 16.

5. ØERST., *Palm. centr.-amer.*, in *Nat. For. Vid. Medd. Kjob.* (1858).

6. MART., *Palm. bras.*, 42, t. 38, 39; *Palm. Orbign.*, 20, t. 13, 21. — DR., *Fl. bras.*, III, II, 391 (*Buruiti, Borti, Bruti, Palma real, Carandai, Guaza, Guary*).

7. Pour les distinguer de ceux des *Draco* et des *Pterocarpus*.

8. *Palmijuncus Draco* RUMPH., *Herb. amboin.*, V, 114, t. 58, 116. — O. K., *Revis.*, 732. — *P. accedens* O. K. — *Calamus Draco* W., *Spec.*, II, 203. — PLENCK, *Pl. off.*, t. 276. — NEES, *Pl. off.*, 17, t. 3, 4. — HAYN., *Arzngew.*, 10, t. 3. — ROXB., *Fl. ind.*, III, 774. — MART., *Palm.*, t. 116, fig. 9. — K., *Enum.*, III, 210. — HANB. et FLUCK., *Pharmacogr.*, 609. — H. BN, *Tr. Bot. méd. phanér.*, 1413. — *C. Rotang*, var. β L. — *Dæmonorops Draco* MART. — *Dsjerenang* KENPF., *Amæn. exot.*, 552 (*Rotang-jernang, Battan-palm*).

au temps de RUMPHIUS, on l'obtenait en secouant les fruits dans un sac de toile rude. Ses mailles donnaient passage au médicament qui, fondu à une douce chaleur, se pétrissait en sphérules qu'on enveloppait de feuilles de palmier. Un produit de qualité inférieure est encore obtenu par l'ébullition des péricarpes concassés dans l'eau que surmonte bientôt une couche de la résine, rassemblée alors en tablettes. Ailleurs, le Sang-dragon est en pains ou en galettes, ou encore, comme en Annam, coulé dans des tiges de bambou. C'est non seulement un remède, mais un produit industriel, employé comme matière colorante et pour la fabrication des vernis. Dans les Aréquiers, c'est la graine¹ qui renferme le suc astringent, comme il arrive surtout dans celle de l'*Areca Catechu*² (fig. 212-216), bel arbre des localités humides de l'Asie et de l'Océanie tropicales, et qu'on croit d'origine malaise. Les populations asiatiques tiennent en grande estime cette semence comme masticatoire; ils l'ajoutent aux gommés pour leur donner de la force; ils l'emploient pour adoucir la gorge et favoriser la digestion. C'est aussi un vermifuge énergique³. On fabrique des poudres dentifrices avec l'albumen carbonisé. Un certain nombre des propriétés qu'on attribue à cette graine jeune employée comme masticatoire, doivent sans doute être rapportées aux feuilles du Bétel, à la chaux, au camphre ou aux Cardamomes qu'on leur adjoint. Quoique l'opinion que l'on extrait du Cachou de la graine ait été contestée, il est encore admis par bien des auteurs qu'elle en fournit deux sortes : le *Cuttacumbou*, qui est consommé dans l'Inde même comme masticatoire, et le *Cashculti*, qui s'importe surtout en Europe pour les usages médicaux. Le bourgeon terminal de cet arbre se mange aussi comme chou-palmiste. Son écorce fibreuse sert à faire des cordages et des toiles grossières d'emballage.

Nous passerons maintenant en revue, d'une façon sommaire, les

1. Noix d'Arec, de Bétel, Fôfal, Pin-lang.

2. L., *Spec.*, ed. 1, 1189. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 169, t. 102. — K., *Enum.*, III, 184. — ROXB., *Pl. corom.*, I, t. 75; *Fl. ind.*, III, 615. — BL., *Rumphia*, III, 65, t. 102, A; 104. — GRIFF., in *Calc. Journ. Nat. Hist.*, V, 153; *Palms brit. Ind.*, 47. — MIO., *Fl. ind. bat.*, III, 8. — KURZ., *For. Fl.*, II, 536. — GAMBL., *Man. ind. timb.*, 421. — SCHEFF., *Arec.*, 9; in *Ann. Jard. Buitenz.*, I, 144, t. 1, V; 3, fig. 2. — GUIB., *Drog. simpl.*, éd. 7, II, 130, fig. 347. — HAYN., *Arsneigew.*, VII, t. 35. — BENTL. et TRIM., *Med. pl.*, n. 276. — H. BN., in *Dict. enc. sc. méd.*, sér. 1, VI, 40;

Tr. Bot. méd. phanér., fig. 3446, 3447; 3454 (sphalm. *Elæis*). — HANB. et FLUCK., *Pharmacogr.*, 607. — BECC., in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 405. — TH. OSENBURG, *Inaug. Diss. A. Catechu* (Marburg, 1894). — A. *hortensis* LOUR., *Fl. cochinch.*, 568. — A. *Fausel* GERTN., *Fruct.*, I, 19, t. 7, fig. 2 (*Betel-nut-Palm*, *Goovaka*, *Pissanga*).

3. Cette graine ne renfermerait pas, paraît-il, de Catéchine (FLUCK.), mais un principe astringent mal déterminé, assez analogue au rouge de Ratanhia et de Quinquina. Sur ses divers alcaloïdes: *Amer. Journ. Pharm.* (1889), 133; *Nouv. Rem.* (1889), 184.

principaux usages d'importance secondaire qui sont relatifs à un grand nombre d'espèces de cette famille. Le *Chamærops humilis*¹ (fig. 175-182) a des jeunes pousses comestibles qui se vendent, dit-on, en Sardaigne², surtout dans les temps de disette. On emploie ses fruits, dans le nord de l'Afrique, à l'alimentation de l'homme et surtout des porcs. On fait des brosses avec les racines. Les feuilles servent à confectionner des paniers, des nattes, des balais, des cordages ; on en use comme litière. Outre leurs fruits comestibles, les *Phœnix* fournissent aussi des fibres textiles et des bois de construction et de foyers. On chauffe les fours avec les vieilles feuilles. Intactes, celles-ci sont l'objet d'un grand commerce, parfois dorées ou argentées, pour l'ornementation des maisons et des temples. Sèches, elles servent à fabriquer des tapis, des chapeaux et une foule d'ustensiles. La bourre qui occupe leur base est surtout utilisée par les Arabes. Très jeunes, elles sont comestibles, notamment en salade. En Égypte, on fait un bon vinaigre avec les péricarpes fermentés ; et en Espagne, une poudre dentifrice et une sorte d'encre de Chine avec le charbon des graines torréfiées. La sève sucrée obtenue par incision de la base du bourgeon terminal est aigrette, fermentescible et d'une saveur plus ou moins agréable ; c'est le *Laybi* des Arabes³. Les *Trachycarpus*, dont les fruits ne sont pas comestibles, ne sont utilisés que pour leur bois, leurs feuilles et leur bourre ; ils servent à la fabrication de cordages, de nattes, de chapeaux ; notamment les *T. excelsa* WENDL. F.⁴ et *Fortunei* WENDL. F.⁵, vulgairement nommés dans nos jardins Chanvres

1. L., *H. Cliff.*, 482 ; *Spec.*, 1637. — LAMK., *Dict.*, IV, 714. — LAMB., in *Linn. Trans.*, X, t. 8. — VIV., *Fl. lyb.*, 62. — NEES, *Gen. Fl. germ.*, *Monoc.*, 10, t. 2, 3. — MART., *Palm.*, 248, t. 120 ; 124, fig. 2-5 ; t. 16, fig. 4. — K., *Enum.*, III, 248. — *Phœnix humilis* CAV., *lc.*, II, 12, t. 115. — *Chamæripes major* GÆRTN. — *C. minor* GÆRTN., *Frukt.*, I, 26, t. 9, fig. 4 (*Palmier nain*, *P. des Deux-Siciles*, *P. éventail*, *Palmetto*).

2. *Margalions velus* (VALER., *Voy. en Corse*, II, 353).

3. Sur le Dattier, voy. surtout le très intéressant fascicule IV des *Amœnitates exotice* de KENPFER : *De Palma dactylifera in Perside crescente* (659, t. 1-3). — DYBOWSKI, in *Ann. agron.*, XV, n. 10. Le nombre des variétés du *P. dactylifera*, surtout quant à la forme et aux qualités du fruit, est considérable. Le prétendu genre *Microphœnix* NDN, « hybride de *P. dactylifera* et de *Chamærops humilis* »,

a des fruits assez longs, sucrés, mais peu charnus. On dit que cet hybride a lui-même été fécondé par le *Trachycarpus*. Ce qui a été dit des usages des organes végétatifs du *P. dactylifera* s'applique plus ou moins aux *P. reclinata* JACQ., *sylvestris* ROXB., *paludosa* ROXB., *farinifera* ROXB., *pusilla* GÆRTN., *spinosa* THONN. (*Fulchironia senegalensis* LESC., in *Desf. Cat. pl. Mus. par.* (1829), 29). Sur la structure des fruits de Dattier, *Journ. N. York M. Soc.*, VIII, 107, t. 37. On a falsifié le café avec des graines torréfiées de Dattier.

4. *Chamærops excelsa* THUNB., *Fl. jap.*, 130 (part.). — SMITH, in *Rees Cyclop.*, n. 2. — MART., *Palm.*, 251, t. 125, fig. 2, 3. — K., *Enum.*, III, 250. — MIQ., *Prol.*, 329. — CARR., in *Rev. hort.* (1877), 233. — BECC., in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 436. — KEMPF., *Amœn. exot.*, 898.

5. *Chamærops Fortunei* HOOK., *Bot. Mag.*, t. 5221 (*Chusan Palm*) (var.? du précédent).

de Chine ou du Japon et les *T. Martiana* WENDL. F.¹ et *Khasyana* WENDL. F.², de l'Inde. Les *Livistona* sont souvent cultivés dans nos serres sous le nom erroné de *Latania*. Au Népal, le *L. Jenkinsiana*³ sert à faire des nattes, des chapeaux, des toitures. Les feuilles du *L. Saribus*⁴, espèce cochinchinoise, servent aux mêmes usages que celles du précédent; on en fait aussi des éventails et des parasols. Son fruit s'emploie, avec la saumure ou le vinaigre, à la préparation d'un aliment assez agréable. Le *L. australis*⁵ (fig. 190-192) donne un chou-palmiste. Le *L. rotundifolia*⁶ est recherché pour son bois et ses feuilles. Celles-ci servent à envelopper le tabac, à fabriquer des écrans et des stores. Le *L. Diepenhorstii* HASSK., de Sumatra, a un fruit dur et un albumen résistant avec lesquels on fabrique des objets artistiques. En Perse et dans les montagnes de l'Inde, on réduit en poudre les folioles desséchées du *Nannorhops Ritchiana* WENDL. F.⁷ pour traiter les coliques et diverses affections abdominales. Avec les fibres on fabrique des sandales qui s'exportent dans diverses régions de l'Asie. Il y a tout intérêt à introduire cet arbre dans notre colonie algérienne. En Géorgie, on mange le fruit du *Rhapidophyllum Hystrix*⁸; on dit qu'il se substitue aux pailles des *Carludovica* de Panama. Les Indiens du Brésil emploient à un grand nombre d'usages domestiques l'*Acanthorrhiza Chuco*⁹. En Chine et au Japon, on fait des cannes qui s'importent en Europe¹⁰, avec les petits palmiers souvent cultivés comme ornementaux du genre *Rhapis*, tels que le *R. flabelliformis*¹¹ (fig. 193); le *R. cochin-*

1. In Bull. Soc. bot. Fr. (1861), 429. — BECC., in Hook. f. Fl. brit. Ind., VI, 436. — *Chamærops Marliana* WALL. — MART., in Wall. Pl. as. rar., III, t. 211.

2. GRIFF., in Calc. Journ. Nat. Hist., V, 341; *Palms brit. Ind.*, t. 227, A-C. — BRAND., *For. Fl.*, II, 526. — KURZ, *For. Fl.*, II, 526. — GAMBL., *Man. ind. timb.*, 418 (var. ? du précédent).

3. GRIFF., in Calc. Journ. Nat. Hist., V, 334; *Palms brit. Ind.*, t. 226, A, B. — BECC., in Hook. f. Fl. brit. Ind., VI, 435 (*Tako-pat*). Les chapeaux se nomment *Ihapees*.

4. *L. cochinchinensis* MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 242. — BECC., in Hook. f. Fl. brit. Ind., VI, 434. — *L. spectabilis* GRIFF., in Calc. Journ. Nat. Hist., V, 336; *Palms brit. Ind.*, t. 226, C. — *Corypha Saribus* LOUR., *Fl. cochinch.*, 212. — *Saribus cochinchinensis* BL., *Rumphia*, II, 49 (*Gây-ilo*).

5. MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 241. — K. Enum., III, 242. — WENDL. F. et DR., in Lin-

na, XXXIX, 232. — BENTH., *Fl. austral.*, VII, 147. — *L. inermis* WENDL. F. et DR., loc. cit., 229. — *Corypha australis* R. BR., *Prodr.*, 267.

6. MART., *Hist. nat. Palm.*, III, t. 135, fig. 5. — K., *Enum.*, III, 241. — *Corypha rotundifolia* LAMK. — MART., loc. cit., t. 102.

7. Voy. p. 310, not. 6.

8. WENDL. F. et DR. — *Chamærops Hystrix* FRAS., in Pursh *Fl. Am. sept.*, I, 240. — CHAPM., *Fl. S. Un.-St.*, 439. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 250, t. 125, fig. 4. — K., *Enum.*, III, 249 (*Palma de escoba*).

9. DR., in Mart. *Fl. bras.*, III, II, 554. — *Thrinax? Chuco* MART., *Palm. Orbign.*, 45, t. 8, fig. 1; t. 25, fig. B (*Chuco*).

10. *Ground Rattons*, en Angleterre.

11. AIT., *H. kew.*, ed. I, 3, 473. — JACQ. *H. schœnbr.*, III, t. 316. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 253, t. 144. — K., *Enum.*, III, 251. — *Bot. Mag.*, t. 1371. — *Chamærops excelsa* THUNB. (part.). — *Nunnezhazia* (sph.) H. BR., *Dict. Bot.*, II, 438, fig. (*Surotsiku, Taw-koog*)

*chinensis*¹, dont on utilise le bois et les feuilles; les *R. major* BL. et *humilis* BL. Le *Corypha umbraculifera*² a un fruit alimentaire; et des incisions pratiquées à la base de ses spathes découle un liquide qui s'épaissit au soleil, mais qui n'est pas une boisson agréable : c'est plutôt un vomitif et, au dire des négresses indiennes, un abortif. Les graines dures servent à faire des colliers et des bracelets qui, teints en rouge, imitent bien le corail. Le bois sert aux constructions; on en fait des clôtures. Avec les feuilles on recouvre les huttes; elles constituent des éventails gracieux qu'on orne souvent de peintures. On en forme des livres sur les pages desquels on pique les caractères avec un petit stylet de fer. La bourre de la gaine sert à fabriquer des chapeaux et des vêtements. Le *C. Talliera*³ a, comme l'espèce précédente, une sorte de sagou dans le parenchyme de sa tige. Aux îles Andaman, le *C. macropoda* KURZ⁴; au Bengale, le *C. elata* ROXB.; à Java et aux Moluques, les *C. Gebangu* BL.⁵ et *sylvestris* BL.⁶ ont absolument la même utilité que le *C. umbraculifera*. La racine du *C. sylvestris* est usitée comme astringente. Aux Antilles, le *Sabal umbraculifera*⁷ (fig. 198) a des feuilles qui servent à contrefaire les pailles de Panama et dont on fabrique des chapeaux d'un prix peu élevé. Le tronc de cette espèce est dur à la périphérie, rempli à l'intérieur d'une sorte de pulpe qui s'extraît facilement; c'est ainsi qu'on en peut faire des conduites pour les eaux. Le *S. Palmetto*⁸, de l'Amérique du Nord, a des tiges assez résistantes pour servir à la con-

1. MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 254. — K., *Enum.*, III, 252. — *Chamærops cochinchinensis* LOUR., *Fl. cochinch.*, 808.

2. L., *Spec.*, 1657 (part.). — GÆRTN., *Fruct.*, I, 18, t. 17. — LAMK., *Dict.*, II, 130; III, t. 899. — BUCH., *Decad.*, I, t. 8. — K., *Enum.*, III, 236. — ROXB., *Fl. ind.*, II, 177. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 232, t. 108, 127 (part.). — GRIFF., in *Calc. Journ. Nat. Hist.*, V, 319; *Palms brit. Ind.*, 116. — THW., *En. pl. Zeyl.*, 329. — DALZ., *Bomb. Fl.*, Suppl., 94. — KURZ., *For. Fl.*, II, 525. — BRAND., *For. Fl.*, 549. — BECC., in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 428. — *Codda-panna* REED., *Hort. malab.*, III, 1, t. 1-12.

3. ROXB., *Pl. corom.*, III, 251, t. 255, 256 *Fl. ind.*, II, 174. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 231. — K., *Enum.*, III, 236. — GRIFF., in *Calc. Journ. Nat. Hist.*, V, 317; *Palms brit. Ind.*, 114, t. 220, E, F. — BECC., in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 428. — *Talliera bengalensis* SPRENG. — *T. Tali* MART., in *Ræm. et Sch. Syst.*, VII, 1306 (*Tali*).

4. in *Journ. As. Soc. beng.*, XLIII, II, 197,

t. 15; *For. Fl.*, III, 525. — BECC., in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 429.

5. MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 233. — K., *Enum.*, III, 237. — *Taliera Gembanga* RÆM. et SCH., *Syst.*, V, 1307. — *Gembanga rotundifolia* BL. — *Cabang* RUMPH., *Herb. amboin.*, I, 55 (ex K.).

6. MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 233. — K., *Enum.*, III, 237. — *C. Utan* LAMK., *Dict.*, II, 131. — *Lontarus sylvestris* RUMPH., *Herb. amboin.*, I, 53, t. 11. — BUCH., *Dec.*, X, t. 4. — *L. Utan* RUMPH., *loc. cit.*, 56. — *Gembanga sylvestris* BL. — *Taliera sylvestris* BL.

7. MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 245, t. 130; t. T, fig. 5; Z, fig. 1. — K., *Enum.*, III, 245. — *Corypha umbraculifera* JACQ., *Fragm.*, 7, n. 47 (non L.). — *Sabal Blackburniana* KIRKL. — RÆM. et SCH., *Syst.*, III, 245 (ex K.).

8. LODD., in *Ræm. et Sch. Syst.*, VI, 1487. — K., *Enum.*, III, 247. — *Corypha Palmetto* WALT., *Fl. carol.*, 119. — *Chamærops Palmetto* MICHX., *Fl. bor.-amer.*, I, 206; *Arbr.*, t. 10. — PURSH., *Fl. Am. sept.*, t. 240. — NUTT., *Gen. amer.*, I, 231 (*Palmetto*).

struction de quais, de radéaux, de navires, et, comme on l'a vu, dit-on, pendant la guerre de l'Indépendance, à celle des forteresses. Les feuilles s'emploient à couvrir les huttes. Le *S. Adansonii*¹ (fig. 194-197), des mêmes régions, passe pour avoir une moelle comestible. Ses fruits le sont à peine, quoi qu'on en dise. Le *Teysmannia altifrons*², de la Malaisie et de Sumatra, est employé aussi à couvrir les cases. On mange son fruit, qui est de la grosseur d'un œuf de pigeon. Dans l'Amérique du Nord, le *Serenæa serrulata*³ a des fruits charnus dont on extrait une huile médicinale, préconisée contre les névralgies; avec ses folioles on fabrique des brosses et un solide papier d'emballage. Les feuilles du *Brahea dulcis*⁴ servent de litière et de couverture pour les toitures. On le cultive comme plante d'ornement, de même que le *B. calcarea* LIEBM. et aussi que l'*Erythea edulis* et l'*E. armata*⁵. Les fruits du premier sont comestibles. Les *Thrinax parviflora* Sw., *multiflora* MART. et *argentea* LODD.⁶ servent aux mêmes usages que les *Brahea*. C'est avec la paille de la dernière de ces trois espèces que se fabriquent les chapeaux dits *Chip-hats*. En Colombie, les habitations indiennes sont souvent recouvertes des feuilles du *Trithrinax mauritiæformis* KARST.; et il en est de même de celles du *Copernicia cerifera*⁷, dont le bois sert aux constructions, dont la racine est médicamenteuse, substituée aux salsepareilles; dont les fibres sont employées à faire des cordages, et dont le spadice et le fruit sont des aliments estimés. La plante fournit aussi une sorte de liège. Le *Licuala acutifida*⁸ a des pétioles rigides et qui prennent un beau poli; on en fait des cannes dites *Penang-layers*. Avec les feuilles du *L. spinosa*⁹ et du *L. Rumphii* BL., on enveloppe le tabac à

1. GUERS., in *Bull. Soc. philom.*, n. 67, t. 25. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 246, t. 103, fig. 2; t. Y, fig. 4. — K., *Enum.*, III, 246. — *Bot. Mag.*, t. 1434. — *Corypha minor* MURR. — *Chamærops glabra* MILL. — *C. acaulis* MICHX. — *Rhapis acaulis* W.

2. REICHB. F. et ZOLL., in *Linnaea*, XXVIII, 657. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 749. — BECC., in *Fl. brit. Ind.*, VI, 483. — RIDL., in *Trans. Linn. Soc.*, ser. II, Bot., III, 392 (*Daun Payoh*).

3. VOY. p. 315, not. 2 (*Palmier-scie*).

4. MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 244, t. 137, 162. — K., *Enum.*, III, 245. — *Corypha dulcis* H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, I, 300.

5. S.-WATS., in *Proc. Amer. Acad.*, XI, 120, 146; *Bot. Calif.*, II, 211, 485.

6. H. par., in *Desf. Cat.*, ed. III, 31. — K., *Enum.*, III, 253. — *Palma argentea* JACQ., *Fragm.*, 38, t. 43, fig. 1. Les *T. pumilio*, *radiata* et *barbadensis* LODD., souvent confondus

avec cette espèce dans les jardins botaniques où plusieurs sont quelquefois cultivées, peuvent servir également aux mêmes usages.

7. VOY. p. 288, not. 3.

8. MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 236, t. 135, fig. 3, 4. — GRIFF., in *Calc. Journ. Nat. Hist.*, V, 327; *Palms brit. Ind.*, 122, t. 222, A, B. — BECC., in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 433 (*Plassitikoos*).

9. WURMB., in *Verh. Bot. Gen.*, II, 469. — ROXB., *Fl. ind.*, II, 181 (part.). — GRIFF., in *Calc. Journ. Nat. Hist.*, V, 321. — BL., *Rumphia*, II, t. 82, 88. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 235, 318, t. 135. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 53; *Suppl.*, 254. — BECC., *Males.*, III, 74; in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 431. — *L. rammosa* BL., in *Ræm. et Sch. Syst.*, VII, 1303. — *L. horrida* BL., *Rumphia*, II, 41, t. 89, fig. 1. — *L. paludosa* KURZ., in *Journ. As. Soc. beng.*, XLIII, 528; *For. Fl.*, II, 528.

fumer. On mange les fruits du *L. peltata*¹, dont les feuilles servent de toiture. Celles du *L. Bissula* MIQ., des Célèbes, s'emploient à la confection de tissus grossiers. Le *Nipa fruticans*² n'est pas seulement un palmier à vin et à sucre. Ses jeunes fibres se mangent et se confisent au sirop. Ses jeunes feuilles servent aussi à envelopper les cigares. Le bois est utilisé pour les constructions. Le péricarpe grillé donne un bon charbon de palmier. Le Cocotier des Seychelles³ a toutes les propriétés générales du Rondier, dont il est si voisin par son organisation. Ses gros fruits bilobés⁴ ont été longtemps un objet de curiosité : ils étaient portés par la mer à d'assez grandes distances, sans qu'on connût leur véritable patrie. Ils passaient pour résister à l'action de tous les venins et servaient à faire des vases incassables⁵. L'albumen est comestible, mais médiocre, de même que l'huile qu'on en extrait, et astringent; ce qui l'a fait vanter comme antidysentérique. Les feuilles énormes servent à de nombreux usages domestiques, remarquables surtout par l'élégance des paniers et autres ouvrages délicats de vannerie fine qu'on confectionne avec leurs lanières étroites. Jeunes, elles servent à faire des chapeaux souples et légers. De leurs côtes, on fabrique des balais, et du duvet qui couvre leur base, des matelas. Les *Chamæriphes* sont presque tous des arbres utiles, plus connus sous le nom d'*Hyphæne* ou de *Doums*. Le *C. thebaica* O. K.⁶, de l'Afrique tropicale orientale, remarquable par la fréquente ramification de son stipe, bien connu, croit-on, des anciens, a des fruits peu sapides, à odeur de pain d'épice, dont on mange le sarcocarpe spongieux. C'est aussi un médicament : infusé dans l'eau avec des dattes, il se donne aux fébricitants. Les *C. coriacea*⁷, *guineensis*⁸, *turbinata*⁹, *ventricosa* O. K.¹⁰

1. ROXB., *Fl. ind.*, II, 179. — HAM., in *Mem. Werner. Soc.*, V, 313. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 234, t. 162. — K., *Enum.*, III, 238. — BECC., in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 430. — *Gardn. Chron.* (1872), fig. 350 (*Chattah-patte*).

2. Voy. p. 321, not. 5.

3. Voy. p. 323, not. 2.

4. *Coco des Maldives, Coco de mer, Cul-de-nègresse*.

5. *Vaisselle de l'Isle Praslin*.

6. *H. thebaica* K., *Enum.*, III, 227 (part.). — A. RICH., *Fl. abyss.*, 349. — BOISS., *Fl. or.*, V, 46. — *Fl. serres*, t. 2152, 2153. — *H. crinita* GÆRTN., *Fruct.*, II, 13, t. 82, fig. 4. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 226, t. 131-133. — *H. cucifera* PERS., *Syn.*, II, 623. — *Corypha thebaica* L., *Spec.*, 1657. — *Douma thebaica* POIR.,

Suppl., II, 519. — LAMK., *Ill.*, t. 900. — TURP., in *Dict. sc. nat.*, Atl., t. 157, 158. — *Cucifera thebaica* DEL., *Fl. ægypt.*, I, 57 (1824), in *Descr. Eg.*, XIX, 20, 117, t. 1, 2. — DOME POC., *Reis. or.*, I, 281, t. 73 (*Palmier de la Thébaïde, P. pain-d'épice*).

7. *Hyphæne coriacea* GÆRTN., *Fruct.*, I, 28, t. 10, fig. 2. — R. BR., in *Tuck. Cong. App.*, 457. — K., *Enum.*, III, 227. — ? *Corypha africana* LOUR., *Fl. cochinch.*, 264.

8. *Hyphæne guineensis* THONN. et SCHUM., in *Dansk. Vid. naturv. Afhand.*, IV (1829); in *Bull. univ. sc. nat.*, XXIV, 330. — ? JOHNST. (H.), *Riv. Cong.*, 10.

9. *Hyphæne turbinata* WENDL. F.

10. *Hyphæne ventricosa* KIRK. — JOHNST. (H.), *loc. cit.*, 195.

ont, dit-on, des propriétés analogues. Plusieurs d'entre eux donnent par incision une sorte de vin de palme et ont un bourgeon terminal comestible. Le véritable Latanier¹, des Mascareignes, est aussi un arbre des plus utiles par son bois; par ses feuilles qui servent à une foule d'usages domestiques; par son fruit, dont la chair est astringente et sert à préparer des émulsions antiscorbutiques; par ses graines, dont l'albumen est amer et purgatif; par sa sève, qui est également antiscorbutique et se transforme facilement en vinaigre. Dans la Malaisie, le *Pholidocarpus Ihur* BL. est aussi recherché pour les nombreux emplois de ses feuilles dont on fait des nattes et des tissus; de son bois, appliqué aux constructions; de sa moelle, dont on extrait une fécule alimentaire; de son fruit et de son albumen, qui sont comestibles; de sa sève, qui sert à préparer divers mets de poissons et de crustacés; de sa racine, qui est médicinale, astringente.

La plupart des Rotangs sont utiles. On confectionne avec leurs tiges fendues des sièges dits « cannés »; et l'on se sert de ces tiges comme cannes, principalement de celles des *R. Linnæi*², *verus*³, *niger*⁴, *micracanthus*⁵, *latispinus*⁶, *rudentum*⁷, *Royleanus*⁸, *petræus*⁹, *equestris*¹⁰, *rhomboideus*¹¹, *viminalis*¹², *scipionum*¹³, *heteroideus*¹⁴, *ornatus*¹⁵, *spectabilis*¹⁶, *Manan*¹⁷, *Blancoi*¹⁸, *albus*¹⁹, *gramino-*

1. *Lalania Commersonii* MART.

2. *Calamus Rotang* L., *Spec.*, 463. — W., *Spec.*, II, 202. — K., *Enum.*, III, 207, n. 12 (excl. syn. plerisq.).

3. *Calamus verus* LOUR., *Fl. cochinch.*, 261 (non W.). — SPRENG., *Syst.*, II, 17. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 209. — K., *Enum.*, III, 208, n. 15. — ? *Palmijuncus verus latifolius* RUMPH.

4. RUMPH., *Herb. amboin.*, V, 101, t. 52. — *Palmijuncus niger* RUMPH. — *Dæmonorops melanochætis* BL., in *Rœm. et Schult. Syst.*, VII, 1333. — K., *Enum.*, III, 202. — ? *Calamus niger* W. — *C. Rotang* β L., *Spec.*, 463.

5. *Calamus micracanthus* GRIFF., *Palms brit. Ind.*, 72. — *Dæmonorops micracanthus* BECC., in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 467.

6. *Calamus latispinus* HOST (ROSENTH., *Syn. pl. diaphor.*, 151).

7. *Calamus rudentum* LOUR., *Fl. cochinch.*, 260. — LAMK., *Dict.*, VI, 304. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 211. — K., *Enum.*, III, 210.

8. *Calamus Royleanus* GRIFF. (ROSENTH.).

9. *Calamus petræus* LOUR., *Fl. cochinch.*, 260. — SPRENG., *Syst.*, II, 17 (part.). — K., *Enum.*, III, 206, n. 8.

10. *Calamus equestris* W., *Spec.*, II, 204. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 203, t. 113, 128. — K., *Enum.*, III, 204, n. 1. — *Palmijuncus*

equestris RUMPH., *Herb. amboin.*, V, 110, t. 56, 57, fig. 1.

11. *Calamus rhomboideus* BL., in *Rœm. et Schult. Syst.*, VII, 1327. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 212. — K., *Enum.*, III, 212, n. 26.

12. *Palmijuncus viminalis* RUMPH., *Herb. amboin.*, V, t. 55, fig. 2. — *Calamus viminalis* W., *Spec.*, II, 203. — NEES, *Pl. off.*, t. A, B — K., *Enum.*, III, 205, n. 3. — BECC., *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 444. — *C. extensus* MART. — *C. Pseudo-Rotang* MART.

13. *Calamus scipionum* LOUR., *Fl. coch.*, 260. — K., *Enum.*, III, 206, n. 7. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 342. — GRIFF., *Palms brit. Ind.*, 43. — BECC., in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 461. — *C. micranthus* BL., *Rumphia*, III, 53, t. 157 (part.).

14. *Calamus heteroideus* BL. (ROSENTH.).

15. *Calamus ornatus* BL., in *Rœm. et Sch. Syst.*, V, 1326. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, t. 116, fig. 2. — K., *Enum.*, III, 205, n. 2. — BECC., in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 460. — *C. ovatus* REINW. — *C. aureus* REINW. (ex MART.)¹

16. *Calamus spectabilis* BL. (ROSENTH.).

17. *Calamus Manan* TETSM. (ROSENTH.).

18. *Calamus Blancoi* K., *Enum.*, III, 595, n. 50. — *C. gracilis* BLANC., *Fl. d. Filip.*, 267.

19. *Calamus albus* PERS., *Syn.*, I, 383 (var. ? (K.) du *C. rudentum* LOUR.).

*sus*¹, *cæsius*², *melanoloma*³, *pisicarpus*⁴, *asperrimus*⁵, *Cawa*⁶, *crinitus*⁷, *scandens*⁸, *longipes*⁹, *periacanthus*¹⁰, *palembanicus*¹¹, *adscendens*¹², *barbatus*¹³, etc. On mange les fruits des *R. barbatus*, *maximus*, *Manan* et de quelques espèces de l'Afrique tropicale; les jeunes pousses des *R. Linnæi*, *petræus*, *heteroideus*, *adscendens*. La sève de plusieurs espèces sert de boisson; celle du *R. Blancoi* est astringente, anti-aphteuse. A Java, on extrait des tiges du *Plectocomia elongata*¹⁴ un suc qui sert à traiter les affections fébriles et dont on peut préparer une liqueur fermentée. C'est aussi une plante à fibres textiles et à sparteries. Ces derniers usages sont encore, à Java, ceux du *Ceratolobus glaucescens* BL. Quant aux *Korthalsia*¹⁵, leurs tiges flexibles sont employées comme celles des Rotangs. Les feuilles des Sagoutiers sont usitées comme textiles et en litière. On mange les fruits des *Zalacca edulis* REINW., *Wallichiana* MART., *macrostachya* GRIFF.; et leurs feuilles sont employées à couvrir les habitations, comme celles de l'*Eugeissona tristis*¹⁶. On peut faire des liens avec les lanières de leur limbe ou de leur pétiole; usage auquel nous

1. *Calamus graminosus* BL. (ROSENTH.).

2. *Calamus cæsius* BL., *Rumphia*, III, 57.

— MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 340. — BECC., in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 456. — *C. glaucescens* BL., *Rumphia*, III, 65.

3. *Calamus melanoloma* MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 207, t. 116, fig. 3. — K., *Enum.*, III, 206, n. 6.

4. *Calamus pisicarpus* BL. (ROSENTH.).

5. BL., in *Ræm. et Schult. Syst.*, VII, 1327. — MART., *Hist. nat. Palm.*, 212. — K., *Enum.*, III, 212, n. 35.

6. *Calamus Cawa* BL. (ROSENTH.).

7. *Dæmonorops crinitus* BL. (ROSENTH.).

8. *Dæmonorops scandens* BL. (ROSENTH., loc. cit., 1093).

9. *Calamus longipes* GRIFF., in *Calc. Journ. Nat. Hist.*, V, 68; *Palms brit. Ind.*, 78, t. 203, A, B. — *C. strictus* MIQ., *Palm. Arch. ind.*, 28. — *Dæmonorops longipes* MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 329, t. 176. — BECC., in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 471. — *D. strictus* BL., *Rumphia*, III, 19, t. 163, A, B.

10. *Dæmonorops periacanthus* TEYSM. (ROSENTH.).

11. *Dæmonorops palembanicus* BL. (ROSENTH.).

12. *Dæmonorops ascendens* BL. (*Ratan-pella*).

13. *Calamus barbatus* MACKL., in *Bull. sc. nat.*, XXIV, 67. — K., *Enum.*, III, 213, n. 45.

14. MART. et BL., in *Ræm. et Schult. Syst.*, VII, 1333. — MART., *Hist. nat. Palm.*, 199, t. 114; t. 116, fig. 1. — K., *Enum.*, III, 202.

— BL., *Rumphia*, III, 68, t. 158; 163, A. — BECC., in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 479. — *Calamus maxinus* REINW. — BL., *Cat. H. bogor.*, 59.

15. Notamment le *K. scaphigera* MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 211. — BECC., in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 475. — K. *Lobbiana* WENDL. f. — *Calamosagus scaphigera* GRIFF., *Palms brit. Ind.*, 30, t. 184, A. — *C. wallichiaefolius* MART.; le *K. polystachya* MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 210, t. 172, fig. 1. — BECC., *Males.*, II, 74; in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 476. — *Calamosagus polystachyus* GRIFF. — *G. ochriger* GRIFF., *Palms brit. Ind.*, t. 216, fig. 1 (*Rotang-oram*); le *K. wallichiaefolia* WENDL. f., in *Kerch. Palm.*, 248. — BECC., *Males.*, II, 75; in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 475. — *Calamosagus wallichiaefolius* GRIFF., *Palms brit. Ind.*, t. 184 (non MART.). — *C. harinaefolius* GRIFF., loc. cit., 29 (*Rotang-simote*); le *K. laciniosa* MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 212. — KURZ, in *Journ. Beng. As. Soc.*, XLIII, II (1874), 207. — BECC., *Males.*, II, 76; in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 475. — *K. scaphigera* KURZ, loc. cit., t. 20, 21 (non MART.). — *K. andamanensis* BECC., *Males.*, II, 76. — *Calamosagus laciniosus* GRIFF., in *Calc. Journ. Nat. Hist.*, V, 23, t. 1; *Palms brit. Ind.*, 27, t. 183 (*Rohrstöcke*).

16. GRIFF., in *Calc. Journ. Nat. Hist.*, V, 101; *Palms brit. Ind.*, 109, t. 220, A. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 212, t. 179, 180. — BECC., in *N. Giorn. bot. ital.*, III, 28; in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 481.

voions si fréquemment appliquées en horticulture celles des divers *Raphia* de Madagascar et de l'Afrique tropicale occidentale.

Parmi les Arengées, outre les espèces du genre qui leur a donné son nom, on doit remarquer, en Amérique, les *Ænecarpus*, dont le nom indique assez que ce sont des palmiers à vin, à sève fermentescible, comme celle de la plupart des grandes espèces de l'Asie, de l'Océanie et de l'Afrique tropicales. Tel est l'*Æ. Bacaba*¹, dont les feuilles et le bois sont très utiles aux Indiens du Brésil, et dont les fruits fournissent une huile abondante. On emploie également l'*Æ. Bataua*², du même pays, dont les gaines foliaires portent des épines employées comme flèches; et l'*Æ. distichus*³, assez souvent cultivé pour ses fruits oléagineux. A la Guyane, l'*Æ. Catuna* AUBL. a des fruits comestibles et des graines qu'on transforme en charbon végétal. Les *Euterpe*⁴ sont les plantes américaines les plus connues, on le sait, comme choux-palmistes. L'*E. precatoria* a un bourgeon terminal aussi savoureux que celui de l'*E. oleracea*. Son fruit servirait à faire des chapelets. Frais, il est noir et globuleux, et l'on en prépare une boisson comparable aux gros vins rouges de Bourgogne. Dans les îles de la Sonde, l'*Oncosperma filamentosa*⁵ donne le meilleur des choux-palmistes. Le *Jessenia polycarpa*⁶ est une plante employée en Colombie pour son bois et son feuillage. Le *Calypptocalyx spicatus* BL.⁷ est aussi, aux Moluques, recherché pour son bois. Sa graine est parfois substituée à la Noix d'Arec. Dans l'Amérique tropicale, on cultive souvent, à cause des qualités excellentes de leur bourgeon terminal, les *Oreodoxa oleracea*⁸ et *regia*⁹. Celui-ci est, aux Antilles, employé à faire des conduites d'eau, et l'on engraisse les porcs avec ses fruits. Le premier donne une fécule analogue au sagou

1. MART., *Palm. bras.*, 24, t. 26, fig. 1, 2. — K., *Enum.*, III, 180. — WALL., *Palm.-tr. Amaz.*, t. 9. — DR., *Fl. bras.*, III, II, 469. — ? *Palma Comon* AUBL. (*Bacaba naçu*).

2. MART., *Palm. bras.*, 23, t. 24, 25. — K., *Enum.*, III, 180. — DR., *Fl. bras.*, III, II, 468, t. 108, fig. 1. — ? *Palma Patayona* AUBL. (*Bataua, Patawa*).

3. MART., *Palm. bras.*, 22, t. 22, 23. — K., *Enum.*, III, 180. — DR., *Fl. bras.*, III, II, 467 (*Bacaba de aceite*).

4. Voy. p. 345, not. 2.

5. BL., *Rumphia*, II, 97, t. 82, 103. — BECC., in Hook. f. *Fl. brit. Ind.*, VI, 414. — *O. cam-bodianum* HANCE. — *Areca tigillaria* JACK. — A. Nibung MART., *Hist. nat. Palm.*, III, t. 153 (*Palmier Nibung*).

6. KARST., *Fl. columb.*, I, 197, t. 98. — DR., *Pflanzenfam.*, fig. 52 (*Unamo*).

7. *Areca spicata* LAMK., *Dict.*, I, 241. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 179. — K., *Enum.*, III, 187. — *Pinanga globosa* RUMPH., *Herb. amboin.*, I, 38, t. 5, fig. 1, A. — *Areca frondibus pinnatis; spadice non ramoso, spiciformi; fructu globoso* N. B. (ex LAMK.) (*Pinang-oelang, Niboeng*).

8. MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 166, t. 156, fig. 1, 2; 163. — K., *Enum.*, III, 181. — *Areca oleracea* L., *Syst.*, 828. — JACQ., *Amer.*, 278, t. 170. — ? *Euterpe caribæa* SPRENG.

9. H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, I, 305. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 168, t. 156, fig. 3-5. — K., *Enum.*, III, 182. — (*Ænecarpus regius* SPRENG. (*Palmilo, Palma real*)).

et une huile tirée du fruit. Avec ses pétioles on fait des berceaux pour les négrillons, des cannes et divers articles de ménage. Le bois de l'*O. Sancona*¹ sert aux constructions, et les feuilles de l'*O. frigida*² s'emploient à recouvrir les cases. Aux Mascareignes, on coupe comme choux-palmistes les *Dictyosperma*, et, en Océanie, le *Kentia sapida*³. Beaucoup d'autres Arécées s'emploient au même usage. A Madagascar, plusieurs petits *Dypsis* et *Phloga* servent à l'extraction d'un sel qui s'applique aux usages domestiques. D'autres fournissent une huile usitée dans le même pays comme antirhumatisme et dépurative. A Java, le *Wallichia porphyrocarpa* MART. est une plante médicinale, de même que le *Seaforthia Calapparia* MART. et le *Ptychosperma latisecta* MIQ. Le *Saguerus Gomutus* (fig. 222, 223), dont nous connaissons déjà les produits sucrés et alcooliques⁴, a un fruit qui, avant sa maturité, passe pour stomachique, pectoral, fortifiant. Quand il est frais, on obtient par incision de son péricarpe un suc irritant qui enflamme la peau et les muqueuses. C'est avec lui qu'aux Moluques, on préparait par décoction une *Eau infernale* que les assiégés lançaient sur les assaillants. En Amérique, les *Iriartea* sont employés à de nombreux usages. L'*I. ventricosa*⁵ sert aux Indiens à fabriquer des armes, des canots et un grand nombre d'ustensiles domestiques. De son tronc renflé ils font des cymbales⁶. Les *I. exorrhiza*⁷ et *Orbignyana*⁸ servent aux mêmes usages économiques. L'*I. setigera*⁹, dont la moelle est alimentaire, a des hampes dont les Indiens fabriquent leurs sarbacanes (*Sarabatanos*).

Parmi les produits les plus remarquables du Brésil figurent les fibres des *Piaçaba*¹⁰, avec lesquelles on balaye souvent les rues de Paris. Ces fibres rigides, solides, noirâtres, provenaient toutes originale-

1. H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, I, 304. — K., *Enum.*, III, 182. — *Ænocarpus Sancona* SPRENG. (*Sancona*).

2. H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, I, 304. — K., *Enum.*, III, 183. — *Ænocarpus frigidus* SPRENG. (*Sancona*).

3. *Areca sapida* SOL., in *Forst. Pl. esc.*, 66. — BAUER, *Ill. norfolk.*, t. 179, 180, 202, 203. — ENDL., *Fl. norfolk.*, 26. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 172, t. 151, 152. — K., *Enum.*, III, 185. — HOOK. F., *Handb. N. Zeal. Fl.*, 288. — *Bot. Mag.*, t. 5139. — A. Banksii A. CUNN.

4. Voy. p. 229, not. 5.

5. MART., *Palm. bras.*, 37, t. 35, 36. — K., *Enum.*, III, 195. — WALL., *Palm.-tr. Amaz.*, 37, t. 14. — SPRUCE, *Palm. Amaz.*, 133. — DR., *Fl. bras.*, III, II, 538, t. 126, fig. 2. —

Deckeria ventricosa KARST., in *Linnæa* (1859), 259 (*Baziuva, Barrigada*).

6. *Juriparis* ou Diablos.

7. MART., *Palm. bras.*, 36, t. 33, 34. — K., *Enum.*, III, 194. — WALL., *Palm.-tr. Amaz.*, 35, t. 12, 13. — DR., *Fl. bras.*, III, II, 539, t. 126, fig. 1. — *I. philonotica* BARB.-RODR. (ex DR.). — *Socratea exorrhiza* WENDL. F., in *Bonplandia*, VIII, 103. — *S. elegans* KARST. (ex DR.) (*Paziuba*).

8. MART., *Palm. Orbign.*, 14, t. 15, fig. 1; t. 20, fig. B. — *Socratea Orbignyana* KARST. (*Acuna*).

9. MART., *Palm. bras.*, 39, t. 37. — K., *Enum.*, III, 195.

10. Celui de Madagascar vient du *Dictyosperma fibrosum* WRIGHT (*Kew Bull.* (1894), 358).

ment, à ce qu'on croyait, d'un *Attalea*, l'*A. funifera*¹; fibres de la base du pétiole et de la spathe, dont on fait des brosses, des filets, des cordages. L'endocarpe sert à tourner de jolis petits ouvrages très variés. On croit aujourd'hui que des fibres analogues, de qualité supérieure, sont fournies par la gaine foliaire d'un autre palmier brésilien, le *Leopoldinia Piassaba*², arbre dont les fruits³ servent d'aliment aux Indiens. Ils emploient aussi à plusieurs usages domestiques la tige et les feuilles du *L. pulchra*⁴ et du *L. insignis*⁵; tandis que le fruit du *L. major*⁶, incinéré, puis traité par l'eau, sert à l'extraction du sel dont ils se servent. La plupart des *Attalea* sont aussi des plantes utiles : l'*A. compta*⁷, par les lanières de ses feuilles qu'on tresse comme l'osier, par ses graines comestibles et par son sarcocarpe oléifère; l'*A. Indaya*⁸, dont les péricarpes charnus et les feuilles sont également utilisés; l'*A. humilis*⁹, dont la graine se mange et dont les feuilles servent à faire de solides filets de pêche; l'*A. spectabilis*¹⁰, dont le sarcocarpe a une saveur agréable et dont le feuillage sert à couvrir les habitations; l'*A. nucifera*¹¹, dont les fruits se mangent; l'*A. princeps*¹², qui donne à la fois de l'huile, du vin de palme, des bourgeons comestibles, des fibres textiles et du bois de construction; l'*A. excelsa*¹³, dont le bois et les feuilles encore verts servent à sécher les caoutchoucs, auxquels leur épaisse fumée communie une coloration brune ou noire; l'*A. speciosa*¹⁴, dont les feuilles abritent les cases et dont le bois et l'écorce¹⁵ s'emploient

1. MART., *Palm. bras.*, 136, t. 95; 96, fig. 4; T, fig. 1, 2. — TARG.-TOZ., in *Mem. Soc. sc. Moden.*, XX, II, 311. — PR. M.-NEUW., *Reis. Bras.*, I, 272. — K., *Enum.*, III, 276, n. 1. — DR., *Fl. bras.*, III, II, 436 (*Coco de Piaçaba*).

2. WALL., *Palm.-tr. Amaz.*, 17, t. 6. — SPRUCE, in *Journ. Linn. Soc.*, IV, 58; *Palm. Amaz.*, 127. — DR., *Fl. bras.*, III, II, 153.

3. *Chiquiriquis*.

4. MART., *Palm. bras.*, 59, t. 53, fig. 1, II; 100, fig. 1, II. — WALL., *Palm.-tr. Amaz.*, t. 2, fig. 6; 4. — SPRUCE, *Palm. Amaz.*, 126. — K., *Enum.*, III, 177. — DR., *Fl. bras.*, III, II, 514, t. 123, fig. 2 (*Jara, Jaravia, Caraña*).

5. MART., *Palm. bras.*, 60, t. 63, fig. 16, 17. — K., *Enum.*, III, 177. — DR., *Fl. bras.*, III, II, 516, t. 123, fig. 1.

6. WALL., *Palm.-tr. Amaz.*, 15, t. 5. — SPRUCE, *Palm. Amaz.*, 125. — DR., *loc. cit.*, 515 (*Jara-uassu*).

7. MART., *Palm. bras.*, 127, t. 41, 97; *Hist. nat. Palm.*, III, 217; *Palm. Orbign.*, 120. — K., *Enum.*, III, 276. — *Cocos Ndaiá-assu* PR.

M.-NEUW., *Reis. Bras.*, I, 271. — *Pindova* PIS. — *Pindoba* MARCGR. — JOHNST., *Dendr.* (ed. 1768), 155.

8. DR., *Fl. bras.*, III, II, 437, t. 100, fig. 2.

9. MART., in *Spreng. Syst.*, II, 624; *Palm. bras.*, t. 75; *Hist. nat. Palm.*, III, 297, t. 168, fig. 1; *Palm. Orbign.*, 121. — DR., *loc. cit.*, 438 (*Pindova, Catolé, Palmeirim*).

10. MART., *Palm. bras.*, t. 96, fig. 1, 2. — K., *Enum.*, III, 276. — WALL., *Palm.-tr. Amaz.*, 118, t. 3, fig. 1. — DR., *loc. cit.*, 440, t. 99 (*Curuã, Macupi*).

11. KARST., *Fl. columb.*, I, t. 68.

12. MART., *Palm. Orbign.*, 113, t. 4, fig. 2, 31; *Hist. nat. Palm.*, III, 298, t. 167, fig. 1. — *Scheelea princeps* KARST., *Fl. columb.*

13. MART., *Palm. bras.*, 138, t. 96, fig. 3; *Hist. nat. Palm.*, III, 298, t. 169, fig. 3; *Palm. Orbign.*, 117. — K., *Enum.*, III, 277. — WALL., *Palm.-tr. Amaz.*, 117, t. 48 (*Uauassu*).

14. MART., *Palm. bras.*, 138, t. 96, fig. 3. — K., *loc. cit.*, n. 4.

15. *Pahla branca*.

aux usages domestiques. L'A. *Humboldtiana*¹ a, sur les bords de l'Amazone, des qualités analogues. Les *Orbignya racemosa* DR.² et *Eichleri* DR.³ fournissent aussi aux Indiens du Brésil des *Piaçaba* plus ou moins recherchés, mais de qualité relativement fort inférieure. Les *Acrocomia* ne rendent pas moins de services aux peuplades brésiliennes. L'A. *sclerocarpa*⁴ sert à préparer des mets qu'elles recherchent surtout pour ses feuilles, qu'elles cuisent au vinaigre. La pulpe de son mésocarpe et son albumen servent au traitement des affections catarrhales. On mange aussi le fruit drupacé de l'A. *Totai*⁵. Le péricarpe de l'A. *funiformis*⁶ contient, dit-on, une huile jaune, à odeur de violettes et qui servirait à faire des savons fins. Le *Manicaria saccifera*⁷ (fig. 231), de l'Amérique tropicale, donne une sève fermentescible et enivrante, des fruits dont on prépare aussi des boissons, des feuilles qui servent de litière et de couverture, des spathes dont on fait des coiffures singulières⁸. Les *Bactris*, souvent de petite taille, sont moins utiles aux Indiens d'Amérique. Le *B. Maraja*⁹ a des fruits comestibles pour l'homme et les oiseaux. Le *B. campestris*¹⁰ sert à établir des clôtures infranchissables. Le *B. acanthocarpa*¹¹ fournit des fibres pour la fabrication des filets. Le *B. piscatorum*¹² a une petite baie, excellente amorce pour les meilleurs poissons du Brésil. Le *B. major*¹³ fournit du vinaigre par fermentation de son péricarpe. Le *B. Gasipaes*¹⁴ est cultivé dans un grand nombre de villages américains pour ses fruits, qu'on compare quant à la qualité à nos pêches; pour son bois noir et dur; pour ses épines rigides qui servent d'aiguilles.

1. SPRUCE, *Palm. Amaz.*, 163 (*Yagua*, Tiassé, Caiat).

2. *Piaçaba verdadeira*.

3. À Goyaz, Pindoba.

4. MART., *Palm. bras.*, 66, t. 56, 57; 100, fig. 5; *Palm. Orbign.*, 81. — K., *Enum.*, III, 271. — DR., *Fl. bras.*, III, II, 390, t. 7, 33. — A. *leiospatha* WALL., *Palm.-tr. Amaz.*, 97, t. 37. — *Bactris globosa minor* GÆRTN., *Fruct.*, I, 22, t. 9, fig. 1. — *Cocos aculeata* JACQ., *Amer.*, t. 169; ed. pict., t. 154. — *Macoya* AUBL. (*Macaüba*, *Coco de Catarho*, *Mocaja*).

5. MART., *Palm. Orbign.*, 78, t. 9, 29.

6. Qu'on dit originaire de la Jamaïque.

7. GÆRTN., *Fruct.*, II, 468, t. 176. — W., *Spec.*, IV, 493. — MART., *Palm. bras.*, 139, 230, t. 198, 199. — K., *Enum.*, III, 234. — WALL., *Palm.-tr. Amaz.*, 69, t. 26; t. 2, fig. 3. — DR., *Fl. bras.*, III, II, 518, t. 124; t. phys. 40. — M. *Plukenetii* GRISEB. et WENDL. F., *Fl. brit. W.-Ind.*, 518. — *Pilophora testicularis* JACQ., *Fragm.*, 32, t. 35, 36. — W., in *Act.*

berol. (1815), 1. — *Palma saccifera* CLUS. (*Busui*).

8. Bonnets tourlouris.

9. MART., *Palm. bras.*, 93, t. 71, fig. 1. — K., *Enum.*, III, 262.

10. PÖPP., — MART., *Palm. bras.*, 146. — K., *Enum.*, III, 266.

11. MART., *Palm. bras.*, 92, t. 70, 71, fig. 2 (*Tucum*).

12. WEDD., herb. — DR., *Fl. bras.*, III, II, 355 (*Tucum mirim de fruta doce*).

13. JACQ., *Amer.*, 280, t. 171, fig. 2. — LAMK., *Ill.*, t. 805; *Dict.*, Suppl., I, 557. — W., *Spec.*, IV, 402. — K., *Enum.*, III, 268 (*Coco de vinagre*).

14. H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, I, 302; t. 700; *Syn. pl. æquin.*, I, 35. — *Guilielma speciosa* MART., *Palm. bras.*, 82, t. 66, 67; *Palm. Orbign.*, 73. — WALL., *Palm.-tr. Amaz.*, 93, t. 36; t. III, fig. 4. — K., *Enum.*, III, 269. — *Paripou* AUBL. — *Pirijao*, *Pihiguao* H. — *Chontó* H. K. (*Pupanha*, *Chontadura*).

Le *B. insignis*¹ a aussi un bois résistant d'excellente qualité, et ses fruits sont également comestibles. C'est parfois dans l'écorce de l'*Euterpe oleracea* qu'on conserve, au Brésil, les huiles d'*Astrocaryum*, de *Bactris*, d'*Acrocomia*, d'*Ænocarpus*, d'*Elæis* et de *Cocotiers*. Certains voyageurs ont qualifié de délicieux les fruits de l'*Astrocaryum Murumuru*². L'*A. Ayri*³ est fort redouté des Indiens à cause de ses aiguillons, qui leur déchirent la peau et dont ils considèrent les blessures comme provoquant des accidents tétaniques. On fabrique de menus objets avec l'endocarpe de l'*A. Janari*⁴. On mange avant leur complète maturité les fruits de l'*A. Huaimi*⁵; et ceux de l'*A. Tucuma*⁶ sont préférés à tous les autres. Les fibres des feuilles de l'*A. vulgare*⁷ servent à la confection de filets, de câbles, de matelas. Son fruit est exploité pour la préparation de l'huile. L'*A. acaule*⁸ donne des fibres par son pétiole. Son fruit est médiocre. Les Indiens Pariquis extraient une farine alimentaire des tiges de l'*A. farinosum*⁹. L'*Allagoptera arenaria*¹⁰ porte des graines dont on mange l'albumen avant sa complète maturité. Le *Calyptronoma robusta*¹¹ a, comme tant d'autres espèces, un bourgeon terminal comestible, et ses feuilles servent à couvrir les huttes. Le *Kunthia montana*¹² est réputé alexipharmaque parmi les Indiens : ils emploient sa sève contre tous les poisons. On vend à Londres des cannes faites avec le *Linospadix monastachya* WENDL. F. et DR., petit palmier australien. A Cordoba, les fruits comestibles du *Trithrinax campestris* DR.¹³ se mangent et donnent un alcool qui vaut, dit-on, celui des raisins.

1. *Guilielma insignis* MART., *Palm. Orbign.*, 71, t. 10, fig. 3; 29, fig. A. — DR., *Fl. bras.*, III, II, 364 (*Chonta, Palma real*).

2. MART., *Palm. bras.*, 70, t. 58, 59. — K., *Enum.*, III, 272. — WALL., *Palm.-tr. Amas.*, 100, t. 38. — DR., *Fl. bras.*, III, II, 374 (*Murumuru*).

3. MART., *Palm. bras.*, 71, t. 59, A. — K., *Enum.*, III, 272. — DR., *Fl. bras.*, III, II, 376. — *Toxophoenix aculeatissima* SCHOTT, *Nachr. v. d. k. k. Naturf. Bras.*, II, Anh., 12. — Hairs THEV. — *Palma Ayri* PIS. — Yri BAUH. — *Airi-Assu* PR. M.-NEUW.

4. MART., *Palm. bras.*, 76, t. 52, 65, fig. 1. — K., *Enum.*, III, 273.

5. MART., *Palm. Orbign.*, 86, t. 13, fig. 3; t. 30, A.

6. MART., *Palm. bras.*, 77, t. 65, II. — K., *Enum.*, III, 274. — WALL., *Palm.-tr. Amas.*, t. 41; II, fig. 5. — DR., *loc. cit.*, 380, t. 81, fig. 5 (*Tucum*).

7. MART., *Palm. bras.*, 74, t. 62, 63 (part.).

— WALL., *Palm.-tr. Amas.*, 105, t. 40. — DR., *loc. cit.*, 381. — *Palma Tucum* PIS.

8. MART., *Palm. bras.*, 78, t. 24, 63, fig. 5. — K., *Enum.*, III, 274. — WALL., *Palm.-tr. Amas.*, t. 44. — DR., *loc. cit.*, 385 (*Iù*).

9. BARB.-RODR., *En. Palm. rar.*, 21; ed. II, 27. — DR., *loc. cit.*, 387, t. 81, fig. 2 (*Murumuru-Iri*).

10. NEES (1821). — O. K., *Revis.*, 726. — *Diplothemium maritimum* MART., *Palm. bras.*, 108, t. 75, 75. — DR., *loc. cit.*, t. 430, t. 98, fig. 2.

11. TRAIL, in *Trim. Journ.* (1876), 330, t. 183, fig. 3. — DR., *loc. cit.*, t. 122 (*Ubim-nassu*).

12. H. B., *Pl. æquin.*, II, 128, t. 122. — H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, I, 243. — MART., *Palm. bras.*, 163, t. 101, fig. 6, 7; 142. — DR., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 533 (*Cana de la Vibora, C. de San Pablo*).

13. DR. — GRISEB., *Symb. Fl. argent.*, 283. — *Copernicia campestris* BURMST. — GRISEB., *Pl. Lorents.*, 200 (*Yerba buena, Cerca de Orconu*).

Traité par l'eau chaude, ce fruit fournit aussi une sorte d'huile. Les fibres des gaines foliaires servent à faire des filtres.

Les *Caryota*, palmiers à feuilles exceptionnelles, dont il a été plusieurs fois incidemment fait mention, sont des plus utiles à l'homme. Le *C. urens*¹ (fig. 217-221) donne aux habitants de l'Asie et de l'Océanie tropicales de la fécule alimentaire; une sève fermentescible, qui s'écoule de sa tige et de ses racines; un chou-palmiste comestible. Son fruit, qu'on dit « brûlant », lui a valu son nom spécifique. Son bois sert aux constructions, et ses fibres sont textiles. Le *C. Rumphiana* MART. donne des produits analogues. On cite encore comme fournissant du bois, des tissus et du vin de palme, les *C. furfuracea* BL., *propinqua* BL., *maxima* BL. et *sobolifera*².

Les *Phytelephas* sont les palmiers à ivoire végétal de l'Amérique équinoxiale. L'albumen très dur de leurs semences sert, en effet, à une foule d'usages artistiques et industriels, absolument comme les ivoires d'origine animale. Leur bourgeon terminal se mange comme chou-palmiste. Leur péricarpe sert à préparer ce qu'on a appelé la boisson nationale des Péruviens³. Tel est surtout le rôle du *P. macrocarpa*⁴ (fig. 239-242). On emploie beaucoup moins le *P. microcarpa*⁵, dont les graines sont aussi fréquemment ouvrées. Il est bien entendu qu'il faudra se reporter aux ouvrages spéciaux⁶ pour constater tout le parti que tire d'un très grand nombre de Palmiers, souvent élégants ou magnifiques, la culture ornementale, objet dans toute l'Europe civilisée d'un commerce considérable.

1. L., *Fl. zeyl.*, 187; *Spec.*, 1660. — LAMK., *Ill.*, t. 897. — GÆRTN., *Fruct.*, I, 20, t. 7. — ROXB., *Fl. ind.*, III, 625. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 193, t. 107, 108, 162. — K., *Enum.*, III, 198. — B.-MIRB., in *Ann. Mus.*, XIII, t. 3, fig. 29. — GRIFF., in *Calc. Journ. Nat. Hist.*, V, 479; *Palms brit. Ind.*, 160. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 41. — H. BN., in *Dict. enc. sc. méd.*, sér. 1, XII, 742. — BECC., in Hook. *f. Fl. brit. Ind.*, VI, 422. — Schunda Pana RHEED., *Hort. malab.*, I, 15, t. 11.

2. WALL., in *Mart. Palm.*, 194, t. 107, fig. 2. — K., *Enum.*, III, 199. — *C. urens* JACQ., *Fragm.*, t. 12, fig. 1 (non L.). — *Palma indiana* Birli ZAN., *Ist. bot.*, 159, t. 63; *Rar. st.*, 176, t. 133.

3. Chicha de Tagua.

4. R. et PAV., *Fl. per. et chil. Syst. veg.*, 301. — H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, I, 83. — K., *Enum.*, III, 109. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 306. — Hook., *Journ. Bot.*, I, 204. — GAUDICH., *Voy. Bonite*, All., t. 14, 15 (part.), 29, 30 (part.). — SEEM., *Her. Bot.*, 208, t. 45-47; *Bonplandia*, III, 270, t. 1, 2. — *Bot. Mag.*, t. 4913, 4914. — *Elephantusia macrocarpa* W., *Spec.*, IV, 1156 (*Coroso, Tagua, Marfil*).

5. R. et PAV., *loc. cit.*, 302. — K., *Enum.*, *loc. cit.*, n. 2. — KARST., *Fl. columb.* — *Elephantusia microcarpa* W., *loc. cit.*, 1157.

6. Voy. n. 275, not. 14, et les figures nombreuses du *Botanical Magazine*, du *Gartenflora*, de la *Flore des serres*, etc.

GENERA

I. CORYPHEÆ.

1. *Chamærops* L. — Flores hermaphroditi v. polygami; receptaculo convexo. Sepala 3, parva, subulata v. lanceolata, libera v. sæpius basi connata. Petala 3, alterna, majora, ovato-acuta, libera v. ima basi connata, subvalvata v. plus minus imbricata. Stamina 6-9, hypogyna; filamentis brevibus plus minus late 3-angularibus, basi 1-adelphis ibique imæ corollæ adnatis; antheris (nunc sterilibus) basifixis; loculis linearibus, basi liberis, introrsum rimosis. Gynæceum (nunc rudimentarium) liberum; carpellis alternipetalis 3; singulorum germine crasso, 1-loculari; stylo apicali tenui recurvo, intus sulcato stigmatoso. Ovulum 1, subbasilare; micropyle extrorsum infera; obturatore parvo. Fructus carpella 1-3, ovoidea v. sphærica, intus (ubi plura) plana v. angulata, carnosa intusque fibrosa. Semen sphæricum v. ellipsoideum erectum; hilo basilari; raphe vix distincta laxèque ramosa; albumine duro corneo varie ruminato; embryone excentrico infra medium dorsali. — Gregariæ inermes humiles v. mediocres cæspitosæ aque basi ramosæ, vaginis vetustis oblectæ. Folia terminalia conferta alterna, semi-orbicularia v. cuneato-flabellata; laciniis profundis rigidis induplicatim plicatis, 2-fidis; ligula brevi; petiolo gracili biconvexo, ad margines lævi v. spinescente; vagina demum fissa reticulato-fibrosa. Spadices interfoliacei erecti breves valde ramosi; pedunculo compresso; ramis crebris brevibus densifloris ad bracteas membranaceas axillaribus supraque eas elevatis; bracteolis parvis v. sæpius 0. Spathæ inflorescentiam primum involventes 2-4, late membranaceæ crasseque coriaceæ: superior completa; inferiores autem demum fissæ. (*Reg. Medit. occid.*) — *Vid. p.* 245.

2. **Phoenix** L. — Flores (*Chamæropsis*) diœci; masculorum calyce breviter cupulari, 3-dentato. Petala multo longiora 3, ovato-oblonga, valvata v. margine obliquo leviter imbricata. Stamina 6 (v. raro 3-9), imæ corollæ incrassatæ inserta; filamentis subulatis erectis basi quoque incrassato-connatis; antheris elongatis erectis ad basin dorsifixis, lateraliter v. extrorsum rimosis. Gynæcei rudimentum vix conspicuum v. 0. Floris fœminei calyx brevis dentatus. Petala rotundata brevia concava, arcte imbricata. Staminodia libera v. in cupulam brevem connata. Carpella 3, alternipetala libera, subsphærica v. ovoidea, intus angulata conniventia; stylis brevibus stigmatosis apicalibus uncinatis. Ovulum in germine quoque 1, suberectum; micropyle extrorsum infera. Fructus carpella 1-3, oblonga teretia carnosa; exocarpio endocarpioque tenuiter membranaceis. Semen erectum oblongum v. fusiforme, ventre profunde sulcatum; hilo basilari; albumine corneo; embryone dorsali v. subbasilari subhorizontali. — Inermes; caudice subnullo v. elongato, gracili robustove, superne foliorum basibus oblecto. Folia inæqui-pinnatisecta; segmentis elongatis rigidis; marginibus per longitudinem totam induplicatis; rhachi lateraliter compressa; petiolo plano-convexo, nunc spinescente; vagina brevi fibrosa. Spadices interfoliacei plures, erecti v. demum penduli; pedunculo valde compresso; spatha elongata completa compressa coriacea, ventre dorsoque fissa; ramis crebris; bracteis minutis v. 0; bracteolis 0. (*Asia et Africa calid.*) — *Vid. p. 247.*

3. **Trachycarpus** WENDL. F.¹ — Flores (fere *Phœnicis*) polygamomonœci; sepalis ovato-acutis membranaceis leviter imbricatis. Petala longiora crassioraque ovata, sæpe acuta, subvalvata v. leviter imbricata. Stamina 6 (in flore fœmineo sterilia); filamentis subulatis liberis v. ima basi connatis; antheris dorsifixis; loculis inferne liberis, introrsum rimosis. Carpella 1-3 (in flore masculo imperfecta), libera v. ima basi connata; germine ovoideo-3-gono, nunc varie tomentoso; stylo conico brevi, recto v. recurvo; marginibus induplicatis papillosis. Ovulum adscendens 1; micropyle extrorsum infera. Fructus sphæricus, ovoideus, ellipsoideus v. subreniformis, stylo terminatus; exocarpio tenuiter carnosio; endocarpio crustaceo v. membranaceo.

1. In *Bull. Soc. bot. Fr.*, VIII, 429. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 251 (part.). — B. H., *Gen.*, III, 929, n. 98. — H. BN, in *Dict. Bot.*,

IV, 207; in *Bull. Soc. Linn. Par.*, 704 (florum caractere nonnihil quoad speciem prototypicam emend.). — DR., *Pflanzenfam.*, 32, fig. 25.

Semen erectum liberum, ventre sulcatum; hilo basilari; rapheos ramis obscure diffusis; albumine corneo æquabili; embryone ad medium dorsali. — Elatæ v. humiles inermes, nunc cæspitosæ, vaginis retiformi-fibrosis superne indutæ. Folia orbicularia v. semi-orbicularia plicato-∞-fida; laciniis angustis induplicatis, 2-fidis; ligula brevi; petiolo bi convexo; vagina integra dense fibrosa. Spadices interfoliacei plures; spathis pluribus alternis compressis imbricatis, oblique fissis, coriaceis v. crassis, tomentosis v. farinaceis; bracteis bracteolisque minutis; floribus¹ secus ramos glomeratis, solitariis paucisve, sæpius 2-nis. (*India, Burma, China, Japonia*².)

4. *Livistona* R. Br.³ — Flores (*Phœnicis*) hermaphroditi; sepalis 3, obtusis concavis, basi connatis, imbricatis. Petala longiora, basi connata, ovato-acuta coriacea, valvata. Stamina 6; filamentis apice brevi subulatis, basi dilatata in annulum fauci adnatum connatis; antheris brevibus dorsifixis; loculis basi discretis, introrsum rimosis. Carpella 3, alternipetala, angulo ventrali cohærentes; stylis subulatis, apice minuto stigmatosis, liberis v. cohærentibus. Ovulum in angulo interno 1, adscendens; micropyle extrorsum infera. Fructus⁴ e flore quoque 1-3, sphæricus, ellipsoideus v. oblongus, rectus v. arcuatus drupaceus; exocarpio carnoso v. coriaceo; putamine crustaceo. Semen descendens conforme, ventre excavatum; hilo basilari parvo; rapheos ramis obscure diffusis; albumine corneo æquabili. — Inermes; caudice inferne annulato, superne vaginarum vestigiis oblecto. Folia terminalia patentia, ambitu suborbicularia, flabellatim plicata, plus minus profunde fissa; segmentis 2-fidis induplicatis, nunc margine filiferis; rhachi brevi; ligula libera cordiformi; petiolo longo plano-convexo v. bi convexo, margine spinescente; vagina in fibras reticulatas soluta. Spadices interfoliacei sessiles v. pedunculati, decomposite ramosi, primum erecti demumque penduli; floribus⁵ ad ramos

1. Flavidis, parvis.

2. Spec. 3, 4. THUNB., *Fl. jap.*, 349, part. (*Chamærops*). — SW., in *Rees Cyclop.*, n. 2 (*Chamærops*). — WALL., *Pl. as. rar.*, III, 5, t. 211 (*Chamærops*). — K., *Enum.*, III, 250, n. 3, 4 (*Chamærops*). — GRIFF., in *Calc. Journ. Nat. Hist.*, V, 339, n. 1; *Palms brit. Ind.*, 133, t. 227, A, B (*Chamærops*). — KURZ, *For. Fl.*, II, 526 (*Chamærops*). — BRAND., *For. Fl.*, 546 (*Chamærops*). — FR. et SAV., *En. pl. jap.*, II, 1 (*Chamærops*). — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 60 (*Chamærops*). — J. GAY, in *Bull. Soc. bot. Fr.*, VIII, 410 (*Chamærops*). — BECC., in *Hook. f.*

Fl. brit. Ind., VI, 435. — PRIST., *Beitr. vergl. Anat. Sab.*, 20. — *Bot. Mag.*, t. 5221 (*Chamærops*), 7128.

3. *Prodr.*, III, 123. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 239, 319, t. 109-111, 135, 145, 146. — ENDL., *Gen.*, n. 1754. — K., *Enum.*, III, 241. — SPACH, *Suit. à Buff.*, XII, 103. — WENDL. r. et DR., in *Linnaea*, XXXIX, 192, 226. — B. H., *Gen.*, III, 929, n. 97. — DR., *Pflanzenfam.*, 35, fig. 24, H. — SARIBUS BL., *Rumphia*, II, 48, t. 95, 96 (non alior.).

4. Cærulescentes, flavidi v. brunnei.

5. Flaventi-viridulis.

graciles pedicellatis v. sessilibus, solitariis v. glomerulatis; bracteis minutis v. 0. Spathæ plures longe tubulosæ compressæ vaginantes, coriaceæ, 2-lobæ v. 2-fidæ, ancipites v. 2-carinatae. (*Asia et Oceania calid.*¹⁾)

5. **Nannorhops** WENDL. F.² — Flores (fere *Phœnicis* v. *Chamæropsis*) polygami; calyce tubuloso membranaceo inæqui-3-lobato. Corollæ tubus brevis; segmentis profundis 3, ovato-acutis valvatis. Stamina in flore masculo 6-9, in hermaphrodito sæpius 6; filamentis basi dilatatis fauci corollæ insertis; antheris oblongo-sagittatis. Germen ovoideo-3-gonum; stylo terminali subulato brevi, apice stigmatoso-3-dentato; ovulis adscendentibus; micropyle extrorsum infera. Fructus drupaceus sphaericus, oliviformis v. oblongus, 1-locularis; stylo basilari; exocarpio carnosio; endocarpio tenuiter crustaceo. Semen erectum; hilo basilari; ventre fossa spongiosa materia farcta excavato; rapheos ramis laxè reticulatis; albumine æquabili; embryone ad medium v. propius ad hilum dorsali. — Gregaria³ humilis v. subacaulis (pallida); caudicibus cæspitosis repentibus vaginiferis. Folia terminalia cuneato-flabellata; laciniis curvis 2-fidis induplicatim plicatis; rhachi brevi; ligula 0; petioli concavo-convexi marginibus serrulatis v. subintegris; vagina brevi fissa ad margines membranacea. Spadices interfoliacei longi decomposite patentimque ramosi; pedunculo crassiusculo elongato v. breviusculo; ramis gracilibus; floribus⁴ in ramulis gracilibus per paria bractea⁵ membranacea inclusis; altero sessili bracteato; altero autem pedicellato ebracteato. Spathæ tubulosæ pedunculum spadicis ramosque vestientes; ore obliquo hinc acuminato. (*India mont., Affghanistania, Beluchistania, Persia austr.*⁶⁾)

1. Spec. ad 12. LOUR., *Fl. cochinch.*, 211 (*Corypha*). — JACQ., *Fragm.*, t. 11, fig. 2 (*Latania*). — MART., *loc. cit.*, t. 102 (*Corypha*). — GRIFF., in *Calc. Journ. Nat. Hist.*, V, 333; *Palms brit. Ind.*, 127, t. 226, A-D; App., XXIII. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 58; Suppl., 591; *Pl. Jungh.*, 165; *Palm. Arch. ind.*, 12. — KURZ, *For. Fl.*, II, 525. — F. MUELL., *Fragm. phyt. Austral.*, VIII, 221. — BENTH., *Fl. austral.*, VII, 145. — BECC., *Males.*, I, 84; III, 69; in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 434. — FR. et SAV., *En. pl. jap.*, II, 2. — WENDL. F. et DR., in *Linnaea*, XXXIX, 192, 226; in *Bull. Soc. bot. Fr.*, VIII, 430. — R. PEIST., *Beitr. vergl. Anat. Sab.*, 25. — *Bot. Mag.*, t. 6274.

2. In *Bot. Zeit.* (1879), 147. — B. H., *Gen.*, III, 923, n. 84. — DR., *Pflanzenfam.*, 35.

3. *Chamæropsis* habitu.

4. Pallidis, parvis.

5. Tubulosa, 2-nervi cumque *Polygonorum* ochrea nunc comparata.

6. Spec. 1. *N. Ritchiana* WENDL. F. — AITCHIS., in *Journ. Linn. Soc.*, XIX, 140, 141, 187, t. 26. — BECC. et HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 429. — *Bull. Soc. tosc. ortic.* (1887), t. 3. — *Chamærops Ritchiana* GRIFF., in *Calc. Journ. Nat. Hist.*, V, 342; *Palms brit. Ind.*, 135. — BRAND., *For. Fl.*, 547. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 252. — BOISS., *Fl. or.*, V, 47, n. 2. — *Gardn. Chron.* (1886), 652, fig. 128, 129.

6. **Rhapidophyllum** WENDL. F. et DR.¹ — Flores (*Chamæropsis*) hermaphroditi v. polygami; sepalis 3, ovatis, basi connatis, ima basi gibbis crassioribus. Petala 3, rotundato-ovata imbricata, basi inter se et cum staminibus connata. Stamina 6, quorum 3 imis petalis inserta; filamentis late subulatis; antheris introrsis basifixis versatilibus; loculis basi liberis. Carpella 3 (raro 4-6), libera, demum lanata; stylis parvis recurvis; ovulo in singulis erecto; micropyle extrorsa. Fructus carpella drupacea 1-3, stylo terminata, lana detergibili undique induta; pericarpio tenuiter fibroso; endocarpio crustaceo. Semen erectum; hilo lato; raphe lata haud ramosa; albumine æquabili duro; embryone ad medium dorsali. — Humilis armata; caudice brevi repente sobolifero v. erecto vaginis vetustis spinisque longis oblecto. Folia terminalia orbicularia profunde inæquiplicata fissaque, subtus argentea; segmentis induplicatis integris v. 2-4-fidis; ligula brevi obtusa; petiolo margine dentato, subtus floccoso; vaginæ fibris intertextis v. crispis. Spadices interfoliacei breviter pedunculati compositi ramosi; floribus² ad ramos sessilibus. Spathæ 2-5, tubulosæ compressæ completæ floccosæ, 2-fidæ. Bractea sub flore quoque bracteolæque minutæ 2. (*Florida et Carolina austr.*³)

7. **Acanthorhiza** WENDL. F.⁴ — Flores hermaphroditi v. polygami; calyce cupulari, basi carnoso; lobis 3, oblongis obtusis. Petala 3, orbicularia concava coriacea arcte torta v. imbricata. Stamina 6; filamentis basi 1-adelphis, apice subulato liberis exsertis; antheris oblongis supra basin dorsifixis; loculis parallelis, ima basi liberis, introrsum rimosis. Carpella 3, alternipetala libera; stylis longis erectis, apice stigmatoso crassiusculis; ovulo adscendente 1; micropyle extrorsa. Fructus « baccatus depresso-globosus in vértice breviter umbonatus parce carnosus. Semen globosum; albumine osseo æquabili. » — Inermes; caudice mediocri robusto vaginis vetustis obsito basique radicibus aeriis obliquis composito-spinescentibus onusto. Folia terminalia; limbo palminervi, ambitu orbiculari; segmentis cuneiformibus plicatis, profunde 3-∞-fidis, subtus glaucescentibus; petiolo ad margines lævi; vagina fibrosa brevi. Spadices interfoliacei 3-plicato-ramosi; floribus ad ramos subsessilibus soli-

1. In *Bot. Zeit.* (1876), 803. — B. H., *Gen.*, III, 925, n. 87. — DR., *Pflanzenfam.*, 33.

2. *Croceis*, minutis.

3. Spec. 1. *R. Hystrix* WENDL. F. et DR. — *Chamærops Hystrix* FRAS. — MART., *Hist. nat.*

Palm., 250, t. 125, fig. 4. — CHAPM., *Fl. S. Un.-St.*, 439.

4. In *Bot. Zeit.* (1879), 147. — B. H., *Gen.*, III, 925, n. 88. — WENDL. F. et DR., *Pflanzenfam.*, 33, fig. 24, A.

tariis; bracteis minutis; bracteolis setaceis deciduis. Spathæ ad ramorum basin longæ coriaceæ deciduæ. (*America trop. et centr. utraque*¹.)

8. **Rhapis** L. F.² — Flores polygamo-diœci; masculorum calyce cupulari, 3-dentato v. 3-lobo, valvato. Corolla nunc basi clavata 3-loba; lobis ovato-acutis valvatis. Stamina 6; filamentis aut brevibus subliberis, aut longis, corollæ plus minus alte adnatis, apice liberis; antherarum dorsifixarum brevium demum versatiliū loculis extrorsum rimosis. Germen rudimentarium minutum, 3-lobum v. 0. Floris fœminei calyx fere ut in mare. Petala latiora valvata. Staminodia 3-6, nunc fertilia. Carpella 3, libera, receptaculo longiusculo inserta, dorso convexa, in stylum brevem desinentia; ovulo adscendente. Fructus carpella 1-3, obovoidea, stylo coronata carnosā, intus fibrosa. Semen ventre excavatum; cavitate spongioso-farcta; hilo subbasilari v. ventrali; albumine æquabili; embryone dorsali. — Humiles inerme; caudicibus dense cæspitosis arundinaceis, vaginarum vestigiis obtectis. Folia alterna inter nervos irregulariter 3-∞-partita; segmentis ellipticis v. cuneatis, integris, dentatis v. fissis, 3-∞-nerviis; ligula brevi; petiolo lævi v. serrulato; vagina longa retiformi. Spadices breves interfoliacei; rhachi vaginata; ramis patentibus ramulosis; spathis membranaceis incompletis 2, 3; floribus³ sessilibus solitariis, 1-bracteatis. (*China, Japonia. Sund*⁴.)

9. **Corypha** L.⁵ — Flores (fere *Rhapidis*) hermaphroditi; calyce breviter cupulari, 3-dentato v. 3-lobo. Petala 3, majora, basi stipite solido contracto connata, ovato-acuta, leviter imbricata. Stamina 6; filamentis dilatato-subulatis v. compressis; oppositipetalis majoribus; antheris dorsifixis cordato-ovatis versatilibus; loculis inferne divergentibus, introrsum rimosis. Germen liberum, ovoideo-3-gonum,

1. Spec. 3, 4. MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 252 (*Chamærops*); *Palm. Orbign.*, 45, t. 8, fig. 1; 25, fig. B (*Trinax*?). — DR., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 554, t. 132, 133. — FRIEDR., in *Act. H. petrop.*, VII, 535. — *Ill. hort.*, XXVI, t. 367. — HENSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 411. — R. PRIST., *Beitr. vergl. Anat. Sab.*, 34. — *Bot. Mag.*, t. 7302.

2. In *Ait. H. kew.*, III, 473 (1789). — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 253, t. 144. — ENDL., *Gen.*, n. 1761. — K., *Enum.*, III, 251. — B. H., *Gen.*, III, 930, n. 99. — DR., *Pflansensam.*, 33.

3. Jaunâtres, petites.

4. Spec. 5. LHER., *St.*, II, t. 100. — JACQ., *H. schænbr.*, t. 316. — MART., *Progr.*, 8. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 61. — FR. et SAV., *En. pl. jap.*, II, 2. — R. PRIST., *Beitr. vergl. Anat. Sab.*, 29. — *Bot. Mag.*, t. 1371.

5. *Gen.*, ed. I, n. 888; ed. VI, n. 1221. — J., *Gen.*, 39 (part.). — CÆRTN., *Fruct.*, I, t. 7. — LAMK., *Ill.*, t. 899. — ENDL., *Gen.*, n. 1753. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 231, 318, t. 108, 127. — K., *Enum.*, III, 235. — B. H., *Gen.*, III, 922, n. 81. — DR., *Pflansensam.*, 34, fig. 26. — *Taliera* MART., *Progr.*, 10. — *Gembanga Bl.*, in *Flora* (1825), 580, 678.

3-lobum; stylo conico v. subulato, apice stigmatoso simplici v. 3-dentato. Ovula in loculis solitaria adscendentia; micropyle extrorsum infera. Fructus carpella 1-3, sphaerica carnosae; stylo demum basilari. Semen sphaericum v. oblongum erectum; rapheos ramis ab hilo basilari divergentibus moxque ad embryonem convergentibus; albumine aequabili, cavo v. pleno. — Elatae inermes, 1-carpicae; caudice robusto annulato; foliis orbicularibus magnis, flabellatim ad medium limbum fissis; segmentis lanceolatis induplicatis; rhachi 0; ligula parva; petiolo robusto longo spinoso-marginato; vagina fissa. Inflorescentia terminalis pyramidalis (nunc ingens) ramosissima; spathis tubulosis pluribus axes vaginantibus; bracteis minutis; floribus¹ ad ramos crebris sessilibus v. breviter pedicellatis. (*Asia trop.*, *Malaisia*².)

10. **Sabal** ADANS.³ — Flores (fere *Coryphæ*) hermaphroditi; calycis cupularis brevis lobis saepe inaequalibus, leviter imbricatis. Corollae longioris gamopetalae tubus brevis; lobis ovato-acutis, nisi apice valvato imbricatis. Stamina 6, 1-adelpha; oppositipetala saepe majora; filamentis basi dilatata inter se et cum ima corolla connatis, apice subulatis; antheris dorsifixis cordato-ovatis; loculis basi liberis, introrsum rimosis. Germen 3-gonum, 3-loculare; stylo valido 3-gono, ad apicem stigmatosum obtusum attenuato. Ovulum in loculo quoque suberectum; micropyle extrorsum supera. Fructus carpella 1-3, sphaerica⁴, saepe inaequalia carnosae; stylo demum subbasilari; epicarpio membranaceo soluto. Semina depresso sphaerica; hilo basilari; albumine corneo aequabili; fossa basilari intrusa, intus spongiosa rugoso-marginata; embryone dorsali. — Inermes, elatae, humiles v. subacaules; caudicis saepe robusti annulati superneque vaginis onusti basi recurva adscendente eque solo exserta. Folia terminalia flabellata multifida; segmentis linearibus 2-fidis, saepe filiferis, induplicatis; ligula brevi adnata; vagina breviuscula. Spadices magni decompositi ramosi; spathis ad pedunculum ramosque

1. Viridulis, parvis.

2. Spec. ad 6. ROXB., *Pl. corom.*, t. 255, 256; *Fl. ind.*, II, 174. — BL., *Rumphia*, II, 57, t. 97, 98, 105. — GRIFF., in *Calc. Journ. Nat. Hist.*, V, 314; *Palms brit. Ind.*, III, t. 120, D-F; App., XXIII. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 49. — KURZ, *For. Fl.*, II, 524; in *Journ. As. Soc. beng.*, XLIII, II, 197, t. 15. — WERDL. F. et DR., in *Linnaea*, XXXIX, 226. — THW., *En. pl.*

Zeyl., 329. — BRAND., *For. Fl.*, 549. — BECC., in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 428. — R. PRIST., *Beitr. vergl. Anat. Sab.*, 27.

3. *Fam. des pl.*, II, 496. — ENDL., *Gen.*, n. 1758. — K., *Enum.*, III, 245 (part.). — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 245 (part.). — B. H., *Gen.*, III, 922, n. 82. — DR., *Pflanzenfam.*, 37, fig. 24, J.

4. Saepius nigricantia nitida.

vaginantibus tubulosis, ore obliquis; bracteis bracteolisque minutis; floribus¹ basi truncata v. foveolata articulatis sessilibus. (*America trop. et subtrop. utraque*².)

11. **Teyssmannia** REICH. F. et ZOLL.³ — Flores hermaphroditi; calyce cupulari, basi carnosulo, apice 3-dentato. Petala 3, basi lata, 3-angulari-lanceolata crassa valvata. Stamina 6; filamentis subulatis, basi 1-adelphis; antheris basifixis ovatis. Carpella 1-3, libera; stylis subulato-3-gonis, apice punctiformi stigmatosis; ovulo adscendente. Fructus depresso-sphæricus, 1-spermus; pericarpio corticato tessellatim verrucoso; verrucis pyramidatis, 3-6-gonis; stylo cum carpellis abortivis 2 basilari. Semen depresso-sphæricum erectum rugulosum; hilo basilari; raphe brevi; albumine æquabili, ventre intruso; fossa intus spongiosa farcta; embryone laterali. — Humilis inermis; caudice rhizomatiformi annulato, superne aërio. Folia basilaria erecta elongato-rhombea obtusa, basi attenuata, valde plicata, ad margines laciniata; laciniis obtuse 2-fidis; petiolo extus carinato et ad margines uncinato-aculeato; vagina brevi. Spadices interfoliacei breves; pedunculo fusco-tomentoso; ramis paucis basi divisim superneque reflexis; floribus ad ramulos solitariis v. glomerulatis, bracteatis, 2-bracteolatis. Spathæ coriaceæ vaginantes: inferiores 2-seriatim equitantes; superiores autem sparsæ. (*Malais. penins., Sumatra*⁴.)

12. **Serenæa** Hook. F.⁵ — Flores (fere *Coryphæ*) hermaphroditi; calyce cupulari, 3-fido. Corolla multo longior, basi cupulari gamopetalâ; lobis oblongo-acutis valvatis. Stamina 6; filamentis basi dilatata in cupulam corollæ tubo adnatam connatis, mox liberis longe subulatis; antheris ellipsoideis dorsifixis versatilibus, introrsum rimosis. Carpella 3, alternipetala libera; singulorum germine intus 3-gono, 1-ovulato; stylo longe subulato erecto cum cæteris coalito. Ovulum erectum; micropyle extrorsum infera. — Fructus ovoideus stylo apiculatus; pericarpio crasse carnosulo intusque parce fibroso. Semen

1. Albidis v. viridulis, parvis.

2. Spec. 6, 7. GUERS., in *Bull. Soc. philom.*, III, 205, t. 25. — JACQ., *H. vindob.*, III, t. 8. — CHAPM., *Fl. S. Un.-St.*, 438 (part.). — GRISEB., *Fl. brit. W.-Ind.*, 514. — KARST., *Fl. columb.*, II, 137, t. 172 (*Trithrinax*). — R. PFIST., *Beitr. vergl. Anat. Sab.*, 40.

3. In *Linnaea*, XXVIII, 657 (*Teyssmannia*). — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 749; in *Ann. Mus.*

lugd.-bat., IV, 89, t. 2, 3. — B. H., *Gen.*, III, 924, n. 85. — DR., *Pflanzenfam.*, 37.

4. Spec. 1. *T. allifrons* REICH. F. et ZOLL. — BECC., in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 483. — R. PFIST., *Beitr. vergl. Anat. Sab.*, 27. — RIDL., in *Trans. Linn. Soc.*, ser. II, Bot., III, 392 (*Daun-Payot*).

5. *Gen.*, III, 926, n. 91. — DR., *Pflanzenfam.*, 37.

erectum oblongum teres, ventre planiusculum; hilo basilari; raphe crassa ventrali; albumine æquabili; embryone versus basin dorsali. — Humilis inermis cæspitosa repens; caudice rete vaginali inferne induto. Folia terminalia plicato-multifida (*Chamæropis*); segmentis 2-fidis; ligula brevi; petiolo ad margines dentato. Spadices interfoliacei ramosissimi tomentosi; rhachi flexuosa vaginis tubulosis fissis ramis patentibus; spathis pluribus vaginantibus; floribus¹ sessilibus crebris bracteatis et 2-bracteolatis. (*Florida, Carolina*².)

13. **Colpotherinax** GRISEB. et WENDL. F.³ — Flores hermaphroditi; calyce tubuloso-campanulato, ore 3-dentato. Corollæ gamopetalæ tubus cylindraceus coriaceus persistens; limbi lobis 3, ovato-acutiusculis valvatis coriaceis deciduis. Stamina 6; filamentis 3-angulari-subulatis, basi in coronam corollæ adnatam connatis; antheris dorsifixis oblongis; loculis linearibus, apice basique liberis, introrsum rimosis. Germinis obovoideo-trapezoidei carpella libera 3, vertice exsculpta et in stylos crassos erectos attenuata; apice stigmatoso punctiformi; ovulo in germinibus singulis 1, erecto; micropyle extrorsa. Fructus⁴ carpellum 1, drupaceum sphæricum, stylo terminatum, carnosum intusque parce fibrosum; endocarpio crustaceo. Semen erectum sphæricum; hilo basilari; raphe ventrali verticali incrassata lobulata; albumine æquabili; embryone ad medium dorsali. — Inermis; foliis terminalibus flabellatim plicato-∞-fidis; segmentis crebris rigidis longe acuminatis induplicato-2-fidis; nervis ∞; rhachi longa; ligula libera semi-circulari. Spadices interfoliacei breves decurvi, sub-2-plicato-ramosi; ramis validis patentibus; inferioribus basi ramulosis; floribus⁵ in tuberculis ramorum sessilibus sparsis solitariis, minute bracteatis. Spathæ plures coriaceæ fuscato-furfuracæ; inferiore magna ad basin fissâ; superiore autem tubulosa superneque fissâ. (*Cuba*⁶.)

14? **Cryosophila** BL.⁷ — Flores polygami (fere *Sabal*is), « calyce 3-partito; laciniis lanceolatis. Corollæ 3-fidæ laciniæ ovatæ. Stamina 6

1. Albis, parvis.

2. Spec. 1. *S. serrulata* HOOK. F. — *Chamærops serrulata* MICHX., *Fl. bor.-amer.*, I, 239. — PURSH, *Fl. Amer. sept.*, I, 239. — *Sabal serrulata* ROEM. et SCH. — K., *Enum.*, III, 246. — CHAPM., *Fl. S. Un.-St.*, 438.

3. In *Bot. Zeit.* (1879), 147. — B. H., *Gen.*, III, 927, n. 92. — DR., *Pflanzenfam.*, 33.

4. Cerasi æqualis.

5. Majusculis.

6. Spec. 1, male nota. *C. Wrightii* GRISEB. et WENDL. F. — R. PFIST., *Beitr. vergl. Anat. Sab.*, 49, t. 1, fig. 4.

7. In *Lindl. Veg. Kingd.*, 139. — WENDL. F., in *Kerch. Palm.*, 242. — B. H., *Gen.*, III, 928 (*Cryosophila*). — DR., *Pflanzenfam.*, 37.

(in flore fœmineo 0). Stylus 3-queter; ramis stigmatosis androcæo longioribus 3. Baccæ sphaericæ¹; semine 1, extus venoso. — Brevis² gracilis inermis; caudice extus dædaleo-venoso; foliis digitato-multifidis, ad margines filamentosis, subtus albidis. Spathæ imbricatæ 3, 4, obovatæ inermes, extus tomentosæ. Spadices ramosi breves³; floribus arcte spicatis. (*Mexicum*⁴.) »

15. *Brahea* MART.⁵ — Flores hermaphroditi; sepalis 3, brevibus suborbicularibus, basi nunc gibbis, imbricatis. Petala longiora ovata crassiuscula valvata, nunc basi carinata. Stamina 6; filamentis subulatis, basi dilatata in cupulam corollæ adnatam connatis; antheris dorsifixis brevibus; loculis basi liberis, introrsum rimosis. Carpella 3, libera approximata; stylo terminali anguste conico, intus sulcato; marginibus superne stigmatosis. Ovulum erectum; micropyle extrorsa. Fructus carpella 1-3, compressiuscula, oblique ellipsoidea puberula, stylo coronata, lateraliter carinata; exocarpio tenuiter carnosio; endocarpio crustaceo. Semen erectum, sulco ventrali intruso exaratum; albumine æquabili corneo; embryone ad medium dorsali. — Inermes; caudice superne vaginarum reliquiis tecto, inferne annulato. Folia subpeltatim orbicularia, flabellatim plicata et ad medium fissa; laciniis 2-fidis induplicatis, filis interjectis; rhachi brevi; ligula sub-3-angulari; petiolo ad margines subdentato; vagina fibrosa. Spadices interfoliacei penduli elongati composite ramosissimi; ramulis ultimis longe vermiformibus rigidis dense velutinis; spathis in pedunculo pluribus elongatis coriaceis glabris fissis; floribus ramulo minoribus indumento immersis, sessilibus, minute bracteatis bracteolatisque. (*America mont. orient. utraque*⁶.)

16? *Erythea* S.-WATS.⁷ — Flores fere *Braheæ* (v. *Coperniciæ*?) « hermaphroditi; calyce cupulari, 3-lobo. Corollæ late campanulatæ lobi late ovato-acuti valvati. Stamina 6, faucis inserta; filamentis brevibus, basi in anulum connatis; antheris dorsifixis cordato-

1. « Virides glabræ semi-pollicares. »

2. « Caudex 1, 2-orgyalis. »

3. « 3, 4-pollicares. »

4. Spec. 1, male nota. *C. nana* DR. — *Corypha? nana* H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, I, 240. — K., *Enum.*, III, 237. — ? LIEBM., *Herb. mexic.*

5. *Hist. nat. Palm.*, III, 243, 319, t. 137, 162. — ENDL., *Gen.*, n. 1756. — K., *Enum.*, III, 244. — WENDL. F., in *Bot. Zeit.* (1879),

147. — B. H., *Gen.*, III, 926, n. 90. — DR., *Pflanzenfam.*, 36.

6. Spec. ad 3. H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, I, 300; *Syn.*, 302 (*Corypha*). — RÖHM. et SCHULT., *Syst.*, VII, 1311 (*Corypha*). — R. PFIST., *Beitr. vergl. Anat. Sab.*, 32 (part.). — HENSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 411. — WALP., *Ann.*, III, 470; V, 817.

7. *Bot. Calif.*, II, 211, 485. — B. H., *Gen.*, III, 927, n. 93. — DR., *Pflanzenfam.*, 35.

ovatis. Germen obovoideo-3-gonum; carpellis 3, ventre connatis; stylo subulato brevi, 3-canaliculato, apice stigmatoso, 3-dentato. Ovulum basilare. Fructus sphaericus, stylis terminatus; perianthio immutato; pericarpio carnoso, intus molli. Semen erectum liberum¹ sphaericum v. subplano-convexum, ventre sulcatum; sulco materia spongiosa farcto; albumine æquabili corneo; embryone subbasilari. — Inermes; caudice robusto solitario, inferne annulato, superne vaginis vetustis oblecto. Folia terminalia, juniora tomentosa, orbicularia, flagellatim ∞-fida; segmentis induplicatis, apice laceris; filis interjectis; rhachi brevi; ligula longa; petiolo longo, ad margines nudo v. spinescente. Spadices interfoliacei longi (albo-tomentosi) decomposite ramosi; floribus² in ramis robustis solitariis v. glomerulatis, bracteatis et 2-bracteolatis. Spathæ plures pedunculum vaginantes coriaceæ dense tomentosæ; bracteis bracteolisque distinctis³. » (*California austr.*⁴)

17. **Thrinax** L. f.⁵ — Flores (fere *Braheæ*) hermaphroditi; sepalis 3 petalisque totidem basi in cupulam brevem connatis, cæterum liberis acutatis, post anthesin immutatis. Stamina 6-∞, imo perianthio inserta; filamentis subulatis, v. (*Hemithrinax*⁶) subnullis, ima basi plerumque connatis; antheris oblongis basifixis v. ad basin dorsifixis; loculis basi v. utrinque liberis, ad margines rimosis. Germen superum, 1-loculare; stylo tenui, apice stigmatoso plus minus oblique infundibulari-dilatato. Ovulum 1, erectum anatropum⁷. Fructus pisiformis, styli basi apiculatus; pericarpio tenui indehiscente. Semen erectum liberum sulcatum; rapheos ramis in sulcis nidulantibus; albumine corneo æquabili v. parce ruminato; embryone subapicali. — Humiles v. mediocres inermes; caudicibus solitariis v. cæspitosis, inferne annulatis, altius vaginatis; foliis orbicularibus v. subreniformibus, flabellatim plicato-∞-fidis; laciniis induplicatis, 2-fidis; rhachi brevi v. 0; ligula libera concava; petiolo utrinque convexo; vagina sæpe pulchre retiformi. Spadices interfoliacei longi; rhachi vaginis vestita; ramis alternis ramulosis; spathis pluribus fissis coriaceis v. papyraceis et spadiceis pedunculo communi insertis;

1. In *E. eduli* pericarpio adhærens.

2. Pallidis, parvis.

3. An sat a *Copernicia* distinctum? (B. H.).

4. Spec. 2, male notæ. R. PFIST., *Beitr. vergl. Anat. Sab.*, 32 (*Brahea*).

5. In *Sw. Prodr. Fl. ind. occid.*, 57; *Fl.*,

613, t. 13. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 254, 320, t. 103, 163. — ENDL., *Gen.*, n. 1762.

— K., *Enum.*, III, 252. — B. H., *Gen.*, III, 930, n. 100. — DR., *Pflanzenfam.*, 34, fig. 24, G.

6. Hook. f., *Gen.*, III, 930, n. 101.

7. Micropyle extorsum infera v. sublaterali.

pedicellis basi bracteatis, ad apicem articulatis; bracteolis minutis v. 0. (*Antillæ, Florida*¹.)

18. **Trithrinax** MART.² — Flores (fere *Thrinaxis*) hermaphroditi; calyce plus minus alte gamophyllo, 3-dentato v. 3-fido, basi carnosulo. Petala 3, erecta, sæpe lata, arcte imbricata. Stamina hypogyna 6; filamentis subulatis v. basi latiusculis, ibi nunc connatis, apice exsertis; antheris dorsifixis versatilibus; loculis basi liberis, introrsum rimosis. Carpella 3, libera; germinibus brevibus; ovulo adscendente v. suberecto; micropyle extrorsum infera; stylis gracilibus elongatis, nunc recurvis, apice stigmatoso oblique capitatis. Fructus baccatus, stylo apiculatus, 1-spermus. Semen adscendens; « albumine æquali (?) ; embryone ad verticem dorsali ». — Inermes; caudice mediocri v. brevissimo cicatricibus notato. Folia terminalia, ambitu orbicularia v. ovata flabellato- ∞ -fida; laciniis lanceolato-acuminatis induplicatis, 2-fidis; petiolo 2-convexo, marginibus acutatis integro; ligula rigida cordata; vagina fibrosa sæpius spinis erectis reflexisve horrida. Spadices interfoliacei, 3-plicato-ramosi; floribus ad ramulos subsessilibus solitariis; pedunculi crassi ramis flexuosis; bracteis minutis v. 0. Spathæ in pedunculo plures oblongæ et oblique fissæ; superiores oblique truncatæ ocreiformes. (*Brasilia, Argentina, Chili*³.)

19. **Copernicia** MART.⁴ — Flores (fere *Trithrinaxis*) hermaphroditi; calycis breviter campanulati v. cupularis coriacei lobis 3, imbricatis, demum recurvis. Corolla campanulata, late basi obconica gamophylla; lobis ovato-acutis crassiusculis valvatis, demum patentibus. Stamina 6, fauci corollæ in coronam v. anulum disciformem affixa; filamentis mox liberis, brevibus rectis v. longiusculis arcuatis subulatis; oppositipetalis longioribus; antheris brevibus v. ellipticis,

1. Spec. ad 9. LAMK, *Dict.*, VII, 135. — LODD., in *Ræm. et Schult. Syst.*, VII, 1301. — GRISEB., *Cat. pl. cub.*, 221. — DESF., *Cat. II. par.*, ed. III, 31 (part.). — HEMS., *Bot. centr.-amer.*, III, 412. — R. PFIST., *Beitr. vergl. Anat. Sab.*, 35. — *Bot. Mag.*, t. 7088. — WALP., *Ann.*, V, 819. — *Chamathrinax Hooke-riana* WENDL. F., c R. PFIST., loc. cit., 46, 50, nomine tantum notum est.

2. *Hist. nat. Palm.*, III, 149, 247, 320; *Palm. Orbign.*, 43, t. 10; 25, A (part.). — K., *Enum.*, III, 247. — SPACH, *Suit. à Buff.*, XII, 62. — B. H., *Gen.*, III, 925, n. 89. — DR.,

Pflanzenfam., 34, fig. 24, B. — *Diodosperma* WENDL. F., in *Bot. Zeit.*, XXXVI, 117.

3. Spec. ad 4. MART., *Palm. Orbign.*, t. 10, fig. 1. — BURNEIST., *Reis. Plat. Staat.*, II, 48, 49, 98 (*Copernicia*). — GRISEB., *Pl. Lorentz.*, 200 (*Copernicia*); *Symb. Fl. argent.*, 283. — DR., in *Gartenfl.* (1878), 361, t. 959. — KERCH., *Palm.*, t. 26; *Fl. bras.*, III, 11, 549. — R. PFIST., *Beitr. vergl. Anat. Sab.*, 45.

4. *Hist. nat. Palm.*, II, 56, t. 49, 50; 51, fig. 5; III, 242, 319. — K., *Enum.*, III, 242. — ENDL., *Gen.*, n. 1757. — B. H., *Gen.*, III, 927, n. 94. — DR., *Pflanzenfam.*, 37, fig. 24, C.

suborbicularibus, ovatis v. ellipsoideis, introrsum rimosis. Gynæcei carpella 3, imæ corollæ affixa; germinibus liberis contiguis; stylo brevi v. longiusculo subulato, apice 3-denticulato, longitudinaliter 3-sulco. Ovulum in germine quoque 1, adscendens suberectum; micropyle extrorsum infera. Fructus sphæricus v. ellipsoideus, coriaceus v. carnosus, apice cicatrice styli notatus v. varie exsculptus. Semen suberectum liberum v. endocarpio adhærens, ventre nunc sulcatum; rapheos ramis laxis descendentes, nunc parum conspicuis; albumine corneo v. carnosus, æquabili v. parce ruminato; embryone subbasilari. — Inermes; caudice robusto, superne vaginarum vestigiis notato. Folia orbicularia flabellata multifida plicata; laciniis integris v. laceris, nunc filiferis; petioli validi marginibus spinosis v. lævibus; vagina nunc apice 2-auriculata. Spadices elongati, glabri v. tomentosi; spathis vaginantibus pluribus, nunc incompletis, sæpe tomentosis; bracteis bracteolisque distinctis; floribus¹ in ramis sessilibus, solitariis v. glomeratis. (*America trop. utraque*².)

20. **Pritchardia** SEEM. et WENDL. F.³ — Flores hermaphroditi; calyce gamophyllo cylindraceo nervato, 3-lobo v. 3-dentato. Corolla multo longior; tubo campanulato crasso; lobis ovato-oblongis acutis striatis valvatis, mox a tubo solutis. Stamina 6, e corollæ fauce libera; filamentis erectis subulatis; antheris ad basin dorsifixis, lineari-oblongis conniventibus; loculis basi liberis, introrsum rimosis. Germen imo tubo inclusum liberum, 3-gonum v. 3-lobum, apice conico induratum; loculis inferioribus 3; ovulo in singulis subbasilari. Stylus longe angustequ pyramidato-3-gonus, erectus rigidus; angulis prominulis linearibus stigmatosis. Fructus sphæricus v. ellipsoideus, stylo terminatus, fibrosus; endocarpio tenui. Semen erectum sphæricum; raphe parum conspicua; albumine solido æquabili; embryone supra basin dorsali. — Inermes elatæ; caudice solitario annulato, superne vaginis oblecto. Folia ampla, orbicularia v. cuneata, haud profunde plicato-∞-fida; segmentis angustis induplicato-2-fidis, margine filiferis, sæpe albido-furfuraceis; ligula brevi;

1. Lutescentibus, parvis.

2. Spec. ad 6. FAHLB., in *Vetersk. Handl.* (1793), 194 (ex MART.). — H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, I, 298 (*Corypha*). — RÖEM. et SCHULT., *Syst.*, VII, 1311 (*Corypha*). — GRISEB., *Fl. brit. W.-Ind.*, 514; *Cat. pl. cub.*, 220; *Symb. Fl. argent.*, 283. — DR., *Fl. bras.*, III, 11, 545, t. 128. — HEMS., *Bot. centr.-amer.*, III, 411. —

R. PFIST., *Beitr. vergl. Anat. Sab.*, 42. — WALP., *Ann.*, V, 817.

3. In *Donplandia*, IX, 260; X, 197, 310, t. 15 (non UNG.). — B. H., *Gen.*, III, 928, n. 95. — DR., *Pflanzenfam.*, 35. — *Washingtonia* WENDL. F. et DR., in *Bot. Zeit.* (1879), 68. — B. H., *Gen.*, III, 923, n. 83 (non WINSL.). — O. K., *Revis.*, 737.

petiolo inermi; vagina brevi. Spadices interfoliacei pedunculati; ramis ramulisque adscendentibus; rhachi vaginata; spathis coriaceis amplis, basi tubulosis, superne fissis, sæpe argentato-furfuraceis; floribus¹ in ramulis sessilibus solitariis. (*Ins. Sandwic. et Amicorum, America austro-occid.*²)

21. *Licuala* RUMPH.³ — Flores hermaphroditi; calyce cupulari, turbinato v. tubuloso, subintegro, 3-fido crenatove. Corolla gamopetala, e basi plus minus longe obconica profunde 3-loba; lobis valvatis, demum patentibus ovato-acutis crassis valvatis. Stamina 6; filamentis corollæ tubo adnatis, aut basi connatis, aut annulum fauci adnatum formantibus, superne liberis tenuibus v. crassis compressis; antheræ dorsifixæ oblongæ v. cordatæ loculis parallelis, introrsum rimosis. Germina 3, alternipetala, imo tubo corollæ affixa totumque eum implentia, vertice truncata exsculpta v. torulosa, ventre diu cohærentia. Stylus apicalis longe subulatus, 3-sulcus, 3-gonus, apice stigmatoso tubuloso minute 3-dentatus. Ovula in imis germinibus erecta anatropa. Carpella matura solitaria, sphærica, ellipsoidea v. obovoidea; stylo apicali; pericarpio drupaceo; putamine coriaceo v. crustaceo. Semen liberum sphæricum læve erectum, ventre perfossum; hilo basilari; albumine corneo; embryone dorsali. — Frutescentes humiles; caudicibus solitariis v. cæspitosis annulatis vaginisque sæpius tectis. Folia flabellatim in lacinias cuneatas, plicatas, laceras v. lobatas inæqui-fissa; rhachi brevissima; ligula brevi v. 0; petiolo inermi v. ad margines spinescente; vagina fibrosa; floribus⁴ in spadices graciles glabros v. furfuraceos dispositis; spathis pluribus vaginantibus, ore 2-fidis, persistentibus coriaceis; ramis flores ∞ , aut solitarios, aut 2, 3-nos sessiles v. pedunculatos, gerentibus. (*Asia et Oceania trop.*⁵)

1. Albidis, pro serie majusculis.

2. Spec. 7, 8. FORST., *Pl. esc.*, 49; *Prodr.*, n. 48 (*Corypha*). — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 242 (*Livistona*, n. 7, 8). — GAUDICH., *Voy. Bonite Bot.*, t. 58, 59 (*Livistona*?). — SEEM., *Fl. vit.*, 273, t. 79. — H. MANN., in *Proc. Amer. Acad.*, VII, 204. — FENZL., in *Bull. Soc. tosc. ori.*, I, 116, c. ic. — SEEM., *Fl. vit.*, 273, t. 79. — S.-WATS., *Bot. Calif.*, II, 211, 485 (*Washingtonia*). — DRAKE, *Fl. Polyn. fr.*, 231. — BECC., *Males.*, III, 281, t. 37, 38. — HILLEBR., *Fl. haw.*, 450. — R. PFIST., *Beitr. v. Anat. Sab.*, 16, 30; 17, 31 (*Washingtonia*).

3. Ex WURMB., in *Verh. Bot. Gen.*, II, ed. II,

285 (1780). — THUNB., in *Act. holm.* (1782), 84. — J., *Gen.*, 39. — GÆRTN., *Fruct.*, II, t. 139. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 234, t. 134, 135, 162. — ENDL., *Gen.*, n. 1755. — K., *Enum.*, III, 238. — B. H., *Gen.*, III, 928, n. 96. — DR., *Pflanzenfam.*, 35, fig. 24, E, F. — *Pericyla* BL., *Rumphia*, II, 47, t. 94.

4. Parvis v. nunc semipollicaribus.

5. Spec. ad 35. LAMK., *Dict.*, II, 131 (*Corypha*). — BL., *Rumphia*, II, 37, t. 82, 88-93. — GRIFF., in *Calc. Journ. Nat. Hist.*, V, 321; *Palms brit. Ind.*, 117, t. 221, A-C; 222, A, B; 223, A, B; 225. — KURZ., *For. Fl.*, II, 527. — BECC., *Males.*, I, 80; III, 69, t. 6-8; in *Hook.*

22. *Nipa* WURMB.¹ — Flores² monœci; masculorum perianthio tubuliformi; sepalis petalisque alternis liberis conniventibus lineari-cuneatis, apice truncato inflexis, valvatis v. leviter imbricatis. Stamina 3, centraliam in columnam cylindraceam erecta, 1-adelpha; antheris lineari-elongatis in summa columna erectis linearibus, apice solo liberis; loculis adnatis parallelis, extrorsum rimosis³. Floris fœminei masculo multo majoris perianthium rudimentarium; foliolis dissitis 6. Carpella 3, libera. obovoideo-cuneata, intus pressione mutua angulata, apice curvo-pyramidata ibique intus sulco stigmatoso exarata. Ovulum in germine quoque 1, erectum (v. 2?). Fructus carpella magna in syncarpium sphæricum⁴ conferta, inæqui-obovoidea compressa, obtuse 6-gona, superne pyramidata; pericarpio crasso carnosodenseque fibroso; endocarpio spongioso venoso farinoso, hinc longitudinaliter angulato v. carinato; carina intrusa semenque intus sulcatum penetrante. Semen erectum; hilo lato basilari; integumento exteriore coriaceo intusque endocarpio arcte adhærente; rapheos latæ incompletæ ramis circa semen arcuatis; albumine cavo corneo æquabili; embryone obconico basilari. — Humilis inermis; caudicibus horizontalibus v. obliquis robustis radicanibus vaginisque vetustis obtectis. Folia terminalia pinnatisecta; segmentis acuminato-lanceolatis plicatis, subtus paleaceis; marginibus basi recurvis; petiolo plano-convexo; vagina brevi. Spadices inter folia summa terminales, mox nutantes; spathis pluribus vaginantibus; supremis cucullatis; floribus fœmineis in capitulum spurium spadicem terminantem congestis bracteatis bracteolatisque; masculis autem lateraliter in spatharum superiorum axillis amentaceis; bracteis lineari-setiformibus intermixtis ∞ . (*Asia et Oceania trop.*⁵)

f. *Fl. brit. Ind.*, VI, 430. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 51; Suppl., 254, 591; *Palm. Arch. Ind.*, 10; *Pl. Jungh.*, 163. — BENTH., *Fl. austral.*, VII, 144. — WENDL. F. et DR., in *Linnaea*, XXXIX, 191, t. 3, fig. 2. — DR., in *Bot. Zeit.* (1877), 638, t. 6, fig. 36-38. — RIDL., in *Trans. Linn. Soc.*, ser. II, *Bot.*, III, 391. — R. PRIST., *Beitr. vergl. Anat. Sab.*, 22. — *Bot. Mag.*, t. 6704, 7053. — WALP., *Ann.*, V, 815, 843.

1. In *Verhandl. Batav. Gen.* (1779), I, 349. — THUNB., in *Vet. Ac. n. Handl.* (1782), 234; *Nov. gen.*, V, 91. — J., *Gen.*, 38. — LABILL., in *Mém. Mus.*, V, 297, t. 21, 22. — LAMK., III, t. 897. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 305, t. 108, 171, 172, II. — ENDL., *Gen.*, n. 1717. — K., *Enum.*, III, 110, 589. — BL., *Rumphia*, II, 72; III, t. 164, 165. — B. H., *Gen.*, III, 920, n. 78. — DR., *Pflanzenfam.*, 89, fig. 65.

2. Sæpe difformes.

3. Polline subsphærico hispidulo.

4. Humano capiti æquale.

5. Spec. 1. *N. fruticans* THUNB., in *Act. holm.* (1782), 231; *Nov. gen.*, 91. — GAUDICH., *Voy. Bon. Bot.*, t. 67. — ROXB., *Fl. ind.*, III, 650. — SPACH, *Suit. à Buff.*, XII, 30. — LINDL., *Veg. Kingd.*, 132 (*Pandanaceæ*). — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 150. — GRIFF., *Notul.*, III, 168; *Ic. pl. asiat.*, 244. — THW., *En. pl. Zeyl.*, 327. — KURZ, *For. Fl.*, II, 541. — WENDL. F., in *Bot. Zeit.* (1881), 89 (*Borassineæ*). — BECC., in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 424. — WALP., *Ann.*, III, 495; V, 834. — *Cocos Nypa* LOUR., *Fl. cochinch.*, 567. — *Nypa* RUMPH., *Herb. amboin.*, I, 72, t. 16. — BUCH., *Des.*, VIII, t. 8. — *Arbor nipa* VALENT. — *Safa* HARP., *Voy.*, V, IV, 330.

II. BORASSEÆ.

23. **Borassus** L. — Flores dicæci; masculorum in alabastro claviformium sepalis 3, glumaceis cuneiformibus; apice obtuso subtruncato leviterque inflexo; præfloratione imbricata. Petala 3, summo receptaculo ultra calycem obconice producto inserta, longiuscule obovata imbricata, demum patentia. Stamina 6, cum corolla inserta eaque breviora; filamentis subulatis; antheris oblongis basifixis; loculis sub insertione filamenti liberis, introrsum rimosis. Gynæcei rudimentum centrale, apice longe v. breviter 3-lobum; lobis nunc setiformibus v. 0. Floris fœminei masculo multo majoris subsphærici sepala brevialataque crassa obtusa, intus concava arcteque imbricata. Petala conformia 3, sæpe breviora, arcte imbricata v. torta. Staminiodia hypogyna pauca inæqualia. Germen subsphæricum v. subangulatum; loculis 2-4, apice nunc distinctis. Stylus brevis apicalis; lobis stigmatosis recurvis 2-4. Ovulum in loculo quoque 1, anatropum, imo angulo interno insertum; micropyle extrorsum infera. Fructus magnus sphæricus, stylo coronatus; exocarpio carnoso; endocarpium pyrenis 1-4, extus fibrosis, a dorso compressis subobcordatis, osseis, apice pertusis, intus processibus 2 intrusis. Semen (pyreno conforme) oblongum, superne 3-lobum, extus endocarpio adhærens; albumine corneo cavo æquabili; embryone seminis versus apicem carnoso. — Elata inermis; caudice robusto annulato, nunc ad medium v. altius incrassato, sæpius simplici rariusve apice pauciramoso, cicatricibus foliorum annulato. Folia terminalia ample palmato-flabellata plicato- ∞ -fida; segmentis induplicatis, apice 2-fidis; rhachi brevi; ligula rigida brevi; petiolo spinescente; vagina brevi. Spadices interfoliacei ampli simpliciter ramosi, ad ramorum basin spathis incompletis vaginati; masculorum ramis solitariis v. 2, 3-nis crasse cylindræis, bracteis alternis imbricatis ∞ -seriatis foveolas florigeras efficientibus onustis; floribus masculis in foveola quaque 1-pari-cymosis; cyma in receptaculo parvo subreniformi inserta; alabastro uno post alterum a foveola egresso explanatoque; bracteolis imbricatis ∞ ; fœmineis autem in ramo spadicis simpliciusculi robustis alternis; solitariis v. 2-nis bracteisque latis cum sepalis conformibus involutis. (*Africa et Asia trop.*) — *Vid. p. 255.*

24. *Lodoicea* COMMERS.¹ — Flores (fere *Borassi*) diœci; masculorum sepalis 3, elongato-cuneiformibus, apice inflexo truncatis, imbricatis. Petala quam sepalis remote altius receptaculi obconici ad apicem cum androcæo inserta, subspathulata obtusiuscula tenuiter membranacea, apice leviter imbricata; marginibus cæterum haud contiguis. Stamina ad 30; filamentis inæqualibus plus minus polyadelphis subulatis; antheris lineari-elongatis basifixis, apice obtuso nunc recurvis; loculis parallelis, basi liberis, introrsum rimosis. Gynæcei rudimentum parvum v. 0. Floris fœminei subsphærici masculoque multo majoris sepala orbicularia crenulata crasse coriacea late imbricata. Petala minora consimilia imbricata v. torta. Germen ovoideum, styli lobis 2-4 sessilibus coronatum. Ovulum in loculis 2-4 solitarium; micropyle...? Fructus (maximus) oblique obovoideus, 1- v. imperfecte 2, 3-locularis; exocarpio crasso duro carnosulo; endocarpio osseo crasso, extus fibroso, longitudinaliter 3-6-lobo. Semen endocarpio adhærens; integumentis tenuibus; albumine cavo corneo æquabili; embryone basilari sinumque spectante. — Elata robusta inermis; caudice annulato. Folia (ampla) terminalia cordato-ovata palmato-flabellata plicato-∞-fida; laciniis induplicatis; rhachi elongata; petiolo supra concavo marginibusque inermi; vagina brevi demum ad medium fissa. Spadices (pluripedales) interfoliacei e vaginalium fissuris extrusi; masculorum ramis florigeris crasse cylindraceis; bracteis latis brevibus coriaceis arcte imbricatis; floribus in cymam ad bracteas axillarem 1-param dispositis circinatimque evolutis, e bractea uno post alterum exsertis. Flores fœminei in spadicis robusti ramis sparsi, solitarii v. 2-ni, bracteis latissimis cincti. (*Ins. Sechellæ*².)

25. *Latania* COMMERS.³ — Flores (fere *Borassi*) diœci; masculorum obovoideorum receptaculo longiuscule conico. Sepala 3, basi atte-

1. Ex J. S.-H., *Expos.*, I (1805), 96. — LABILL., in *Ann. Mus.*, IX, 140, t. 13 (1807). — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 221, t. 109, 122. — ENDL., *Gen.*, n. 1746. — K., *Enum.*, III, 225. — B. H., *Gen.*, III, 940, n. 117. — DR., *Pflanzenfam.*, 40, fig. 31.

2. Spec. 1. *L. Sonnerati*. — *L. Sechellarum* LABILL. — SPRENG., *Syst.*, II, 622. — HOOK., *Bot. Mag.*, t. 2734-2738. — BAK., *Fl. maurit.*, 379. — SWINB.-WARD, in *Journ. Linn. Soc., Bot.*, VIII, 135; IX, 118. — E.-P. WRIGHT, in *Ann. and Mag. Nat. Hist.* (1868). — *L. Callicypæ* COMMERS., *ms.* — *L. maldivica* PERS.,

Syn., II, 630. — *Coccus de Maldiva* GARC. — CLUS., *Exot.*, 190. — *Coccus maldivicus* s. *Calappa* LAUT RUMPH., *Herb. amboin.*, VI, 210, t. 81. — *Cocos maldivica* GMEL. — *Borassus Sonnerati* GIS., *Præl.* (1792), 86 (*Coco des Maldives, C. de mer* SONNER., *Voy. N.-Guin.*, I, 3-10, t. 3-7, *Cul-de-Négresse*).

3. J., *Gen.*, 39. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 223, t. 148, fig. 4; 154; 161, t. 2. — SPACH, *Suit. à Buff.*, XII, 62. — ENDL., *Gen.*, n. 1747. — B. H., *Gen.*, III, 940, n. 118. — DR., *Pflanzenfam.*, 30. — *Cleophora* GÆRTN., *Fruct.*, II, 185, t. 120.

nuata, arcte imbricata. Stamina ad 38; filamentis subulatis; antheris oblongis imo connectivo dorsifixis; loculis basi liberis, introrsum v. ad margines rimosis. Germinis rudimenta inæqualia columnaria. Floris fœminei subsphærici masculoque multo majoris sepala breviter reniformia crasse carnosae subque fructu aucta, arcte imbricata. Petala subconformia paulo majora, imbricata v. torta. Staminodia in cupulam dentatam connata. Germen sphæricum, 3-loculare; styli ramis sessilibus recurvis. Ovulum basilare. Fructus¹ drupaceus, sphæricus, pyriformis v. obovoideus, teres v. angulatus, stylo coronatus; exocarpio succulento; pyrenis angulatis, crustaceis v. lignosis, lævibus v. exsculptis. Semina erecta obovoidea libera endocarpio adherentia; albumine solido corneo æquabili; embryone in seminis vertice carnosulo. — Elatae inermes; caudice solitario annulato. Folia terminalia ampla suborbicularia palmato-flabellata plicato-∞fida; laciniis induplicatis, margine spinulosis v. inermibus; rhachi brevi; ligula conchoidea; petiolo longo valido; 3-gono, supra concavo; vagina brevi. Spadices (magni) interfoliacei; duplicatim ramosi; ramulis musculis amentiformibus cylindraceis in summo ramo-digitatim insertis, bracteis crebris dense imbricatis onustis; floribus in foveola bracteis efformata solitariis. Ramuli fœminei subtortuosi pauciflori; bracteis vaginantibus latis dentatis. (*Ins, Muscaren.*²)

26. **Chamseriphes** DILL.³ — Flores (fere *Lataniæ*) diœci; masculorum sepalis 3, oblongis, basi connatis, imbricatis. Petiola 3, obovata obtusa, crassiora, basi in stipitem communem attenuata, imbricata. Stamina 6, stipiti communi affixa; filamentis subulatis breviusculis; antherarum ovato-linearium basifixium versatilius loculis basi liberis, introrsum rimosis. Gynœcei rudimentum minutum v. 0. Floris fœminei masculo majoris sepala suborbicularia v. ovata obtusa, post anthesin paulo aucta. Petala paulo minora obtusa imbricata. Staminodia 6, basi 1-adelpha; antheris effœtis v. 0. Germen subsphæricum, nunc obscure 3-lobum; styli terminalis ramis minutis 3. Ovula basi intus loculo affixa sessilia. Fructus⁴ subsphæricus; obovoideus,

1. Flavi, majusculi.

2. Spec. 3. JACQ., *Fragm.*, t. 8. — BOB., *Voy.*, I, 154; II, 88, 355. — K., *Enum.*, III, 226. — LEME, *Ill. hort.*, t. 229. — BALF. F., in *Bak. Fl. maurit.*, 381. — WALP., *Ann.*, V, 815.

3. *Cat. pl. afr. Shaw* (1738), n. 143 (non PONTED.). — O. K., *Revis.*, 728. — *Hyphæne* GÆRTN., *Fruct.* (1788), I, 28, t. 10, fig. 2; II

(1791), 13, t. 82. — MART., *Palm. fam.*, 14; *Hist. nat. Palm.*, III, 225, t. 131-133. — ENDL., *Gen.*, n. 1748. — K., *Enum.*, III, 226. — B. H., *Gen.*, III, 940, n. 119. — DR., *Plantenfam.*, 39, fig. 14, J. — *Douma* LAMK, *Ill.*, t. 900. — TURP., in *Dict. sc. nat.*, Atl., t. 28, 29. — *Cucifera* DEL., *Fl. Eg.*, I, 57, t. 1, 2.

4. MIRB., in *Ann. Mus.*, XVI, t. 27, fig. 1-3.

ovoideus v. oblongus, teres v. obtuse angulatus lobatusve, nunc medio constrictus nuncve basi apiceque intrusus, sessilis v. stipitatus, 1-locularis; stylo demum hinc subbasilari; exocarpio extus lævi nitido, intus carnosogrumoso fibroso; endocarpio duro, intus carnosogrumoso. Semen endocarpio adhærens erectum, loculo conforme, basi intrusum; testa (fuscata) dura; rapheos ramis reticulatis planis; albumine late cavo osseo æquabili; embryone apicali. — Elatae v. mediocres inermes; caudice sæpe inflato, superne simplici v. dichotome ramoso, cicatricato. Folia terminalia orbicularia v. late ovata palmati-flabellata, plicato- ∞ -fida; laciniis acutis v. 2-fidis, margine induplicatis; fibris interpositis; rhachi brevi; petiolo valido, biconvexo v. supra plano, margine spinuloso; ligula brevi obtusa; vagina brevi aperta. Spadices interfoliacei spathis incompletis vaginati; ramis amentiformibus cylindraceis fastigiatis; floribus masculis in axilla bractearum semicircularium dense imbricarum cymulosis 2; bractea cum bracteolis membranaceis barbatis v. ciliatis fossulas efformantibus. Flores foeminei in axilla bractearum bracteolarumque solitarii immersi. (*Africa trop.*, *Madagascaria*, *Arabia*¹.)

27. *Medemia* G. DE WURTEMB. ET BRAUN². — Flores inflorescentiaque verisimiliter *Chamæriphis*; α fructu ellipsoideo e perianthio secedente; basi hinc areolis lævibus parvis 2 nunc confluentibus notato; styli cicatrice areolis opposito; pericarpio suberoso sicco ruguloso; endocarpio lævi (albo); semine 1, oblongo, basi late endocarpio adhærente; testa coriacea; albumine corneo cavo leviter ruminato (*Eumedemia*) β v. α fructu obovoideo; loculo fertili 1; cæteris rudimentariis; stylo basilari; pericarpio subspungioso fragili, extus sicco rugoso; endocarpio 3-6-fasciato; fasciis verticalibus anostomosanti-ramosis; semine ovoideo profunde rugoso; albumine corneo ruminato; sulco hippocrepiformi ventre exsculpto; embryone apicali (*Bismarckia*³) γ . — Inermes; caudice simplici; foliis flabelliformibus; laciniis ad margines filamentosis; petiolo inermi; ligula nunc 0.

1. Spec. ad 9. L., *Spec.*, 1657 (*Corypha*). — JACQ., *Fragm.*, t. 133 (*Palma*). — KIRK, in *Journ. Linn. Soc.*, IX, 234. — WENDL. F., in *Bot. Zeit.* (1881), 91. — SCHREB., *Not. ad Poc. Reis.*, II, t. 120, 307. — POIR., *Suppl.*, II, 549 (*Douma*). — R. BR., in *App. Tuck. Cong.*, 457. — LOUR., *Fl. cochinch.*, 264 (*Corypha*). — BOISS., *Fl. or.*, V, 46. — THONN. et SCHUM., in *Dansk. Vid. naturv. Afh.*, IV (1829). — *Fl.*

serres, t. 2152, 2153. — H. JOHNST., *Riv. Cong.* (1884), 10, 195 (pleraque sub *Hyphæne* v. *Cucifera*).

2. Ex WENDL. F., in *Bot. Zeit.* (1881), 93. — B. H., *Gen.*, III, 882. — DR., *Pflanzenfam.*, 38.

3. HILDEBR. et WENDL. F., in *Bot. Zeit.* (1881), 93. — B. STEIN, in *Gartenfl.* (1885), 193, t. 1221. — B. H., *Gen.*, III, 882.

« Amentorum masculorum gracilium squamæ tomentoso-hirtulæ. »
(*Nubia, Abyssinia, Madagascar occid.*¹⁾)

28? *Pholidocarpus* BL.² — « Flores masculi...? Fœmineorum carpella distincta³. Fructus sphæricus v. ovoideus; exocarpio marcescente; endocarpio⁴ ab exocarpio haud v. plus minus facile secedente, apice nunc mutico rotundato v. varie mucronato-spinescente, extus plus minus profunde tessellato v. rarius fibroso-hispido. Semen sub-sphæricum subbasilare v. sæpius plus minus excentricum; hilo late orbiculari v. ovali; albumine duro inæqui-lobulato ruminatove; embryone basilari. — Elatæ; caudice obscure annulato; foliorum terminalium flabellatorum 4-6-partitorum⁵ petiolo aculeato; fructibus parallele seriatis. (*Malaisia*⁶.) »

III. ROTANGÆ.

29. *Rotang* L. — Flores monœci, diœci v. polygami; masculorum calyce gamophyllo, 3-lobo v. 3-dentato, nunc imbricato. Petala 3, altius receptaculo ultra calycem producto crasso v. carnosio inserta, libera v. basi connata, valvata. Stamina sæpius 6 (raro pauciora), cum corolla v. imis petalis inserta; filamentis brevibus v. longiusculis subulatis, basi sæpius 1-adelphis, apice nunc infractis; antheris dorsifixis linearibus oblongis v. sagittatis; loculis sæpe basi liberis, introrsum rimosis. Gynœcei rudimentum parvum v. 0. Floris fœminei masculo subæqualis perianthium fere marium; petalis nunc altius connatis. Staminodia 6, 1-adelpha, nunc imæ corollæ adnata; antheris cassis v. 0. Germen liberum, incomplete 3-loculare, extus retrorsum squamatum; styli crassi brevis v. longi ramis stigmatosis 3. Ovula 3, basilaria erecta anatropa; micropyle extrorsum infera. Fructus sphæricus v. ellipsoideus, stylo coronatus; pericarpio

1. Spec. 3. MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 227, n. 6, O. Z, t. 15, fig. VII (*Hyphæne*). — HILDEBR., *Zeitschr. f. Erdk.*, XV (1879), 107.

2. In *Schult. Syst.*, VII, 1308 (1830). — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 222. — MEISSN., *Gen.*, 354 (264) (*Mauritia*). — BECC., *Males.*, I, 79; III, 90, t. 9-11. — B. H., *Gen.*, III, 883. — DR., *Pflanzenfam.*, 38.

3. *Livistonæ* more (BECC.). Genus unde forte

Coryphearum. Nervatio foliorum potius (B. H.), *Coryphearum* quam *Borassearum*.

4. Duro, 1-4-loculari.

5. « *Borassi* v. *Livistonæ*. »

6. RUMPH., *Herb. amboin.*, I, 56, t. 12 (*Longitarsus*). — GIS., *Præl.*, 87 (*Borassus*?). — K., *Enum.*, III, 224 (*Borassus*?). — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 47; Suppl., 591; *Palm. Arch. ind.*, 10. — BECC., in *Hook. Fl. brit. Ind.*, VI, 436.

tenui v. carnosio, squamis deorsum imbricatis tessellatim loricato. Semina 1-3, sæpius subsphærica, nunc hemisphærica, compressa v. deformia, lævia v. sinuato-sulcata, sæpe extus carnosula; hilo sub-basilaris; chalaza hinc laterali; rapheos ramis a chalaza decurrentibus; albumine æquabili v. varie lobato subruminato; embryone subbasilari v. laterali. — Erectæ v. multo sæpius debiles sarmentosæ v. scandentes, varie armatæ; caudicibus cæspitosis longis remote annulatis. Folia remote alterna, æqui-pinnatisecta; segmentis æquidistantibus, fasciculatis v. interruptis, linearibus, lanceolatis v. ensiformibus, apice integris; marginibus recurvis; costa nervisque nunc setosis; rhachi sæpe longa flexuosa, dorso convexa, facie angulata, sæpe in funem gracilem aculeatum producta; petiolo vario, 3-gono; vagina varia aculeata, apice in ligulam v. ocream producta, nunc lateraliter aculeato-flagellifera. Spadices interfoliacei ramosi vaginati; ramis plerumque gracilibus, nunc rarius crassis, rectis v. arcuatis revolutisve, dense bracteatis; floribus articulatis solitariis v. glomeratis paucis; glomerulis hinc ramulo 2-fariam insertis, sæpe 2, 3-floris, plerumque 2-sexualibus; flore hermaphrodito v. fœmineo 1; rhachi nunc in funem producta; bracteis sæpe brevibus cupulatis; bracteolis liberis v. connatis. Spathæ ∞ , pedunculum ramosque vaginantes, aut tubulosæ, aut incompletæ omnes, v. inferiores 1-paucæ completæ majoresque, rigidæ, coriaceæ, aculeatæ v. inermes, deciduæ v. omnes inferioresve solæ persistentes. (*Orbis vet. reg. omn. trop. et subtrop.*) — *Vid. p. 258.*

30. **Plectocomia** MART. et BL.¹ — Flores (fere *Rotangis*) diœci; masculorum calyce gamophyllo, obconico v. cupulari, 3-dentato v. 3-lobo. Petala 3, oblique lanceolato-acuminata, ima basi connata, valvata. Stamina 6, imo perianthio inserta; filamentis breviter 4-adelphis; antheris linearibus erectis dorsifixis, introrsum rimosis. Gynæcei rudimentum minimum v. 0. Floris fœminei masculo majoris calyx cupularis, 3-dentatus, post anthesin auctus. Corollæ 3-fidæ inferneque ventricosæ post anthesin auctæ lobi ovato-lanceolati valvati. Staminodia 6, in annulum corollæ affixum connata; antheris cassis. Germen liberum, 3-loculare, squamis elongatis integris v. nudis reversis imbricatis vestitum; styli crassi brevissimi, basi subarticulati, ramis 3

1. In *Schult. Syst.*, VII, 2, 1333. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 198, 325, t. 114; 116, fig. 1; 176, fig. 11, 12. — K., *Enum.*, III, 302.

— SPACH, *Suit. à Buff.*, XII, 61. — ENDL., *Gen.*, n. 1738. — B. H., *Gen.*, III, 934, n. 107. — DR., *Pflanzenfam.*, 49, fig. 40, A, B.

crasse linearibus erectis. Ovulum in loculo quoque 1, suberectum v. adscendens; micropyle extrorsum infera. Fructus carnosus (sphæricus parvus) stylo breviter rostratus, squamis retrorsum imbricatis tessellatim loricaus. Semina 1-3, erecta, sphærica v. compressa, margine crenata; hilo basilari; raphe conspicua; albumine æquabili; embryo inferiore. — Scandentes monocarpicæ (?) recurvo-aculeatæ; caudicibus robustis v. gracilibus elongatis, superne longe vaginatis. Folia alterna æqui-pinnatisecta; segmentis elliptico-lanceolatis acuminatis, basi contractis; rhachi in funem aculeatum longe producta; petiolo vaginaque aculeatis; ligula 0. Spadices ad plantæ basin laterales¹ ramosi; ramis secundis pendulis longissimis; spathellis imbricatis conchiformibus amplexantibus imbricatis coriaceis persistentibus; spiculis masculis ∞-floris; fœmineis paucifloris brevioribus; bracteis bracteolisque subulatis. (*India et Oceania trop.*)

31? **Plectocomiopsis** BECC.³ — Flores cæteraque *Plectocomiæ*; fructu squamis crebris minutissimis verticaliter ∞-seriatis obsito; seminibus sphæricis lævibus; albumine æquabili; embryo basilari. — Armata; caudicibus elongatis; foliis superioribus ad squamas longe flagellatas reductis; foliolis 0; spathellis infundibularibus parvis. (*Malaisia, Martaban*⁴.)

32? **Myrtalepis** BECC.⁵ — « Flores fere *Plectocomiopsisidis*; calyce 3-lobo. Corolla multo longior. Fructus sphæricus squamis minutis acuminatis haud recurvis inordinate dispositis obtectus; mesocarpio spongioso-tuberoso; seminis sphærici albumine æquabili. — Folia cæteraque *Plectocomiæ*; segmentis obtuse angulato-3-gonis sparse spinosis. (*Borneo, Perak*⁶.) »

33. **Ceratolobus** BL.⁷ — Flores (fere *Rotangis*) polygamo-monœci;

1. In *P. himalayana* terminales (T. ANDERS.).

2. Spec. ad 6. BL., *Rumphia*, III, 68, t. 158, 159, 163. — GRIFF., in *Calc. Journ. Nat. Hist.*, V, 96; *Palms brit. Ind.*, 103; App., XXI, t. 217-219. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 78; Suppl., 592. — T. ANDERS., in *Journ. Linn. Soc.*, XI, 11. — KURZ, *For. Fl.*, II, 514. — WENDL. F., in *Bot. Zeit.* (1859), 165. — RIDL., in *Trans. Linn. Soc.*, ser. II, Bot., III, 392. — BECC., in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 477. — *Bot. Mag.*, t. 5105. — WALP., *Ann.*, V, 825.

3. In *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 479.

4. Spec. 3. KURZ, in *Journ. As. Soc. beng.*,

XLIII, II, 213, t. 29, 30; *For. Fl.*, II, 521 (*Calamus*). — GRIFF., *Palms brit. Ind.*, 70, t. 199, A (*Calamus*). — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 338 (*Calamus*).

5. *Males.*, III, 62; in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 480.

6. Spec. 2.

7. In *Schult. Syst.*, VII, 1334; *Rumphia*, II, 163, t. 129; 137, A. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 196, 325, t. 115. — ENDL., *Gen.*, n. 1739. — SPACH, *Suit. à Buff.*, XII, 61. — B. H., *Gen.*, III, 933, n. 105. — DR., *Pflanzenfam.*, 50, fig. 40, C, D.

masculorum calyce 3-fido; lobis patulis, 3-gonis. Petala 3, lanceolata valvata. Stamina 6, imæ corollæ inserta, basi 1-adelpha; antheris dorsifixis linearibus introrsis. Floris hermaphroditi corolla 3-fida valvata. Stamina 6 (marium). Germen ovoideum (in flore masculo rudimentarium) imperfecte 3-loculare; styli ramis 3, recurvis; ovulis in loculo 3, erectis; micropyle extrorsa. Fructus sphæricus v. ellipsoideus (parvus), stylo coronatus; pericarpio squamis deorsum imbricatis tessellatim loricato. Semen erectum sessile rugulosum, integumento carnosulo indutum; chalaza laterali; embryone basilari; albumine ruminato. — Gracilis; caudice tenui erecto v. scandente, vaginis aculeatis tecto. Folia æqui-pinnatisecta; segmentis cuneato-rhombeis plicatis acuminatis erosis; rhachi aculeata, 3-gona et in funem aculeatum producta; vagina tubulosa, apice breviter ligulata. Spadix interfoliaceus laxè compositus compressus; ramis gracillimis flexuosis; floribus in eis plerumque 2-nis; inferiore hermaphrodito sessili; superiore autem masculo v. neutro stipitato. Pedunculus spadicis longissimus aculeatus pendulus. Spatha 1, lineari-oblonga v. lanceolata complanata rostrata membranacea, secus margines aculeolata demumque ibi dehiscens. Cætera *Rotangis*. (*Java, Sumatra*¹.)

34. *Korthalsia* BL.² — Flores (fere *Calami*) polygamo-diœci; sepalis orbicularibus v. breviter oblongis. Petala marium oblonga valvata. Stamina 6, imæ corollæ affixa; filamentis brevibus, liberis v. ima basi connatis; antheris linearibus erectis, ad basin dorsifixis; loculis basi subsagittata liberis, introrsum rimosi. Germen rudimentarium (nunc fertile) ovoideo-oblongum. Floris fœminei corolla basi tubulosa, mox 3-fida, valvata. Staminodia corollæ affixa 6-∞. Germen squamis reflexis obtectum; styli varii ramis stigmatosis recurvis. Ovula 3, septis imperfectis sejuncta, erecta; micropyle extrorsa. Fructus sphæricus v. ovoideus, stylo coronatus, 1-spermus; pericarpio tenui squamis deorsum imbricatis tessellatim loricato. Semen erectum, vertice profunde foveolatum; albumine ruminato; embryone varie ventrali. — Graciles scandentes; caule elongato flexuoso. Folia alterna pinnatisecta; segmentis alternis trapeziformibus cuneatis flabellato-

1. Spec. 2. K., *Enum.*, III, 200. — MEISSN., *Gen.*, 351. — LENE, in *Dict. d'Orb.*, III, 290. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 73, 129. — GRIFF., in *Calc. Journ. Nat. Hist.*, V, 72; *Palms brit. Ind.*, 72 (*Calamus*). — BECC., *Males.*, III, 63; in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 477.

2. *Rumphia*, II, 166, t. 130, fig. 2. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 210, 243, t. 172, fig. 1. — B. H., *Gen.*, III, 932, n. 104. — DR., *Pflanzenfam.*, 48. — *Calamosagus* GRIFF., in *Calc. Journ. Nat. Hist.*, V, 22; *Palms brit. Ind.*, 26, t. 183, 184; 184, A.

venosis, superne erosis; rhachi funiformi aculeata; vagina in ligulam scaphoideam producta. Flores in ramulis spadicum laxè ramosorum crebris confertis, bracteatis et bracteolatis; ramis primariis cum pedunculo spathis persistentibus longe tubulosis vaginatis; bracteis late brevibus membranaceis; bracteolis sæpe ad villos reductis. (*Oceania trop.*¹)

35. **Metroxylon** ROTTB.² — Flores hermaphroditi v. polygami; masculorum calyce gamophyllo infundibulari, 3-dentato v. 3-fido. Corollæ gamopetalæ longioris lobi valvati 3. Stamina 6, corollæ plus minus alte adnata; filamentis basi 1-adelphis; antheris dorsifixis linearibus v. sagittatis; loculis introrsum rimosis. Gynæcei rudimentum breve v. elongatum, 3-lobum. Floris fœminei perianthium ut in mare. Staminodia in urceolum membranaceum connata; antheris cassis v. 0. Germen summo receptaculo producto inter stamina insertum oblongum, incomplete 3-loculare, extus retrorsum squamosum; styli conici lobis stigmatosis dentiformibus. Ovula erecta 3 (*Rotangis*). Fructus subsphæricus v. ellipsoideus stylo terminatus; exocarpio squamis deorsum imbricatis tessellatim loricato; endocarpio carnosulo v. spongioso. Semen erectum subsphæricum v. depressum rugosum; albumine ruminato; embryone hinc laterali. — Erectæ monocarpicæ; caudicibus cæspitosis e rhizomate ortis soboliferis, longis v. brevibus, basi e foliorum inferiorum occasorum cicatricibus annulatis. Folia sæpe maxima terminalia suberecta æqui-pinnatisecta; segmentis oppositis; costa setosa; marginibus basi recurvis; rhachi extus convexa, intus autem acutata v. obtusata; petiolo intus concavo, inermi v. nunc dense armato; vagina aperta coriacea. Spadix amplius terminalis laxè ramosus totusque spathis tubulosis vaginatus; spathis subæqualibus primum imbricatis, v. superioribus gradatim minoribus ramulis amentiformibus distichis elongatis patenti-recurvis dense confertis multifariis, in axilla brac-

1. Spec. 18, 19. BL., *Rumphia*, III, t. 157; 157, B (*Ceratolobus*). — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 74, 750; Suppl., 591; *Pl. Jungh.*, 162; *Palm. Arch. ind.*, 15, 26; in *Journ. bot. néerl.*, 15. — WENDL. F., in *Bot. Zeit.* (1859), 174. — KURZ, *For. Fl.*, II, 512. — BECC., *Males.*, I, 87; II, 73; III, 67, t. 5-7; in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 474. — WALP., *Ann.*, V, 833.

2. In *Nye Saml. Dansk. Vid. Selsk. Skrift.*, II, 525, t. 1 (1783). — MART., *Hist. nat. Palm.*,

III, 213, 343 (part.), t. 102, 159. — ENDL., *Gen.*, n. 1742. — K., *Enum.*, III, 213 (part.). — B. H., *Gen.*, III, 935, n. 109. — DR., *Pflanzenfam.*, 47, fig. 34, K-N. — *Sagus* RUMPH., *Herb. amboin.*, I (1741), 72, t. 17, 18 (vix gener.). — GERTN., *Fruct.*, II, 186, t. 120, fig. 3. — BL., *Rumphia*, II, 146 (part.), t. 86, 126, 227. — TURP., in *Dict. sc. nat.*, Atl., t. 161, 162. — O. K., *Revis.*, 736. — *Calococcus* WENDL. F., in *Seem. Fl. vit.*, 279 (*Sagus viliensis*).

tearum solitariis v. nunc 2-nis subpedicellatis laxè immersis; bracteis latioribus quam longioribus; bracteolis in cupulam connatis. Spathæ coriaceæ nunc aculeatæ. (*Oceania trop.*¹)

36? **Pigafetta** MART.² — Flores (fere *Rotangis*) polygami; masculorum calyce gamophyllo obconico integro v. breviter dentato. Petala lanceolata valvata. Stamina 6; filamentis brevibus crassis; antheris basifixis sagittato-lanceolatis cuspidatis. Gynæcei rudimentum minimum v. 0. Floris fœminei germen stylo coronatum. Fructus sphaericus v. oblongus, 1-locularis, stylo coronatus, squamis retrorsum imbricatis tessellatim loricatus. Semen conforme 1, inæqui-costatum v. rugulosum; integumento extimo molliter carnosio; hilo basilari; chalaza dorsali; albumine æquabili; embryone dorsali. — Elatæ robustæ, basi soboliferæ, inferne remote annulatæ, superne aculeatæ. Folia terminalia pinnatisecta; segmentis lanceolato-acuminatis; marginibus basi recurvis; petiolo glabro v. aculeato. Spadices axillares penduli laxè ramosissimi pedunculati; ramulis amentiformibus bracteatis; pedunculo ramisque primariis spathis incomplete tubulosis apiceque sæpe truncatis vaginatis; bracteis lanceolatis; floribus ad ramulos dense confertis, spiraliter dispositis lanaque immersis³. (*Oceania trop.*⁴)

37. **Zalacca** REINW.⁵ — Flores (fere *Rotangis*) monœci v. polygamo-dicœci; masculorum calyce tubuloso, plus minus alte 3-lobo, v. sepalis 3, membranaceis. Corolla tubulosa, basi attenuata, valvata. Stamina 6, tubo affixa; filamentis brevibus, basi inter se et corollæ adnatis; antheris basi v. paulo supra basin affixis, brevibus v. elongatis sagittatisve. Germen rudimentarium parvum v. 0. Floris fœminei masculo majoris calyx 3-partitus v. 3-fidus, post anthesin auctus. Corollæ tubulosæ lobi lanceolati valvati. Staminodia 3-6,

1. Spec. 6, 7. Kœn., *Ann. bot.*, I, 193, t. 4. — GRIFF., *Palms brit. Ind.*, 21, t. 181; App., XX (*Sagus*). — ROXB., *Fl. ind.*, III, 623 (*Sagus*). — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 139 (part.). — BECC., in *N. Giorn. bot. ital.*, III, 29; *Males.*, I, 91; in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 481. — WALP., *Ann.*, V, 833.

2. MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 215, 343 (*Metroxylum* Sect.). — B. H., *Gen.*, III, 933, n. 106. — DR., *Pflanzenfam.*, 48. — BECC., *Males.*, I, 89 (*Pigafettia*).

3. Genus imperfectè notum.

4. Spec. ad 3. RUMPH., *Herb. amboin.*, I, 84, t. 19 (*Sagus*). — BUCH., *Dec.*, VIII, t. 6 (*Sagus*). — BL., *Rumphia*, II, 154, t. 128 (*Sagus*). — K., *Enum.*, III, 245, n. 5 (*Metroxylon*). — MART., *loc. cit.*, t. 102 (*Sagus*). — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 149 (*Metroxylon*).

5. In *Syll. Soc. bot. Ratisb.*, II, 3 (*Salacca*). — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 199, 325, t. 118, 119, 123, 136; 159, fig. 3; 173, 174. — ENDL., *Gen.*, n. 1737. — K., *Enum.*, III, 202. — BL., *Rumphia*, II, 158. — B. H., *Gen.*, III, 933, n. 103. — DR., *Pflanzenfam.*, 48, fig. 38.

libera v. connata. Germen squamosum v. setosum; styli ramis subulatis 3; ovulis 3, erectis; micropyle extrorsum infera. Fructus sphaericus, obovoideus v. turbinatus, stylo coronatus sæpeque rostratus; pariete tenui fragili squamis deorsum imbricatis, apice nunc breviter v. longe spinescentibus, tessellatim loricata. Semina erecta solitaria sphaerica v. hemisphaerica 2, nunc angulata 3, dorso convexa, indumento crasso carnosum obsita; albumine copioso cartilagineo æquabili, membrana tenui (fusca) cincto; chalaza superne canaliculo longo tenui perforata; embryone basilari parvo. — Acaules soboliferæ; foliis basilaribus longis æqui-pinnatisectis; segmentis æquidistantibus alternis v. fastigiatis, rectis v. arcuatis acuminatis parallele venosis; marginibus setosis, inferne recurvis; rhachi aculeata obtuse 3-gona; petiolo aculeis sæpe spiraliter dispositis armato, eligulato. Spadices interfoliacei penduli, simplices v. fastigiatis ramosi; ramis amentiformibus; ramulis breviusculis remotis v. confertis, stipitatis v. sessilibus; floribus¹ in ramulo dense ∞-fariam confertis, bracteatis et 2-bracteolatis; masculis 2-nis; fœmineis 2-nis; altero nunc sterili, v. solitariis. Spathæ diu persistentes: inferiores pedunculum ramosque vaginantes incompletæ; partiales autem ramulum subtendentes papyraceæ, primum clausæ. Bracteolæ in cupulam 2-locellatam glabram villosamve connatæ. (*India, Malaisia*².)

38. *Euglossoma* GRIFF³. — Flores (fere *Metroxyl*) diœci; masculorum calyce campanulato, 3-fido. Corollæ longioris, basi contracta solidæ, foliola 3, lanceolata acuminata pungentia valvata. Stamina 9-12, basi 1-adelpha; antheris lineari-acutatis, ad margines rimosis. Floris fœminei masculo majoris calyx campanulatus (marium). Petala elongato-lanceolata pungenti-acuminata, basi dilatata intusque crista pilorum transversa instructa, valvata. Germen oblongum reverso-squamosum, 3-loculare; styli lobis stigmatosis oblongis complanatis sessilibus. Ovula erecta; micropyle extrorsa. Fructus ovoideus crasse obtuseque rostratus stylo coronatus, 1-spermus, extus

1. Sæpe roseis, parvis.

2. Spec. ad 10. RUMPH., *Herb. amboin.*, V, 113, t. 57 (*Palmijuncus*). — GÆRTN., *Fruct.*, II, 267, t. 139, fig. 1 (*Calamus*). — WALL., *Pl. as. rar.*, III, 14, t. 222-224. — Rœm. et Sch., *Syst.*, VII, 1334 (*Calamus*). — GRIFF., in *Calc. Journ. Nat. Hist.*, V, 6; *Palms brit. Ind.*, 9, t. 175-185, C; 186 (*Calamus*); App., XIX. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 80. — KURZ, *For. Fl.*,

II, 511. — BECC., *Males.*, I, 87; III, 63; in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 472. — RIDL., in *Trans. Linn. Soc.*, ser. II, Bot., III, 392. — WALP., *Ann.*, V, 825.

3. In *Calc. Journ. Nat. Hist.*, V, 101, c. ic.; *Palms brit. Ind.*, 109; App., XXII, 109, t. 220, A-C. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 212, 343, t. 179, 180. — B. H., *Gen.*, III, 934, n. 108. — DR., *Pflanzenfam.*, 46.

squamis retrorsum imbricatis tessellatim loricatus, intus lignosus septisque longitudinalibus imperfectis 6 percursus. Semen ovoideum v. subsphæricum, varie 6-sulcum; hilo basilari; albumine æquabili; embryone basilari. — Cæspitosæ monocarpicæ armatæ; foliis æquipinnatisectis; segmentis anguste lanceolatis caudato-acuminatis; costa gracili setosa; rhachi inermi, 3-gona; petiolo teretiusculo aculeis complanatis armato; vagina brevi. Spadices terminales erecti longe pedunculati, solitarii v. 2, 3-ni, stricti, composite ramosi, inferne paucivaginati. Ramuli crassi erecti, vaginulis subdistichis dense imbricatis obtekti, superne in bracteas desinentibus; floribus magnis¹ teretibus arcuatis longe exsertis. (*Archip. Malayan.*²)

39. **Raphia** PAL.-BEAUV.³ — Flores (fere *Rotangis*) polygamomonœci; calyce tubuloso gamophyllo, apice truncato integro v. minute 3-dentato. Corolla receptaculo ultra calycem producto ibique sub-3-gono inserta arcuata; foliolis lanceolatis rigidis valvatis. Stamina (in flore fœmineo sterilia) cum corolla inserta 6-15; filamentis subulatis, inferne inter se et cum ima corolla connatis; antheris erectis linearibus acuminatis v. obtusis ad basin dorsifixis, introrsum v. sub marginibus rimosis. Germen (in flore masculo minimum v. 0) ovoideum, retrorsum squamosum, 3-loculare; septis nunc ex parte evanidis; styli erecti brevis ramis crassiusculis subulatis recurvis, intus stigmatosis. Ovula erecta 3; micropyle extrorsum infera. Fructus⁴ ovoideus v. oblongo-ellipsoideus rostratus, stylo coronatus, 1-locularis; pericarpio squamis retrorsum imbricatis tessellatim loricato; endocarpio carnosulo. Semen adscendens oblongum sulcatum; hilo ventrali; rapheos linearis ramis reticulatis; albumine durissimo ruminato; embryone laterali. — Monocarpicæ inermes v. ad vaginas armatæ; caudice simplici v. 2-chotome diviso annulato. Folia terminalia adscendentia longa æquipinnatisecta; segmentis lineari-lanceolatis coriaceis acuminatis; marginibus basi recurva setosis v. aculeolatis; rhachi intus acuta; petiolo tereti v. intus subplano, extus convexo; vaginæ brevis marginibus valde

1. 1-4-pollicaribus.

2. Spec. 2, 3. Miq., *Fl. ind. bat.*, III, 77. — BECC., in *N. Giorn. bot. ital.*, III, 18; *Males.*, III, 58; in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 480. — WALP., *Ann.*, V, 833.

3. *Fl. owar. et ben.*, I, 75, t. 44, fig. 1, 45, 46. — MART., *Hist. nat. Palm.*, II, 53, t. 45,

47, fig. 5, 48 (*Sagus*); III, 216, 343. — K., *Enum.*, III, 216. — SPACH, *Suit. à Buff.*, XII, 89. — ENDL., *Gen.*, n. 1741. — DR., *Pflanzenfam.*, 44, fig. 16, A; 34, A-J; 36. — B. H., *Gen.*, III, 935, n. 110.

4. Sphalmate in *Tr. Bot. méd.*, fig. 3445, pro *Metrozylis* fructu figuratum.

fibrosis. Spadices terminales dense ramosi penduli; ramis crebris brevibus flabelliformibus pectinatim ramulosis compressis; bracteis late vaginantibus dense imbricatis¹; floribus distichis elongatis, arcuatis v. decurvis exsertis; inferioribus fœmineis; superioribus sæpius hermaphroditis v. nunc masculis; singulis bracteatis et 2-bracteolatis, nunc in bracteam spuriam posticam utrinque concavam conniventibus. (*Africa trop., Madagascaria, America trop. austr-or.*²)

40. **Oncocalamus** MANN et WENDL. F.³ — Flores (fere *Rotangis*) monœci; masculorum calyce oblongo valvato, 3-dentato v. 3-fido. Petala ovato-acuta concava coriacea, basi connata, valvata, calyce longiore inclusa. Stamina 6; filamentis in tubum oblongum corollæ æqualem connatis; antheris ad os tubi sessilibus parvis, 2-dymis; alternis 3 altius insertis. Gynœcei rudimentum styliforme. Floris fœminei calyx corollaque marium; tubo longiore. Staminodia staminibus fertilibus similia, at ananthera. Germen oblongum, superne squamigerum; stylo elongato, apice breviter stigmatoso-3-lobo; ovulis erectis 3. Fructus sphaericus stylo terminatus; semine. . . ? — Scandens gracilis; foliis æqui-pinnatisectis; segmentis oblongo-lanceolatis; rhachi in funem gracilem producta; segmentis ibi reverse spinescentibus; petiolo brevi; vagina in ocream truncatam producta. Spadices axillares cernui; ramis distichis gracilibus pendulis, basi nudis, superne spathis tubulosis vaginatis; floribus distiche glomeratis; glomerulis polygamis; bracteis infundibulari-campanulatis spathelliformibus, 5-12-floris; bracteolis in corpus faviforme confertis. (*Africa trop.-occid.*⁴)

41. **Anclistrophyllum** MANN et WENDL. F.⁵ — Flores (fere *Rotangis*) hermaphroditi; receptaculo apice cupulari basique longe attenuato. Calycis campanulati coriacei lobi breves 3. Corollæ cylindrææ foliola 3, lineari-oblonga acuta valvata, mox erecto-patentia persis-

1. Spurie articulatis.

2. LAMK, III., t. 771 (*Sagus*). — TURP., in *Diet. sc. nat.*, Atl., t. 159, 160 (*Sagus*). — GÆRTN., *Fruct.*, I, t. 10, fig. 1 (*Sagus*). — SPRENG., *Syst.*, II, 139 (*Metroxylon*). — W., *Spec.*, IV, 404 (*Sagus*). — BORY, *Voy.*, I, 178. — GRIFF., *Palms brit. Ind.*, t. 182 (*Sagus*). — MEISSN., *Gen.*, 354 (265) (*Sagus*). — WALL., *Palm. Amaz.*, 42, t. 2, 16. — DR., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 286, t. 61, 62. — G. MANN et WENDL. F., in *Trans. Linn. Soc.*, XXIV,

423, 437, t. 39, A, B; 42, A-D. — WALP., *Ann.*, V, 833.

3. In *Kerch. Palm.*, 252; in *Trans. Linn. Soc.*, XXIV, 436, t. 41, E; 43, E (subgen.). — B. H., *Gen.*, III, 936, n. 111. — DR., *Pflanzenfam.*, 45.

4. *Spec.* 1. *O. Mannii* MANN et WENDL. F.

5. In *Kerch. Palm.*, 230; in *Trans. Linn. Soc.*, XXIV, 432, t. 38, D; 41, G; 43, C. — B. H., *Gen.*, III, 937, n. 113. — DR., *Pflanzenfam.*, 46.

tentia aucta indurataque. Stamina 6, imis perianthii foliolis adnata; filamentis lingulatis v. clavatis, nunc rigidis; antheris dorsifixis lineari-oblongis erectis; loculis linearibus, basi liberis. Germen ovoideum, 3-loculare; stylo gracili elongato, apice minute stigmatoso-3-lobo. Ovula erecta v. suberecta; micropyle extrorsum infera. Fructus ovoideus, stylo rostratus; pericarpio tenui squamis deorsum imbricatis tessellatim loricato. Semen suberectum sphaericum peltatum foveolatum (*Laccosperma*¹), v. compressum læve; hilo basilari; raphe lineari; albumine æquabili v. nunc extus lacunoso; embryone ventrali. — Cæspitosi, alte scandentes, monocarpici; caudicibus longe flexuosis. Folia remote alterna æqui-pinnatisecta; segmentis subaggregatis v. alternis, lanceolatis v. falcatis, aut basi lata insertis (*Laccosperma*), aut lineari-lanceolatis basique angustatis; rhachi valida, dorso convexa; marginibus lævibus v. aculeatis; apice in funem rigidum longe 3-gonum producta; segmentis deflexis ensiformibus rigidis pungentibus, sæpe per paria dispositis; vagina clausa spinescens longe ocreata. Spadices erecti terminales, distiche 2-plicato-ramosi; ramis longis pendulis; ramulis alternis flexuosis longissimis. Spathæ tubulosæ spadicis pedunculum ramosque vaginantes; bracteis spathelliformibus, 2-floris; bracteolis in cupulam obliquam 2-alatam et 2-cuspidatam connatis. (*Africa trop. occid.*²)

42. *Eremospatha* MANN et WENDL. F.³ — Flores (fere *Rotangis*) hermaphroditi v. polygami; calyce cupulari v. campanulato, truncato v. dentato. Corollæ lobi ovato-acuti valvati. Stamina 6; filamentis basi in annulum crassum connatis; antheris parvis dorsifixis cordatis. Germen columnare reverso-squamatum; styli lobis lingulatis; ovulis subbasilaribus. Fructus oblongus v. subcylindræus, 1-3-locularis; pericarpio squamis deorsum imbricatis tessellato. Semen oblongum peltatum subrugosum; hilo lineari suprabasilari; rapheos ramis ab eo radiantibus; albumine æquabili; embryone laterali. — Scandentes graciles flexuosi annulati; foliis alternis æqui-pinnatisectis; segmentis lineari-lanceolatis v. obovatis obtusis; nervis flabellatis; marginibus integris v. superne erosis, nudis v. aculeolatis; rhachi ad margines

1. MANN et WENDL. F., in *Kerch. Palm.*, 249; in *Trans. Linn. Soc.*, XXIV, t. 38, B; 41, D; 43, D. — DR., in *Bot. Zeit.* (1877), 635, t. 5, fig. 45. Typus forte potius ad genericam dignitatem elevandus.

2. Spec. ad 3. PAL.-BEAUV., *Fl. owar. et ben.*,

t. 9, 10 (*Calamus*). — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 341 (*Calamus*).

3. In *Kerch. Palm.*, 252; in *Trans. Linn. Soc.*, XXIV, 433, t. 41, A-C; 43, B (*Calami* subgen.). — B. H., *Gen.*, III, 936, n. 112. — DR., *Pflanzenfam.*, 46.

spinosa et in funem elongatum deflexo-spinosum producta; petiolo brevissimo; vagina tubulosa ocreata. Spadices axillares breviter robusteque pedunculati nudi; floribus ebracteolatis, minute bracteatis, ad ramulos 2-nis; cæteris *Rotangis*. (*Africa trop. occid.*¹)

43. *Mauritia* L. F.² — Flores monœci, diœci v. polygami; masculorum calyce cyathiformi, cupulari, campanulato v. infundibulari, aut subintegro truncato, aut rarius cuneiformi-lobato v. 3-dentato. Petala 3, libera v. basi in stipitem brevem obconicum connata, ovato v. obovato-lanceolata crassiora erecta valvata. Stamina 6, sub gynœcei rudimento parvo, minimo (v. 0) inserta; filamentis erectis, subulatis v. crassiusculis; alternipetalis plerumque longioribus; aut liberis, aut raro in columnam connatis; antherarum dorsifixarum v. subbasifixarum loculis linearibus elongatis v. rarius abbreviatis, introrsum v. ad margines rimosis. Flores fœminei hermaphroditive majores; calyce masculorum. Petala sæpe longiora, libera v. basi unguiculata sublibera, apice nunc longe acuminata, crassa valvata. Staminodia 6, inæquilonga, nunc crassa 3-gona acuminata, quorum 3 petalis adnata, nunc contigua v. circa faucem connata; antheris parvis (in flore fœmineo cassis v. 0). Germen sessile, retrorsum squamosum; styli ramis lineari-subulatis (*Lepidocaryum*³); v. sæpius brevius crassiusque subulatis (*Eumauritia*). Ovula in loculis 3 solitaria erecta plus minus complete anatropa. Fructus sphaericus, obovoideus v. ellipsoideus, squamis retrorsum imbricatis tessellatim loricatus; endocarpio tenui v. crassiusculo carnosulo. Semen 1, sphaericum v. ovoideo-oblongum læve, aut dorso sulcatum (*Lepidocaryum*), aut exsulcum; chalaza apicali brevi v. elongata verticaliter mamillari calcaratave; albumine duro v. osseo æquabili; embryone ad ventrem v. infra apicem parvo. — Excelsæ v. mediocres elegantes inermes v. armatæ; caudice gracili erecto flexuoso, nunc annulato; annulis v. internodiis conico-spinosis. Folia flabelliformia v. pinnatim flabellata; limbo basi cuneato v. cordato; petiolo teretiusculo, 3-gono

1. Spec. 3, 4; foliorum segmentis ut in *Korthalsia nervatis*, v. nervis in spinula terminali convergentibus.

2. *Suppl.*, 70. — ENDL., *Gen.*, n. 1743. — MART., *Hist. nat. Palm.*, II, 41, t. 38-44; III, 344. — K., *Enum.*, III, 217. — DR., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 287, t. 61-65, 67; *Pflanzensfam.*, 43, fig. 32, 33. — B. H., *Gen.*, III, 937, n. 114. — *Orophoma* DR., in *Mart. Fl. bras.*,

III, II, 294, t. 66. — *Lepidococcus* WENDL. F. et DR., in *Kerch. Palm.*, 249.

3. MART., *Gen. et spec. Palm.*, II, 49, t. 47, fig. 1-3; III, 344. — K., *Enum.*, III, 220. — ENDL., *Gen.*, n. 1744. — DR., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 296, t. 62, 67, 68; *Pflanzensfam.*, 43, fig. 32, A, 1, 2. — B. H., *Gen.*, III, 938, n. 115. — SPRUCE, in *Journ. Linn. Soc.*, XI, 172 (Subgen.).

v. a latere compresso, varie vaginato; segmentis lanceolatis v. linearibus acuminatis, inermibus v. spinulosis, nunc fissis v. in fibras solutis; costa marginibusque nunc ciliato-setosis. Spadices ampli v. (*Lepidocaryum*) graciles, distiche v. subdistiche composite ramosi; spathis tubulosis v. incompletis; ramulis floriferis aut cylindraceutiformibus (*Eumauritia*), aut brevibus compressis (*Lepidocaryum*); floribus secundis v. 2-fariis v. spiraliter confertis; spathellis sæpe cochleatis, infundibularibus, ramulos involucrantibus; bracteolis nunc in cupulam 2-carinatum v. 2-alatam connatis. (*America trop. austr.*, *Antillæ*¹.)

IV. ARECÆ.

44. **Areca** L. — Flores monœci; masculorum (parvorum) compressorum v. 3-quetrorum sepalis 3, æqualibus v. inæqualibus, liberis v. ima basi connatis, valvatis v. subimbricatis. Petala 3, multo majora oblique lanceolata acuta v. acuminata, valvata v. basi leviter imbricata. Stamina oppositipetala 3, v. sæpius 6, 2-seriata; filamentis brevibus v. brevissimis; antheris sagittatis basifixis; loculis inferne liberis, extrorsum v. ad latera rimosis. Gynæcei rudimentum breve v. elongatum; ramis subulatis 3. Floris fœminei masculo multo majoris sepala 3, orbicularia concava late imbricata, post anthesin accreta. Petala 3, sepalis longiora, nisi apice acutato valvato imbricata v. torta. Staminodia varia, libera v. in urceolum connata, nunc 0. Germen ovoideum, 1-loculare; styli terminalis ramis stigmatosis 3, subulatis erectis v. recurvis. Ovulum basilare sessile elongato-depressum; micropyle infera. Fructus ovoideus v. oblongus, perianthio stipatus; exocarpio crasse carnosio diteque fibroso; endocarpio tenui semini contiguo. Semen basilare ovoideum v. hemisphæricum, basi truncatum v. concaviusculum; hilo basilari; rapheos ramis undique adscendentibus reticulato-ramosis. Albumen durum ruminatum; embryo parvo basilari. — Inermes, elatæ v. humiles; caudicibus solitariis v. cæspitosis annulatis. Folia terminalia æqui-pinnatisecta;

1. Spec. ad 12. MART., *Palm. Orbig.*, 19, t. 13, fig. 1, 14, 21, A, B. — SPACE, *Suit. à Buff.*, XII, 61 (*Lepidocaryum*), 91. — TRAIL, in *Trim. Journ.* (1877), 129. — WALLACE, *Palm. Amas.*, 46, t. 2, fig. 2; t. 17, 21; 60,

t. 2, fig. 4, 22 (*Lepidocaryum*). — GRISEB., *Fl. brit. W.-Ind.*, 515. — BARR.-RODR., *En. Palm.*, n. 18; 19 (*Lepidocaryum*); *Les Palm.* (1882), 9, t. 1, fig. 1, 2; 10 (*Lepidocaryum*). — WALP., *Ann.*, V, 834.

segmentis lanceolato-acuminatis plicatis, basi margine recurvis; superioribus confluentibus, truncatis v. 2- ∞ -fidis; rhachi 3-gona, dorso subplana v. convexa, ventre acuta, inferne cum petiolo concava; vagina elongata. Spadix intrafoliaceus simpliciter v. composite ramosus, latus v. contractus; ramis floriferis patentibus demumque pendulis; floribus in ramo eodem masculis superioribus crebris, solitariis v. 2-nis; fœmineo inferiore 1. Bracteæ sæpius obsoletæ. Spathæ 3- ∞ , caducæ; inferiore completa; superioribus incompletis sæpeque bracteiformibus. (*Asia et Oceania trop.*) — *Vid. p. 262.*

45. **Pinanga** BL.¹ — Flores (*Areca*) monœci: masculi subirregulares, 3-quetri v. compressi. Sepala 3, nunc brevissima, libera v. basi connata, vix v. haud imbricata. Petala ovato-lanceolata, nunc obliqua, acuminata, crasse coriacea, valvata. Stamina ∞ , v. rarius 6; filamentis brevibus erectis, liberis v. basi connatis; antheris erectis linearibus basifixis, nunc sagittatis, introrsum v. sublateraliter rimosis. Floris fœminei sphærici v. ovoidei sepala petalaeque suborbicularia concava, arcte imbricata. Staminodia pauca v. 0. Germen sessile ovoideum, 1-loculare; styli brevis ramis stigmatosis 3, crassis confluentibus, nunc reflexis. Ovulum 1, basilare crassum sessile transversim subarcuatum; micropyle subapicali inferiore. Fructus ellipsoideus v. ovoideus, stylo coronatus; pericarpio crasse fibroso; endocarpio nunc tenui semini adhærente. Semen erectum; hilo basilari; rapheos ramis adscendentibus, altius anostomosantibus; albumine ruminato; embryone inferiore parvo. — Inermes; caudicibus simplicibus v. fasciculatis, nunc soboliferis, annulatis. Folia simplicia, apice 2-fida, inæqui-fissa v. pinnatisecta; segmentis plurinerviis plicatis; superioribus confluentibus; petiolo rhachique antice convexis; vagina longa. Spadicis simplicis v. compositi rami fastigiati v. flabellati; spatha completa compressa v. tumente 1; floribus in ramis 2-6-stichis; ubi 3-ni, 1-lateraliter cymosis; fœmineo centrali minore; masculis lateralibus; bracteis bracteolisque vix conspicuis v. obsoletis. (*Asia, Malaisia*².)

1. *Rumphia*, II, 76, t. 87; 108, A; 109-116. — ENDL., *Gen.*, n. 1727¹. — K., *Enum.*, III, 640 (part.). — B. H., *Gen.*, III, 884, n. 3. — DR., *Pflanzenfam.*, 76. — *Cladosperma* GRIFF., *Notul.*, III, 165. — *Ophiria* BECC., in *Ann. Jard. Buitenz.*, II, 128; *Males.*, III, 129 (ex BECC.).

2. Spec. ad 40. MART., *Hist. nat. Palm.*, III,

183, 313, t. 158, fig. 2, 3 (*Seaforthia*). — GRIFF., *Palms brit. Ind.*, 146, t. 230, C; 231; 232, A-C; 235 (*Areca*); *Notul.*, III, 164; *lc. pl. as.*, t. 248 (*Areca*). — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 20 (*Ptychosperma*). — SCHEFF., in *Nat. Tijdsch. Ned. Ind.*, XXXIII, 171; in *Ann. Jard. Buitenz.*, I, 115, 133, 148, t. 13-15; 16, fig. 1; 17-21. — KURZ, *For. Fl.*, II, 538; in *Journ. As. Soc.*

46. *Cyphophoenix* WENDL.¹ — Flores (fere *Arecae*) monœci; masculorum in alabastro oblongorum sepalis ovato-orbicularibus concavis coriaceis arcte imbricatis. Petala longiora ovato-acuta valvata. Stamina 6; filamentis subulatis, apice inflexis; antheris dorsifixis oblongis versatilibus introrsis. Germen rudimentarium ovoideum v. longe conicum pyramidatumve. Floris fœminei masculo minoris sepala suborbicularia crassa arcte imbricata. Petala paulo longiora similia late imbricata. Staminodia membranacea 3-6. Germen oblongum, 1-loculare, apice indurato styli lobis crassis 3-gonis coronatum; ovulo parietali hemitropo; micropyle extrorsum infera. Fructus elongato-ellipsoideus v. ovoideus lente curvus styloque coronatus; pericarpio carnoso granulato intusque fibroso; endocarpio duro. Semen suberectum liberum læve; hilo basilari; rapheos ramis patentibus deinceps descendentes reticulatis; albumine æquabili; embryone basilari. — Inermes robustæ; caudice annulato; foliorum terminalium pinnatisectorum segmentis elongato-ensiformibus robustis acutatis; marginibus basi incrassato-plicatis recurvis; costa nervisque subtus sparse paleaceis; rhachi crassa, superne acutata. Spadices intrafoliacei robusti; ramis elongatis; spathis oblongis coriaceis; glomerulis ad ramos elongatos spiraliter dispositis, 3-floris; flore intermedio fœmineo; lateralibus masculis; bracteis bracteolisque brevibus. (*Nova Caledonia*².)

47? *Mischophloeus* SCHEFF.³ — Flores (fere *Arecae*) monœci; masculorum asymmetricorum calyce longiuscule gamophyllo, 3-dentato. Petala 3, obliqua valvata. Stamina 9; filamentis ima basi 1-adelphis; antheris sagittatis basifixis. Gynœcei rudimentum parvum. Floris fœminei ovoidei masculo minoris sepala orbicularia arcte imbricata. Petala paulo longiora, nisi apice acutato valvato imbricata. Staminodia parva 9. Germen ovoideum, 1-loculare; styli terminalis ramis 3, brevibus recurvis. Ovulum erectum anatropum. Fructus ovoideus stylo coronatus; pericarpio carnoso fibrosoque. Semen ovoideo-sphæricum; hilo basilari; albumine ruminato. —

beng., XLIII, II, 200 (*Areca*). — WENDL. F. et DR., in *Linnaea*, XXXIX, 176. — DR., in *Bot. Zeit.* (1877), t. 5, fig. 12, 13. — BECC., *Males.*, III, 170; *Fl. brit. Ind.*, VI, 406. — RIDL., in *Trans. Linn. Soc.*, ser. II, *Bot.*, III, 390. — WALP., *Ann.*, V, 839.

1. In *B. H. Gen.*, III, 893, n. 22. — DR.,

Pflanzenfam., 75. — *Campecarpus* WENDL. F. (ex B. H.).

2. Spec. 2. AD. BR., in *C. rend. Ac. sc. Par.*, LXXVII, 399.

3. In *Ann. Jard. Buitenz.*, I, 115, 134, 152, t. 11, 12. — B. H., *Gen.*, III, 883, n. 2. — DR., *Pflanzenfam.*, 76.

Inermis; caudice elato annulato, basi radicibus aeriis suffulto. Folia terminalia inæqui-pinnatisecta; segmentis lanceolatis 2-plicato-dentatis, ∞ -nerviis; marginibus basi recurvis; inferiore 1-nervi acuminato. Spadices intrafoliacei ramosissimi; pedunculo brevi; ramis patentibus; floribus in ramo eodem masculis superioribus 2-nis subdistichis; inferioribus autem glomeratis, 3-nis, spiraliter dispositis; intermedio fœmineo; lateralibus in glomerulo masculis. (*Ternata*¹.)

48. *Mentia* BL.² — Flores (fere *Arece*) monœci; masculorum asymmetricorum et inæqui-compressorum sepalis inæqualibus acutis v. acuminatis, ima basi connatis ibique nunc imbricatis. Petala 3, multo majora ovato-oblonga v. ovato-lanceolata, acutata v. acuminata rigida valvata. Stamina 6; filamentis subulatis, nunc basi connatis, apice inflexis; antheris supra basin dorsifixis; loculis linearibus, introrsum rimosis, ima basi liberis. Gynœcei rudimentum varium parvum v. elongato-columnare, apice nunc obliquum. Floris fœminei ovato-pyramidati masculoque minoris sepala breviter orbiculata arcte imbricata petalaeque longiora ovata imbricata, apice acutato valvata. Staminodia breviter squamiformia inæqualia 3-6. Germen ovoideum, 1-loculare, stylis 3 pyramidato-3-gonis primumque conniventibus coronatum. Ovulum basillare crassiusculum; micropyle extrorsum infera loculique basi contigua. Fructus ovato-ellipsoideus, stylo coronatus, perianthio stipatus; pericarpio fibroso; endocarpio tenui. Semen erectum; hilo basilari; rapheos ramis adscendentibus paucis laxè reticulatis; albumine duro æquabili; embryo basilari. — Elatæ inermes; caudice annulato. Folia terminalia æqui-pinnatisecta; segmentis lineari-lanceolatis acuminatis v. 2-dentatis; marginibus ad basin callosam recurvis; costa subtus persistenti-paleata; rhacheos facie acuta; petiolo superne concavo; vagina cylindracea. Spadices intrafoliacei; ramis ad areolas decussatas glomeruligeris; flore intermedio fœmineo; lateralibus masculis; bracteis brevibus latis; bracteolis 2. Spathæ 3; inferiore incompleta. Spathellæ nunc ad ramorum basin lanceolatæ; ramulis elongatis gracilibusque pendulis. (*Ins. Molucc., Nova Guinea*³.)

1. Spec. 1. *M. paniculata* SCHEFF. — *Areca paniculata* BECC., *Males.*, I, 22.

2. *Rumphia*, II, 94, t. 106, 160. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 312 (part.). — ENDL., *Gen.*, n. 1727². — K., *Enum.*, III, 639. — B. H., *Gen.*, III, 884, n. 4. — DR., *Pflanzenfam.*,

73. — BECC., in *Ann. Jard. Buitenz.*, II, 127.

3. Spec. ad 3, quar. typica 1, *K. procera* BL. — BECC., *Males.*, I, 35, 98; in *Ann. Jard. Buitenz.*, II, 129. — WENDL. f. et Da., in *Linnaea*, XXXIX, 179 (part.).

49. *Exorrhiza* BECC.¹ — Flores fere *Kentia*; ♂ masculorum sepalis ovato-3-angularibus imbricatis. Stamina 6 filamenta elongata. Gynæcei rudimentum breviter ovoideum. Fructus (magnus) ovoideo-ellipticus. — Inermis; radicibus epigæis; foliorum segmentis longissime acuminatis rigidiusculis, 3-nervibus; nervo marginali 0. » Cætera *Kentia*. (*Oceania calid.*²)

50? *Carpentaria* BECC.³ — Flores fere *Kentia*; ♂ fructus⁴ mesocarpio carnosio; foliorum segmento terminali eroso-dentato; rhachitomentella; segmentis inferioribus angustissimis acuminatis integris; intermediis gradatim latoribus, 2-dentatis; supremis 2 basi confluentibus, apice pluridentatis. » Cætera *Kentia*. (*Australia occid.*⁵)

51. *Gulubia* BECC.⁶ — Flores fere *Kentia*; ♂ fœmineorum sphaericorum petalis valvatis; staminibus 6; staminodiis sæpius 3; ovulo parietali; fructu ovoideo v. oblongo apiculato, perianthio cupuliformi basi suffulto; albumine ruminato v. æquabili; spadiceis ramis crebris fastigiatis elongatis, 4-gonis; spathis 2. » (*Moluccæ, Nova Guinea*⁷.)

52. *Cyphokentia* AD. BR.⁸ — Flores (fere *Kentia*) monœci. Masculorum ovoideorum v. oblongo-cylindraceorum sepala 3, coriacea crassa concava plus minus arcte imbricata. Petala 3, sæpius longiora, ovata v. oblonga striata valvata. Stamina 6, v. raro 12; filamentis subulatis, nunc apice inflexis; antheris oblongis dorsifixis versatilibus; loculis linearibus, introrsum rimosis. Gynæcei rudimentum columnare crassum, apice nunc dilatatum truncatumve. Floris fœminei masculo subæqualis v. minoris brevioris sepala lata obtusa coriacea arcte imbricata. Petala vix v. paulo longiora orbicularia, arcte imbricata. Staminodia 3-6, varia minuta. Germen ovoideum v. cylindraceum styli excentrici conoidei lobis 3-gonis coronatum; ovulo in loculo solo fertili descendente; micropyle infera. Fructus perian-

1. In *Ann. Jard. Buitenz.*, II, 128, 169.

2. Spec. 1. *E. Wendlandiana* BECC. — *Kentia exorrhiza* WENDL. F., in *Bonplandia* (1862), 191. — *Areca? exorrhiza* WENDL. F., in *Bonplandia* (1861), 260. Genus a *Rhopalostylide* differt (BECC.) calyce masculo et gynæcei rudimentarii forma.

3. In *Ann. Jard. Buitenz.*, II, 128.

4. *Dryophlæi* (BECC.).

5. Spec. 1. *C. acuminata* BECC. — *Kentia*

acuminata WENDL. F. et DR., in *Linnaea*, XXXIX, 207. — BENTH., *Fl. austral.*, VII, 138 (fructu, ut videtur, excludendo).

6. In *Ann. Jard. Buitenz.*, II, 137.

7. Spec. 2. BECC., loc. cit., 131, 134, t. 7, 8; *Malenia*, I, 35, 36 (*Kentia*). — WENDL. F., in *Kerch. Palm.*, 248 (*Kentia*).

8. In *C. rend. Acad. sc. Par.*, LXXVII, 399 (part.). — B. H., *Gen.*, III, 894, n. 25. — DR., *Pflanzenfam.*, 73.

thio haud v. parum aucto stipatus, sæpius subsphæricus (parvus) drupaceus; exocarpio nunc corticato; mesocarpio carnosio v. grumoso; endocarpio plus minus indurato. Semen subsphæricum v. rarius angulatum v. tuberculatum (*Cyphosperma*¹); albumine æquabili duro; embryone sæpius inferiore. — Robustæ inermes v. rarius (*Microkentia*²) arundinaceæ. Folia terminalia, varie pinnatisecta; segmentis attenuatis, acuminatis v. rarius (*Cyphosperma*) præmorsis fissisque. Spadices interfoliacei validi v. nunc (*Microkentia*) graciles; floribus in glomerulos ad ramos spadiceis spiraliter dispositis; intermedio fœmineo, nunc solitario; lateralibus masculis 1, 2, v. glomerulis superioribus omnino masculis, 1-3-floris; bracteis bracteolisque sæpius brevibus inque cupulam approximatis. Spathæ 2, sæpius deciduæ, breves. (*Nova Caledonia*³.)

53. **Hydriastele** WENDL. F. et DR.⁴ — Flores (fere *Kentia*) monœci; masculorum asymmetricorum sepalis parvis acutis. Petala ovato-lanceolata acuminata valvata. Stamina 6; filamentis brevibus; antheris basifixis linearibus. Floris fœminei masculo minoris subsphærici sepala reniformia petalaeque orbicularia paulo longiora imbricata. Germen 1-loculare; styli lobis 3, sessilibus minutis depressis patulis; ovulo descendente supra loculum medium affixo. Fructus (parvus) ellipsoideus lævis v. costatus, stylo coronatus; pericarpium fibris nunc longitudinaliter fasciculatis⁵; endocarpio crustaceo tenui. Semen ellipsoideum; hilo laterali; rapheos ramis paucis a chalaza descendentes remoteque reticulatis; albumine æquabili; embryone inferiore. — Elata inermis; caudice annulato; foliis terminalibus pinnatisectis; segmentis alternis linearibus præmorsis, apice fissis; costa inferne paleacea; rhachi dorso convexa lateraliter compressa; petiolo intus concavo; vagina brevi. Spadices intrafoliacei crasse pedunculati simpliciter ramosi; ramis longis gracilibus pendulis sub-4-dratis; glomerulis ad areolas decussatim oppositas 3-floris; flore intermedio fœmineo; lateralibus masculis; bracteis bracteolisque in cupulam obscuram connatis. Spathæ completæ deciduæ 2; inferiore ancipiti. (*Australia trop.*⁶)

1. WENDL., ex B. H., *Gen.*, III, 895, n. 26.

2. WENDL., ex B. H., *Gen.*, loc. cit., n. 27.

3. Spec. ad 10.

4. In *Linnaea*, XXXIX, 180, 190, 208. — B. H., *Gen.*, III, 885, n. 5. — DR., *Pflanzenfam.*, 73.

5. Pericarpio inde costato.

6. Spec. 1. *H. Wendlandiana*. — *Kentia Wendlandiana* F. MUELL., *Fragm. phyt. Austral.*, VII, 102. — BENTH., *Fl. austral.*, VII, 138. Species verisimiliter sub nomine eodem confusæ 2.

54? *Vitiphœnix* BECC.¹ — Flores fere *Kentiæ* (v. *Ptychospermatis*); « perianthii sub fructu persistentis foliolis brevibus; fructu ellipsoideo²; seminis haud sulcati albumine æquabili. — Inermis; foliorum terminalium pinnatisectorum segmentis elongato-lanceolatis, oblique acuminatis, ad apicem longe filiferis. » (*Ins. Viti*³.)

55. *Ptychandra* SCHEFF.⁴ — Flores (fere *Cyphokentiæ*) monœci: masculi subsphærici regulares; sepalis orbicularibus coriaceis imbricatis. Petala majora cordato-ovata valvata. Stamina ∞ , exserta; filamentis tenuibus, basi 1-adelphis, apice inflexis; antheris dorsifixis oblongis versatilibus. Gynœcei rudimentum minutum. Floris fœminei masculo subæqualis ovoideo-conoidei sepala reniformia petalaeque orbicularia majora imbricata; petalorum apice acutato valvato. Staminodia dentiformia ∞ . Germen 1-loculare; styli ramis 3, sessilibus, 3-gonis; ovulo parietali. Fructus subsphæricus; stylo infra-apicali; pericarpio fibroso; endocarpio duro. Semen sphæricum; rapheos ramis radiantibus brevibus valde reticulatis; albumine duro ruminato. — Elatæ inermes; foliis æqui-pinnatisectis; segmentis lanceolatis; vagina longa albo-cereo-tomentosa. Spadices intrafoliacei decomposite ramosi; glomerulis 3-floris ad ramos spiraliter dispositis; flore intermedio fœmineo v. in glomerulis superioribus 0. Spathæ completæ 2: inferior nunc 2-cristata; superior autem cylindracea, utrinque acuminata. (*Moluccæ, Nova Guinea*⁵.)

56. *Enocarpus* MART.⁶ — Flores (fere *Kentiæ*) monœci; masculorum subirregularium sepalis parvis, liberis v. basi connatis, valvatis v. leviter imbricatis. Petala multo longiora oblique ovata, oblonga v. lanceolata, acuta v. acuminata, rigida, valvata. Stamina 6; filamentis subulatis, basi liberis v. ima basi corollæ adnatis, apice rectis v. incurvis; antheris dorsifixis versatilibus; loculis linearibus, basi liberis, introrsum rimosis, demum explanatis. Gynœcei rudimentum 3-fidum. Floris fœminei masculo minoris breviter conoidei sepala late concava coriacea arcte imbricata. Petala paulo longiora

1. In *Ann. Jard. Buitenz.*, II, 91.

2. « Aurantiaco. »

3. Spec. 1. *V. filifera*. — *Ptychosperma filifera* WENDL. F., in *Bonplandia*, X, 195. — *Drymophlæus filiferus* SCHEFF.

4. In *Ann. Jard. Buitenz.*, I, 140, 160, t. 28; 29, fig. 1. — B. H., *Gen.*, III, 893, n. 23. — Dr., *Pflanzenfam.*, 73.

5. Spec. 3. BECC., in *Ann. Jard. Buitenz.*, II, 90; in *N. Giorn. bot. ital.*, XX, 177.

6. *Hist. nat. Palm.*, II, 21, t. 22-27; III, 310. — K., *Enum.*, III, 179. — SPACH, *Suit. à Buff.*, XII, 65. — SPRENG., *Syst.*, II, 140; *Gen.*, I, 284, n. 1174. — ENDL., *Gen.*, n. 1726. — B. H., *Gen.*, III, 897, n. 30. — Dr., *Pflanzenfam.*, 72.

v. sepalis æqualia similiaque, imbricata v. torta, cum calyce post anthesin sæpius aucta. Staminodia 3-6, v. 0. Germen breve, 3-loculare; styli lobis subsessilibus parvis 3; loculis effœtis 2. Ovulum adscendens; micropyle extrorsa. Fructus¹ sphæricus, ovoideus v. ellipsoideus; pericarpio grumoso, fibroso v. carnosulo. Semen sphæricum v. ellipsoideum, hilo plus minus longe lineari affixum; rapheos ramis radianti-reticulatis; albumine æquabili v. ruminato; embryone basilari. — Elatæ, inermes v. raro aculeatæ; caudicibus solitariis v. fasciculatis annulatis, nunc ad medium ventricosus. Folia terminalia, nunc disticha, pinnatisecta; segmentis rigidis acuminatis plicatis; marginibus basi recurvis; rhachi lateraliter sulcata, intus carinata; petiolo brevi; vagina brevi aperta, nunc raro spinescente. Spadices interfoliacei, breviter pedunculati, fastigiatim ramosi, scapiformes v. hippuriformes; ramis elongatis crassiusculis pendulis; floribus in spadice eodem 2-sexualibus; aut fœmineo in glomerulo 3-floro centrali, aut masculis superne 2-nis; bracteis circa areolas vix depressas brevibus. Spathæ lignosæ caducæque 2: inferior brevior, 2-carinata, apice fissa; superior autem rostrata cylindracea ventrequè rupta. (*America trop.*²)

57. **Euterpe** GÆRTN.³ — Flores (fere *Ænocarpi*) monœci, regulares v. irregulares; sepalis membranaceis v. scariosis 3, arcte imbricatis. Petala 3, multo longiora, ovata v. lanceolata, crassiora, basi connata, valvata. Stamina 6; filamentis ima basi inter se et cum corolla connatis subulatis; antheris rectis v. demum valde arcuatis, linearibus v. oblongis, versatilibus, inter loculos basi liberos dorsifixis. Germen (in flore masculo rudimentarium apiceque integrum v. subulato-3-fidum) ovoideum v. oblongum, basi sæpe gibbum; loculis 3 (vacuis v. ovulo abortivo donatis 1, 2); stylo apice stigmatoso minute 3-gono. Ovulum descendens parietale subsphæricum. Fructus⁴ pisiformis; stigmatibus lateralibus; pericarpio carnosulo parce fibroso granulato; putamine membranaceo. Semen sphæricum, liberum v. adhærens; hilo laterali; rapheos ramis ab eo

1. Nigrescens v. purpurascens.

2. Spec. ad 8. AUBL., *Pl. Guian.*, Suppl., 102 (*Comon*). — MART., *Palm. Orbign.*, 12, t. 8, 18. — KARST., *Fl. columb.*, I, 111, t. 55. — WALL., *Palm.-tr. Amaz.*, 28, t. 9-11. — SPRUCE, in *Journ. Linn. Soc.*, XI, 139. — DR., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 465, t. 108. — WALP., *Ann.*, V, 806, 837.

3. *Fruct.*, I, 24 (part.), t. 9, fig. 3. — SPRENG., *Syst.*, II, 140. — MART., *Hist. nat. Palm.*, II, 28, t. 28-30; III, 165, 309 (part.). — ENDL., *Gen.*, n. 1725. — K., *Enum.*, III, 177. — MEISSN., *Gen.*, 355 (265). — LINDL., *Veg. Kingd.*, 138. — B. H., *Gen.*, III, 896, n. 29. — DR., *Pflanzenfam.*, 72, fig. 14, E; 54.

4. *Purpureus*.

radiantibus; albumine æquabili v. ruminato; embryo ad hilum parvo. — Elatæ graciles; caudicibus annulatis solitariis v. fasciculatis. Folia terminalia æqui-pinnatisecta; segmentis ensiformibus v. lineari-lanceolatis acuminatis plicatis; marginibus recurvis incrassatis; rhachi 3-gona; vagina elongata integra cylindracea; spadiceis ramosi rhachi elongata; ramis superioribus gradatim minoribus, demum erecto-patentibus; spathis membranaceis v. coriaceis 2; inferiore brevior 2-carinata, 2-fida; floribus¹ ramorum cavis spiralliter dispositis insertis, 3-nis; fœmineo sæpius intermedio; cæteris masculis bracteolatis. (*America trop., Antillæ*².)

58. *Oncosperma* BL.³ — Flores (fere *Kentia*) monœci; masculorum asymmetricorum et inæqui-3-gonorum sepalis ovato-acutis parvis inæqualibus, basi imbricatis. Petala oblique ovata acutata rigidiora valvata. Stamina 6, v. rarius 9-12; filamentis subulatis brevibus imæ corollæ adnatis, apice inflexis; antheris oblongis ad basin dorsifixis; loculis linearibus, basi longe liberis, introrsum rimosis. Germen rudimentarium longe conicum, apice 3-fidum. Floris fœminei masculo multo minoris breviterque ovoidei sepala orbiculata, basi crassiuscula gibba, arcte imbricata. Staminodia parva 3-6. Germen oblique ovoideum; stylo brevi crasso, 3-fido; loculis 1-3, quorum 2 nunc minores altius siti. Ovulum parietale adscendens v. « pendulum ». Fructus⁴ sphæricus; styli ramis lateralibus v. basilaribus; pericarpio fibroso v. grumoso; endocarpio subcrustaceo tenui. Semen subsphæricum; hilo longiusculo subbasilari v. ventrali; rapheos ramis ab hilo radiantibus laxèque reticulatis; albumine duro ruminato; embryo subbasilari v. altius sito. — Humiles stoloniferae armatae; caudice longe aculeato. Folia terminalia æqui-pinnatisecta; segmentis ensiformibus acutatis, nunc fasciculatis; marginibus basi recurvis; costa subtus paleacea; rhachi furfuracea superne obtuse carinata, subtus convexa; vagina longa. Spadices intrafoliacei breviter pedunculati, semel bisve ramosi; spathis completis 2, eusi-

1. Albidis, parvis.

2. Spec. ad 9. SCHEFF., in *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, XXXII, 192; in *Ann. Jard. Buitenz.*, I, 128, 130, t. 29, fig. 2. — SPACH, *Suit. à Buff.*, XII, 64. — DR., *Fl. bras.*, III, II, 461, t. 107. — GRISEB., *Fl. brit. W.-Ind.*, 516; *Pl. Wright. cub.*, 530. — SPRUCE, in *Journ. Linn. Soc.*, XI, 136. — OERST., *Palm. centr.-amer.*, 30. — ENG., in *Linnaea*, XXXIII, 669. — TRAILL,

in *Trim. Journ.* (1877), 131. — WALL., *Palm.-tr. Amaz.*, 22, t. 7, 8. — BARB.-RODR., *En. palm. nov.* (1875), 15; *Les Palm.*, obs. (1882), 34, t. 3, fig. 1. — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 401. — WALP., *Ann.*, V, 806.

3. *Rumphia*, 96, t. 82, 103. — B. H., *Gen.*, III, 895, n. 28. — DR., *Pflansenfam.*, 71. — *Kepleria* MEISSN., *Gen.*, 355; *Comm.*, 266.

4. *Mediocris* v. *parvus*.

formibus, inermibus v. aculeatis, caducis; inferiore 2-cristata; floribus glomeratis; fœmineo intermedio v. 0; lateralibus masculis; cymis spiraliter dispositis; bracteis bracteolisque brevibus fossas cymigeras marginantibus. (*Asia trop.*¹⁾

59. **Acanthophœnix** WENDL. F.² — Flores monœci; masculorum asymmetricorum sepalis 3, minutis subcarinatis imbricatis. Petala multo longiora v. nunc longissima, oblique ovata, oblonga v. lanceolato-acuminata valvata. Stamina 6-15, exserta; filamentis longis liberis, apice incurvis; antheris brevibus v. sæpius lineari-oblongis v. sagittatis dorsifixis versatilibus; loculis basi liberis, introrsum rimosis. Gynœcei rudimentum parvum integrum v. 2, 3-fidum. Floris fœminei masculo minoris, ovoidei v. subsphærici, sepala orbicularia petalaeque conformia arcte imbricata. Germen ovoideum v. oblongum asymmetricum, hinc gibbum; styli brevis lobis stigmatosis terminalibus; ovulo parietali hemitropo. Fructus parvus³ v. rarius majusculus, oblongus v. sphæricus, teres v. compressus; stylo laterali v. subbasilari; pericarpio carnosulo intusque fibroso. Semen adscendens; hilo laterali elliptico; rapheos ramis obliquis laxè reticulatis; albumine æquabili; embryone basilari. — Elatæ armatæ; caudice robusto annulato. Folia terminalia æqui-pinnatisecta, plus minus longe spinoscentia; segmentis lineari-lanceolatis acuminatis, subtus paleaceis; marginibus basi recurvis; rhachi sub-3-gona; vagina elongata sæpe spinosa. Spadices intrafoliacei laxè ramosi; glomerulis ad ramos spiraliter confertis; flore⁴ intermedio in singulis fœmineo v. 0; lateralibus autem masculis; pedunculo crasso pendulo spinoso v. lævi; bracteis bracteolisque minutis circa areolam adnatis. (*Ins. Mascaren.*⁵⁾

60. **Deckenia** WENDL. F.⁶ — Flores (*Acanthophœnicis*⁷⁾ monœci :

1. Spec. ad 5. MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 173, 312, t. 150; 153, fig. 4, 5 (*Areca*). — K., *Enum.*, III, 185, n. 4 (*Areca*). — GRIFF., in *Calc. Journ. Nat. Hist.*, V, 423, 465 (*Areca*); *Palms brit. Ind.*, 146, 157, t. 233, B, C (*Areca*). — SCHEFF., in *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, XXXII, 189; in *Ann. Jard. Buitenz.*, I, 139, 159, t. 29, fig. 3; 30. — JACK, in *Mal. Misc.*, II, VII, 88 (*Areca*). — HANCE, in *Trim. Journ.* (1876), 261. — MOON, *Cat. Ceyl. pl.*, 64 (*Caryota*). — THW., *En. pl. Zeyl.*, 328. — BECC., in *Ann. Jard. Buitenz.*, II, t. 15; in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 414. — RIDL., in *Trans. Linn. Soc.*, ser. II, Bot., III, 391.

2. In *Fl. serres*, XVI, t. 181. — B. H., *Gen.*, III, 898, n. 32. — DR., *Pflanzenfam.*, 71.

3. Nunc « *Triticum* grano vix longior ».

4. Flavus v. ruber.

5. Spec. 4, 5. MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 174, 176, t. 154, 155 (*Areca*). — BORY, *Voy.*, I, 306, 307 (*Areca*). — BALF. F., in *Bak. Fl. maurit.*, 384. — *Bot. Mag.*, sub t. 7277. Fructus a MARTIO descriptus non ad *A. rubram* (*Areca rubram* BORY pertinet).

6. In *Bak. Fl. maurit.*, 385. — DR., *Pflanzenfam.*, 71.

7. Ad quam hinc inde refertur (B. H., *Gen.*, III, 898).

masculi minuti; petalis ovato-acutis valvatis. Stamina 9, 1-adelpha; antheris sphæricis. Gynæcei rudimentum columnare angulato-3-fidum. Floris fœminei perianthium imbricatum. Staminodia in cupulam dentatam connata. Fructus¹ ovoideo-delloideus valde compressus fibrosus; endocarpio crustaceo; stylo subbasilari. Semen erectum; rapheos ramis 3-5, ab hilo adscendentibus; albumine æquabili; embryone basilari. — Excelsa²; foliis terminalibus pinnatisectis, plerumque spinescentibus; pinnis subtus crinitis³. Spadices intrafoliacei, basi amplexicaules, bis v. ter ramosi; floribus⁴ ad ramulos pendulos glomeratis; glomerulis spiraliter dispositis; flore glomerulorum intermedio fœmineo (v. in glomerulis superioribus 0); masculis lateralibus superioribus. Spathæ 2, completæ dense spinescentes⁵. (Ins. *Sechellæ*⁶.)

61. *Stevensonia* DUNC.⁷ — Flores monœci; masculorum in alabastro ovoideo-3-gonorum sepalis brevibus reniformibus imbricatis. Petala ovato-acuta coriacea valvata. Stamina 15-20, imo perianthio inserta; filamentis subulatis; antheris lineari-oblongis dorsifixis versatilibus; loculis utrinque liberis, introrsum rimosis. Gynæcei rudimentum subintegrum v. 3-fidum. Floris fœminei masculo minoris sphærici sepala orbicularia crassa imbricata. Petala conformia longiora imbricata v. torta, apice acutato valvata. Staminodia in cupulam dentatam connata (v. 0). Germen ovoideum, 1-loculare; stylo mitriformi, 3-fido; ovulo parietali. Fructus⁸ ellipsoideus (parvus) hinc planiusculus, dorso subcarinato convexus; stylo basilari; pericarpio fibroso; endocarpio crustaceo. Semen adscendens ovoideum; hilo basilari lato; rapheos ramis adscendentibus laxè reticulatis; albumine ruminato; embryone subbasilari. — Elata, aculeata v. demum subinermis; caudice annulato. Folia terminalia patentia; limbo recurvo cuneato-obovato, 2-fido, basi obliquo et plicato-nervoso, margine fisso; segmentis incis; costis validis nervisque subtus paleaceis; petiolo plano-convexo; vagina squamosa aculeata profunde fissa. Spadices interfoliacei, 2-plicato-ramosi; pedunculo longo, basi

1. Niger, in sicco stramineus.

2. « 80-120-pedalis. »

3. « Costula flava. »

4. Flavis.

5. Spinis flexuosis flaventibus, apice sæpius nigrescentibus.

6. Spec. 1. *D. nobilis* WENDL.

7. *Cat. Hort. maurit.*, 87. — BALF. F., in *Bak. Fl. maurit.*, 388. — *Phœnicophorium* WENDL. F., in *Ill. hort.*, XII, t. 433; *Misc.*, 5. — DR., *Pflanzensam.*, 69, fig. 9, H.

8. *Croceus*, parvus.

compresso; floribus⁴ spiraliter glomeratis; intermedio fœmineo (v. 0). (*Ins. Sechellæ*³.)

62. **Verschaffeltia** WENDL. F.³ — Flores monœci. « Masculorum sphæricorum sepala orbicularia imbricata. Petala vix longiora ovato-acuta valvata. Stamina 6; antheris ad medium dorsifixis didymis; loculis nisi medio utrinque liberis, lateraliter rimosis. Gynæcei rudimentum breviter clavatum, vertice dilatato truncato-3-gonum. Floris fœminei masculo majoris sphærici sepala orbicularia concava, basi gibba, coriacea imbricata. Petala paulo longiora coriacea imbricata. Staminodia subulata 6; antheris parvis cassis. Germen oblique ovoideum; stylo laterali; ovulo parietali. Fructus⁴ sphæricus lævis; stylo subbasilari; pericarpio duro carnosio; endocarpio crustaceo pluricarinato. Semen sphæricum erectum sulcatum; hilo basilari; rapheos ramis adscendentibus reticulatis; albumine ruminato; embryone subbasilari. » — Elata, armata v. demum inermis; caudice gracili annulato; radicibus epigæis ∞. Folia terminalia; limbo oblongo v. cuneato-obovato, 2-fido, plicato-nervoso, nunc fere ad rhachin laciniato; segmentis incis; costa nervisque validis, subtus paleaceis; petiolo semitereti; vagina longa furfuracea, alte fissa. Spadices interfoliacei ampli decomposite ramosi; floribus⁵ in glomerulos spiraliter insertos 3-floros dispositis; intermedio fœmineo; bracteis bracteolisque 0; pedunculo longo decurvo furfuraceo. Spathæ 2, 3, longæ vaginantes: inferior persistens; superiores autem deciduæ. (*Ins. Sechellæ*⁶.)

63. **Nephrosperma** BALF. F.⁷ — Flores monœci; « masculorum regularium sepalis orbicularibus, basi gibbis, imbricatis. Petala vix 2-plo longiora ovato-oblonga valvata. Stamina ∞; filamentis inæqualibus crassiusculis; antheris brevibus subhorizontalibus summo filamento dilatato late adnatis. Gynæcei rudimenta ovoidea 1, 2. Floris fœminei masculo minoris subsphærici sepala orbicularia coriacea imbricata. Petala orbicularia paulo longiora imbricata, apice acutato

1. Mediocribus.

2. Spec. 1. *Stevensonia grandifolia* DUNC. — *Bot. Mag.*, t. 7277. — *Phœnicophorium Sechellarum* WENDL. F. — *Astrocaryum Sechellarum* hort. — *Areca Sechellarum* hort.

3. In *Ill. hort.*, XII, *Misc.*, 5. — B. H., *Gen.*, III, 908, n. 55. — DR., *Pflanzenfam.*, 69. — *Rugelia* hort. (ex B. H.).

4. « Pollicaris. »

5. Minutis.

6. Spec. 1. *V. splendida* WENDL. F. — BALF. F., in *Bak. Fl. maurit.*, 387. — *Stevensonia viridiflora* DUNC., *Cat. Hort. maurit.* (ex BALF. F.).

7. In *Bak. Fl. maurit.*, 386. — B. H., *Gen.*, III, 907, n. 52. — DR., *Pflanzenfam.*, 69.

valvata. Staminodia squamiformia. Germen ellipsoideum, 1-loculare; stylo conoideo, 3-fido; ovulo parietali descendente. Fructus¹ sphaericus laevis; stylo laterali; exocarpio tenui carnosio-fibroso; endocarpio tenui crustaceo. Semen suberectum sphaericum; hilo subbasilari oblongo; rapheos ramis adscendentibus laxè reticulatis; albumine ruminato; embryone suprabilari. » — Mediocris, longè spinescens; caudice annulato. Folia terminalia inaequi-pinnatisecta; segmentis inaequalibus acuminatis, 1-plurinerviis; terminalibus confluentibus; nervis subtus paleaceis; rhachi petioloque spinosis; vagina spinosa late fissa. Spadices interfoliacei longi; pedunculo longo compresso erecto simpliciter ramoso, basi bracteis tomentosis 2, 3 aucto; ramis cernuis; glomerulis spiraliter dispositis, 3-floris, obscure bracteatis; flore intermedio foemineo; lateralibus masculis². Spathæ 2: inferior spinosa persistens; superior autem decidua. (*Ins. Sechellæ*³.)

64. *Roscheria* WENDL. F.⁴ — Flores monœci; « masculorum teretiusculorum symmetricorum sepalis suborbicularibus concavis imbricatis. Petala ovata subacuta valvata. Stamina 6; filamentis brevibus triangularibus breviter connatis; antheris dorsifixis late didymis. Gynœcei rudimentum obconicum, vertice dilatato plano-3-gonum. Floris foeminei masculo majoris subsphaerici sepala subreniformia arcte imbricata. Petala cum calyce post anthesin aucta longiora orbicularia imbricata. Staminodia parva v. 0. Germen ovoideo-ellipsoideum, 1-3-loculare; stylo conoideo terminali, 3-fido; ovulo parietali pendulo. Fructus⁵ fusiformis, 1, 2-spermus; stylo subbasilari; pericarpio tenuiter fibroso-carnoso; endocarpio crustaceo, intus nitido. Semen adscendens sphaericum v. (ubi 2) hemisphaericum; hilo basilari; rapheos ramis divaricatis laxè reticulatis; albumine ruminato; embryone hilo proximo. » — Gracilis erecta; caudice ad nodos spinoso; radicibus epigæis. Folia terminalia, 2-fida, demum inaequi-pinnatisecta; segmentis crebris lineari-lanceolatis, apice 2-fidis; nervis subtus paleaceis ∞ ; petiolo longo inermi, intus sulcato et sub-3-gono; vagina longa aculeata. Spadices interfoliacei elongati⁶; pedunculo longo gracili compresso; ramis decompositis; floribus⁷ ad

1. Aurantiaco-ruber, semipollicaris.

2. Majusculis.

3. Spec. 1, raro apud nos culta, insignis.

N. *Vanhoutteana* BALF. F. — *Oncosperma Vanhoutteana* WENDL. F.

4. In *Bak. Fl. maurit.*, 386. — B. H., *Gen.*, III, 913, n. 63. — DR., *Pflanzensam.*, 69.

5. Niger, parvulus.

6. « 2-6-pedales. »

7. Pallidis, minutis.

ramos sparsis, solitariis v. 2-nis; masculo altero; altero autem fœmineo; bracteis bracteolisque 0. Spathæ plures completæ angustæ compressæ inermes: inferiores persistentes 2. (*Ins. Sechellæ*^{1.})

65. *Jessenia* KARST.² — Flores (fere *Ænocarpi*) monœci; masculorum sepalis brevibus subsemiorbicularibus, nunc breviter acuminatis, margine membranaceis, imbricatis. Petala multo longiora, oblonga v. sub lanceolata, rigida v. cartilaginea, valvata. Stamina ∞ ; filamentis brevibus; antheris basifixis linearibus, acutis v. apiculatis, nunc versatilibus adque margines v. introrsum rimosis; loculis inferne ad medium liberis. Gynœcei rudimentum 3-fidum. Floris fœminei masculo minoris depresso sphærici sepala orbicularia carnosula imbricata, cum corolla post anthesin aucta. Petala sepalis consimilia teneriora imbricata v. torta. Germen 3-loculare; loculis effœtis 2; tertio 1-ovulato; stylis brevis ramis stigmatosis validis. Fructus³ ellipsoideus stylo coronatus; exocarpio carnosio-fibroso-oleoso. Semen conforme; hilo elongato ventrali; rapheos ramis crebris vix conspicuis ab hilo divergentibus; albumine ruminato; embryone cylindraceo basilari. — Elatæ inermes; caudice robusto annulato. Folia terminalia æqui-pinnatisecta; segmentis oppositis confertis ensiformibus acuminatis plicatis, basi ad margines recurvis; petiolo breviusculo; vagina brevi aperta; margine fibrosa. Spadices interfoliacei⁴ fastigiatim ramosi penduli; pedunculo brevi; ramis elongatis glomeruligeris; floribus in glomerulis spiraliter dispositis 3; intermedio fœmineo (v. in glomerulis superioribus 0); lateralibus masculis 2 (v. 1), ebracteatis et ebracteolatis. Spathæ fusiformes 2: superior longior ventreque fissa. (*America austr. calid.*⁵)

66. *Clinostigma* WENDL. F.⁶ — Flores monœci; masculorum symmetricorum sepalis 3, orbiculari-concavis, basi gibbis v. saccatis, imbricatis. Petala ovata paulo longiora valvata. Stamina 6-12; filamentis apice inflexis; antheris linearibus v. oblongis dorsifixis versa-

1. Spec. 1. *R. melanochæta* WENDL. F. — *Verschaffellia melanochæta* WENDL. F., in *Ill. hort.* (1871), t. 54. — ? *Dypsis gracilis* MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 181, t. 161, fig. 5 (ex B. H.).

2. In *Linnaea*, XXVIII, 387 (part.); XXXIII, 691, t. 3, fig. 6; *Fl. columb.*, I, 197, t. 98. — B. H., *Gen.*, III, 897, n. 31. — DR., *Pflansenfam.*, 69, fig. 52.

3. Fere *Ænocarpi*.

4. Fructiferæ infrafoliaceæ.

5. Spec. 3. GRISEB., *Fl. brit. W.-Ind.*, 516. — DR., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 472, t. 109. — ENG., in *Linnaea*, XXXIII, 691. Typus est iacolarum *Palma Unamo*.

6. In *Bonplandia* (1862), 196; in *Linnaea*, XXXIX, 185; 186, 218, t. 2 (sect. *Lepidorrhachis*). — B. H., *Gen.*, III, 894, n. 24. — DR., *Pflansenfam.*, 69.

tilibus. Gynæcei rudimentum crasse columnare. Floris fœminei subsphærici masculoque minoris sepala reniformia imbricata. Petala longiora orbicularia imbricata, apice acutato subvalvata. Staminodia linearia 3-6. Germen turbinatum v. subsphæricum, 1-3-loculare; styli brevissimi ramis stigmatosis parvis crassis, 3-gonis; ovulo parietali. Fructus¹ subsphæricus v. oblongus obliquus; stylo basilari v. laterali; pericarpio fibroso grumoso; endocarpio crustaceo v. tenui; loculis 1-3; vacuis minoribus 1, 2. Semen sphæricum v. oblongum arcuatum; hilo orbiculari basilari; rapheos ramis radianti-reticulatis; albumine æquabili; embryone hilo propinquo. — Inermes; caudice elato v. humili, conspicue v. obscure annulato; foliis terminalibus æqui-pinnatisectis; segmentis lanceolatis subfalcatis, basi latis, acuminatis v. 2-fidis (?); marginibus basi vix recurvis; rhachi furfuracea. Spadices intrafoliacei composite ramosi; glomerulis in ramis spirallyter dispositis, 3-floris; flore intermedio fœmineo (v. 0); masculis lateralibus 1, 2; bracteis obsoletis; areolis remotiusculis; spathis 2, 3. (*Australia, Polynesia* ².)

67. *Heterospatha* SCHEFF.³ — Flores⁴ monœci; masculorum compressorum asymmetricorum sepalis suborbicularibus, basi gibbis, imbricatis. Petala ovato-acutiuscula valvata. Stamina 6; filamentis basi connatis, apice inflexis; antheris dorsifixis linearibus versatilibus; loculis utrinque liberis, introrsum rimosis. Gynæcei rudimentum columnare, 3-gonum. Floris fœminei masculo subæqualis sepala reniformia imbricata. Petala longiora orbicularia imbricata, apice acutato conniventia. Staminodia setiformia 6. Germen oblongum, 1-loculare; styli ramis parvis recurvis; ovulo parietali descendente. Fructus pisiformis grumosus; stylo excentrico. Semen adscendens sphæricum; hilo basilari; rapheos elongatæ ramis a chalaza descendentibus reticulatis; albumine parce ruminato; embryone basilari. — Elata inermis; foliis terminalibus æqui-pinnatisectis; segmentis lanceolatis acuminatis, 1-nerviis; marginibus basi recurvis; rhachi dorso rotundata, facie plana; petiolo longo⁵; vagina brevi, basitumente, fibrosa. Spadices interfoliacei ramosissimi; glomerulis spi-

1. Ruber, parvus.

2. Spec. 3. F. MUELL., *Fragm. phyt. Austral.*, VII, 101; VIII, 234 (*Kentia*), 235. — BENTH., *Fl. austral.*, VII, 139. — BECC., *Malezia*, I, 40 (part.).

3. In *Ann. Jard. Builens.*, I, 141, 162. — B. H., *Gen.*, III, 906, n. 51. — DR., *Pflansenfam.*, 69.

4. Mediocres.

5. Cicatricibus in stipite conspicuis.

raliter dispositis, 3-floris; flore intermedio fœmineo (v. 0). Spathæ 2 : inferior multo brevior, 2-cristata. (*Amboina*¹.)

68. **Iguanura** BL.² — Flores in spadice eodem monœci regulares; masculorum sepalis orbicularibus coriaceis, basi extus gibbis v. carinatis, imbricatis. Petala ovato-acuta v. lanceolata, ima basi connata crassiuscula, valvata. Stamina 6-9; filamentis basi connatis; apice subulato recto v. inflexo; antheris dorsifixis oblongis v. sagittatis versatilibus, introrsum rimosi. Gynæceum rudimentarium 3-gonum. Floris fœminei masculo minoris et subsphærici sepala (marium) imbricata. Petala paulo longiora orbiculari-acutata imbricata. Staminodia dentiformia 6. Germen ovoideo-oblongum, teres v. gibbum, 1-3-loculare; loculis effœtis 2; styli brevis 3-goni lobis stigmatosis; ovulo adscendente « parietali ». Fructus ovoideo-oblongus, stylo coronatus, fibroso-carnosus; endocarpio chartaceo. Semen suberectum, lateraliter affixum; rapheos ramis adscendentibus, mox arcuatis reticulatis; albumine æquabili v. ruminato; embryone subbasilari. — Humiles inermes arundinaceæ; caulibus annulatis. Folia terminalia, integra v. demum æqui-pinnatisecta; segmentis latis acuminatis præmorso-dentatis fissisve; summis conniventibus; petiolo gracili cum rhachi furfuraceo v. glabrato; vagina basi integra v. aperta. Spadices pedunculati interfoliacei simplices v. ramosi; ramis gracilibus patentibus paucis. Spathæ 2, persistentes tubulosæ : inferior 2-cristata; superior autem superne aperta; glomerulis ad foveolas bracteatas bracteolatasque spiraliter dispositis; floribus 2, 3-nis; intermedio fœmineo; lateralibus masculis 1, 2. (*Archip. Malayan*.³)

69. **Sommieria** BECC.⁴ — Flores (fere *Iguanuræ*) monœci; masculorum sphæricorum regularium sepalis rotundatis carinatis subscariosis imbricatis. Petala breviter ovata acuta tenuiora valvata. Stamina 6; filamentis subulatis, basi connatis; antheris dorsifixis oblongis versatilibus. Gynœcei rudimentum minutum. Floris fœminei

1. Spec. 1. *H. elata* SCHEFF. — BECC., *Malesia*, I, 101.

2. *Rumphia*, II, 105, t. 117. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 229, 317, t. 178. — K., *Enum.*, III, 643. — ENDL., *Gen.*, n. 1752. — B. H., *Gen.*, III, 907, n. 53. — DR., *Pflanzenfam.*, 68. — *Slackia* GRIFF., *Notul.*, III, 162; *lc. pl. as.*, t. 243; *Palms brit. Ind.*, 161, t. 234.

3. Spec. ad 10. MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 43, 749. — WALL., *Cat.*, n. 8600 (*Areca*). — SCHEFF., in *Ann. Jard. Buitenz.*, I, 132, 141, 161. — WENDL. F., in *Bot. Zeit.* (1859), 63. — BECC., *Malesia*, III, 100, 187; in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 415. — WALP., *Ann.*, V, 814.

4. *Malesia*, I, 66. — B. H., *Gen.*, III, 909, n. 58. — DR., *Pflanzenfam.*, 69.

masculo minoris sepala reniformia imbricata. Petala orbicularia paulo longiora imbricata, apice acutato valvata. Staminodia parva. Germen....; styli ramis reflexis crassiusculis; ovulo basilari (?). Fructus sphæricus¹; stylo basilari; pericarpio extus suberoso-corticato et angulato-echinato; endocarpio crustaceo fragili. Semen erectum sphæricum; hilo basilari; rapheos ramis adscendentibus moxque descendentibus reticulatis, endocarpio impressis; embryo ad albumen æquabile basilari. — Humiles inermes; caudice annulato brevi. Folia terminalia oblongo-cuneata, 2-fida plicato-nervosa; lobis apice crenatis; rhachi intus acuta dorsoque convexa; petiolo longo furfuraceo, intus concavo adque margines acutato; vaginæ marginibus fibrosis. Spadices interfoliacei digitatim ramosi; glomerulis ad ramos simplices graciles spiraliter dispositis, 3-floris; flore intermedio fœmineo; lateralibus masculis, bracteatis bracteolatisque. Spathæ 2, completæ membranaceæ: inferior longe tubulosa; superior autem sub ramis 2-partita laceraque. (*Papua*².)

70. *Calyptrocalyx* BL.³ — Flores monœci; masculorum symmetricorum sepalis 3, orbiculari-cucullatis coriaceis imbricatis. Petala 3, paulo longiora ovata obtusa valvata. Stamina ∞: exteriora fertilia; filamentis subulatis inæqualibus, basi connatis; antheris basifixis linearibus versatilibus; loculis inferne longe liberis, introrsum rimosis. Staminodia interiora inæqualia ∞. Gynæcei rudimentum minutum. Floris fœminei masculo minoris subsphærici sepala orbicularia imbricata. Petala paulo longiora, basi dilatata imbricata, apice acutato conniventi-valvata. Staminodia 8, 9 (v. 0). Germen ovoideo-oblongum sub-3-gonum, 1-loculare, stylo conoideo crasse 3-fido coronatum; ovulo parietali. Fructus oliviformis v. ovoideus stylo umbonatus; pericarpio crasso succoso-fibroso; endocarpio semini adhærente. Semen sphæricum v. ovoideum; hilo ventrali lineari; rapheos ramis radiantibus reticulatis; albumine ruminato; embryo basilari. — Graciles inermes; caudice annulato; foliis terminalibus æqui-pinnatisectis; segmentis lineari-lanceolatis acutis; marginibus incrassatis, basi recurvis; vagina petioloque brevibus. Spadices interfoliacei longissimi penduli longe pedunculati, solitarii v. 2-ni; glo-

1. *Piso* major.

2. Spec. 2. *S. leucophylla* BECC. et *S. elegans* BECC., loc. cit.

3. *Rumphia*, II, 103, t. 102, D; 118, 161; in *Bull. néerl.* (1838), 66. — K., *Enum.*, III, 642.

— SCHEFF., in *Ann. Jard. Buitenz.*, I, 131, 140. — B. H., *Gen.*, III, 902, n. 42. — DR., *Pflanzenfam.*, 68, fig. 51. — *Laccospadix* WENDL. F. et DR., in *Linnaea*, XXXIX, 178, 189, 205, t. 2, fig. 2.

merulis in foveolis spiraliter dispositis immersis, 3-floris; flore fœmineo intermedio; bractea labio foveolæ hinc adnata, nunc protrusa linguiformi; bracteolis brevissimis. Spatha 1, completa spadiceque brevior decidua. (*Amboina, Australia*¹.)

71. **Linospadix** WENDL. F. et DR.² — Flores (fere *Kentia*) monœci; masculorum calyce plus minus 3-gono; sepalis suborbicularibus crassis, nunc gibbis, arcte imbricatis. Petala ovata v. oblonga crassa valvata. Stamina 6-12; filamentis brevibus subulatis; antheris oblongis dorsifixis v. subbasifixis, apice obtuso nunc connectivo truncato crassiusculo superatis; loculis basi liberis, introrsum rimosis. Gynæcei rudimentum varium (v. 0). Floris fœminei masculo minoris, ovoidei v. subsphærici, sepala brevia crassa arcte imbricata. Petala æquilonga v. sæpius longiora, apice acutato valvata, inferne dilatato-imbricata. Staminodia dentiformia varia. Germen ovoideum, basi abrupte contractum, apice in styli ramos 3, acutato-3-gonos, attenuatum. Ovulum in loculo unico subbasilare adscendens v. horizontale; micropyle infera. Fructus ovoideus v. ellipsoideus stylo coronatus, carnosus v. coriaceus fibrosus; endocarpio tenui. Semen erectum sessile; rapheos ramis adscendentibus v. reticulatis; albumine æquabili; embryone basilari. — Humiles inermes; caulibus arundinaceis annulatis. Folia inæqui-pinnatisecta v. flabellato-2-fida; lobis dentatis, laciniatis v. pinnatisectis; pinnis angustis v. latioribus, superne nunc confluentibus; petiolo rhachique gracilibus furfuraceis; vagina aperta sæpius brevi, nunc reticulato-fibrosa. Spadices interfoliacei simplices; foveolis plus minus profundis; glomerulis 2, 3-floris, bracteatis bracteolatisque; flore intermedio fœmineo; lateralibus masculis 1, 2. (*Oceania calid.*³)

72. **Gigliolla** BECC.⁴ — Flores⁵ monœci; masculorum subsymmetricorum calyce breviter tubuloso truncato, 3-dentato. Petala 3, lanceolato-acuminata coriacea valvata. Stamina 3-9; filamentis basi

1. Spec. 2. MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 44; *Palm. Arch. ind.*, 9. — BENTH., *Fl. austral.*, VII, 140 (*Ptychosperma*). — BECC., in *Ann. Jard. Bot. Buitenz.*, II, 142, t. 10.

2. In *Linnaea*, XXXIX, 177, 188, 198, t. 2, fig. 2. — BECC., *Males.*, I, 62. — DR., *Pflanzenfam.*, 67. — B. H., *Gen.*, III, 903, n. 44. — *Bacularia* F. MUELL., *Fragm. phyt. Austral.*, VII, 103.

3. Spec. ad 6. MART., *Hist. nat. Palm.*, 178, t. 155, fig. 4 (*Areca*). — F. MUELL., *Fragm. phyt. Austral.*, VII, 82 (*Kentia*). — BENTH., *Fl. austral.*, VII, 137, n. 1, 2 (*Kentia*). — BECC., *Males.*, III, 108 (*Bacularia*). — *Bot. Mag.*, t. 6644 (*Bacularia*).

4. *Males.*, I, 171. — B. H., *Gen.*, III, 904, n. 46. — DR., *Pflanzenfam.*, 67.

5. Majusculi.

1-adelphis; antheris introrsis dorsifixis brevibus v. lineari-elongatis. Gynæcei rudimentum parvum, 3-lobum. Flores fœminei masculo multo majores ovoidei; sepalis rotundatis arcte imbricatis. Petala ovato-rotundata paulo longiora, basi concava imbricata, apice in-crassato valvata. Staminodia minuta 3-6. Germen ovoideum, basi abrupte contractum, 1-loculare; stylo crasse conico; lobis stigmatosis crasse 3-gonis; ovulo basilari subhorizontali. Fructus ovoideo-cylindræus, stylo coronatus; pericarpio crasse coriaceo; semine elongato basifixo. — Humiles inermes; caule arundinaceo nunc brevissimo annulato. Folia terminalia; limbi 2-fidi lobis apice dentatis v. æqui-pinnatisectis; segmentis flaccidis lineari-lanceolatis acuminatis caudatis; marginibus basi recurvis; petiolo gracili; vagina fissa. Spadices interfoliacei longe pedunculati; ramis subdigitatis rigidis v. flexuosis; glomerulis subdistichis; superioribus masculis 1, 2-floris; flore fœmineo versus basin solitario v. floribus masculis 1, 2 stipato; bracteis bracteolisque 0. Spatha 1, longissime ensiformis compresso-2-carinata completa; hinc longitudinaliter fissa. (*Borneo*¹.)

73. *Howea* BECC.² — Flores monœci; masculorum symmetri-corum sepalis 3, orbicularibus concavis subcarinatis imbricatis. Petala late ovata, basi connata, coriacea valvata. Stamina ∞ ; antheris sessilibus v. subsessilibus basifixis erectis linearibus. Floris fœminei masculi minoris sepala reniformia imbricata. Petala minora orbicularia imbricata v. torta, apice acutato valvata. Germen 1-loculare³; styli lobis stigmatosis 3; ovulo erecto. Fructus oliviformis crassus fibrosus, stylo umbonatus; endocarpio solubili tenuiter crustaceo. Semen erectum; hilo basilari; rapheos ramis adscendentibus; ramulis autem descendentibus reticulatis; albumine æquabili; embryone basilari. — Elatæ inermes; caudice robusto annulato; basi nunc recurva e terra exserta radicifera. Folia dense terminalia æqui-pinna-tisecta; segmentis acuminatis. Spadices ampli⁴, solitarii simplices v. e spatha una pauci crasse cylindræci penduli; glomerulis in cavis spiraliter semi-immersis, 3-floris; flore fœmineo intermedio v. 0; masculis⁵ lateralibus, bracteatis et bracteolatis. Spatha 1, cylin-

1. Spec. 2, dissimiles, scil. *G. insignis* et *G. subacaulis* BECC., loc. cit.

2. *Males.*, I, 67 (*Howea*). — B. H., *Gen.*, III, 904, n. 45. — DR., *Pflanzenfam.*, 67. — *Grisebachia* WENDL. F. et DR., in *Linnæa*,

XXXIX, 177, 188, 200, t. 4, fig. 1, 2 (non Kl.).

3. Vel loculi nunc 2, 3.

4. Circiter 1-metrales.

5. Semi-pollicaribus.

dracea, apicem versus 2-carinata, longitudinaliter rupta. (Ins. Lord Howe¹.)

74. *Oreodoxa* W.² — Flores (fere *Howeæ*) monœci; masculorum sepalis minutis obtusis scariosis imbricatis. Petala multo longiora ovato- v. oblongo-acuta coriacea, ima basi connata, valvata. Stamina 6-12; filamentis subulatis, ima basi dilatata corollæ adnatis; antheris (magnis) ovato-oblongis dorsifixis versatilibus; loculis inferne liberis, introrsum rimosis. Flores fœminei masculo minores ovoideo-conici; sepalis subreniformibus obtusis late imbricatis. Corolla plus minus alte 3-loba valvata. Stamina ad coronam dentatam corollæ fauci adnatam reducta. Germen hinc gibbum, 3-loculare; stylo brevi crasso stigmatoso-3-lobo. Ovulum in loculo solo fertili adscendens ventrifixum; micropyle extrorsum infera. Fructus ovoideus v. oblongus curvus; styli lobis subbasilaribus; exocarpio fibroso-carnoso; endocarpio tenui. Semen intus pericarpio adnatum; hilo elongato ventrali; rapheos ramis ab hilo radiantibus reticulato-ramulosis; albumine æquabili; embryo subbasilari. — Inermes elatæ; caudice robusto cylindrico v. ad medium dilatato. Folia æqui-pinnatisecta; segmentis lineari-lanceolatis inæqui-2-fidis; costa subtus paleacea; marginibus basi recurvis; petiolo semi-cylindrico, intus sulcato; vagina longa. Spadices infrafoliacei (magni) decompositi; ramulis longis pendulis; spathis completis 2; inferiore spadici æquali semi-cylindracea; superiore autem angusta, ventre fissa; floribus³ in glomerulos sparsos bracteatos bracteolatosque spiraliter dispositis 2, 3; intermedio inferne fœmineo; masculis in glomerulo eodem laterilibus. (*America trop.*⁴)

75. *Nenga* WENDL. F. et DR.⁵ — Flores (fere *Pinangæ*) monœci; masculorum sepalis 3-angulari-subulatis, demum corolla⁶ multo longioribus. Stamina 6. Gynæcei rudimentum parvum (v. 0). Floris fœminei sepala petalaeque rotundata. Stamina 0. Germen 1-locu-

1. Spec. 2. F. MUELL., *Fragm. phyt. Austral.*, VII, 99; VIII, 234 (*Kentia*). — BENTH., *Fl. austral.*, VII, 137 (*Kentia*). — DR., in *Bot. Zeit.* (1877), 636, t. 5, fig. 14, 15. — *Ill. hort.*, t. 191 (*Kentia*). — *Bot. Mag.*, t. 7018.

2. In *Mém. Acad. Berl.* (1804), 34. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 166, 310, t. 156, 163. — ENDL., *Gen.*, n. 1727. — K., *Enum.*, III, 181. — B. H., *Gen.*, III, 899, n. 35. — DR., *Pflanzenfam.*, 67.

3. Albidis, parvis.

4. Spec. ad G. JACQ., *St. sel.*, t. 170 (*Areca*). — H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, I, 304. — SPRENG., *Syst.*, II, 140 (*Enocarpus*). — GRISEB., *Fl. brit. W.-Ind.*, 527; *Cat. pl. cub.*, 222. — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 401. — WALP., *Ann.*, V, 807.

5. In *Linnæa*, XXXIX, 182. — B. H., *Gen.*, III, 888, n. 12. — DR., *Pflanzenfam.*, 475 (part.).

6. Nunc anomala duplici.

lare; stylo conico profunde 3-lobo; ovulo parietali. Fructus¹ ovoideus, mamillaris v. elongato-ellipsoideus. Semen ellipsoideo-acutum v. late ovoideum. — Inermes; foliis pinnatis; segmentis alternis ensiformibus v. sigmoideo-falcatis. Spadices infrafoliacei, 3, 4-ramosi; floribus² ad ramos 4-6-stichis. Spathæ magnæ glabræ³. Cætera *Pinangæ*. (*Malaisia* ⁴.)

76? *Nengella* BECC.⁵ — Flores fere *Nengæ* (v. *Pinangæ*). Masculorum asymmetricorum sepala ovato-acuta v. subulata inæqualia. Petala oblique ovato-lanceolata, apice acuminato valvata. Stamina 6; filamentis subulatis; antheris basifixis linearibus. Gynæcei rudimenta parva. Floris fœminei masculo minoris et longe pyramidati sepala orbicularia imbricata. Petala basi late imbricata, apice ovato-lanceolata valvata. Staminodia 3 (v. 0). Germen ovoideum, basi contractum; styli ramis 3, brevibus recurvis; ovulo parietali descendente; micropyle infera. Fructus elongatus, rectus v. arcuatus; stylo terminali; pericarpio parce fibroso; endocarpio tenui. Semen adscendens elongatum; rapheos ramis gracilibus longitudinalibus; albumine æquabili; embryone basilari. — Humiles inermes; caudicibus arundinaceis annulatis. Folia terminalia pinnatisecta v. flabeliformia furcata; segmentis superioribus erosis v. fissis; inferioribus lineari-lanceolatis acuminatis; petiolo rhachique cum vagina longe fissa furfuraceis, 3-gonis. Spadix infrafoliaceus simplex pendulus gracilis; glomerulis in areolis decussatis 3-floris; flore intermedio fœmineo; lateralibus masculis; bracteis bracteolisque squamiformibus. (*Nova Guinea*, *Arch. Malayan*.⁶)

77. *Gronophyllum* SCHEFF.⁷ — Flores (*Nengæ*) monœci; masculorum asymmetricorum 3-gono-compressorum sepalis parvis acutatis. Petala ovato-lanceolata acuminata valvata. Stamina 6; filamentis brevibus; antheris basifixis linearibus introrsis. Gynæcei rudimentum 3-lobum. Floris fœminei masculo minoris sepala orbicularia

1. Ruber v. aurantiacus.

2. Albido-lutescentibus.

3. Nunc purpureæ.

4. Spec. 2. BL., *Rumphia*, II, 77, t. 107 (*Pinanga*); t. 99; 102, C (*Areca*). — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 311, t. 153, fig. 1-3 (*Areca*). — SCHEFF., in *Ann. Jard. Buitenz.*, I, 120, 134, 153, t. 9, 10. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 14 (part.); *Palm. Arch. ind.*, 23 (*Areca*). — BECC. et HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 412.

— BECC., *Males.*, I, 25; III, 180; in *Ann. Jard. Buitenz.*, II, 83. — *Bot. Mag.*, t. 6025.

5. *Males.*, I, 24, 32, t. 1; 97, t. 2; III, 180.

— B. H., *Gen.*, III, 886, n. 8.

6. GRIFF., *Palms brit. Ind.*, 156, t. 232, fig. 2 (*Areca*). — DR., *Pflanzenfam.*, 75 (*Nengæ* subgen. 4). — BECC., in *Ann. Jard. Buitenz.*, II, 81.

7. In *Ann. Jard. Buitenz.*, I, 135, 153. — B. H., *Gen.*, III, 886, n. 7.

imbricata, post anthesin cum corolla aucta. Petala longiora, basi dilatata imbricata apiceque acutato valvata. Staminodia minuta (v. 0). Germen oblongum, 1-loculare; styli ramis erectis crasse deltoideis; ovulo parietali. Fructus pisiformis v. ovoideo-oblongus, stylo coronatus, fibrosus intusque lævis. Semen sphæricum v. oblongum endocarpio adhærens; hilo laterali elongato; rapheos ramis descendentibus laxè reticulatis; albumine ruminato; embryone basilari. — Inermes; caudice gracili annulato. Folia terminalia æqui-pinnatisecta; segmentis cuneatis truncatis multinerviis, apice erosio v. laceris; summis confluentibus; marginibus basi recurvis; nervis extimis marginalibus; rhachi dorso convexa petioloque intus canaliculato furfuraceis; vagina longissima fissa. Spadices infrafoliacei fastigiatis ramosi; glomerulis ad ramulos graciles pendulos 3-floris et in areolis decussato-oppositis insertis; flore intermedio fœmineo v. 0; masculis lateralibus 1, 2; bracteis bracteolisque perbrevis in annulum connatis. Pedunculus brevis. Spathæ 3, completæ longè complanatæ caducæ. (*Oceania trop.*¹)

78. **Leptophœnix** BECC.² — Flores fere *Nengæ*: « masculi ...? Fœmineorum in alabastro pyramidorum sepala rotundata late imbricata. Petala basi imbricata, apice 3-angulari valvata, sepalis longiora. Germen oblongum; stylo profunde 3-lobo; lobis crassis acutis, 3-gonis. Ovulum ex apice loculi pendulum; raphe perbrevis. Semen pericarpio tenuiter adhærens elliptico-oblongum; hilo brevissimo areolæformi, lateraliter apicali. » (*Nova Guinea*³.)

79. **Archontophœnix** WENDL. F. et DR.⁴ — Flores monœci; masculorum assymetricorum et 3-gono-compressorum sepala 3, parva, 3-angulari-rotundata, dorso carinata, imbricata. Petala 3, ovato-oblonga acuta obliqua valvata. Stamina 9-∞; filamentis basi connatis, apice inflexis; antheris linearibus dorsifixis versatilibus; loculis basi liberis, introrsum rimosis. Gynæcei rudimentum columnare. Floris fœminei subsphærici masculo minoris sepala orbicularia imbricata. Petala minora conformia. Staminodia subulata 6 (v. 0). Germen pyramidatum, 3-gonum, 1-loculare; styli terminalis ramis stigma-

1. Spec. 2. BECC., *Males.*, I, 28, 98, t. 2, fig. 1-22 (*Nengæ*); in *Ann. Jard. Buitenz.*, II, 81, t. 1, 2.

2. In *Ann. Jard. Buitenz.*, II, 82. Genus forte potius ad *Nengæ* sectionem reducendum.

3. Spec. 2. *L. pinangoides* BECC. et *L. affinis* BECC. — *Nengæ* spec. BECC., *Males.*, I, 27, 28.

4. In *Linnaea*, XXXIX, 182, 190, 211, t. 3, fig. 6. — B. H., *Gen.*, III, 889, n. 15. — DR., *Pflanzenfam.*, 75.

tos recurvis parvis 3; ovulo parietali; micropyle infera. Fructus ellipsoideo-sphæricus stylo umbonatus; pericarpio fibroso; fibris anastomosanto-vittatis; endocarpio tenui. Semen adscendens cumque endocarpio adhærens læve; hilo lineari ventrali; rapheos ramis reticulatis; albumine valde ruminato; embryone basilari. — Elatæ inermes; caudice robusto annulato. Folia terminalia æqui-pinnatisecta; segmentis lineari-lanceolatis, apice acuminatis v. 2-dentatis; marginibus basi recurvis; costa paleacea; rhachi extus convexa intusque valde carinata, cum petiolo superne canaliculato tomentella; vagina cylindracea longa alte fissa. Spadices infrafoliacei breviter pedunculati, 3-plicato-ramosi; ramis ramulisque gracilibus pendulis flexuosis; glomerulis spiraliter dispositis, 3-floris; flore intermedio fœmineo (v. 0); bracteis semi-lunaribus adnatis; bracteolis minutis persistentibus. Spathæ 2, completæ longe complanatæ caducæ. (*Australia*¹.)

80. **Dictyosperma** WENDL. F. et DR.² — Flores (fere *Nengæ*) monœci; sepalis parvis ovato-acutis sæpius inæqualibus, basi imbricatis. Petala longiora ovata rigida, apice obtusa v. acutiuscula, valvata. Stamina 6; filamentis subulatis breviusculis, apice inflexis; antheris dorsifixis versatilibus; loculis linearibus, introrsum rimosis. Gynæcei rudimentum columnare v. longe conicum, apice sæpe 3-fidum. Floris fœminei masculo minoris sepala petalæque paulo longiora orbicularia, arcte imbricata subque fructu aucta. Staminodia 3-6, dentiformia v. subulata. Germen oblongo-obovoideum, basi angustatum, apice stigmatoso obtuse 3-gonum. Ovulum in loculorum uno adscendens plus minus alte parietale; micropyle extrorsum infera. Fructus ovoideus v. subsphæricus furfuraceus stigmatate coronatus; pericarpio fibroso; endocarpio tenui. Semen conforme, hilo laterali nunc usque ad apicem affixum; rapheos ramis obliquis laxè reticulatis; albumine duro ruminato; embryone subbasilari. — Inermes graciles annulatæ. Folia æqui-pinnatisecta; segmentis lanceolatis acuminatis v. 2-fidis; summis confluentibus; marginibus inferne recurvis; nervis paleatis nudisve; rhachi petioloque 3-gonis furfuraceis; vagina longe integra. Spadices infrafoliacei

1. Spec. 3. MART., *Hist. nat. Palm.*, II, 181, t. 105, 106, 109 (*Seaforthia*). — F. MUELL., *Fragm. phyt. Austral.*, V, 47, t. 43, 44 (*Ptychosperma*). — BENTH., *Fl. austral.*, VII, 141

(*Ptychosperma* 2 et 3). — KENCK., *Palm.*, t. 5. — *Bot. Mag.*, t. 4961 (part.) (*Seaforthia*).
2. In *Linnaea*, XXXIX, 181. — B. H., *Gen.*, III, 890, n. 17. — DR., *Pflanzenfam.*, 75.

breviter pedunculati simpliciter ramosi; floribus¹ 3-nis; glomerulis spiraliter dispositis; flore intermedio sæpius fœmineo; lateralibus masculis. Spathæ 2, completæ aque dorso compressæ caducæ: inferior 2-cristata; bracteis bracteolisque squamiformibus; inferioribus sæpius majoribus. (*Ins. Mascaren.*²)

81. **Ptychoraphis** BECC.³ — Flores (fere *Nengellæ*) monœci. Masculorum sphæricorum symmetricorum sepala nunc gibba, imbricata, margine ciliata. Petala valvata. Stamina 6; erecta; filamentis basi dilatatis; antheris dorsifixis. Floris fœminei sepala gibba, apice ciliata, imbricata. Petala subtriloba imbricata. Staminodia 6; filamentis late 3-angularibus; antheris abortivis. Germen obovato-oblongum; styli ramis 3, reflexis canaliculatis; ovulo parietali. Fructus cæteraque *Nengellæ*; semine ad raphen sulco profundo recto instructo; albumine profunde ruminato; embryone basilari oblongo. — Elatæ v. humiles; foliis æqui-pectinato-pinnatisectis; segmentis alternis lanceolatis acuminatis; supremis nunc confluentibus. Spadices a basi simpliciter ramosi; ramis paucis rimuloso-squamosis. (*Asia austro-or., Malaisia, Ins. Philipin.*⁴)

82. **Rhopaloblaste** SCHEFF.⁵ — Flores (fere *Nengæ*) monœci; masculorum symmetrice sphæricorum v. ovoideorum sepalis orbicularibus concavis imbricatis. Petala ovato-elliptica valvata. Stamina 6-9; filamentis apice inflexis; antheris dorsifixis oblongis versatilibus. Gynœcei rudimentum columnare truncatum. Floris fœminei masculo majoris subsphærici sepala orbicularia imbricata, cum corolla post anthesin aucta. Petala basi dilatata imbricata, apice acutato valvata. Staminodiâ 6 in cupulam dentatam connata. Germen ovoideum, basi abrupte contractum, 1, 2-loculare; styli ramis 3, subulatis recurvis; ovulo parietali descendente. Fructus⁶ ovoideus acutiusculus stylo coronatus; pericarpio fibroso; endocarpio crustaceo intus lævi. Semen conforme erectum; hilo exsculpto a basi ad verticem

1. Flavescentibus v. albidis.

2. Spec. 2, 3. MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 175, t. 154, 155 (*Areca*). — BORY, *Voy.*, I, 306 (*Areca*). — BOJ., *Hort. maurit.*, 305 (*Areca*). — BALF. F., *Fl. maurit.*, 384. — SCHEFF., in *N. Tijd. N. Ind.*, XXXII, 183 (*Ptychosperma*). — WRIGHT, in *Kew Bull.* (1894), 358.

3. In *Ann. Jard. Buitenz.*, II, 90, 126; *Males.*, III, 109.

4. Spec. ad 3. KURZ, in *Trim. Journ.* (1875), 331 (*Areca*). — B. H., *Gen.*, III, 892 (*Rhopaloblaste*). — BECC., *Males.*, I, 61 (*Ptychosperma*); in Hook. f. *Fl. brit. Ind.*, VI, 413. Genus *Nengæ*, ut videtur, quam maxime affine.

5. In *Ann. Jard. Buitenz.*, I, 135, 137, 156, t. 26; 27, fig. 1. — B. H., *Gen.*, III, 891, n. 19. — DR., *Pflanzenfam.*, 75.

6. Cum floribus inter minores.

extenso; rapheos ramis descendentibus laxè reticulatis parum conspicuis; albumine ruminato; embryo basilari. — Inermes; caudice robusto v. gracili annulato. Folia terminalia æqui-pinnatisecta; segmentis alternis lineari-lanceolatis acuminatis angustis, 3-5-nerviis; marginibus basi recurvis v. planis; costa subtus paleacea. Spadices infrafoliacei breviter pedunculati, laxè racemosi; racemis longis gracilibus; glomerulis spiraliter dispositis, 3-floris; flore intermedio fœmineo, nunc 0; masculis lateralibus 1, 2, nunc in glomerulis superioribus solitariis; bracteis bracteolisque minute squamiformibus. Spathæ completæ caducæ 2; inferiore brevior, 2-carinata. (*Ins. Moluccæ, Nova Guinea*¹.)

83. **Actinorhytis** WENDL. F. et DR.² — Flores (fere *Nengæ*) monœci; masculorum assymetricorum sepalis orbicularibus concavis carinatis imbricatis. Petala ovata crassa valvata. Stamina ∞ , imo perianthio affixa, ∞ -fasciculata; filamentis apice inflexis; antheris dorsifixis linearibus versatilibus. Gynœcei rudimentum minutum subulatum (v. 0). Floris fœminei masculo multo majoris sepala reniformi-orbicularia imbricata, post anthesin cum corolla valde aucta. Petala paulo longiora suborbicularia imbricata, apice valvato 3-angularia. Staminodia 3 (v. 0). Germen late ovoideum, 1-loculare; stylis 3, parvis subulatis recurvis; ovulo parietali. Fructus³ ovoideo-ellipsoideus styloque coronatus crasso-fibrosus; endocarpio crustaceo. Semen conforme, pericarpio adhærens; hilo laterali semini æquali; rapheos ramis crebris reticulatis; albumine radiatim ruminato; embryo basilari longo. — Elata inermis; caudice robusto annulato. Folia terminalia æqui-pinnatisecta; segmentis lineari-lanceolatis acutis, apice oblique dentatis; marginibus incrassatis, basi recurvis; costa valida, subtus persistenti-paleacea; rhachi valida cum petiolo plano-convexo furfuracea. Spadices infrafoliacei breviter pedunculati, 2-plicato-ramosi; glomerulis ad ramos flexuosos pendulos 3-floris; flore intermedio fœmineo v. 0; masculis lateralibus 1, 2, bracteatis bracteolatisque. Spathæ 2, completæ complanatæ caducæ: inferior 2-cristata. (*Arch. Malayan*.⁴)

1. Spec. 2.

2. In *Linnaea*, XXXIX, 184. — B. H., *Gen.*, III, 889, n. 14. — DR., *Pflanzenfam.*, 74.

3. Magnus.

4. Spec. 1. *A. Calapparia* WENDL. F. et DR. — *Seaforthia Calapparia* MART., *Hist. nat. Palm.*,

III, 313. — SCREFF., in *Ann. Jard. Buitens.*, I, 122, 136, 156, t. 22, 23. — WALP., *Ann.*, III, 462; V, 809. — *Areca Calapparia* BL., *Rumphia*, II, 68, not., t. 100, fig. 2. — *A. coccoides* GRIFF., *Palms brit. Ind.*, 150, t. 230, B. — *Pinanga Calapparia* RUMPH.

84. **Lexococcus** WRNDL. F. et DR.¹ — Flores (fere *Nengæ*) monœci; masculorum asymmetricorum sepalis plus minus acutatis imbricatis. Petala 3, multo majora oblique ovata acutiuscula valvata. Stamina ad 12; filamentis ima basi connatis; antheris oblongis ad basin dorsifixis; loculis linearibus, basi liberis, introrsum rimosis. Gynæcei rudimentum breve, 3-dentatum. Flores fœminei masculo minoris breviterque ovoidei sepala rotundata concava arcte imbricata. Petala longiora, basi late concava imbricata, apice acutato valvata. Germen oblongum; styli lobis brevibus erectis terminalibus; ovulo parietali 1. Fructus sphæricus subobliquus, apice abrupte conico-rostratus; stigmatibus terminalibus; pericarpio coriaceo fibroso, intus lævi. Semen subsphæricum liberum rugulosum, basi intrusum; hilo ventrali elongato; albumine duro valde ruminato; embryone excentrico subbasilari. — Inermis; caule mediocri annulato. Folia terminalia æqui-pinnatisecta; segmentis elongatis coriaceis glabris, apice oblique truncatis; marginibus basi recurvis; costa valida; rhachi superne sulcata, inferne convexa; petiolo vaginaque brevibus. Spadix infrafoliaceus crasse pedunculatus parce ramosus; glomerulis in ramo² spiralter dispositis, 2, 3-floris; flore intermedio fœmineo (v. 0); lateralibus masculis 1, 2. Bracteæ bracteolæque breves squamiformes. Spathæ longæ 2. (*Zeylania*³.)

85. **Ptychosperma** LABILL.⁴ — Flores (fere *Ptychoraphidis*) monœci; masculorum calyce subirregulari; sepalis inæqualibus ovato-orbicularibus, dorso rotundatis, gibbis v. carinatis, arcte imbricatis. Petala ovato-oblonga, acuta v. acuminata, valvata v. basi leviter imbricata. Stamina ∞ (15-30); filamentis subulatis, brevibus v. rectis, apice nunc inflexis; antheris oblongis dorso v. ad basin affixis, introrsum 2-rimosis, versatilibus. Gynæcei rudimentum subcylindraceum, apice sæpius 3-fidum. Flos fœmineus sæpius masculo minor subsphæricus; sepalis brevibus suborbicularibus concavis imbricatis; petalis paulo majoribus conformibus, apice acutato valvatis. Stamina hypogyna 3-6, parva subulata. Germen ovoideo-oblongum; styli lobis stigmatosis sessilibus 3. Ovulum plus minus alte parietale,

1. In *Linnaea*, XXXIX, 185. — B. H., *Gen.*, III, 888, n. 13. — DR., *Pflansenfam.*, 74.

2. Sanguineo-rubro.

3. Spec. 1. *L. rupicola* WENDL. F. et DR. — BECC. et HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 413. — *Bot. Mag.*, t. 6358. — *Ptychosperma rupicola*

TAW., *En. pl. Zeyl.*, 328. — ? *Caryota mitis* MOON, *Cat. pl. Ceyl.*, 65 (ex HOOK. F.).

4. In *Mém. Inst. Par.* (1808), IX, 253. — ENDL., *Gen.*, n. 1730. — B. H., *Gen.*, III, 891, n. 18. — DR., *Pflansenfam.*, 74, fig. 9. — *Seaforthia* R. BR., *Prodr.*, 267.

horizontale v. obliquum, basi crassum; micropyle infera. Fructus ovoideus v. oblongus, nunc sulcatus v. rostratus, stylo coronatus; pericarpio crasso fibroso; endocarpio lævi crustaceo v. tenui. Semen transversum v. adscendens, nunc 3-5-sulcum; hilo a basi ad verticem producto; rapheos ramis parce v. varie reticulatis; albumine plus minus ruminato; embryone basilari. — Inermes; caudice elato v. minore annulato; foliis æqui-pinnatisectis; segmentis linearibus v. superne dilatatis præmorsis plurinerviis; rhachi 3-gona; vagina elongata. Spadix varius ramosus; spathis 2, v. pluribus; floribus in glomerulos secundum ramos dispositis; glomerulis sæpe 3-floris; flore fœmineo centrali (v. nunc 0); bracteis bracteolisque squamiformibus brevibus¹. (*Oceania trop.*²)

86. **Colcospadix** BECC.³ — Flores (fere *Ptychospermatis*) monœci; masculorum symmetricorum oblongorum sepalis suborbiculatis concavis ciliatis, sæpe squamulosis imbricatis. Petala sub-3-plo longiora oblongo-lanceolata subcymbiformia. Stamina erecta ad 25. Gynæcei rudimentum conicum subulatum. Floris fœminei masculo paulo minoris sphærico-pyramidati perianthium imbricatum. Androcæi rudimentum annulare. Germen 1-loculare; ovulo parietali. Fructus drupaceus ovato-acuminatus, basi perianthio cupulari suffultus; pericarpio carnosio-fibroso; endocarpio tenuissimo. Semen ovoideo-lanceolatum, vertice acutatum, basi subtruncatum, sæpius esulcatum; albumine ruminato. — Humilis⁴ inermis; foliis increscenti-pinnatisectis parce furfuraceis; segmentis cuneato-lanceolatis, apice oblique truncatis, acute eroso-dentatis; margine superiore producto subulato-acuminato; terminalibus 2 nunc confluentibus. Spadices parce ramosi; ramis inferioribus simplicibus, v. inferioribus furcatis. Spathæ 2, completæ furfuraceæ persistentes: inferior 2-carinata, 2-loba; superior autem breviter 2-fida. (*Ins. Papuanæ*⁵.)

87. **Balaka** BECC.⁶ — Flores *Ptychospermatis*. Fructus baccatus oblongus; semine haud sulcato; albumine æquabili. — Inermes; foliis

1. Genus *Pinangæ* quoque valde affine.

2. Spec. paucæ, enumeratæ licet ad 12. MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 182, t. 128, 129 (*Seaforthia*). — BL., *Rumphia*, II, 118. — BECC., *Males.*, I, 47, 99 (part.), III, 108? — WENDEL. F., in *Bot. Zeit.* (1858), 345 (*Seaforthia*). — WENDEL. F. et DR., in *Linnaea*, XXXIX, 183, 215 (part.). — BENTH., *Fl. austral.*, VII,

141, n. 4. — ? F. MUELL., in *Melb. Chem. a. Drugg.* (feb. 1882). — *Bot. Mag.*, t. 4961, 7345.

3. In *Ann. Jard. Buitenz.*, II, 90.

4. « 1-3-metralis. »

5. Spec. 1. BECC., *Males.*, I, 50 (*Ptychosperma*). Genus flore simul *Actinophlæo* et *Loxococco* affine.

6. In *Ann. Jard. Buitenz.*, II, 91.

pinnatisectis; segmentis dimidiato-rhomboidalibus, quadratis, apice sinuato eroso-dentatis, antice cuspidatis; spadicebus sæpius gracilibus; spathis caducis¹. (*Oceania*².)

88. **Normanbya** F. MUELL.³ — Flores (fere *Ptychospermatis*) monœci; masculo 30-40-andro. Sepala cordato-orbicularia. Petala longiora ovato-lanceolata, ima basi connata, valvata. Gynœcei rudimentum fusiformi-clavatum, apice styloideo filiforme. Antheræ lineares filamentum æquilongæ v. longiores. Floris fœminei sepala rotundata concava imbricata. Petala deltoideo-rotundata. Germen ellipsoideum, 1-loculare; stylis 3, deltoideo-semi-lanceolatis; ovulo descendente. Fructus⁴ carnosus ovoideo-sphæricus, apice depresso umbonatus; mesocarpio rigide fibroso; endocarpio tenui lævi osseolignoso. Semen conforme; rapheos semini longitudine æqualis ramis reticulato-areolatis; albumine inæqui-ruminato; embryone basilari. — Elata⁵ inermis; foliorum terminalium segmentis numerosissimis; plerisque secus rhachin fasciculato-confertis, apice laceris, subtus cum rhachi cinerascete albido-puberulis; petiolo semi-tereti-3-gono, basi ample canaliculato. Spadicis pedunculus jam paulo supra basin ramosissimus; floribus in ramis dissite spiraliter dispositis; masculis sessilibus solitariis v. 2-natis; fœmineis inferioribus solitariis v. masculo adstantibus. Spatha 1, membranacea v. fibroso-coriacea. (*Australia*⁶.)

89. **Ptychococcus** BECC.⁷ — Flores fere *Ptychospermatis*; « staminibus 100-200; gynœcei rudimento conico. Floris fœminei masculo minoris ovoideo-conici sepala petalaeque longissima. Staminodia 3-6, dentiformia ananthera. Germen conoideo-ovatum, 1-loculare; styli ramis 3, acuminatis reflexis; ovulo laterali. Fructus subdrupaceus; endocarpio osseo durissimo. Semen apice oblique attenuatum; albumine ruminato; embryone basilari. — Inermes; caudice lævi cicatrizzato; foliis terminalibus 8-10, æqui-pinnatisectis; segmentis late linearibus, basi cuneatis, inæqui-dentatis. Flores in glomerulos spira-

1. Genus imprimis a *Drymophlæo* differt foliorum segmentorum forma spathisque caducis.

2. Spec. 2. WENDL. F., in *Bonplandia*, X, 192, 193 (*Ptychosperma*).

3. *Fragm. phyt. Austral.*, XI, 56. — BECC., in *Ann. Jard. Buitenz.*, II, 91, 170, 171.

4. « Ruber, lævis, 1 1/2-pollicaris. »

5. « 20-metralis. »

6. Spec. 1. *N. australis*. — *Saguerus australis* WENDL. F. et DR., in *Linnaea*, XXIX, 219. — *Ptychosperma Normanbyi* F. MUELL., loc. cit. — *Cocos Normanbyi* HILL, *Rep. Brisbane Gard.* (1874), 6. — *Areca Normanbyi* F. MUELL., *Fragm. phyt. Austral.*, VIII, 235. — BENTH., *Fl. austral.*, VII, 142.

7. In *Ann. Jard. Buitenz.*, II, 100.

liter insertos dispositi 3; intermedio fœmineo (v. apicem versus ramulorum 0); lateralibus masculis. » (*Ins. Papuanæ*¹.)

90. **Drymophilæus** ZIPP.³ — Flores (*Ptychospermatis*) monœci; masculorum sepalis suborbicularibus imbricatis. Petala acuta v. obtusa coriacea. Stamina ∞ ; antheris versatilibus, dorso v. infra dorsum affixis. Floris fœminei masculo majoris subsphærici calyx marium. Petala orbicularia, imbricata, v. torta, apice acutato subvalvata. Staminodia minuta. Germen 1-loculare, styli ramis recurvis coronatum; ovulo parietali descendente. Fructus ovoideus stylo coronatus, nunc sulcatus; pericarpio fibroso; endocarpio crustaceo v. tenui, intus lævi. Semen teres v. sulcatum³; hilo ventrali a basi ad verticem extenso; rapheos ramis paucis tenuibus descendentibus laxè anastomosantibus; albumine æquabili; embryone basilari. — Inermes; caudice annulato. Folia terminalia, interrupte v. æquipinnatisecta; segmentis cuneato-oblongis, ad apicem præmorsis; rhachi sæpe furfuracea, 3-gona; vagina longa. Spadices infrafoliacei simpliciter ramosi; glomerulis spiraliter dispositis, 3-floris; flore intermedio fœmineo (nunc 0). Spathæ 2, v. plures: inferior 2-cristata; bracteis bracteolisque squamiformibus. (*Oceania trop.*⁴)

91. **Cyrtostachys** BL.⁵ — Flores (fere *Drymophlæi*) monœci; masculorum symmetricorum petalis rotundatis imbricatis. Petala valvata. Stamina 6 (v. 12-15) exserta; filamentis basi connatis, apice inflexis; antheris introrsis versatilibus. Gynœcei rudimentum subulato-3-partitum. Floris fœminei ovoidei sepala orbicularia arcte imbricata. Petala longiora suborbicularia arctè imbricata, apice acutato valvata. Staminodia in cupulam membranaceam dentatam connata. Germen breviter clavatum, 1-loculare; styli crassi brevissimi ramis stigmatosis subulatis recurvis; ovulo 1 (suborthotrope?) pendulo. Fructus elongato-ovoides stylo coronatus; pericarpio tenuitè fibroso,

1. Spec. 2. SCHEFF., in *Ann. Jard. Buitenz.*, I, 83, 121, 155 (*Ptychosperma*); 53, 121 (*Drymophilæus?*). — BECC., *Males.*, I, 60 (*Ptychosperma*). — WENDL. F., in *Kerch. Palm.*, 254 (*Ptychosperma*).

2. In *Flora* (1829), I, 185. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 186, 314 (*Seaforthiæ* Sect.). — B. H., *Gen.*, III, 892, n. 21. — BECC., *Males.*, I, 41, 98. — DR., *Pflanzenfam.*, 74.

3. In sectione *Actinophlæo* BECC.

4. Spec. ad 12. BL., *Rumphia*, II, 117, t. 83,

84, 119; III, t. 156 (*Ptychosperma*). — GRIFF., *Palms brit. Ind.*, t. 142, A (*Ptychosperma*). — MIQ., *Palm. Arch. ind.*, 24. — SCHEFF., in *Ann. Jard. Buitenz.*, I, 52, 138, 157. — WENDL. F. et DR., in *Linnaea*, XXXIX, 183. — BECC., in *Ann. Jard. Buitenz.*, II, 100, t. 6. — *Bot. Mag.*, t. 7202.

5. *Rumphia*, II, 101, t. 120; in *Ann. sc. nat.*, sér. 2, X, 375. — ENDL., *Gen.*, n. 1752². — B. H., *Gen.*, III, 892, n. 20. — DR., *Pflanzenfam.*, 74, fig. 53, D.

intus lævi. Semen adscendens, subsphæricum, ovoideum v. fusiforme læve; hilo basilari; rapheos ramis descendentibus reticulatis; albumine æquabili; embryone basilari. — Gregariæ inermes; caudice gracili elato annulato. Folia terminalia æqui-pinnatisecta; segmentis linearibus, apice attenuatis oblique 2-dentatis; marginibus incrassatis, basi plicata recurvis; costa paleacea; nervis utrinque 2; rhachi sub-4-gona, superne 3-quetra; petiolo¹ facie concavo; vagina longa. Spadices infrafoliacei, breviter pedunculati; rhachi compressa, duplicato-ramosa; glomerulis ad ramulos foveolatos spiraliter dispositis, 3-floris; flore intermedio fœmineo; lateralibus masculis; bracteis plus minus ramo coadunatis; bracteolis squamiformibus. Spathæ 2, 3, ensiformes, nunc valde inæquales, completæ complanatæ caducæ. (*Arch. Malayan.*²)

92. **Veitchia** WENDL. F.³ — Flores (fere *Kentia*) monœci; masculorum subsymmetricorum sepalis 3, ovato-orbiculatis concavis, basi connatis, nervosis, subvalvatis v. superne leviter imbricatis. Petala paulo longiora elliptica coriacea, basi connata, valvata. Stamina 6, imo perianthio adnata; filamentis brevibus; antheris basifixis erectis linearibus. Gynæcei rudimentum crasse columnare, apice truncatum. Floris fœminei masculo multo majoris subsphærici sepala concava, oblique orbiculata coriacea crassa imbricata. Petala conformia multo minora imbricata v. torta. Germen subsphæricum v. late ovoideum, basi contracta cylindraceum, 1-loculare; styli conoidei erecti dentibus stigmatiferis 3-gonis. Ovulum parietale; micropyle infera. Fructus⁴ sphæricus, ellipsoideus v. subfusiformis rostratus, stylo terminali umbonatus, lævis; pericarpio crasso fibroso; endocarpio tenui, intus lævi. Semen conforme adscendens; hilo lato ad verticem extenso; rapheos ramis prominulis descendentibus reticulatis; albumine æquabili duro; embryone basilari. — Elatæ inermes; caudice annulato; foliis⁵ terminalibus æqui-pinnatisectis; segmentis oblique truncatis, linearibus v. acuminatis; marginibus crassioribus. Spadices infrafoliacei crasse pedunculati, 2-plicato-ramosissimi; floribus glomerulatis 1-3; flore fœmineo intermedio v. 0; glomerulis inferioribus

1. Læte rubente.

2. Spec. 2. MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 316 (*Bentlinckia*). — K., *Enum.*, III, 641 (*Bentlinckia*). — MIQ., *Fl. ind. bat.*, Suppl., 589 (*Areca?*). — SCHEFF., in *Ann. Jard. Buitenz.*, I, 138, 159. — BECC., in *Ann. Jard. Buitenz.*,

II, 137, 141, t. 9; in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 414.

3. In *Seem. Fl. vit.*, 271, t. 81. — B. H., *Gen.*, III, n. 10. — DR., *Pflanzenfam.*, 74.

4. Majusculus (circ. 2-pollicaris).

5. Nunc fere *Kentia*.

ribus remotioribus; superioribus autem confertis; bracteis vix conspicuis. Spathæ deciduæ 2, 3 (?). (*Ins. Viti, Nov. Hebrid.*¹)

93. **Kentleopsis** AD. BR.² — Flores (fere *Kentia*) monœci; masculorum in alabastro inæqui-pyramidatorum sepalis ovato-acutis concavis imbricatis. Petala 3, oblique ovata, obtusa v. acuta rigida valvata. Stamina ∞ ; filamentis subulatis erectis, ima basi sæpius connatis; antheris erectis dorsifixis sagittatis; loculis linearibus, basi plus minus longe liberis, introrsum v. extrorsum rimosis. Floris fœminei masculo minoris in alabastro sphærico-pyramidati sepala orbicularia crassa concava, late imbricata. Petala paulo longiora, basi lata arcte imbricata, apice acutato valvata. Germen subsphæricum v. cylindraceum, basi nunc contractum, apice conico induratum, 1-loculare; styli crassi lobis 3, erectis, 3-gonis. Ovulum parietale ventrifixum; micropyle extrorsum infera. Fructus ovoideus v. ellipsoideus perianthio stipatus, apice obtusus v. rostratus, stylo coronatus; pericarpio crasso fibroso; endocarpio duro, intus lævi. Semen adscendens liberum; hilo usque ad verticem laterali; rapheos ramis reticulatis totumque semen involventibus; albumine æquabili duro; embryone basilari. — Elatæ inermes; caudice robusto annulato. Folia terminalia æqui-pinnatisecta; segmentis linearibus coriaceis prominule nervosis, margine incrassatis, apice attenuatis, obtusatis v. dentatis; costa 3, 4-gona. Spadices infrafoliacei fastigiato-ramosi; ramis robustis longis; floribus³ in glomerulos spiraliter dispositis; glomerulis inferioribus 3-floris; flore fœmineo intermedio; superioribus ad flores masculos 1, 2 reductis; bracteis bracteolisque brevibus in cupulam conniventibus. (*Nova Caledonia*³.)

94. **Hyospathæ** MART.⁴ — Flores (fere *Arecæ*) monœci; masculorum calyce brevi gamophyllo; lobis acutis v. obtusis. Corolla multo longior; petalis oblongis, basi connatis, valvatis. Stamina 6: oppositipetala longiora; filamentis subulatis imo perianthio adnatis; antheris oblongis dorsifixis versatilibus; loculis basi liberis, introrsum rimosis. Gynæcei rudimentum elongatum v. turbinatum, nunc apice 3-lobum. Floris fœminei masculo brevioris calyx imbricatus, 3-lobus.

1. Spec. ad 4. BECC., *Males.*, I, 39.

2. In *C. rend. Ac. sc. Par.*, LXXXVII, 398.
— B. H., *Gen.*, III, 887, n. 9. — DR., *Pflanzenfam.*, 73.

3. Spec. ad 2.

4. *Hist. nat. Palm.*, II, 1, t. 1, 2. — ENDL., *Gen.*, n. 1720. — B. H., *Gen.*, III, 898, n. 33.
— DR., *Pflanzenfam.*, 67.

Petala paulo longiora suborbicularia, apice acutato conniventia, imbricata. Stamina varia 6. Germen breve; loculis effœtis 2; stylo brevi, apice acuto recurvo stigmatoso. Ovulum adscendens; micropyle extrorsum infera. Fructus¹ subsphœricus v. ellipsoideus, stylo demum basilari stipatus; exocarpio grumoso; endocarpio tenui membranaceo. Semen erectum (fuscum) vix reticulatum; albumine æquabili; embryone basilari. — Arundinaceæ inermes; caudice annulato; radicibus epigæis. Folia pauca terminalia inæqui-pinnatisecta; segmentis obliquis lanceolatis v. quadratis acuminatis; rhachi dorso convexa acuta; petiolo intus canaliculato; vagina longa. Spadices interfoliacei pauci simpliciter ramosi, erecti demumque penduli; spathis dissimilibus 2; superiore fusiformi; inferiore autem compressa, 2-carinata; floribus² 2, 3-nis; intermedio sæpius fœmineo; bracteis bracteolisque 0. (*Brasilia bor.*, *Guiana*, *Columbia*³.)

95. **Prestoea** Hook. F.⁴ — Flores (fere *Hyospathes*) monœci; masculorum asymmetricorum calyce parvo gamophyllo; lobis obtusis 3. Petala oblique ovata acutiuscula valvata. Stamina 6; filamentis subulatis; antheris (magnis) dorsifixis versatilibus; loculis basi alte liberis linearibus, introrsum rimosis. Gynœcei rudimentum columnare. Floris fœminei masculo minoris sphœrici sepala suborbicularia concava imbricata. Petala calyci subæqualia ovato-acutiuscula imbricata. Germen 1-loculare; stylo crasso sessili; lobis 3-gonis; ovuli erecti micropyle extrorsa. Fructus⁵ pisiformis; stylo laterali; exocarpio tenui fragili; endocarpio fibroso laxè reticulato; albumine parce ruminato; embryone hilo proximo. — Humiles graciles; caudice arundineo annulato. Folia pinnatisecta; segmentis superioribus in laminam laceram plicato-nervosam apiceque 2-fidam connatis; inferioribus angustis valide nervatis; marginibus basi recurvis; rhachi puberula, 3-gona; petiolo gracili longo, dorso convexo, intus sulcato; vagina brevi aperta fibroso-reticulata. Spadices⁶ infrafoliacei breviter pedunculati, simpliciter ramosi; rhachi stricta crassa; ramis erecto-patentibus strictis longe attenuatis; floribus in glomerulos 3-floros spiraliter dispositis; flore intermedio fœmineo (nunc 0⁷); lateralibus masculis; bracteolis minutis cupulatis. Spathæ 2, membra-

1. Purpureus.

2. Viridulus.

3. Spec. 3. Dr., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 519. — K., *Enum.*, III, 173. — Walp., *Ann.*, V, 805.4. *Gen.*, III, 899, n. 34. — Dr., *Pflanzenfam.*, 67.

5. Intus viridis.

6. Fusco-pubentes.

7. Cf. *P. Carderi*, in *Bot. Mag.*, t. 7108.

naceæ, mox laceræ; inferiore apice 2-dentata, haud fissa; superiore autem longiore ventre fissa. (*Antillæ*¹.)

96. **Dypsis** NORONH.² — Flores³ monœci; masculorum asymmetricorum in alabastro inæqui-3-gonorum sepalis 3, inæqualibus concavis, basi subcarinata extus in gibbum v. calcar spurium breve productis; præfloratione arcte imbricata. Petala 3, paulo longiora ovato-acuta valvata. Stamina 3, oppositipetala; filamentis plus minus compressis, nunc basi et apice attenuatis; antherarum loculis oblongis v. breviusculis subliberis descendentibus, introrsum rimosis. Gynæcei rudimentum breve v. elongatum, regulare v. asymmetricum, apice integrum v. 3-lobatum. Floris fœminei masculo minoris subsphærici sepala suborbicularia imbricata. Petala « paulo longiora, basi imbricata, apice acutato valvata ». Staminodia 6, dentiformia (v. 0). Germen obliquum, 3-loculare; loculo fertili 1, 1-ovulato; ovulo suberecto anatropo; stylo ad loculos abortivos laterali v. subbasilari; ramis stigmatosis subulatis 3. Fructus obovoideus v. oblongus, basi obliquus; stylo laterali v. subbasilari; pericarpio tenuiter carnoso v. intus fibroso. Semen conforme; « hilo laterali; rapheos ramis obscuris; albumine ruminato; embryone dorsali ». — Parvulæ v. mediocres inermes; caudice arundinaceo. Folia terminalia alterna, varie pinnatisecta; segmentis terminalibus confluentibus; imo sinu nunc costa summa subulata aucto; segmentis inferioribus variis, acutis, integris v. rarius cum supremis inæqui-fissis, præmorsis dentatisve, aut inæqui-remotis, aut varie confertis sessilibus (nunc 0); petiolo gracili; vagina parva fibrosa. Spadices axillares interfoliacei sæpe longe pedunculati; pedunculo compresso basique in arcum dilatato; ramis parce decompositis; ramulis glomeruligeris; glomerulis in axilla bractearum brevium latarumque plus minus adnatarum 3-floris; flore fœmineo intermedio (v. 0), nunc solitario; masculis lateralibus 1, 2; bracteolis minutis glabris v. cum bractea pilis ramosis instructa. Spathæ 2, inæquales membranaceæ vaginantes; superiore majore longiusque apice fissa. (*Madagascaria*⁴.)

1. Spec. prototyp. 1. *P. pubigera* HOOK. F. — *Hyospathe pubigera* GRISEB. et WENDL. F., *Fl. brit. W.-Ind.*, 516. — ? *Euterpe montana* GRAH., in *Bot. Mag.*, t. 3874.

2. In *Dup.-Th. Prodr. phytol.*, 2. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 180, 312, t. 143; 158, fig. 1, 2; 165, fig. 5. — K., *Enum.*, III, 188.

— ENDL., *Gen.*, n. 1729. — B. H., *Gen.*, III, 909, n. 56. — DR., *Pflanzenfam.*, 66. — H. BN., in *Bull. Soc. Linn. Par.*, 1161.

3. Minuti crebri.

4. Spec. ad 10. BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XXII, 525 (part.). — WALP., *Ann.*, V, 809 (part.).

97. **Trichodypsis** H. BN¹. — Flores (fere *Dypsidis*) monœci; masculorum staminibus 3, oppositipetalis, basi 1-adelphis. Gynœcei rudimentum minutum. Floris fœminei masculo minoris sepala petalaeque imbricata, post anthesin vix aucta. Germinis loculi 3; abortivis multo minoribus 2. Ovulum adscendens anatropum. Stylus subbasilaris; ramis subulatis 3. Fructus oblique ovoideus compressiusculus parce carnosus. Semen conforme suberectum; albumine æquabili. — Pumila erecta inermis; caudice fere a basi foliifero. Folia alterna, sæpius inæqui-pinnatisecta; segmentis inæqualibus 2, superposite obtriangularibus; rhachi nunc utrumque nuda; loborum apice oblique acutato, integro v. præmorso-dentato. Spadices axillares pauci graciles (*Dypsidis*); spathis 2; ramis compositis; floribus ad ramulos glomerulatis; glomerulis 3-floris; flore fœmineo intermedio; bractea bracteolisque cum ramulo densiuscule ramoso-pilosus. (*Madagascaria*².)

98. **Haplodypsis** H. BN³. — Flores (fere *Dypsidis*) monœci; masculorum sepalis 3, brevibus truncatis in cupulam imbricatis. Petala 3, longiora lanceolata glumacea longitudinaliter striata valvata. Stamina 6, 2-seriata; filamentis gracilibus subulatis; antheris elongatis dorsifixis versatilibus; loculis linearibus, inferne liberis, sublateraliter rimosis. Gynœcei rudimentum longe conicum apice inæqui-3-dentatum. Floris fœminei calyx marium. Petala longiora acutata imbricata. Staminodia minuta v. 0. Germen anguste pyriforme, hinc convexum, in stylum conicum attenuatum; loculis sterilibus 2; fertilis ovulo adscendente. — Humiles inermes; foliis æqui- v. inæqui-pinnatisectis; segmentis lineari-lanceolatis; superioribus confluentibus; petiolo brevi cum vagina subtubulosa primum pubente. Spadices foliis subæquales simplices longe cylindracei; spathis 2, vaginantibus tubulosis; inferiore brevior; floribus dense glomerulatis; fœmineo in glomerulo intermedio; lateralibus masculis. (*Madagascaria*⁴.)

99. **Haplophloga** H. BN⁵. — Flores (fere *Dypsidis*) monœci; masculorum in alabastro conicorum sepalis valde inæqualibus imbricatis. Petala longiora acuta valvata. Stamina 6; filamentis sub gynœcei rudimento longe conico-subulato insertis, subulatis, supra

1. In *Bull. Soc. Linn. Par.*, 1165.

2. Spec. 1. *T. Hildebrandtii* H. BN.

3. In *Bull. Soc. Linn. Par.*, 1167.

4. Spec. 2, 3? BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XXII, 525, 526 (*Dypsis*).

5. In *Bull. Soc. Linn. Par.*, 1168.

medium introflexis; antheris lineari-oblongis introrsis, apice acutis, dorsifixis versatilibus. Floris fœminei masculo minoris sepala petalaeque imbricata. Germen columnare, 1-loculare, cum stylo leviter sub apice dilatato continuum; ramis stigmatosis terminalibus 3, crasse 3-angularibus erectis æqualibus. Ovulum parietale. Fructus carnosulus breviter fusiformis, utrinque acuminatus; albumine æquabili. — Parvæ inermes, nunc aquaticæ; caudice brevi simplici erecto. Folia furcata profunde 2-loba; lobis basi verticali sessilibus, mox liberis ensiformibus acutis; glandula (spuria?) in imo sinu minuta (v. 0). Spadix interfoliaris simplex rectus v. arcuatus; spathis 2, vaginiformi-tubulosis acutis inæqualibus, primum imbricatis; floribus in glomerulos crebros prominulos dispositis; bracteis transverse linearibus latis; flore fœmineo intermedio (v. 0); masculis lateralibus. (*Madagascaria*, *Ins. Comor.*¹)

100. **Neodypsis** H. Bn². — Flores (fere *Dypsidis*) monœci; sepalis valde inæqualibus cymbiformi-carinatis imbricatis. Petala masculorum valvata. Stamina 6, 2-seriata; antheris brevibus introrsis. Gynœcei rudimentum columnare sub apice breviter conico orbiculari-dilatatum. Germen 1-loculare; stylo hinc subbasilari. Fructus exsertus pisiformis baceatus, perianthio haud accreto stipatus, styli basilaris reliquiis hinc instructus; seminis conformis albumine duro æquabili. — Inermes; foliis...? Spadix³ decompositus; ramis tertiariis cylindricis dense glomeruligeris; bracteis adnatis crebris brevibus, 3-floris; flore fœmineo intermedio compresso minimo; lateralibus autem masculis. (*Madagascaria*⁴.)

101? **Dypsidium** H. Bn⁵. — Flores (fere *Dypsidis*) monœci; sepalis imbricatis subæqualibus. Petala glumacea ovata cum calyce persistentia. Staminodia vix conspicua. Fructus baccatus perianthio parum aucto suffultus; embryo æquabili. — Mediocres v. humiles erectæ; caudice simplici obscure annulato. Folia alterna inæqui- v. æqui-pinnatisecta; segmentis 4-∞, sæpius lanceolatis. Spadix parce ramosus; ramis 2, 3; glomerulis ad ramos paucis, 3-floris; flore intermedio fœmineo⁶. (*Madagascaria centr.*⁷)

1. Spec. 4 (quarum dubiæ 2).

2. In *Bull. Soc. Linn. Par.*, 1172.

3. Totus ferrugineus, vix puberulus.

4. Spec. 1, 2.

5. In *Bull. Soc. Linn. Par.*, 1172.

6. An potius *Dypsidis* v. *Phlogæ* sectio imperfecte nota?

7. Spec. ad 3.

102. **Neophloga** H. BN¹. — Flores (fere *Dypsidis*) monœci; masculorum sepalis orbicularibus concavis, imbricatis, ima basi connatis, ibi nonnihil carinatis. Petala 3, longiora acutata valvata. Stamina 6; filamentis apice introflexis; antheris ovato-oblongis apiculatis; loculis introrsum rimosis, haud liberis. Gynæcei rudimentum conico-pyramidatum. Floris fœminei in alabastro acute conoidei sepala breviter obtusa imbricata. Petala oblonga imbricata. Germen longe conicum asymmetricum, apice stigmatoso longe acutatum; ovulo 1, erecto; micropyle extrorsum infera. Staminodia minuta 2-6. Fructus « pisiformis ». — Humilis glabra; foliis pinnatisectis; segmentis lateralibus 8-10, oblique lanceolatis angustis, acutis v. parce præmorsis; terminalibus in laminam latiore obtriangularem confluentibus; lobis acutatis, ad apicem præmorsis. Spadix laxè decompositeque ramosus; glomerulis in ramulis tertiariis 3-floris; bractea brevi lata adnata; flore intermedio fœmineo. Spathæ cæteraque *Dypsidis*. (*Madagascaria*².)

103. **Phlogella** H. BN³. — Flores fere *Neophlogæ* (v. *Dypsidis*) monœci; masculorum in alabastro asymmetrico-3-gonorum sepalis 3, valde inæqualibus arcte imbricatis. Petala 3, ovato-acuta longiora valvata. Stamina 6; antheris ovatis dorsifixis coalitis; loculis adnatis introrsis. Gynæcei rudimentum columnare, 3-gonum, apice leviter dilatato obtuse 3-gonum. Floris fœminei masculo multo minoris lateraliterque compressi sepala valde inæqualia imbricata. Gynæceum (inadultum) oblique ovoideum compressum... — Elata glabra; foliis amplis æqui-pinnatisectis; segmentis longe lineari-lanceolatis rigidis; costula prominula; marginibus basi recurvis. Spadices⁴ decomposite ramosi; ramulis tertiariis glomeruligeris, apice nunc denudatis; bracteis brevibus latis recte sectis; flore intermedio fœmineo compresso; lateralibus masculis. Spathæ...? (*Ins. Comor.*⁵)

104. **Phloga** NORONH.⁶ — Flores (fere *Dypsidis*) monœci; masculorum sepalis orbicularibus v. cymbiformibus inæqualibus, membranaceis v. coriaceis, arcte imbricatis. Petala paulo longiora, suborbi-

1. In *Bull. Soc. Linn. Par.*, 1173.

2. Spec. 1. *N. Commersoniana* H. BN. — *Hyophorbe Commersoniana* MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 154, 164, t. 143, 154. — *H. indica* MART., *loc. cit.* — K., *Enum.*, III, 176 (non GÆRTN., exclusivè synonymis).

3. In *Bull. Soc. Linn. Par.*, 1174.

4. V. spadicum fragmenta?

5. Spec. 1. *P. Humboldtiana* H. BN.

6. In *Dup.-Th. Prodr. phytol.*, 2. — B. H., *Gen.*, III, 909, n. 57. — DR., *Pflansenfam.*, 66. — H. BN, in *Bull. Soc. Linn. Par.*, 1173.

cularia v. ovato-elliptica coriacea crassa, breviter acutata, basi nunc incrassata connata, valvata. Stamina 6 : oppositipetala longiora; filamentis ima basi inter se et cum corolla connatis, cæterum liberis erectis crassiusculis; antherarum parvarum loculis brevibus in connectivo crassiusculo didymis obliquis, introrsum rimosis. Gynæcei rudimentum varie 3-merum. Floris fœminei perianthium ut in mare; petalis basi dilatata subauriculata tenuioribus imbricatis. Staminodia varia 3-6. Germen 3-loculare; stylis 3, erectis subulatis; loculis effœtis, angustis 2; tertio autem fertili gibbo. Ovulum subhorizontale ventrifixum hemitropum; micropyle extrorsum infera. Fructus oblongus; styli hinc subbasilaris ramis subulatis recurvis 3; pericarpio tenui carnosio. Semen conforme suberectum; albumine duro, extus radiato-ruminato; embryone subhorizontali dorsali. — Inermes fruticosæ; foliis pinnatisectis; segmentis varie fasciculatis; fasciculis suboppositis, alternis v. distantibus quaquaversis, nunc spurie verticillatis, linearibus angustis v. latioribus oblanceolatis acuminatis plurinerviis; rhachi teretiuscula gracili glabra v. varie furfuracea. Spadices interfoliacei decomposite ramosi; pedunculo compresso angulato; ramis gracilibus patentibus; glomerulis in axilla bractearum brevium squamiformium 3-floris; flore intermedio fœmineo minore compresso; lateralibus autem masculis 1, 2. Spathæ cæteraque *Dypsidis*. (*Madagascaria*¹.)

105? *Ravenea* BOUCH.² — Flores diœci (v. polygami?); masculorum calycis basi carnosuli lobis ovato-acutis 3. Petala 3, longiora ovato-acuminata valvata, apice plus minus patentia. Stamina 6, subæqualia; filamentis brevibus subulatis, imo perianthio affixis; antherarum oblongarum basifixarum loculis inferne liberis, introrsum rimosis. Gynæcei rudimentum parvum, 3-fidum. Floris fœminei masculo subæqualis perianthium simile; petalis demum in fibras tenues solutis. Staminodia 3-6, ananthera v. anthera cassa donata (nunc 0). Germen longe lageniforme sessile, 3-loculare; loculis nunc effœtis 1, 2; styli lobis brevibus crassis sub-3-gonis recurvis. Ovulum in loculo quoque 1 (v. 0) descendens³ obovoideum; funiculo obliquo brevi. Fructus α parvulus curvus; stylis subbasilaribus. Semen (mini-

1. Spec. 4, 5. MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 312 (*Dypsis*). — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XXII, 527. — BECC., in *Journ. Linn. Soc.*, XXIX, 61.

2. In *Monatsb. Ver. Beford. Gartenb.* (1878),

197, 323, c. xyl., 324. — B. H., *Gen.*, III, 883. H. BN, in *Bull. Soc. Linn. Par.*, 1186.

3. Germinis partem inferiorem v. usque ad medium altiore occupans. Ovulorum insertio nunc certe ut in *Bot. Mag.* sita.

mum) ellipsoideum; albumine æquabili; embryone hilo proximo ». — Gracilis erecta inermis; foliis longe petiolatis; « primordialibus 2-fidis; costa in filum apice excurrente »; cæteris pinnatisectis; segmentis lineari-lanceolatis acuminatis; costa subtus paleacea. Spadices interfoliacei longe pedunculati simpliciter ramosi: masculi recurvi; ramis densifloris brevibus patentibus; fœminei autem erecti; rhachi longa; ramis longe subulatis strictis, apice gracilibus. Bracteæ minutæ acutæ; flore⁴ axillari basi articulo. Spathæ 3, 4, tubulosæ persistentes. (*Ins. Comoræ*².)

106. *Caryota* L.³ — Flores monœci; masculorum symmetricorum sepalis brevibus rotundatis coriaceis arcte imbricatis. Petala lineari-v. ovato-oblonga longiora crassa coriacea valvata. Stamina ∞, receptaculo convexiusculo inserta; filamentis brevissimis liberis erectis; antheris basifixis lineari-acutatis; loculis linearibus adnatis, basi liberis, introrsum rimosis. Floris fœminei masculo minoris sepala ovata v. orbicularia concava arcte imbricata. Petala rotundata coriacea, nunc basi connata imbricata. Staminodia 3-6 (v. 0). Germen 3-loculare; loculis sæpe haud evolutis 2; stylo brevi, 1-3-lobo. Ovulum in loculo fertili quoque 1, suberectum; micropyle extrorsum infera. Fructus⁴ sphæricus, 1- v. rarius 2, 3-spermus, stylo coronatus; pericarpio coriaceo tenui stylo basilari. Semina subsphærica 1, v. 2, 3, plano-convexa v. sub-3-gona, erecta; raphæos ramis intra sulcos absconditis adscendentibus; albumine ruminato; embryone excentrico dorsali. — Monocarpicæ inermes; caudice elato robusto annulato, nunc sobolifero. Folia terminalia; coma sæpius elongata; bipinnatisecta; segmentis cuneatis, dimidiato-flabellatis, integris v. fissis, reduplicato-plicatis, antice præmorsis; costis nervisque flabellatis; petiolo ad basin subtereti; ligula brevi; vagina dorso carinata adque margines fibrosa. Spadices interfoliacei fastigiatim ramosi, deorsum evoluti, alternatim sæpe masculi fœmineive; pedunculo crasso brevique; ramis longis pendulis; bracteis bracteolisque sæpius brevibus; glomerulis in ramo

1. Masculo stramineo; fœmineo sæpius virescente.

2. Spec. 1. *R. Hildebrandtii* BOUCH. — LEME, in *Ill. hort.*, XXVII, 164, c. ic. — HOOK. *f.*, in *Bot. Mag.*, t. 6776.

3. *Gen.*, ed. I, n. 891; ed. VI, n. 1228. — J., *Gen.*, 38. — LAMK, *Ill.*, t. 897. — GÆRTN., *Fruct.*, I, t. 7. — BL., *Rumphia*, II, 134; III,

t. 162, 163. — ENDL., *Gen.*, n. 1705. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 193, 315, t. 107, 108, 162. — K., *Enum.*, III, 198, 504. — DR., in *Bot. Zeit.* (1877), 638, t. 6, fig. 25, 26; *Pflanzenfam.*, 54, fig. 9, D; 43, 44. — B. H., *Gen.*, III 918, n. 73.

4. Cerasiformis, purpurascens; carne raphidibus prurientibus dite farcata.

alternis, 3-floris; flore⁴ intermedio fœmineo v. nunc masculino. Spathæ incompletæ tubulosæ 3-5. (*Asia et Oceania trop.*²)

107. *Saguerus* ADANS.³ — Flores (fere *Areceæ*) monœci; masculorum regularium sepalis 3, rotundatis crassis, basi incrassata obtuse subcalcaratis, imbricatis. Petala 3, longiora oblonga crassa acuta valvata. Stamina ∞ , receptaculo convexiusculo inserta; filamentis brevibus erectis; antheris basifixis erectis linearibus; loculis adnatis, nunc ima basi sagittata liberis, introrsum v. ad margines rimosis; connectivo ultra loculos in appendicem incurvam producto. Floris fœminei subsphærici sepala imbricata. Petala longiora crassiora ovata breviter acuminata, valvata, cum calyce sub fructu nonnihil aucta. Staminodia numero varia v. 0. Germen breviter obovoideum, vertice depressum, styli ramis conicis coronatum, 3-loculare; ovulis erectis anatropis; micropyle extrorsum infera. Fructus subsphæricus, obtuse 3-gonus apiceque breviter crasseque 3-lobus, vertice depresso styli vestigiis coronatus; pericarpio crasse carnosio⁴. Semina 2, 3, inæqui-obovoidea, dorso convexa, ventre plana⁵ v. 2-facialia⁶; hilo basilari parvo; integumento lævi⁷; albumine corneo solido æquabili; embryone ad medium v. altius dorsali subtransverso. — Inermes⁸; caudice crasso cicatrisato, superne vaginis fibrosis vestito, nunc sobolifero. Folia terminalia inæqui-pinnatisecta; segmentis linearibus v. cuneatis petiolulatis, apice oblique fissis v. præmorsis, valide costulatis; nervis parallelis; marginibus basi recurvis, supra medium eroso-dentatis, hinc v. utrinque inferne auriculatis, subtus pallidis; petiolo plano-convexo, margine nunc spinescente; vagina brevi reticulato-fibrosa crinita. Spadices interfoliacei, deorsum evoluti; pedunculo decurvo, simpliciter ramoso;

1. Viridi v. purpurascente.

2. Spec. ad 12. PERS., *Syst.*, 1024; *Syn.*, II, 576. — GRIFF., in *Calc. Journ. Nat. Hist.*, V, 477; *Palms brit. Ind.*, 168, t. 236, A-C; App., 27. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 37; *Pl. Jungh.*, 159; *Anal. Bot. ind.*, I, 3; *Palm. Arch. ind.*, 7. — KURZ, *For. Fl.*, II, 530. — BENTH., *Fl. austral.*, VII, 144. — DR., in *Bot. Zeit.* (1877), 638, t. 6, fig. 25, 26. — HANCE, in *Trim. Journ.* (1879), 174. — BECC., *Males.*, I, 69; in *N. Giorn. bot. ital.*, III, 12. — WENDL. F. et DR., in *Linnaea*, XXXIX, 191. — BECC. et HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 422. — RIDL., in *Trans. Linn. Soc.*, ser. II, *Bot.*, III, 391. — *Bot. Mag.*, t. 5762. — WALP., *Ann.*, III, 466; V, 812.

3. *Fam. des pl.*, II, 24 (1763). — LINK, *Enum.*, II, 392. — ROXB., *Fl. ind.*, III, 626. — LINDL., *Veg. Kingd.*, 138. — BL., *Rumphia*, II, 124, t. 95, 123-125. — O. K., *Revis.*, 735. — ARENGA LABILL., in *Mém. Inst. Par.*, IV (1804), 209 (*Areng.*). — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 191, t. 108, 147, 148 (part.). — K., *Enum.*, III, 196. — B. H., *Gen.*, III, 917, n. 72. — DR., *Pflanzenfam.*, 54, fig. 43. — *Gomulus* SPRENG., *Gen.*, n. 2222.

4. Flavescente, raphidibus crebris prurientibus dite farcto.

5. Ubi 2.

6. Ubi 3.

7. Atrato v. fuscato.

8. Monocarpicæ?

ramis longis pendulis; floribus¹ in spadice eodem v. sæpius in spadibus distinctis ad bracteam latam solitariis v. rarius 2, 3-nis; intermedio tum fœmineo; bracteolis latiusculis. Spathæ in pedunculo ∞ , membranaceæ deciduæ. (*Asia et Oceania trop.*²)

108. **Blancoa** BL.³ — Flores (fere *Sagueri*) monœci; masculorum regularium calyce breviter cupulari; lobis obtusis imbricatis. Petala⁴ oblonga coriacea rigida striata valvata. Stamina ∞ (10–40); filamentis brevibus subulatis, basi 1-adelphis; antheris basifixis; loculis linearibus, utrinque liberis, introrsum rimosis. Floris fœminei masculo minoris subsphærici sepala breviter coriacea imbricata. Petala ovata breviter acutiuscula coriacea, valvata v. imbricata. Germen ovoideum v. depressum, 2, 3-loculare; styli terminalis lobis 3-gonis conniventibus. Ovulum in loculo quoque erectum 1; micropyle extrorsum infera. Fructus oblongus v. ovoideus, perianthio cupulari stipatus, baccatus v. coriaceus, intus fibrosus. Semina 2, v. sæpius 1, erecta loculumque implentia; integumento tenui; albumine copioso cartilagineo æquabili; embryo basilari. — Humiles⁵; caudicibus sæpe pluribus erectis. Folia terminalia inæqui-pinnatisecta; segmentis solitariis, v. inferioribus fasciculatis, e basi plus minus longe cuneata obovatis, oblongis v. oblanceolatis, sinuato-lobatis erosis, oblique terminali-cuneatis; marginibus basi recurvis; nervis flabel-latis. Spadices interfoliacei crasse pedunculati; ramis crassiusculis; floribus aut in spadice eodem, aut in spadibus diversis, bracteatis bracteolatisque. Spathæ vaginantes ∞ . (*Indo-China, Malaisia*⁶.)

109. **Wallichia** ROXB.⁷ — Flores⁸ (fere *Blancoæ*) monœci v. polygami; masculorum calyce tubuloso cylindræo gamophyllo, apice

1. Flavo- v. fusco-viridulis v. purpurascen-tibus, majusculis.

2. Spec. 7, 8. RUMPH., *Herb. amboin.*, I, t. 13. — LOUR., *Fl. cochinch.*, 618 (*Borassus*). — GRIFF., in *Calc. Journ. Nat. Hist.*, V, 471; *Palms brit. Ind.*, 163, t. 235, A-D; App., XXVII. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 34. — KURZ, *For. Fl.*, II, 533. — BENTH., *Fl. austral.*, VII, 143. — WENDL. F. et DR., in *Linnaea*, XXXIX, 219. — DR., in *Bot. Zeit.* (1877), 638, t. 6, fig. 22-24. — BECC., *Males.*, I, 78; III, 92; in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 421. — WALP., *Ann.*, V, 812 (pleraque sub *Arenga*).

3. *Rumphia*, II, 128. — O. K., *Revis.*, 727 (non LINDL.). — *Didymosperma* WENDL. F. et DR. — B. H., *Gen.*, III, 917, n. 71. — DR., *Pflanzenfam.*, 54.

4. Nunc luride violaceæ.

5. Nunc basi surculosæ.

6. Spec. 7, 8. MART., *Hist. nat. Palm.*, 190, t. 157, 315. — BL., *loc. cit.*, t. 85, 95 (*Oreania*). — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 32; *Pl. Jungh.*, 157 (*Wallichia*). — GRIFF., *Palms brit. Ind.*, 176, t. 238, A, B (*Harina*). — BECC., *Males.*, III, 96, 185 (*Didymosperma*); in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 420. — *Bot. Mag.*, t. 6836 (*Didymosperma*).

7. *Pl. corom.*, III, t. 295. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 189 (part.), 315. — K., *Enum.*, III, 193. — B. H., *Gen.*, III, 916, n. 70. — DR., *Pflanzenfam.*, 55. — HARINA HAM., in *Trans. Werner. Soc.*, V, 317. — *Wrightia* ROXB., *Fl. ind.*, III, 621 (non SOLAND., non R. BR.).

8. Flavescentes, mediocres.

truncato. Petala 3, nunc basi connata, longiora, oblonga coriacea valvata. Stamina 6, imæ corollæ affixa v. libera; filamentis subulatis; antheris lineari-oblongis basifixis obtusis; loculis basi liberis, introrsum rimosis. Gynæcei rudimentum subnullum (v. 0). Floris fœminei depresso-subsphærici sepala brevia coriacea obtusa concava imbricata. Petala 3, crasse coriacea, libera v. basi connata, brevia acuta valvata. Staminodia minuta pauca (v. 0). Germen depresso sphæricum, 2, 3-loculare, basi breviter contractum perianthioque immersum; styli lobis sessilibus brevibus subconicis. Ovula subbasilaria in loculis solitaria compressa; micropyle extrorsa. Fructus¹ perianthio stipatus ovoideus v. oblongus coriaceus. Semina 1, 2, plano-convexa oblonga; hilo basilari; integumento raphidis consperso; rapheos ramis flabellatis, extus arcuatis; albumine corneo; embryone dorsali suboperculato. — Humiles cæspitosæ; caudice erecto v. sæpius brevi sobolifero. Folia fasciculata v. terminalia, disticha, inæqui-pinnatisecta; segmentis basi cuneatis, solitariis v. fasciculatis eroso-dentatis; nervis flabellatis; petiolo lateraliter compresso; vagina brevi fissa adque margines crinita. Spadices interfoliacei sæpius 1-sexuales, simpliciter ramosi: masculi decurvi v. cernui ovoidei densiflori; fœminei autem laxiores erecti. Spathæ perplurimæ coriacæ tenues: inferiores tubulosæ; superiores autem imbricatæ cymbiformes. (*India transganget. et mont.*²)

110. *Orania* ZIPP.³ — Flores monœci; masculorum subsymmetricorum calyce minuto, 3-fido. Petala 3, oblongo-lanceolata concava coriacea valvata. Stamina 3-6; filamentis subulatis crassiusculis; antheris lineari-oblongis erectis; loculis basi liberis, « extrorsum » rimosis. Gynæcei rudimentum conicum. Floris fœminei masculo crassioris calyx 3-fidus; lobis cuspidatis. Petala ovata valvata. Staminodia 3-6. Germen 3-gonum v. sub-3-lobum; styli ramis recurvis 3. Ovulum in loculis 1, descendens. Fructus sphæricus, 1-3-locularis; loculis sæpius abortivis 1, 2, cum stylo basilaribus; pericarpio carnosio- v. spongioso-fibroso; endocarpio crustaceo tenui.

1. Purpureus v. rufescens.

2. Spec. ad 3, 4. GRIFF., in *Calc. Journ. Nat. Hist.*, V, 482 (part.); *Palms brit. Ind.*, 174, 175, t. 237, A-C. — KURZ, *For. Fl.*, II, 531 (part.). — BRAND., *For. Fl.*, 549. — ANDERSON, in *Journ. Linn. Soc.*, XI, 6. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 32 (part.). — BECC., in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 418. — *Bot. Mag.*, t. 4584.

3. In *Algm. Konst. en lett.-bode* (1829), 294. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 186, t. 177, fig. 1. — BL., *Rumphia*, II, 115. — B. H., *Gen.*, III, 918, n. 74. — DR., *Pflanzenfam.*, 55. — *Araucasia* BL., *Præf.*, VIII, t. 119, 122. — *Macrocladus* GRIFF., in *Calc. Journ. Nat. Hist.*, V, 489; *Palms brit. Ind.*, 177, t. 239, A, B.

Semen sphæricum v. depressum; integumento exteriori spongioso cum endocarpio adhærente; hilo basilari; rapheos ramis reticulatis ∞ ; albumine æquabili, nunc cavo; embryone ad medium dorsum v. infra sito. — Elatæ inermes; caudice robusto annulato; foliis terminalibus æqui-pinnatisectis; segmentis linearibus, apice lobulatis v. laceris, subtus albido-lepidotis; marginibus recurvis; rhachi robusta dorso convexa facieque acuta; petiolo valido; vagina brevi aperta, marginibus fibrosa. Spadices interfoliacei longi, 2-plicato-ramosi; pedunculo crasso basique dilatata semilunari; ramis fastigiatis; glomerulis distichis, 3-floris; flore intermedio fœmineo, nunc solitario v. 0. Spathæ 2: inferior anceps brevis coriacea, apice pervia; superior autem clavato-fusiformis completa sublignosa cuspidata, longitudinaliter fissa. Bractæe bracteolæque sæpe delitescentes. (*Arch. Malayan., Papua*¹.)

111. *Chamædorea* W.² — Flores diœci v. raro monœci; masculorum calyce plus minus profunde cupulari, subintegro v. plus minus alte 3-lobo imbricato. Petala 3, longiora, libera v. plus minus alte connata valvata. Stamina 6, 2-seriata, imæ corollæ inserta v. libera, sæpius breviora, subulata v. complanata; antheris inclusis dorsifixis; loculis brevibus v. oblongis, basi liberis, introrsum rimosis. Gynæcei rudimentum majusculum, apice obtusum v. varie dilatatum, nunc parvum v. 0. Floris fœminei calyx (marium) imbricatus. Petala 3, breviora v. elongata, libera v. varie connata, valvata v. imbricata. Staminodia 3-6, minuta v. 0. Germen breve, 3-loculare; styli ramis crasse 3-gonis valvatis, v. longioribus tenuioribus recurvis. Ovulum in loculo quoque 1, erectum v. adscendens; micropyle extrorsum infera. Fructus parvi carpella 1-3, oblonga v. sphærica; styli reliquiis basilaribus; pericarpio carnosio v. coriaceo, raro intus parce fibroso. Semen erectum, sphæricum v. ellipsoideum; hilo basilari parvo; rapheos sæpe exsculptæ ramis haud v. parum conspicuis; albumine æquabili duro; embryone basilari v. dorsali. — Inermes, erectæ, procumbentes v. raro scandentes; caudicibus solitariis

1. Spec. 4, 5. MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 16; *Palm. Arch. ind.*, 4. — BECC., *Males.*, I, 76; in *Ann. Jard. Builens.*, II, 151, t. 13, 14; in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 423. — WALP., *Ann.*, V, 809.

2. Spec., IV, 638. — MART., *Hist. nat. Palm.*, II, 3, t. 3; III, 157, 307, t. 126-138. — ENDL.,

Gen., n. 1719. — K., *Enum.*, III, 170. — B. H., *Gen.*, III, 910, n. 59. — DR., *Pflanzenfam.*, 62, fig. 9; 50, A-D. — *Collinsia* LIEBM., in *Ov. K. dansk. Selsk. Forh.* (1858). — ØERST., in *Vid. Medd. Nat. For. Kjob.* (1845). — *Stachyophorbe* LIEBM. — ØERST., *loc. cit.*, t. 4. — KL., in *Allgem. Gartenz.* (1853), 363.

v. cæspitosis annulatis, sæpe arundinaceis. Folia simplicia, apice 2-fida, v. pinnatisecta; segmentis variis rectis v. arcuatis, acutis v. acuminatis, plicato-venosis, nunc basi callosis; marginibus inferne recurvis v. reduplicatis; petiolo vario; vagina subtubulosa brevi longave; ore obliquo. Spadices interfoliacei v. infrafoliacei, simplices v. varie ramosi pedunculati, laxi v. densi. Flores¹ in spadicibus diversis v. in eodem sessiles, exserti v. varie immersi; bracteis bracteolisque vix conspicuis v. 0. Spathæ 3-∞, vaginantes sæpiusque alternæ, membranacæ v. coriaceæ, apice fissæ, nunc plus minus longe persistentes. (*America calid. utraque*².)

112. *Nunnezharea* R. et PAV.³ — Flores fere *Chamædoreæ*: masculi subsphærici; calyce breviter cupulari v. subplano, 3-dentato v. 3-partito. Corollæ obovoideo-sphæricæ vix stipitatæ lobi late ovati, apice liberi. Stamina 6, recta; antheræ loculis basi sejunctis. Gynæcei rudimentum apice 3-lobum. Floris fœminei corolla rotato-campanulata; tubo brevi; lobis ovato-acutis valvatis. Staminodia 6, hypogyna. Germen 3-loculare; styli lobis deltoideis. Fructus parce carnosus; seminis subsphærici albumine æquabili. Spadices sæpius ramosissimi crebriflori; cæteris *Chamædoreæ*. (*Peruvia et Columbia andin.*⁴)

113? *Kunthia* H. B.⁵ — Flores (*Chamædoreæ*) monœci v. nunc polygami; masculorum calyce 3-fido. Petala 3, ovato-oblonga carnosula. Stamina 6; filamentis basi leviter cohærentibus; antheris linearibus. Gynæcei rudimentum parvum. Floris fœminei « calyx campanulatus, 3-dentatus. Styli revoluti 3 ». Bacca parce carnosula. Cætera *Chamædoreæ*. — Mediocris⁶; caudice arundinaceo annulato. Folia pinnatisecta; segmentis ∞-jugis acuminatis. Spadices infrafoliacei

1. Parvi v. minimi.

2. JACQ., *H. schænbr.*, II, t. 217, 248 (*Borassus*). — MART., *Palm. Orbign.*, 4, t. 6, fig. 1 (*Hyospathe*); 16, A, B. — WENDL. F., *Ind. Palm.*, 57; in *Bot. Zeit.* (1859), 29, 102; in *Bonplandia* (1862), 37; in *Gartenfl.* (1880), 101. — OTT., *Carlens.* (1834), 145, 153, t. 6. — DR., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 527, t. 125. — HENSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 402. — *Bot. Mag.*, t. 4831, 4837, 4845, 6030, 6088 (*Nunnezharia*), 6584, 6838, 7205, 7265. — WALP., *Ann.*, V, 804, 834.

3. R. et PAV., *Prodr. Fl. per. et chil.*, 147, t. 31. — O. K., *Revis.*, 729 (part.). — *Morenia*

R. et PAV., *loc. cit.*, 150, t. 32. — DR., *Pflanzenfam.*, 63.

4. Spec. ad 5. MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 161, t. 140, 141; *Palm. Orbign.*, 16, t. 3; 16, C. — KARST., in *Linnaea*, XXVIII, 274; *Fl. columb.*, II, 135, t. 171. — TRAIL, in *Trim. Journ.* (1876), 331. — WENDL. F., *Ind. Palm.* (1854), 60. — *Bot. Mag.*, t. 5492. — WALP., *Ann.*, V, 836 (pleraque sub *Morenia* v. *Chamædoreæ*).

5. *Pl. æquin.*, II, 128, t. 122. — K., *Enum.*, III, 175. — MART., *Hist. nat. Palm.*, II, 163, t. 101, fig. 6, 7; III, 163, t. 142. — DR., *Pflanzenfam.*, 64.

6. « Sub-20-pedalis. »

subverticillati, simpliciter ramosi. Spathæ membranaceæ imbricatæ persistentes. (*Columbia, Brasilia*¹.)

114? **Gaussia** WENDL. F.² — Flores monœci : masculi? Sepala fœmineorum oblonga imbricata. « Petala late ovata valvata. » Germen? Fructus carpella 1-3, obovato-ellipsoidea, recta v. subarcuata, stylo basilari stipata; pericarpio tenui carnosulo. Semen conforme erectum; hilo basilari; rapheos ramis arcuatis paucis; albumine duro æquabili; embryone ad basin parvo. — Mediocris inermis; caudice inferne incrassato, superne attenuato. Folia pinna-tisecta; segmentis linearibus angustis acutis v. apice 2-fidis; marginibus incrassatis, basi recurvis; rhachi tomentosa, superne acuta. Spadices interfoliacei longe pedunculati, 2-plicatim ramosi; floribus ad ramos glomerulatis; glomerulis alterne distichis elongatis, 1-seriatis. Spathæ cylindraceæ plures coriaceæ fissæ pedunculum vaginantes. (*Cuba*³.)

115. **Myophorbe** GÆRTN.⁴ — Flores monœci; sepalis 3, brevibus, basi connatis ibique nunc gibbis, imbricatis. Petala 3, longiora, basi connata v. sublibera crassiuscula, valvata. Stamina 6 (in flore fœmineo sterilia), basi 1-adelpha et corollæ adnata; filamentis subulatis; antherarum loculis liberis descendentibus, introrsum rimosis. Germen (in flore masculo subcylindraceum tenue) superum, ovoideo-3-quetrum; styli brevis crassi ramis erectis late 3-gonis, intus stigmatosis. Ovula in loculis singulis solitaria, e funiculo adscendente descendia; micropyle extrorsum supra. Fructus carpella 2, v. sæpius 1, evoluta adscendentia subgynobasica; stylo parvo lateraliter subbasilari; recta v. arcuata, pyriformia v. oliviformia, baccata. Semen in carpello fertili adscendens, inferne ad hilum attenuatum; rapheos ramis divaricato-furcatis adscendentibus; albumine æquabili; embryone infra subapicali. — Robustæ inermes; caule annulato tereti v. interrupte incrassato; foliis terminalibus spiraliter pinnatisectis; pinnis lineari-acuminatis plicato-nervosis suboppositis; vagina integra

1. Spec. 1. *K. montana* H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, I, 303. — DR., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 533. — ? *Morenia Lindeniana* WENDL. F., in *Bot. Zeit.* (1859), 17.

2. In *Gött. Nachr.* (1885), 327. — B. H., *Gen.*, III, 912, n. 61. — DR., *Pflanzenfam.*, 64.

3. Spec. 1. *G. princeps* WENDL. F. et GRISEB.

4. *Fruct.*, II, 186, t. 120. — ENDL., *Gen.*, n. 1723. — K., *Enum.*, III, 175 (part.). — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 164 (part.), 309, t. 143, fig. 1; 154. — B. H., *Gen.*, III, 912, n. 62. — DR., *Pflanzenfam.*, 64. — *Sublimia* COMBERS., herb. (part.).

dilatata; spadicebus stipitatis ramosis; ramis patulis; spathis distichis imbricatis ∞ ; floribus¹ 1-seriatim cymulosis; fœmineis ad cymulæ basin paucis v. 1, ebracteatis. (*Ins. Mascaren.*²)

116? *Pseudophœnix* WENDL. F. et DR.³ — « Floris fœminei calyx parvus cupularis, tenuiter 3-dentatus. Petala⁴ 3, obtusa refracta. Staminodia 6. Fructus stipitatus drupaceus⁵, e carpellis sphæricis 1-3; stylosum vestigiis lateralibus, basilaribus v. in fructu lobato centralibus; epicarpio coriaceo; mesocarpio grumoso; endocarpio crustaceo subvitreo. Semen erectum liberum subsphæricum; hilo basilari; rapheos adscendentis ramis utrinque arcuatis 2, 3; albumine æquabili; embryone basilari. — Erecta⁶ inermis; foliis abrupte pinnatisectis; segmentis crebris lineari-lanceolatis acuminatis duriusculis, basi valde plicatis. Spadix inter folia ramosus. (*Florida*⁷.) »

117. *Synechanthus* WENDL. F.⁸ — Flores (fere *Hyophorbes*) monœci; masculorum hemisphærico-3-gonorum calyce carnosulo cupulari, 3-lobo. Petala 3, late ovata, basi connata, valvata demumque patentia. Stamina 3-6, imæ corollæ affixa; filamentis subulatis brevibus; antheris ovoideo-subdidymis dorsifixis, introrsum ad margines rimosis. Gynœcei rudimentum subsphæricum. Floris fœminei masculo subæqualis hemisphærici calyx brevis (marium). Petala 3, orbicularia imbricata. Staminodia minuta 3 (v. 0). Germen subsphæricum, 3-loculare; stylo brevissimo minute 3-dentato. Ovula in oculis erecta; micropyle extrorsum infera. Fructus oliviformis; stylo basilari; pericarpio tenuiter carnosio-fibroso. Semen erectum conforme; hilo basilari; rapheos sigmoideæ ramis obscuris; albumine æquabili; embryone inferiore. — Inermes gregariæ graciles, sæpe stoloniferæ; foliis æquipinnatisectis; segmentis membranaceis acuminatis plicato-nervosis, sæpe interruptis; marginibus basi recurvis; rhachi intus carinata; petiolo intus canaliculato; vagina brevi aperta. Spadices interfoliacei

1. Pallide flavidis v. viridulis, parvis.

2. Spec. 3. SPACH, *Suit. à Buff.*, XII, 60 (part.). — WENDL. F., in *Ill. hort.*, XIII, t. 462, 463. — BALF. F., in *Bak. Fl. maurit.*, 382. — WALP., *Ann.*, III, 458; V, 806.

3. *Pflanzenfam.*, 64; *Gard. and For.* (1888), 352.

4. « *Viridia*. »

5. « *Aurantiacus* v. *ruber*. »

6. « *Oreodoxæ* regię habitu. »

7. Spec. 1. *P. Sargenti* WENDL. F. et DR. — *Rev. hort.* (1887), 34; (1888), 482; (1889), 574, fig. 140, 141. Dicitur genus *Gaussiæ* valde proximum.

8. In *Bot. Zeit.* (1858), 145. — B. H., *Gen.*, III, 912, n. 60. — DR., *Pflanzenfam.*, 64, fig. 17. — *Reineckia* KARST., in *Koch Woch.*, I, 349. — *Rathea* KARST., *loc. cit.*, I, 377; II, 15.

plures longe pedunculati, erecti, fructiferi mox nutantes; ramis gracilimimis ancipiti-compressis; floribus in eis 1, 2-seriatim 1-pari-acervulatis; acervulis alternis elongatis, ebracteatis; flore acervulorum inferiore foemineo; cæteris masculis. (*America centr., Columbia*¹.)

118. **Reinhardtia** LIEBM.² — Flores (fere *Synechanthi*) monœci; masculorum in alabastro conoideorum sepalis 3, rotundatis concavis arcte imbricatis. Petala longiora ovato-acuta rigida valvata. Stamina 6-∞, imæ corollæ adnata; filamentis brevibus subulatis; antheris linearibus basifixis; loculis angustis, basi liberis, introrsum rimosis. Floris foeminei masculo minoris sepala ut in mare. Petala multo longiora, basi latiore leviter imbricata, apice longe acutato-acuminata rigida valvata. Germen pyramidato-3-gonum; stylo apice acutato, 3-lobo; lobis erectis conniventibus, introrsum stigmatosis. Ovula in loculis incompletis solitaria placentæ basilari adnata; micropyle extrorsum infera. Fructus oblongo-ellipsoideus, stylis apiculatus, 1-locularis; pericarpio fibroso-coriaceo; endocarpio tenui. Semen erectum; hilo basilari; raphe verticali exsculpta; ramis reticulatis; albumine ruminato; embryone basilari. — Inermes; caudice gracili stricto annulato. Folia æqui-pinnatisecta; segmentis crebris; v. simplicia apiceque 2-fida; segmentis integris acutis v. acuminatis, nunc grosse dentatis v. præmorsis; petiolo gracili; vagina reticulato-fibrosa. Spadices interfoliacei subdigitatim ramosi; floribus ad ramulorum areolas glomerulatis; intermedio foemineo (v. 0); lateralibus masculis 1, 2; bracteis bracteolisque rigidis. Spathæ 1, 2, membranaceæ v. coriaceæ. (*Mexicum, America centr.*³)

119. **Ceroxylon** H. B.⁴ — Flores polygamo-monœci⁵; masculorum sepalis 3, parvis, basi connatis et cupulæ crassæ obconicæ insertis. Petala 3, multo longiora crassa, basi connata, superne anguste lanceolata acuminata, valvata. Stamina usque ad 15, sæpius 9, quorum

1. Spec. 3. HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 407. — *Bot. Mag.*, t. 6572.

2. In *Overs. K. Dansk. Selsk. Kjob.* (1845), 99. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 311. — B. H., *Gen.*, III, 906, n. 50. — DR., *Pflanzenfam.*, 64. — *Malortia* WENDL. F., *Ind. Palm.*, 28; in *Bot. Zeit.* (1859), 5. — B. H., *loc. cit.*, n. 49.

3. Spec. ad 8. HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 402. — *Bot. Mag.*, t. 5247, 5291 (*Malortia*). — WALP., *Ann.*, III, 419; V, 807.

4. *Pl. æquin.*, I, 1, t. 1, 1 b. — H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, I, 307. — PERS., *Syn.*, II, 576. — Rœm., *Collect.*, 305. — ENDL., *Gen.*, n. 1733 (part.). — WENDL. F., in *Bonplandia* (1860), 106. — B. H., *Gen.*, III, 905, n. 47. — DR., *Pflanzenfam.*, 61, fig. 3; 48, J. — *Klopstockia* KARST., in *Linnaea*, XXVIII, 251; *Fl. columb.*, I, t. 1. — *Beethovenia* ENG., in *Linnaea*, XXXIII, 677, t. 3, fig. 4.

5. Fructus dicitur bacciformis, ruber v. violaceus, *Nuci avellanæ* æqualis.

alternipetala 3, corollæ sinubus inserta, et 6 per paria oppositipetala; filamentis brevibus subulatis, basi pyramidata incrassatis ibique inter se et cum corolla connatis; antherarum (magnarum) loculis subdidymis obtusis v. lineari-elongatis, ad margines rimosis; filamento imo loculorum sinu affixo. Gynæcei rudimentum sterile; germine nunc 3-loculari; ovulo rudimentario v. 0. Floris fœminei sepala basi incrassata connata. Petala carnosula, basi connata, valvata. Staminodia 6- ∞ , parva; antheris crassis. Germen 3-lobum; lobis vacuis 1, 2; stylo inter lobos brevi erecto; ramis stigmatosis crasse subulatis sulcatis recurvis. Ovula angulo loculorum interno inserta adscendentia; micropyle extrorsum infera. Fructus sphæricus v. 2-dymus; stylo subbasilari; pericarpio grumoso v. granulato; endocarpio tenui. Semen erectum; hilo basilari; rapheos ramis adscendentibus ramuloso-reticulatis; albumine æquabili; embryone basilari. — Elatæ inermes; caudice annulato, nunc ceram scatente. Folia terminalia æqui-pinnatisecta; segmentis longe ensiformibus acuminatis coriaceis, subtus lanuginosis; marginibus basi recurvis; vagina fibrosa. Spadices interfoliacei longi ramosissimi; ramulis flexuosis; floribus¹ ad nodos insertis, basi articulatis, minute bracteatis. Spathæ 3-5: inferiores completæ coriaceæ sericeo-tomentosæ; fœmineæ autem longiores. (*Columbia, Venezuela* ².)

120. *Juania* DR.³ — Flores (fere *Ceroxyli*) diœci; masculi...? Fœmineorum calyx brevis, basi 3-gibba intrusus; lobis coriaceis breviter acuminatis, imbricatis. Petala 3, longiora, basi connata, coriacea striata breviter acuminata, imbricata. Staminodia 3-6, imæ corollæ affixa. Germen oblongo-conoideum, 3-loculare; loculis effœtis 2; styli brevis ramis stigmatosis recurvis 3. Ovulum adscendens. Fructus subsphæricus, stylis coronatus; exocarpio carnosio, apice conico duro; endocarpio subcrustaceo, intus subrugoso. Semen basilare sphæricum; raphe laterali ab hilo ad chalazam acutatam extenso, parce ramoso; albumine æquabili corneo; embryone subbasilari. — Gracilis inermis; foliis terminalibus pinnatisectis; segmentis longe ensiformibus acuminatis striatis, subtus argentatis, basi recurvis; petiolo gracili furfuraceo. Spadix fœmineus glaber, simpliciter v.

1. Mediocribus v. majusculis.

2. Spec. 4, 5. SPRENG., *Syst.*, II, 623 (*Iriarte*). — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 188 (*Iriarte*). — K., *Enum.*, III, 196, n. 7 (*Iriarte*). — DR., *Fl. bras.*, III, II, 545. —

ENG., in *Linnaea*, XXXIII, 673 (*Klopstockia*). — WALP., *Ann.*, III, 464 (part.); V, 811 (part.), 840 (*Klopstockia*).

3. In *Bot. Zeit.* (1878), 189; *Pflanzenfam.*, 61. — B. H., *Gen.*, III, 905, n. 48.

subsimpliciter ramosus; rhachi valde compressa; ramis flexuosis; floribus fœmineis in ramo solitariis, breviter pedicellatis; spathis elongatis lanceolatis coriaceis furfuraceis. (*Ins. J. Fernandez*¹.)

121. **Wettinia** Poepp.²—Flores monœci; masculorum assymetricorum sepalis 3-6, inæqualibus parvis, 3-angularibus crasse rigidis valvatis. Petala multo longiora lineari-subulata flexuosa dura crassiuscula, demum torta. Stamina 6-15; filamentis subulatis brevissimis; antheris oblongis (magnis) basifixis linearibus, 4-gonis, mucronatis, plus minus pilosis, lateraliter rimosis. Gynœcei rudimentum maximum. Floris fœminei masculo multo majoris sepala inæqualia, 3-angularia, basi dilatata. Petala late subulata multo longiora subflexuosa. Germen villosum, 3-lobum; lobis ovoideis erectis; stylo gynobasico gracili; ramis stigmatosis 3, lineari-lanceolatis flexuosis. Ovulum adscendens; micropyle infera. Fructus carpella mutua pressione obovoideo-obpyramidata, vertice convexo v. truncato villosa; styli vestigiis basilaribus; exocarpio quam endocarpium lignosum molliore. Semen erectum obovoideum; rapheos ramis ad summum semen adscendentibus complanatis; albumine æquabili v. parce ruminato; embryone basilari. — Elatæ graciles inermes; caudice annulato, radicum epigæarum cono compacto sustentato; foliis terminalibus paucis inæqui-pinnatisectis; segmentis basi cuneatis margineque recurvis, dein dimidiato-lanceolatis, plicato-nervosis præmorsis; rhachi obtuse 3-quetra, superne canaliculata; vagina elongata. Spadices infrafoliacei, 3-natiim verticillati breves crassique, simplices v. ramosi: intermedius decurrens fœmineus; floribus in ramis dense spiraliter confertis bracteatis bracteolatisque; bracteolis inter flores fœmineos 3, 4. Spathæ ad 6: inferiores tubulosæ persistentes 3, masculæ inæqui-ruptæ; fœmineæ autem 2-labiatae; superiores 3 fusiformes plus minus laceræ caducæ. (*Peruvia et Columbia andin.*³)

122. **Cateblastus** Wendl. F.⁴— Flores (fere *Wettiniæ*) monœci;

1. Spec. 1. *J. australis* Dr. — *Ceroxylon?* australe Mart. — *Morenia Chonta* Phil.

2. Ex Endl., *Gen.*, n. 1715. — Poepp. et Endl., *Nov. gen. et spec.*, II, 39, t. 153, 154. — K., *Enum.*, III, 108, 589. — Gaudich., *Voy. Bonite Bot.*, t. 15, fig. 7, 8. — Mart., *Hist. nat. Palm.*, III, 304, t. 166, fig. 7. — Wendl. F., in *Bonplandia* (1860), 106. — B. H., *Gen.*,

III, 902, n. 41. — Dr., *Pflanzenfam.*, 61, fig. 48 A.

3. Spec. 3. Spruce, in *Journ. Linn. Soc.*, III, 194; IX, 128. — Hemsl., *Bot. centr.-amer.*, III, 401.

4. In *Bonplandia* (1862), 104, 106. — B. H., *Gen.*, III, 901, n. 40. — Dr., *Pflanzenfam.*, 61, fig. 48, G', G'.

masculorum asymmetricorum sepalis 3, ovato-3-angularibus parvis leviter imbricatis. Petala 3, angusta lanceolato-subulata flexuosa coriacea crassa valvata. Stamina 9- ∞ ; filamentis brevibus; antheris (magnis) lineari-oblongis basifixis apiculatis, sub-4-gonis. Gynæcei rudimentum minutum. Floris fœminei masculo subæqualis sepala 3-angularia. Petala multo majora, 3-angularia coriacea, basi imbricata, apice acutato conniventia ibique subvalvata. Staminodia 3-6; antheris cassis. Germen 3-lobum; lobis subsphæricis stellatim patentibus pubentibus; effœtis 1, 2; styli brevis ramis 3, crassis longis obtusis, intus canaliculatis. Ovulum in loculis fertilibus erectum; micropyle extrorsa. Fructus carpella 1-3, oblonga, rugulosa v. puberula; stylo basilari; pericarpio grumoso. Semen erectum conforme; hilo basilari; rapheos ramis adscendentibus reticulatis; albumine æquabili v. parce ruminato; embryone basilari. — Elatæ v. mediocres inermes; caudice gracili annulato; radicibus aeriis. Folia terminalia inæqui-pinnatisecta; segmentis dimidiato-lanceolatis, basi cuneatis adque margines recurvis, oblique præmorsis; vagina longa. Spadices infrafoliacei breves subverticillati simpliciter ramosi: masculi cum fœmineis mixti; floribus ad ramos spiraliter dispositis; masculis solitariis v. 2-nis; fœmineis solitariis, bracteatis bracteolatisque. Spathæ plures dissimiles: inferiores compressæ, 2-carinatæ; superiores autem longiores immarginatæ, 2-labiatae. Cætera *Wettinia*. (*America austr. trop.*¹⁾)

123. *Iriarteia* R. et Pav.² — Flores (fere *Catoblasti*) monœci; masculorum sepalis brevibus, basi rotundata gibbis, imbricatis. Petala multo longiora crassioraque, ovoidea v. oblonga valvata. Stamina 6- ∞ ; filamentis brevibus erectis, ima basi inter se et cum petalorum basi crassa connatis; antheris erectis basifixis sub-4-gonis, ad margines v. introrsum rimosis. Gynæcei rudimentum parvum (v. 0). Floris fœminei masculo minoris, sæpius ovoidei, sepala 3, orbicularia late imbricata. Petala subæqualia v. paulo longiora concava, arcte imbricata tortave. Staminodia ∞ (v. 0). Germen 3-loculare; loculis effœtis 2; styli brevis crassi lobis stigmatosis brevibus obtusis. Ovulum adscendens v. suberectum. Fructus oblongus, depressus v. ellipsoi-

1. Spec. 3. KARST., *Fl. columb.*, I, 163, t. 81 (*Iriarteia*). — TRAIL, in *Trim. Journ.* (1876), 332 (*Iriarteia*). — DR., *Fl. bras.*, III, II, 541, t. 127, fig. 2. Genus *Iriarteia* cum *Wettinia* nonnihil connectens.

2. *Prodr. Fl. per. et chil.*, 149, t. 32; *Syst.*, 298. — MART., *Hist. nat. Palm.*, 35, t. 35, 36. — ENDL., *Gen.*, n. 1733. — B. H., *Gen.*, III, 960, n. 36. — DR., *Pflanzenfam.*, 60, fig. 13; 48, B-E.

deus, stylo apicali v. subapicali coronatus. Semen sphæricum v. oblongum 1 (rarius 2); rapheos ramis adscendentibus reticulatis; albumine æquabili v. extus parce ruminato; embryone basilari, dorsali v. subapicali. — Inermes elatæ; caudice sæpe annulato cylindræco v. ventricosus, inferne ramis epigeis sustentato. Folia terminalia pauca, æqui- v. inæqui-pinnaiisecta; segmentis sæpius quaquaversis, cuneatis, flabellatis, integris, fissis v. laciniatis, plicato-nervosis. Spadices 1-3, infrafoliacei, simpliciter v. fasciculatim ramosi; glomerulis spiraliter dispositis, 2, 3-floris; flore intermedio fœmineo (v. 0); lateralibus masculis. Spathæ plures v. ∞ : inferiores minores sæpe incompletæ; superiores autem completæ v. omnes deciduæ¹. (*America trop.*²)

124. **Geonoma** W.³ — Flores monœci v. diœci; masculorum perianthio nunc asymmetrico. Sepala ovato- v. obovato-oblonga carinata imbricata. Petala oblonga v. obovata, libera v. basi connata, valvata. Stamina 6, 1-adelpha; tubo cylindræco v. urceolato; antheris exsertis introflexis demumque retroflexis; loculis inferne discretis v. pendulis divaricatis, introrsum rimosis⁴. Gynœcei rudimentum parvum v. 0. Flores fœminei sæpius majores compressi; sepalis ovato- v. oblongo-lanceolatis imbricatis; extimis carinatis. Petala basi connata imbricata. Androcæum rudimentarium urceolatum dentatum. Germen 3-loculare; loculis sæpe rudimentariis v. effœtis 2; stylo elongato centrali v. sæpius basilari v. laterali, apice nunc dila-

1. Sectiones in genere sunt, præter *Euiriar-leam* DR.:

Deckeria KARST., in *Linnaea*, XXVIII, 258; *Fl. columb.*, 107, t. 53; staminibus ad 15; embryone dorsali;

Socratea KARST., in *Linnaea*, XXVIII, 263. — B. H., *Gen.*, III, 900, n. 37; staminibus ∞ ; stylo in fructu subterminali; embryone inferne subterminali;

Dictyocaryum WENDL. F., in *Bot. Zeit.* (1865), 131. — B. H., *Gen.*, III, 901, n. 38; staminibus 6; stylo ad fructum subbasilari; embryone basilari;

Iriartella WENDL. F., in *Bonplandia* (1862), 106. — B. H., *Gen.*, III, 901, n. 39; staminibus ad 15; stylo ad fructum basilari; embryone ad basin subterminali; foliorum segmentis haud quaquaversis.

2. Spec. ad 12. MART., *Palm. Orbign.*, 14, 18, t. 5, fig. 3; t. 12, 19; t. 20, A, fig. 7 (*Dictyocaryum*). — KARST., in *Linnaea*, XXVIII, 259 (*Deckeria*); *Fl. columb.*, 109, t. 54 (*Socratea*).

— DR., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 536, t. 127.

— WALL., *Palm.-tr. Amaz.*, t. 15. — WENDL. F., in *Bonplandia* (1860), 102, 106. — SPRUCE, in *Journ. Linn. Soc.*, XI, 132. — TRAIL, in *Trim. Journ.* (1877), 130 (*Socratea*, *Iriartella*). — OERST., in *Vidd. Medd. Nat. For. Kjob.* (1858), 30. — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 401 (*Socratea*). — BARB.-RODR., *En. Palm. nov.* (1875), 13; *Les Palm.* (1882), App., t. 2. — WALP., *Ann.*, V, 810, 837; 838 (*Socratea*), 833 (*Deckeria*).

3. In *Mem. Acad. Berl.* (1804), 37; *Spec.*, IV (1805), 593. — SPRENG., *Syst.*, II, 18; *Gen.*, I, 250; *Anleit.*, II, I, 202. — MART., *Hist. nat. Palm.*, II, 6, t. 4-12, 14-20; III, 316. — K., *Enum.*, III, 228. — ENDL., *Gen.*, n. 1751. — B. H., *Gen.*, III, 913, n. 64. — DR., *Pflanzenfam.*, 59, fig. 5; 14, H; 46, A-D; 47. — GYNASTUM POIT., in *Mém. Mus.*, IX (1822), 387, t. 16-20. — TURP., in *Dict. sc. nat.*, Atl., t. 156.

4. Sæpe pallidis, nunc demum tortis.

tato; ramis stigmatosis exsertis recurvis 3. Ovulum laterale peltatum v. subbasilare adscendens. Fructus⁴ subsphæricus; stylo v. ejus cicatrice hinc basilari; pericarpio carnoso, subspongioso, coriaceo v. crustaceo, intus parce v. haud fibroso. Semen conforme erectum; hilo basilari; raphe nunc exsculpta semen cingente, obscura v. haud ramosa; albumine æquabili; embryone dorsali v. subbasilari. — Graciles inermes; caudice arundinaceo annulato, nunc gemmifero. Folia alterna v. terminalia; limbo integro, obsagittato-2-fido v. varie pinnatisecto; segmentis acuminatis, basi recurvis; rhachi dorso convexa ventrequae acuta; petiolo basi concavo; vagina varia subtubulosa. Spadices³ axillares, infrafoliacei v. intrafoliacei, simplices, composite v. decomposite ramosi; floribus in cavis ramulorum spiraliter dispositis immersis bracteatis bracteolatisque, in cavo quoque 1-3, nunc demum semicxsertis; fœmineo intermedio (v. 0). Spathæ 2, cito sæpius deciduæ: inferior concava truncata incompleta; superior autem sæpius compressa v. subfusiformis. (*America trop.*³)

125. *Astrogryne* WENDL. F.⁴ — Flores (fere *Geonomæ*) monœci v. diœci; masculorum asymmetricorum sepalis glumaceis carinatis inæqualibus imbricatis. Petala concava glumacea subvalvata. Stamina 6, summo receptaculo ultra perianthium producto longe obconico inserta; filamentis basi connatis; antherarum loculis discretis pendulis, demum divaricatis v. adscendentibus, introrsum rimosis. Gynœcei rudimentum centrale minute 3-lobum. Floris fœminei angulato-compressi sepala inæqualia imbricata; extimis carinatis. Corollæ lobi 3, imbricati, recurvi; tubo demum supra basin circumcisso. Staminodia in cupulam urceolatam connata. Germen 3-loculare; loculis effœtis 2; styli longi apicalis ramis exsertis 3. « Fructus rectus v. decurvus oblongus, utrinque attenuatus; styli cicatrice basilari; pericarpio succoso, intus fibroso. Semen erectum oblongum; hilo basilari; rapheos ramis semen circumcingentibus; albumine æquabili. » — Inermes; caudicibus gracilibus dense annulatis. Folia

1. Sæpe pisiformis, nigrescens.

2. Nunc colorati.

3. Spec. 80-90. AUBL., *Pl. Guian.*, II, App., 99 (*Vouay*, nom. gener.?). — MART., *Palm. Orbign.*, 21, t. 11, 12, 22, 23. — OERST., *Palm. centr.-amer.*, in *Vid. Medd. Nat. For. Kjob.* (1858), 32. — WENDL. F., in *Linnaea*, XXVIII, 333 (part.). — WALL., *Palm.-tr. Amaz.*, 62, t. 23-25. — KARST., in *Linnaea*, XXVIII,

409. — GRISEB., *Fl. brit. W.-Ind.*, 517. — BARB.-RODR., *En. Palm. nov.* (1875), 9; *Les Palm.* (1882), 36, 42, t. 4; *Velloz.*, I, 91. — HENSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 408. — TRAIL, in *Trim. Journ.* (1876), 323, t. 183, fig. 1; (1877), 129. — ? *Bot. Mag.*, t. 5782. — WALP., *Ann.*, III, 467, 813, 841.

4. Ex B. H., *Gen.*, III, 914, n. 65. — DR., *Pflanzenfam.*, 59, fig. 46, E-H.

simplicia, 2-fida, varie fissa v. fenestrata; segmentis plicato-nervosis; petiolo superne concavo. Spadices interfoliacei, simpliciter v. 2-plicatim ramosi; ramis rigidis; floribus in cavis spiraliter dispositis, primum immersis, demum semi-emersis, bracteatis, 1, 2-bracteolatis, in cavo quoque solitariis v. inæqualibus 2-nis. Spathæ cæteraque *Geonomæ*. (*America centr.*¹)

126. *Calyptrigyne* WENDL. F.² — Flores monœci; masculorum subsymetricorum sepalis oblongo-lanceolatis glumaceis, quorum 2, 3 dorso carinata v. alata; præfloratione imbricata. Petala receptaculo ultra calycem in stipitem cylindraceum v. obconicum producto inserta, ovata v. spathulata, valvata. Stamina 6; filamentis 1-adelphis, apice liberis primumque introflexis, demum erectis; antherarum sagittatarum basifixarum connectivo ultra loculos late producto apiceque mucronato. Gynœcei rudimentum minutum. Floris fœminei masculo subæqualis compresso-ovoidei sepala dissimilia concava v. cymbiformia dorsoque carinata v. alata 2. Petala breviter valvata, dorso carinata v. anguste alata, basi plus minus alte in tubum demum circumcissum connata, valvata. Staminodia in saccum conicum membranaceum 6-dentatum germen superantem demumque calyptratim deciduum connata. Germen conicum, 3-loculare; loculis effœtis 2; styli brevis v. elongati terminalis ramis stigmatosis acutatis, demum recurvis. Ovulum fertile 1, hemitropum parietale. Fructus ovoideus v. oblongus; stylo basilari; pericarpio lævi carnosio-fibroso; endocarpio tenui. Semen conforme compressum; hilo basilari; raphe semen circumcingente; albumine æquabili; embryone basilari. — Inermes, nunc stoloniferæ; caudice longo v. rarius brevi, basi annulato. Folia terminalia inæqui-pinnatisecta; segmentis angustis v. latis falcatis, longe acuminatis, ∞ -nervibus; marginibus basi recurvis; petiolo brevi; vagina brevi crassa aperta. Spadices interfoliacei simplices v. semel ramosi; glomerulis in ramorum alveolis profundis spiraliter dispositis, 1-3-floris; flore intermedio fœmineo (v. 0); lateralibus masculis. Spathæ angustæ 2: inferior pedunculo longo multo brevior, apice fissa; superior autem elongata aque basi ad apicem fissa; bractea alveolæ labium inferius marginante; bracteolis minoribus. (*America trop.*³)

1. Spec. 2, 3, incl. *Geonoma Martiana* hort.

2. In *Bot. Zeit.* (1859), 72. — B. H., *Gen.*, III, 914, n. 66 (part.). — Da., *Pflansenfam.*, 59, fig. 46, J.

3. Spec. 3. MART., *Hist. nat. Palm.*, II, 137, t. 13 (*Geonoma*). — TRAIL, in *Trim. Journ.* (1876), 330, t. 112, fig. 3. Genus forte melius ad *Geonomæ* sectionem reducendum.

127? *Calyptronema* GRISEB.¹ — Flores (fere *Calyptrrogynes*) monœci, 6-andri; « antherarum loculis nisi basi cohærentibus. Germinis loculi 3; effœtis 1, 2; stylo excentrico. Fructus subangulatus 1-spermus, nunc oblique oblongo-turbinatus; pericarpio intus dense fibroso. Staminodia in discum spurium connata. — Inermes; foliis æquipinnatisectis; segmentis basi profunde reduplicatis, apice 2-fidis. Spadices 3-partiti; ramis longis crassis, basi floriferis; spathis rigidis coriaceis. (*Antillæ, America trop. austr.*²) »

128. *Welfia* WENDL. F.³ — Flores monœci; masculorum asymmetricorum sepalis lanceolatis concavis carinatis imbricatis. Petala late ovata obtusa, basi in columnam cylindraceam connata, valvata. Stamina ∞ , inclusa; filamentis in columnam cylindraceam connatis, apice libero subulatis; antheris elongato-subulatis acuminatis, basi breviter 2-loba affixis. Gynœcei rudimentum minimum, 3-fidum v. 0. Floris fœminei masculo subæqualis compressi sepala cymbiformi-lanceolata acuminata imbricata. Petala multo majora imbricata: lateralia 2, cymbiformia alato-carinata; dorsale autem angustius planiusculum. Staminodia circa germen in urceolum conicum compressum apiceque dentatum connata; dentibus obtusis valvatis, demum patulis. Germen conico-subulatum, 3-loculare; styli lobis erectis sessilibus conniventibus. Ovulum basilare erectum elongatum. Fructus⁴ oblongus compressus, apicem versus acutum complanatus anceps; stylo basilari; pericarpio crasse coriaceo⁵, intus fibroso; endocarpio crustaceo, intus lævi. Semen cylindraceo-oblongum; hilo laterali elongato; rapheos semen cingentis ramis descendentibus paucis; albumine æquabili; embryone basilari. — Inermes; caudice elato crasse arundinaceo. Folia terminalia pinnatisecta; segmentis basi angustatis, apice integris v. acuminatis fissis, coriaceis plicatis; marginibus basi recurvis; petiolo brevi planiusculo; vagina brevi fissa. Spadices interfoliacei simpliciter ramosi crassi penduli. Flores⁶ in cavis profundis hiantibus 6-stiche dispositi, 3-mi; intermedio fœmineo. Bractæ labio superiori adnatæ linguiformes crasse coria-

1. *Fl. brit. W.-Ind.*, 518. — DR., *Pflanzenfam.*, 59. — TRAIL, in *Trim. Journ.* (1876), 330, t. 183, fig. 3. — *Pholidostachys* WENDL. F., ex B. H., *Gen.*, III, 915.

2. Spec. 4. SW., *Fl. ind. occid.*, I, 619 (*Elæis?*). — K., *Enum.*, III, 281 (*Elæis?*). — GRISEB., *Cat. pl. cub.*, 222. — HEMSL., *Bot.*

centr.-amer., III, 410 (*Pholidostachys*). — DR., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 511, t. 122.

3. Ex B. H., *Gen.*, III, 915, n. 67.

4. « *Atro-violaceus*, 2-pollicaris. »

5. « *Castaneo*, lævi. »

6. « *Pallide ochroleucis*, majusculis; perianthio glumaceo. »

ceæ, cavum claudentes, demum protrusæ. Bracteolæ 2. (*America centr.*¹⁾) »

129. **Manicaria** GÆRTN.² — Flores monœci; masculorum oblongorum receptaculo conico. Sepala 3, breviter rotundata concava crassa coriacea, marginibus scariosa, imbricata. Petala longiora oblonga crasse coriacea valvata. Stamina 20-30, erecta; filamentis subulatis, basi inæqui-connatis; antheris linearibus erectis, apice emarginatis; loculis angustis, basi sagittata longe liberis, introrsum rimosis. Floris fœminei sæpe majoris, in alabastro minus conspicue 3-goni, perianthium fere ut in mare. Staminodia hypogyna 6-∞, inæqui-linearia. Germen subsphæricum v. 3-gonum, 3-loculare; styli lobis stigmatosis sessilibus, sub-3-gonis, demum patentibus. Ovula in loculis adscendentia incomplete anatropa. Fructus subsphæricus, 1-spermus. v. depresso 2, 3-lobus, 2, 3-spermus, stylo coronatus; exocarpio corticato suberoso angulato-echinato; endocarpio crustaceo, intus fibroso basique oblique pervio. Semina adscendentia; integumento durissimo; rapheos ramis reticulatis semenque amplectentibus; albumine æquabili cavo corneo; embryone subbasilari. — Robustæ ineremes; caudice arcuato v. flexuoso mediocri annulato vaginisque vetustis induto. Folia (maxima) terminalia suberecta rigida lanceolata plicato-nervosa demumque pinnatisecta, serrata; costis crassis; nervis tenuibus; rhachi canaliculata; petiolo compresso; vagina fissa ad margines fibrosa. Spadices plures tomentosi; ramis strictis foveolatis, demum nutantibus. Spathæ 2: superior tereti-fusiformis mucronata fibrosa tardeque rupta. Bracteæ subulatæ. Bracteolæ parum conspicuæ. Flores³ in spadice eodem interfoliaceo simpliciterque ramoso cavis ramorum spiralibus basi immersis; masculis superioribus in ramis confertis; fœmineis inferioribus sparsis. (*America austr. trop.*⁴⁾)

139. **Leopoldinia** MART.⁵ — Flores monœci; masculorum sepalis

1. Spec. 2. HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 410.

2. *Fruct.*, II, 468, t. 176. — LAMK., III., t. 774. — MART., *Hist. nat. Palm.*, II, 139, t. 98, 99; III, 230. — ENDL., *Gen.*, n. 1752. — K., *Enum.*, III, 234. — B. H., *Gen.*, III, 919, n. 76. — DR., *Pflanzenfam.*, 58. — *Pilophora* JACQ., *Fragm.*, 32, t. 35, fig. B, G; 36.

3. Majusculi, graveolentes, roseo-ochroleuci.

4. Spec. 2, 3. W., in *Berl. Akad. Abh.* (1815).

1 (*Pilophora*). — CRISEB., *Fl. brit. W.-Ind.*, 518. — TRAIL, in *Trim. Journ.* (1876), 332. — WALL., *Palm.-tr. Amaz.*, 68, t. 2, fig. 2, 3; t. 26. — DR., *Fl. bras.*, III, II, 518, t. 124; t. phys. 40.

5. *Hist. nat. Palm.*, II, 58, t. 52, 53; 100. fig. 1, 2; III, 165. — K., *Enum.*, III, 176. — ENDL., *Gen.*, n. 1724. — B. H., *Gen.*, III, 920. n. 77. — DR., *Pflanzenfam.*, 58.

ovatis v. orbicularibus membranaceis imbricatis. Petala receptaculo ultra calycem producto ibique breviter obpyramidato inserta 3, ovata rigida valvata. Stamina 6; filamentis subulatis, ima basi inter se et cum corolla connatis; antheris brevibus ovatis v. didymis, ad basin dorsifixis; loculis basi liberis, introrsum rimosis. Gynæcei rudimentum ovoideum, nunc 3-corne. Floris fœminei masculo majoris sepala brevialata imbricata. Petala longiora ovata imbricata. Staminodia minuta v. 0. Germen subturbinatum, 3-loculare; loculis effœtis 2; styli lobis stigmatosis sessilibus excentricis 3. Ovulum adscendens; micropyle infera. Fructus inæqui-ovoideus v. subsphæricus, hinc gibbus; stylis demum basilaribus; pericarpio carnoso, intus fibroso-lignoso. Semen suberectum sphæricum; hilo basilari; albumine æquabili corneo; embryone subbasilari v. suprabasilari. — Inermes; caudicibus solitariis v. cæspitosis, petiolorum vetustorum fibrillis obtectis. Folia terminalia longe petiolata, æqui-pinnatisecta; segmentis angustis acuminatis v. inæqui-2-fidis; petiolo ad margines attenuato; vagina fissa longe reticulato-fibrillosa. Spadices interfoliacei decomposite racemosi, penduli, sæpe tomentelli; ramis ramulisque divaricatis; floribus¹ in spadice 1-sexualibus, v. masculis superioribus, bracteatis. Spathæ truncato-laceræ caducæ 2. (*Brasilia bor.*²)

131. *Bentinckia* BERR.³ — Flores polygami; masculorum subsymmetricorum sepalis latis ovato-oblongis, basi connatis, imbricatis. Petala 3, longiora, receptaculo ultra calycem producto inserta valvata. Stamina 6; filamentis gracilibus, apice inflexis; antheris dorsifixis oblongis versatilibus, introrsum rimosis. Gynæcei rudimentum conicum. Floris fœminei ovoidei sepala basi connata ovata imbricata. Petala longiora ovata imbricata. Staminodia parva 6. Germen pyramidato-3-gonum, stylo coronatum; lobis parvis 3-gonis. Ovulum in loculo fertili 1; loculis effœtis 2. Fructus sphæricus subcompressus; stylo protruso subbasilari; pericarpio carnoso-fibroso; endocarpio crustaceo. Semen ventrifixum, late sinuato-sulcatum; rapheos ramis adscendentibus deinceps descendentes reticulatis; albumine æquabili; embryone basilari. — Inermes; caudice arundi-

1. Minutis v. minimis.

2. Spec. 4. SPRUCE, in *Journ. Linn. Soc.*, IV, 58; *Palm. Amaz.*, 127. — WALL., *Palm.-tr. Amaz.*, 12, t. 2, fig. 6; 4-6. — DR., *Fl. bras.*, III, II, 513, t. 123. — WALP., *Ann.*, V, 806.

3. In *Rozb. Fl. ind.*, III, 621. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 165, 228, t. 139. — ENDL., *Gen.*, n. 1749. — K., *Enum.*, III, 227. — B. H., *Gen.*, III, 916, n. 69. — DR., *Pflanzenfam.*, 58. — *Kepleria* MART., ex ENDL., *Gen.*, 251.

naceo mediocri; foliis terminalibus æqui-pinnatisectis; segmentis angustis longe acuminatis inque lacinias graciles fissis; marginibus basi recurvis. Spadices interfoliacei erecto-patentes, 2-plicato-ramosi; glomerulis in ramorum cavis spiraliter dispositis, 1-3-floris, bracteatis et bracteolatis; flore intermedio fœmineo¹ v. 0; masculis² lateralibus 1, 2, perfectis v. ad squamas ciliatas reductis. Spathæ 2: inferior brevis incompleta papyracea; superior autem sub apice 2-fida. Bracteola cum bracteolis squamiformibus cavorum os 2-labiatum marginans. (*India or.*³)

132. **Podococcus** MANN et WENDL. F.⁴ — Flores monœci; masculorum sepalis 3, oblongis membranaceis, leviter imbricatis. Sepala multo longiora, basi cuneata in pedem obconicum connata, coriacea rigida valvata. Stamina 6: oppositipetala longiora; filamentis summo pedi insertis, e basi dilatata subulatis; antheris brevibus ad basin dorsifixis; loculis parallelis linearibus, introrsum rimosis. Gynœcei rudimentum centrale obovoideum, apice 3-lobulatum. Floris fœminei oblongi sepala 3, oblonga membranacea imbricata. Petala ut in flore masculo inferne connata ovato-acuta, valvata v. leviter imbricata. Staminodia minima 6. Germen stipitatum, 3-loculare; styli terminalis erecti brevissimi lobis stigmatosis parvis recurvis. Ovulum in loculo quoque sub apice affixum, primum descendens, quorum 1, 2 sæpe haud evoluta. Fructus carpella 3, quorum magis evolutum 1, oblongo-cylindraceum v. subclavatum baccatum intusque parce fibrosum, e summo stipite geniculato-deflexum; cæteris sæpius minoribus 1, 2, v. plerumque minimis; stylo basilari inter carpella persistente. Semen maturum adscendens elongatum; rapheos ramis adscendentibus superneque reticulatis; albumine duro æquabili; embryone parvo ad medium dorsali. — Humilis inermis rufescenti-furfuraceus; caudicibus brevibus arundinaceis annulatis; foliis basilaribus v. alternis, aut inferioribus simplicibus, aut superioribus inæqui-pinnatisectis; segmentis 1-10, rhombeo-lanceolatis v. obovatis plurinerviis, supra medium lobulatis v. eroso-dentatis; superioribus nunc varie

1. Violaceo.

2. Coccineis.

3. Spec. prototyp. 1. *B. Coddapanna* BERR. — GRIFF., in *Calc. Journ. Nat. Hist.*, V, 467; *Palms brit. Ind.*, 160; App., 26. — WIGHT, in *Madr. Journ.*, II, 385. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 418. Additur ab auctoribus recentio-

ribus species hucusque incomplete nota, scil. *B. nicobarica* BECC., in *Ann. Jard. Buitenz.*, II, 165, quæ *Orania nicobarica* KURZ, in *Journ. Bot.* (1875), 331, t. 171, fig. 19-25.

4. In *Trans. Linn. Soc.*, XXIV, 426, t. 38, A; 40, B; 43, A. — B. H., *Gen.*, III, 915, n. 68. — DR., *Pflanzenfam.*, 57.

confluentibus; petiolo tereti; vagina fissa. Spadices interfoliacei simplices pedunculati; glomerulis 2, 3-floris; flore intermedio fœmineo v. 0; lateralibus masculis. Bracteæ bracteolæque minutæ spadici adnatæ fossulamque floriferam efformantes. Spathæ ad 4, tubulosæ marcescentes: inferiores incompletæ 2; superiores autem oblique dehiscentes fissæque¹. (*Africa trop. occid.*)

133. **Sclerosperma** MANN et WENDL. F.² — Flores monœci; masculorum asymmetricorum sepalis 3, liberis v. basi connatis, imbricatis. Petala 3, forma varia, libera v. basi connata, coriacea valvata, apice incurva. Stamina 20-30; filamentis fasciculatis brevibus; antheris angustis erectis basifixis apiculatis, extrorsum rimosis. Floris fœminei ovoidei masculo majoris sepala falcato-ovata acuta coriacea imbricata. Petala obliqua crasse coriacea apice valvata, basi autem imbricata. Staminodia parva numero varia. Germen anguste ovoideum, 1-loculare; stylo brevi crasso stigmatoso-3-dentato. Ovulum descendens parietale. Fructus depresso-sphæricus; stylo supra medium laterali; pericarpio carnoso intus tenuiter fibroso; endocarpio tenui duro. Semen subsphæricum; hilo excentrico; rapheos ramis adscendentibus reticulato-ramosis, ad embryonis basin hilo oppositam convergentibus; albumine duro æquabili. — Gregaria humilis inermis; caudicibus brevibus fastigiatis. Folia erecto-patentia fasciculata inæqui-pinnatisecta; segmentis suboppositis, basi latis, oblongo-linearibus v. subquadratis præmorsis valide nervatis; marginibus basi recurvis; petiolo tereti; vagina fibrosa fissa. Spadices interfoliacei fusiformes erecti pedunculati; floribus superioribus solitariis masculis; inferioribus autem 3-natis glomerulatis; intermedio fœmineo; lateralibus masculis, bracteatis bracteolatisque. Spathæ 2, coriaceæ: inferior brevior compressa, apice laciniata; superior autem fusiformis, longitudine dehiscens. (*Africa trop. occid.*)³

134. **Cocos** L.⁴ — Flores monœci; masculorum regularium v.

1. Spec. 1, variabilis. *P. Barteri* MANN et WENDL. F. — DUR. et SCHINZ, *Consp.*, V, 454.

2. In *Trans. Linn. Soc.*, XXIV, 427, t. 38, C; 40, A. — B. H., *Gen.*, III, 919, n. 75. — DR., *Pflanzenfam.*, 57. — DUR. et SCHINZ, *loc. cit.*

3. Spec. 1. *S. Mannii* MANN et WENDL. F.

4. *Gen.*, ed. I, n. 889 (*Coccus*); ed. VI, n. 1223.

— ADANS., *Fam. des pl.*, II, 25. — J., *Gen.*, 38.

— LAMK., *Ill.*, t. 894. — PERS., *Syn.*, II, 562.

— GÆRTN., *Fruct.*, I, 15, t. 4, 5 (*Coccos*). — K., *Syn.*, I, 303; *Enum.*, III, 281. — ENDL., *Gen.*, n. 1772. — MART., *Hist. nat. Palm.*, II, 113 (part.), t. 62, 64, 75, 78-82; 84 (part.), 85-88 (part.); III, 289, 323. — B. H., *Gen.*, III, 945, n. 127. — DR., *Pflanzenfam.*, 81, fig. 56, A-F, M-O; 57, 58. — SYAGRUS MART., *Hist. nat. Palm.*, II, 129, t. 73, D; 83, 88 (part.), 89, 90; III, 290, 324, t. 166. — K., *Enum.*, III, 288. —

nunc asymmetricorum sepalis 3, parvis lanceolato-3-angularibus acutis subvalvatis. Petala 3, multo longiora, oblonga, nunc obliqua, acuta, erecta, valvata. Stamina 6, inclusa, sub germine rudimentario simplici, 3-mero (v. 0), inserta; filamentis subulatis; antheris oblongis v. linearibus, acutis v. obtusis, imo connectivo affixis; loculis inferne liberis, introrsum v. sublateraliter rimosis. Gynæcei rudimentum varium, plus minus alte 3-lobum. Floris fœminei masculo majoris sepala 3, ovata v. ovato-lanceolata erecta coriacea imbricata. Petala subæqualia, basi dilatata imbricata, apice plus minus acutato valvata. Staminodia in cupulam nunc brevissimam integram v. breviter dentatam connata. Germen sphæricum v. ovoideum, 3-loculare; styli ramis subulato-acutatis, erectis, contiguis v. demum recurvis, intus canaliculatis et marginibus conduplicatis stigmatoso-papillosis. Ovula in loculis 1, basilaria v. adscendentia anatropa; micropyle extrorsum infera. Fructus ellipsoideus v. ovoideus, teres v. obtuse 3-gonus, apice obtusus, intrusus v. rostratus; exocarpio crasso fibroso; endocarpio osseo, extus fibroso basinque versus varie 3-poroso. Semen conforme; indumento (fusco) rapheos ramis reticulato; albumine solido æquabili v. cavo, radiatim fibroso; embryone pororum uni opposito. — *Elatæ* v. humiles inermes; caudice robusto v. gracili annulato, nunc foliorum basibus oblecto. Folia pinnatisecta; segmentis lanceolatis v. ensiformibus, nunc aggregatis, 1-∞-nerviis; marginibus recurvis integris, v. altero dentato v. laciniato; rhachi sub-3-gona dorso convexa; petioli antice concavi marginibus spinosis v. muticis; vagina brevi fibrosa aperta. Spadices interfoliacei simpliciter ramosi, 2-sexuales, erecti v. demum cernui; spatha inferiore brevi, apice fissa; superiore autem clavata v. fusiformi, dura v. lignosa, dorso sulcata; floribus¹ in ramo eodem masculis superioribus solitariis v. 2-paucis et fœmineis inferioribus paucis sessilibus, solitariis v. masculis 1, 2 lateraliter stipatis. (*America trop. et subtrop.*, *Orb. vet. plag. trop.*²)

Lithocarpus TARG.-TOZ., in *Steud. Nom.*, I, 170; II, 56. — *Glaziova* MART., ex DR., *Fl. bras.*, III, II, 395, t. 83, 86. — *Platenia* KARST., in *Linnaea*, XXVIII, 250.

1. Albidis v. flavidis, sæpius mediocribus.

2. Spec. 25-30. MART., *Palm. Orbign.*, 22; 131 (*Syagrus*). — ROXB., *Pl. corom.*, I, t. 73. — GRIFF., *Palms brit. Ind.*, t. 241. — GRISEB., *Fl. brit. W.-Ind.*, 522 (*Syagrus*). — WALL., *Palm. Amaz.*, 124, t. 48. — SPRUCE, in *Journ. Linn. Soc.*, XI, 161. — HOOK., *Kew Journ.*,

II, t. 1, 2. — TRAIL, in *Trim. Journ.* (1877), 79. — DR., in *Griseb. Symb. Fl. argent.*, 283; in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 398, t. 87-97. — BENTH., *Fl. austral.*, VII, 142. — BECC., *Males.*, I, 85; in *Hook. f. Fl. brit. Ind.*, VI, 482. — HILL., *Fl. haw.*, 451. — HEMSL., *Bot. cent.-amer.*, III, 415. — BARB.-RODR., *En. Palm. nov.* (1875), 38; 40 (*Syagrus*); *Les Palm.* (1882), 19, t. 3, fig. 2-6; *Velloz.*, I, 108 (*Syagrus*); *Pl. nov. Jard. Rio*, 10, t. 4, A; 5, B, C; 8, A. — *Bot. Mag.*, t. 5180. — WALP., *Ann.*, III, 473; V, 823.

135. *Barbosa* BECC.¹ — Flores *Cocois*. « Fructus apice rostratus, 1-locularis; endocarpio tenui osseo operculato, cum mesocarpio fibroso laxè connexo, intus e foraminibus basilaribus usque ad apicem 3-vittato; dissepimentis loculorum vacuorum chartaceis. Semen sphaericum; albumine sublignoso-oleoso haud radiato, intus ample effosso, irregulariter profundeque sæpe tubulose ruminato; embryone basilari usque ad cavitatem internam producto. — Elata, irregulariter annulata; foliis pinnatisectis crispis cæterisque *Cocois*. (*America trop. austr.-or.*²) »

136. *Rhyticoccus* BECC.³ — Flores *Cocois*; « fructu ovoideo, 1-loculari; endocarpio crasso osseo, vertice 3-carinato, fibris crebris cum mesocarpio arcte connexo, intus vittis ad apicem confluentibus et prope basin evanidis notato; dissepimentis loculorum vacuorum membranaceis; albumine duriusculo valde ruminato radiatimque fibroso, vix in centro cavo⁴. — Excelsa⁵; foliis pinnatisectis; segmentis ensiformi-lanceolatis; spadicebus interfoliaceis racemiformibus cæterisque *Cocois*. (*Antillæ*⁶.)

137 ? *Arikuryoba* BARB.-RODR.⁷ — Flores (fere *Cocois*) « monœci; calycis masculorum parvulo. Petala lanceolata subconniventia concava. Stamina 6. Gynæcei rudimentum 3-fidum. Floris fœminei sepala late ovata v. cordata. Petala calyce minora reniformi-cuspidata. Androcæum rudimentarium disciforme, 3-dentatum. Germen ovoideum; stylis longis 3. Fructus⁸ drupaceus, 1, 2-spermus subglobosus succulento-fibrosus; endocarpio osseo, basi 3-poroso, intus 3-vittato, fasciis 3 extus notato; albumine corneo profunde tubuloso-ruminato; subsphaericus v. ovoideus, stylo terminali rostratus; embryone basilari usque ad cavitatem producto. — Humilis; caudice crasso, vaginis induto. Folia pinnatisecta; petiolo spinoso-serrato. Spadices lon-

1. In *Malpighia*, I, 349, t. 9, fig. 1. — *Langsdorfia* RADD., in *Mem. fs. Soc. Moden.*, XVIII, 349 (non AGE, non MART.).

2. Spec. 1. *B. Pseudococos* BECC. — BARB.-RODR., *En. pl. H. flum.*, 18. — *Langsdorfia Pseudococos* RADD. — *Cocos Mikianiana* MART., *Palm. bras.*, 128. — K., *Enum.*, III, 286, n. 11. — DR., *Fl. bras.*, III, II, 405, t. 84, 1; 85. — *Syagrus Mikianiana* MART., *Palm. Orbign.*, 133; *Hist. nat. Palm.*, III, 291, t. 166, fig. 1.

3. In *Malpighia*, I, 350, t. 9, fig. 2.

4. « Haud eduli et nucleum liquoremque continente amarissimum. »

5. « Ultra 100-pedalis. »

6. Spec. 1. *R. amara* BECC. — *Cocos amara* JACQ. — *Syagrus amara* MART., *Palm. Orbign.*, 132; *Hist. nat. Palm.*, III, II, t. 166, fig. 2. — GRISEB., *Fl. brit. W.-Ind.*, 522. — WENDL. F., in *Kerch. Palm.*, 257.

7. *Pl. nov. cult. Jard. bot. Rio* (1891), 5, t. 3.

8. *Aurantiacus*, parvus; endocarpio fuscescente.

gissime pedunculati penduli. Spatha inferior inter folia occulta; superior autem ad apicem hians. (*Brasilia or.*¹) »

138. *Allagoptera* NEES². — Flores monœci v. diœci; masculorum asymmetricorum receptaculo crasso, apice subplano. Sepala 3, ovato-v. elliptico-lanceolata, valvata. Petala 3, sepalis paulo longiora v. subæqualia ovato-acuta, valvata. Stamina ∞ (6-60), inclusa; filamentis erectis subulatis brevibus; antheris oblongis v. lanceolatis, ad basin dorsifixis erectis; loculis linearibus, ima basi liberis, extrorsum, introrsum v. margine rimosis. Gynœcei rudimentum minimum v. 0. Flores fœminei ovoidei v. breviter fusiformes; sepalis late ovatis coriaceis arcte imbricatis. Petala subæqualia tenuius coriacea ovato-acuta striata imbricata. Germen basi 3-loculare; loculis 2 effœtis; superne dilatatum, vertice styli ramis 3 erectis acutis, basi 3-gonis, coronatum; lobis margine intus stigmatosis. Ovulum imo angulo interno affixum adscendens; micropyle extrorsa. Fructus ovoideo- v. obovoideo-pyramidatus, apice styli gerus; exocarpio fibroso; endocarpio osseo, basin versus 3-poroso. Semen suberectum; albumine duro æquabili; embryone pororum uni opposito. — Humiles v. inermes acaules, v. caudicibus robustis solitariis v. fasciculatis annulatis. Folia pinnatisecta; segmentis ensatis v. lanceolatis, subtus argentatis v. glaucescentibus; rhachi lateraliter compressa; petiolo antice concavo; vagina aperta fibrosa. Spadices simplices interfoliacei stricti pedunculati; spathis 2; superiore crassiore cymbiformi rostrata, ventre rimosa; floribus³ in spadicibus diversis v. in eodem dense spiraliter confertis; fœmineis nunc inferne masculis 2 stipatis; bracteis bracteolisque parvis. (*Brasilia med. et austr., Bolivia*⁴.)

139. *Jubæa* H. B. K.⁵ — Flores fere *Cocois*⁶; masculorum sepalis lineari-lanceolatis carinatis. Petala majora ovato-oblonga

1. Spec. 1. *A. Capanemæ* BARB.-RODR., loc. cit.; *En. pl. H. bot. flum.* (1892), 17.

2. In *Flora* (1821), 296; in *Pr. Max. Neuw. Reis.*, ed. min., II, 332. — O. K., *Revis.*, 726. — *Diplothemium* MART., *Hist. nat. Palm.*, II, 107, t. 51, fig. 7; 70, 75-78; III, 293, 324. — ENDL., *Gen.*, n. 1774. — K., *Enum.*, III, 289. — B. H., *Gen.*, III, 945, n. 126. — DR., *Pflanzenfam.*, 82.

3. *Ochroleucis* v. *flavidis*.

4. GOM., in *Act. olyssip.* (1812), 61 (*Cocos*). — DR., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 428, t. 98

(*Diplothemium*). — *Bot. Mag.*, t. 4861. — WALP., *Ann.*, I, 1010; V, 824 (*Diplothemium*).

5. *Nov. gen. et spec.*, I, 308, t. 96. — POIR., in *Dict.*, XXIV, 254. — SPRENG., *Syst.*, II, 623; *Anleit.*, II, II, 876. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 294, t. 161, fig. 3. — ENDL., *Gen.*, n. 1776. — K., *Enum.*, III, 293. — GAUDICH., *Voy. Bon. Bot.*, t. 51. — DR., *Pflanzenfam.*, 82. — *Molinaea* BERTER., in *Merc. chil.*, ex *Sillim. Amer. Journ.*, XIX, 63; in *Linnaea*, VII, *Litt.*, 36. — *Micrococos* PHIL., in *Bot. Zeit.* (1859), 362.

6. Cujus forte potius sectio.

acuta coriacea costata. Stamina ∞ , imo perianthio adnata; filamentis tenuibus; antheris longioribus dorsifixis; loculis linearibus adnatis. Floris fœminei sepala late imbricata. Petala imbricata v. torta. Stamina in urceolum membranaceum connata. Germen 3-loculare; loculis rudimentariis 2; styli ramis subulatis patulis. Fructus¹ obovoideus stylis coronatus; exocarpio carnosio-fibroso; endocarpio osseo, ad v. supra infrave medium 3-poroso. Semen sphæricum; albumine cartilagineo æquabili cavo; embryone pororum uni opposito. — Elata inermis; caudice erecto crasso ad medium incrassato. Folia terminalia pinnatisecta; segmentis quaquaversis patentibus lineari-lanceolatis acuminatis rigidis, glabris v. pulverulentis, margine recurvis; rhachi lateraliter compressa, dorso ventrequ convexa; petiolo crasso inermi; vagina aperta brevi. Spadices interfoliacei plures; floribus² glomeratis; glomerulis inferioribus 3-floris; flore intermedio fœmineo v. in summis ramulis 0; masculis lateralibus superioribus 1, 2. Spatha superior fusiformis completa lignosa, ventre aperta demumque 2-partita. (*Chili*³.)

140. *Attalea* H. B. K.⁴ — Flores monœci v. diœci; masculorum calyce parvo v. minimo; foliolis liberis v. basi connatis. Petala multo longiora lineari- v. oblongo-lanceolata erecta valvata. Stamina 6-24, imæ corollæ ibi crassiusculæ adnata; filamentis subulatis, cæterum liberis; antheris erectis lineari-elongatis, basifixis; loculis introrsis, basi liberis. Germen rudimentarium minimum v. 0. Floris fœminei masculo multo majoris ovoidei v. subsphærici sepala 3, ovata ampla imbricata. Petala 3, subsimilia coriacea, late imbricata concava. Discus⁵ hypogynus alte cupularis truncatus. Germen 3-6-loculare; styli brevis v. longiusculi ramis crassis recurvis v. revolutis, intus stigmatosis. Ovula in loculis fertilibus⁶ erecta; micropyle extrorsum infera. Fructus ovoideus v. ellipsoideus, apice obtusus v. rostratus, stylo coronatus; exocarpio fibroso; endocarpio lapideo osseove, ad basin 2-6-poroso. Semen elongatum; rapheos latiusculæ ramis reti-

1. Flavescens, parvus (*Coccolis*).

2. Ochroleucis (*Coccolis*).

3. Spec. 1. *J. chilensis*. — *J. spectabilis* H. B. K. — MART., *Palm. Orbign.*, 106. — J. GAY, *Fl. chil.*, VI, 157. — *Cocos chilensis* MOL., *Hist. nat. Chil.*, ed. II, 164. — *Molinæa micrococo* BERTER. (*Coquito*, Lilla, Cancan).

4. *Nov. gen. et spec.*, I, 309, t. 95, 96. — MART., *Hist. nat. Palm.*, II, 135, t. 41, 75, 95-97; III, 296, 325, t. 167, fig. 1-6; 168,

fig. 3-5. — ENDL., *Gen.*, n. 1770. — K., *Syn.*, I, 310; *Enum.*, III, 275. — SPRENG., *Syst.*, II, 624; *Gen.*, I, 449. — B. H., *Gen.*, III, 947, n. 130. — DR., *Pflanzenfam.*, 60, fig. 56, G-J. — *Scheelea* KARST., in *Linnaea*, XXVIII, 264; *Fl. columb.*, I, 135, t. 67; II, 145, t. 176. — B. H., *Gen.*, III, 947, n. 129. — *Cylindrostachys* DR., *loc. cit.*, 80 (subgenus fl. 6-andris).

5. Androcœi potius rudimentum.

6. Sæpius 1, 2.

culatis; albumine duro æquabili; embryone pororum uni opposito. — Elatæ v. humiles inermes; caudice subnullo v. solitario elato inermi, annulato v. cicatrisato. Folia pinnatisecta; segmentis lineari-lanceolatis; rhachi lateraliter valde compressa; petiolo intus concavo; marginibus acutatis; vagina fibrosa aperta. Spadices interfoliacei pedunculati; spathis 1, 2; superiore fusiformi lignosa; floribus¹, ubi monœci, in spadicibus diversis v. eodem confertis; bracteis bracteolisque parvis². (*America trop.*³)

141. **Orbignya** MART.⁴ — Flores polygamo-monœci; masculorum sepalis 3, ovato-3-angularibus. Petala 3 (v. 2-5), ovata v. ovato-lanceolata, basi nunc connata, integra v. dentata, valvata. Stamina ∞ (12-30), imæ corollæ adnata inclusa; filamentis gracilibus; antheræ linearis loculis discretis v. divaricatis, mox spiraliter tortis. Gynæcei rudimentum minutum v. 0. Floris fœminei masculo multo majoris⁵ subsphærici v. 3-gono-pyramidati sepala ovata v. lanceolata coriacea imbricata. Petala 3, minima, apice acuta nuncque dentata, imbricata. Staminodia in discum cupularem connata. Germen oblongum v. ovoideum; styli ramis linearibus magnis erectis 2-7. Loculi totidem; ovulo in quoque 1, adscendente; micropyle extrorsum infera. Fructus pericarpio carnosio-fibroso; endocarpio crasso osseo, basin versus 2-7-poroso. Semina 2-7, oblonga v. longe obovoidea; rapheos ramis valde reticulatis; albumine duro æquabili; embryone pororum uni opposito. — Inermes, elatæ v. humiles; caudice cicatrisato. Folia terminalia pinnatisecta; segmentis lineari-lanceolatis acuminatis; marginibus basi recurvis; petiolo nunc ad margines serrato; vagina aperta. Spadices interfoliacei simpliciter ramosi longi; rhachi robusta;

1. Flavidis v. ochroleucis.

2. *Maximiliana* MART., *Hist. nat. Palm.*, I, 131, t. 91-93; III, 295 (non SCHRANK). — K., *Enum.*, III, 291 (part.). — ENDL., *Gen.*, n. 1775. — B. H., *Gen.*, 946, n. 128. — DR., *Pflanzenfam.*, 81, fig. 15. — *Englerophoenix* O. K., *Revis.*, 728, videtur nobis, mediante *Scheelea*, hujus generis mera sectio, petalis angustioribus, quam stamina 6 minoribus et fructu sæpius 1-spermo. Antheræ arcuatæ basi sunt 2-fidæ demumque sæpe pendulæ evadunt.

3. Spec. ad 25. MART., *Palm. Orbign.*, 112, t. 4, 5, 31. — OERST., *Palm. centr.-amer.*, in *Vid. Medd. Nat. For. Kjob.* (1858), 49. — GRISEB., *Fl. brit. W.-Ind.*, 522. — SPRUCE, in *Journ. Linn. Soc.*, XI, 162 (*Maximiliana*), 163. — WALL., *Palm.-lr. Amaz.*, 116; 120 (*Maximi-*

liana), t. 3, 46, 47. — DR., in *Bot. Zeit.* (1877), 636, t. 5, fig. 11; in *Mart. Fl. bras.*, III, 11, 434, t. 99-101; 104 (*Maximiliana*). — KARST., in *Linnaea*, XXVIII, 255, 273; *Fl. columb.*, I, 137, t. 68. — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 415. — BARB.-RODR., *En. Palm. nov.* (1875), 41 (*Maximiliana*), 42; *Les Palm.* (1882), 29; *Velloz.*, I, 112 (*Maximiliana*). — WALP., *Ann.*, I, 1008; 1010 (*Maximiliana*); V, 824, 853; 854 (*Scheelea*). Hujus generis est *Cocos butyracea* L. (?) — H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, I, 301. — K., *Enum.*, III, 286, n. 12 (*Jagua*).

4. In *Endl. Gen.*, 257; *Hist. nat. Palm.*, III, 302, 326, t. 169, fig. 1, 6; 170. — K., *Enum.*, III, 293. — B. H., *Gen.*, III, 948, n. 132. — DR., *Pflanzenfam.*, 79, fig. 56, K, L.

5. Nunc pollicaris, flavi.

ramis alternis erectis; fœmineis crassioribus; floribus nunc masculis omnibus, nunc superioribus solis masculis; cæteris fœmineis v. hermaphroditis. Spathæ plures fusiformes, nunc valde inæquales et inæqui-crassæ, nunc autem subæquales coriaceæ. Bracteæ bracteolæque inæquales sub flore quoque membranaceæ connatæ. (*Brasilia, Bolivia*¹.)

142. *Elais* JACQ.² — Flores monœci; masculorum sepalis 3, ovato-oblongis v. lanceolatis glumaceis imbricatis. Petala 3, subæqualia, nunc tenuiora, valvata v. margine attenuato leviter imbricata. Stamina 6; filamentis cum receptaculo crasse carnosio cylindræo basi continuis ibique breviter 1-adelphis, mox liberis subulatis; antheris basifixis oblongis exsertis; loculis basi discretis, introrsum rimosis. Gynœcei rudimentum summo receptaculo carnosio inter stamina insertum, varie evolutum, nunc 3-lobum. Floris fœminei masculo majoris perianthium subconforme, mox accretum. Staminodia plus minus evoluta, nunc in discum spurium annularem connata. Germen 3-loculare; stylo crassiusculo subconico; ramis stigmatosis linearibus revolutis; loculis sæpe effœtis 1, 2. Ovula « micropyle subapicali ». Fructus ovoideus v. obovoideus, basi intrusus, apice varie umbilicatus, stylo coronatus; pericarpio fungoso oleoso, intus nunc dense fibroso; putamine crasso osseo angulato, extus fibroso; supra medium v. altius 1-3-poroso. Semen sub apice loculi adnatum; integumento tenui; rapheos ramis reticulatis; albumine cavo æquabili cartilagineo; embryone pororum uni opposito. — *Elatæ* v. humiles inermes; caudice erecto v. decumbente solitario annulato, petiolis oblecto. Folia ∞, ample pinnatisecta; segmentis angustis acuminatis, basi recurvis; petiolo brevi ad margines inermi v. spinescente; vagina aperta brevi. Spadices interfoliacei breves crassi; pedunculo bracteato; ramis densis; masculis apice spinescentibus; spathis completis 2, demum in fibras solutis. Bracteæ dense imbricatæ concavæ inter se connatæ et sic foveolas varie dentatas efformantibus; bracteolis squamiformibus; florum fœmineorum bracteis flore longioribus late lanceolatis, apice spinescentibus; bracteolis sepalis conformibus

1. Spec. ad 6. MART., *Palm. Orbign.*, 125, t. 10, fig. 2; 13, fig. 2; 32 (*Orbignia*). — DR., in *Mart. Fl. bras.*, III, 11, 446, t. 102, 103. — BARB.-RODR., *Les Palm.* (1882), 29; *Vell.*, I, 110; *Pl. nov. Jard. Rio*, 32, t. 9, B.

2. *Stirp. amer.*, 280, t. 172. — J., *Gen.*, 38

(*Elais*). — GÆRTN., *Fruct.*, I, t. 6. — LAMK., *Ill.*, t. 896. — ENDL., *Gen.*, n. 1771. — MART., *Hist. nat. Palm.*, II, 61, t. 33, 55, 56; III, 323. — K., *Enum.*, III, 278. — B. H., *Gen.*, III, 944, n. 125 (part.). — DR., *Pflanzenfam.*, 78, fig. 14, B. — *Alfonsia* H. B. K., *Nov. gen.*, I, 306.

floremque vaginantibus; floribus in spadicibus diversis inæqui-dispositis; fœmineis sparsis. (*Africa et America trop.*¹⁾)

143? **Barcella** TRAILL.² — Flores (*Elæidis*) monœci; staminibus breviter 1-adelphis. Fructus (parvus) endocarpio lapideo, supra medium 3-poroso. — Subacaulis; pinnis omnibus flaccidis. Spadix longe pedunculatus laxèque ramosus; floribus in spadicis ramo eodem 2-sexualibus; inferioribus fœmineis paucis; cæteris *Elæidis*³. (*Brazilia trop.*⁴⁾)

144. **Bactris** JACQ.⁵ — Flores monœci; masculorum sepalis 3, liberis v. in annulum urceolumve connatis. Petala majora 3, ovato-lanceolata, æqualia v. inæqualia rigida valvata, nunc basi connata. Stamina 6, v. 9-12, summo receptaculo obconico nunc brevi ultra perianthium producto inserta; filamentis subulatis; antheris lineari-oblongis basifixis; loculis inferne liberis, introrsum rimosis. Germen rudimentarium parvum varium v. 0. Floris fœminei masculis sæpius minoris calyx brevis, varie cupularis v. urceolaris, integer v. plus minus profunde dentatus lobatusve. Corolla gamopetala, calyci subæqualis v. longior, cylindræa v. urceolaris, recta v. arcuata, subintegra truncata v. varie 3-dentata. Staminodia in urceolum varium connata v. 0. Germen 3-loculare; loculis sæpe obsoletis, v. effœtis 2. Stylus crassus, aut subinteger stigmatosus, aut pyramidato-3-lobus; lobis nunc demum recurvis. Ovulum ventrifixum. Fructus sphæricus v. ovoideus, stylo coronatus; pericarpio carnoso, nunc extus corticato; endocarpio osseo supra medium v. verticem versus 3-poroso. Semen ventrifixum v. descendens; rapheos ramis reticulatis; albumine corneo æquabili; embryone pororum endocarpii uni opposito. — Humiles, inermes v. multo sæpius armatæ; radicibus soboliferis; caulibus solitariis v. fasciculatis, ad nodos sæpius aculeatis. Folia in caudice alterna

1. Spec. 2, 3. L., *Mantiss.*, 137. — W., *Spec.*, IV, 799. — AUBL., *Guian.*, Suppl., 95 (*Avoira*). — MART., *Palm. Orbign.*, 91. — OERST., *Palm. centr.-amer.*, in *Vid. Medd. Nat. For. Kjob.* (1858), 51. — KARST., in *Linnæa*, XXVIII, 241. — DR., *Fl. bras.*, III, II, 455, t. 105. — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 415. — WALP., *Ann.*, V, 823, 851. De fructu, HANAUS., in *Just Jahresb.* (1882), 615.

2. In *Trim. Journ.* (1877), 80. — DR., *Pflanzenfam.*, 19, 77, fig. 18.

3. Cujus (B. H., III, 945) nunc pro subgenere habetur.

4. Spec. 1. *B. odora* TRAIL. — DR., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 459, t. 106.

5. *St. amer.*, t. 256. — LAMK., III., t. 896. — GERTN., *Fruct.*, I, t. 9. — MART., *Hist. nat. Palm.*, II, 92, t. 60, 70, 72-74; III, 279, 321. — ENDL., *Gen.*, n. 1765. — K., *Enum.*, III, 261. — B. H., *Gen.*, III, 941, n. 120. — DR., *Pflanzenfam.*, 85, fig. 59, A-D, 61. — *Gulielma* MART., *loc. cit.*, II, 81, t. 66, 67; III, 283, 322. — K., *Enum.*, III, 268. — ENDL., *Gen.*, n. 1766. — *Augustinea* KARST., in *Linnæa*, XXVIII, 395. — *Pyrenoglyphis* KARST., *Fl. columb.*, II, 141, t. 174.

v. terminalia, æqui- v. inæquipinnatisecta, glabra v. varie pubentia; segmentis varie sparsis, aggregatis v. in limbum 2-fidum confluentibus; petiolo vario; vagina longa aculeata. Spadices interfoliacei foliorumque vaginas perforantes, simplices v. varie ramosi; spathis 2; inferiore brevior, apice pervia; superiore autem fusiformi v. cymbiformi, spadice longiore, setosa, aculeata v. nunc inermi, ventre fissa; floribus⁴ in ramis spadicis 3-nis; intermedio fœmineo, v. altius masculis 1-3; bracteis brevibus persistentibus. (*America trop. et subtrop.*⁵)

145. *Attitara* BARR.³ — Flores⁴ (*Bactridis*) monœci; masculorum calyce parvo v. minimo, 3-gono, 3-dentato v. 3-fido, membranaceo; lobis acutis, nunc carinatis⁵. Petala longiora crassioraque 3, ovata v. acuminata, basi plus minus alte connata, valvata. Stamina 6, imo flore receptaculi prominuli apice inserta; filamentis filiformi-subulatis; antherarum basifixarum linearium erectarum oculis basi liberis rimosis. Germen rudimentarium minutum v. 0. Floris fœminei masculo minoris calyx cupularis, nunc brevissimus, 3-6-denticulatus. Corolla gamopetala urceolaris v. cupularis, ore truncata, 3-dentata v. 3-fida. Germen ovoideum v. subpyramidale, 3-loculare, in stylum brevem crassum attenuatum; ramis intus stigmatis brevibus acutatis recurvis v. revolutis. Ovula 3 (abortiva nunc 1, 2), angulo interno hilo lineari-elongato verticaliter affixa; micropyle infera. Fructus⁶ sphæricus, ovoideus v. obovoideus (pisiformis), sæpius 1-spermus drupaceus; carne tenui parca; endocarpio crustaceo v. osseo reticulato-venoso, supra medium v. sub apice 3-poroso; poris stellato-fibrosis. Semen conforme; albumine æquabili cartilagineo; embryone pororum uni opposito. — Gregariæ, ex omni parte aculeatæ; aculeis rectis v. arcuatis. Folia alterna subsessilia, nunc refracta, pinnatisecta; segmentis alternis v. oppositis acuminatis, basi attenuatis, secus

1. Virescentibus v. albidis, parvis.

2. Spec. ad 90. MART., *Palm. Orbign.*, 53, t. 6, fig. 2; 7; 14, fig. 2; 26, B; 27; 28, A, B. — ERST., *Palm. centr.-amer.*, in *Vid. Medd. Nat. For. Kjob.* (1858), 40, t. 8; 9, fig. 32-35; 50-52. — KARST., in *Linnæa*, XXVIII, 397 (*Guilielma*), 405; *Fl. columb.*, II, 127, t. 63 (*Guilielma*); 139, t. 173. — SPRUCE, in *Journ. Linn. Soc.*, XI, 143. — TRAIL, in *Trim. Journ.* (1876), 354; (1877), 1, 40, 75, 132, t. 184. — WALL., *Palm.-tr. Amaz.*, 76, t. 28-35, 45. — GRISEB., *Fl. brit. W.-Ind.*, 519. — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 412. — DR., *Fl. bras.*, III, II, 316, t. 73-80. — BARR.-RODR., *En. Palm.*

nov. (1875), 25; *Les Palm.* (1882), II, t. 1, fig. 7, 8; 2; *Velloz.*, I, 97. — WALP., *Ann.*, V, 820, 844; 846 (*Augustinea*); 847 (*Guilielma*).

3. *Ess. Hist. nat. Fr. equin.* (1741), 20; *N. ess.* (1741), 20. (« *Attitara* MARCGR. »); ed. alt. (1749), 20. — J., in *Dict.*, III, 277. — O. K., *Revis.*, 726. — *Desmoncus* MART., *Hist. nat. Palm.*, II, 84, t. 68, 69; III, 32, 277, 321, t. 165. — K., *Enum.*, III, 258. — ENDL., *Gen.*, n. 1764. — B. H., *Gen.*, III, 942, n. 121. — DR., *Pflanzenfam.*, 86.

4. Virescentes v. albid.

5. « Perianthio basi pervio. »

6. Ruber, pisiformis.

margines basi recurvis; rhachi in cirrhum validum segmentis deformatis deflexis armatum producta; petiolo brevi; vagina longa, superne in ocream producta. Spadices interfoliacei simpliciter ramosi monœci; ramis gracilibus flexuosis fastigiatis; spathis 2; inferiore brevi coriacea, apice aperta; superiore autem cylindracea, rigida v. sublignosa, ventre plerumque longius fissa; bracteis bracteolisque brevibus¹. (*America trop.*²)

146. *Astrocaryum* G.-F.-W. MEY.³ — Flores (fere *Bactridis*) monœci; masculorum sepalis liberis v. varie connatis. Petala valvata, basi plus minus connata. Stamina 6 (v. raro 9-12); filamentis fauci insertis; antheris basifixis v. dorsifixis, inclusis v. exsertis, linearibus v. oblongis, erectis v. versatilibus; loculis basi liberis, introrsum rimosis. Gynœcei rudimentum parvum v. 0; ramis nunc lineari-subulatis 3. Floris fœminei masculo majoris calyx persistens urceolaris v. cupularis, integer v. 3-dentatus. Corolla urceolaris carnosa, apice contracta ibique 3-dentata v. inæqui-fissa. Androcœum sterile corollæ adnatum membranaceo-annulare, nunc 0. Germen ovoideum; loculis effœtis 2; stylo brevi, 3-lobo v. 3-partito. Fructus⁴ subsphæricus v. ovoideus rostratus, aculeatus v. lævis, stylo coronatus; pericarpio carnoso, intus fibroso; endocarpio osseo, vertice 3-poroso; fibris e poro stellato-radiantibus. Semen ovoideum; rapheos ramis reticulatis; albumine cavo duro æquabili; embryone pororum uni opposito. — Armatæ; caudice plus minus elato v. subnullo aculeato annulato. Folia terminalia pinnatisecta; segmentis æqui-distantibus v. fasciculatis, apice acuminatis v. oblique truncatis, subtus albidis; supremis distinctis v. confluentibus; marginibus basi recurvis aculeatis; petiolo brevi; vagina aperta breviuscula. Spadices interfoliacei simpliciter ramosi; ramis effusis pendulis, basi crassioribus, superne gracillimis ibique amentiformibus. Flores masculi in parte amenti-

1. Sect. *Bactridopsis* (DR.), *Eubactridi* proxima, spadice rhachi crassa gaudet; ramis rigidis undique patentibus; spatha superiore ventricosa; endocarpio firmiore.

2. Spec. ad 23. MARCGR., *Bras.*, 64, c. ic. — MART., *Palm. Orbign.*, 47, t. 14, fig. 3; 26, A. — SPRUCE, in *Journ. Linn. Soc.*, XI, 155. — WALL., *Palm.-tr. Amaz.*, 72, t. 27. — GRISEB., *Fl. brit. W.-Ind.*, 519. — DR., *Fl. bras.*, III, II, 391, t. 69-72. — TRAIL, in *Trim. Journ.* (1876), 353, t. 183, fig. 4. — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 413. — BARB.-RODR., *En. Palm. nov.* (1875),

24; *Les Palm.* (1882), 10, t. 1, fig. 3-6; *Velloz.*, I, 92. — WALP., *Ann.*, V, 819 (pleraque sub *Desmonco*).

3. *Prim. Fl. essequib.*, 265. — MART., *Hist. nat. Palm.*, II, 69, t. 52, 58, 59, 65; III, 287, 323. — ENDL., *Gen.*, n. 1769. — K., *Enum.*, III, 271. — B. H., *Gen.*, III, 942, n. 122. — DR., *Pflanzenfam.*, 83, fig. 6, A; 19; 59, E, G: 60. — *Toxophænix* SCHOTT, *Nachr. K.-K. (Esterr. Naturf. Bras.*, II, App., 12 (ex MART.).

4. *Croceus* v. *ruber*, nunc, ut aiunt, in valvas 6 dehiscens.

formi creberrimi, emersi v. immersi; foeminei autem in parte inferiore pauci v. 1, nunc raro floribus masculis lateralibus 2 stipati; omnibus bracteatis et bracteolatis. Spathæ 2: inferior membranacea decidua; superior autem scaphoidea v. fusiformis, lignosa v. coriacea, persistens ventrequæ affixa. (*America trop.*¹)

147. **Martinezia** R. et PAV.² — Flores monœci; masculorum sepalis subliberis ovato-3-angularibus, sæpe inæqualibus, imbricatis. Petala longiora ovato-lanceolata, basi connata, valvata. Stamina 6, perianthio breviora; filamentis brevibus subulatis; antheris elliptico-oblongis ad basin dorsifixis versatilibus; loculis introrsum rimosis, inferne liberis. Gynæcei rudimentum parvum, 3-gonum. Floris foeminei masculo majoris sepala lata brevique membranacea imbricata. Petala longiora ovato-acuta valvata. Staminodia in urceolum integrum v. 6-dentatum corollæ nunc adnatum connata. Germen ovoideum; stylis 3, pyramidato-3-gonis conniventibus; loculis effœtis 2; ovulo in tertio adscendente; micropyle extrorsum infera. Fructus³ sphæricus drupaceus, stylo coronatus; endocarpio osseo ruguloso, ad medium poris radiatim fibrosis 3 perforato. Semen sphæricum rugulosum; hilo basilari intruso; rapheos ramis ramulosis; albumine duro æquabili; embryone pororum uni opposito. — Elata v. humiles armatae; caudicibus solitariis v. cæspitosis armatis annulatis. Folia terminalia pinnatisecta; segmentis alternis v. fasciculatis cuneatis præmorsis, 3-∞-fidis nervatis; petiolo cum rhachi aculeato; vagina brevi aperta. Spadices interfoliacei simpliciter ramosi; floribus⁴ sessilibus; foemineis inferioribus et masculis lateralibus stipatis; masculis altius solitariis v. 2-nis; bracteis membranaceis brevibus. Spathæ 2; inferior incompleta. (*America trop.*⁵)

1. Spec. ad 30. MART., *Palm. Orbign.*, 84, t. 4, fig. 1, 3; 13, fig. 3; 29, C; 30, A. — GRISEB., *Fl. brit. W.-Ind.*, 521. — KARST., *Fl. columb.*, II, 167, t. 83; in *Linnaea*, XXVIII, 245. — DR., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 314, t. 81-83. — SPRUCE, in *Journ. Linn. Soc.*, XI, 157. — TRAIL, in *Trim. Journ.* (1877), 77. — WALL., *Palm.-tr. amaz.*, 100, t. 2, fig. 5, 38-14. — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 414. — BARB.-RODR., *En. palm. nov.*, 20; *Prot. App.*, 27; *Velloz.*, I, 101. — *Bot. Mag.*, t. 4773. — WALP., *Ann.*, III, 475; V, 822, 850.

2. *Fl. per. et chil. Prodr.*, 148, t. 32. — MART., *Hist. nat. Palm.*, III, 283, 322, t. 161, fig. 1. — ENDL., *Gen.*, n. 1767. — K., *Enum.*, II, 269. — B. H., *Gen.*, III, 944, n. 124 (*Co-*

coinea). — DR., *Pflanzenfam.*, 83 (*Bactridea*). — Aiphanes W., in *Mém. Acad. Berl.* (1804), 32. — ? Marara KARST., in *Linnaea*, XXVIII, 389; *Fl. columb.*, II, 133, 143, t. 170, 175 (ex WENDL. F.). — ENDL., *Gen.*, n. 1767¹. — WALP., *Ann.*, V, 849.

3. *Croceus, roseus* v. *coccineus*.

4. *Pallidis, parvis*.

5. Spec. 6, 7. GERTN., *Fruct.*, II, t. 13J, fig. 5 (*Bactris*). — MART., *Palm. Orbign.*, 74, t. 2; 28, C. — GRISEB., *Fl. brit. W.-Ind.*, 521 (*Aiphanes*). — WENDL. F., in *Linnaea*, XXVIII, 349. — KARST., in *Linnaea*, XXVIII, 397. — DR., in *Bot. Zeit.* (1877), 636, t. 5, fig. 10 (*Aiphanes*); in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 392, t. 85. — WALP., *Ann.*, I, 1007; V, 821, 848.

148. **Aerocomia** MART.¹ — Flores (fere *Martinezia*) monœci; masculorum sepalis 3, parvis ovato-oblongis, leviter imbricatis, margine integris v. laceris. Petala 3, multo longiora, basi carnosula connata, valvata. Stamina 6, imis lobis affixa tuboque basi compressa adnata; filamentis longe subulatis curvis; antheris oblongis exsertis dorsifixis versatilibus. Gynœcei rudimentum minutum, 3-lobum v. 0. Floris fœminei masculo majoris sepala concava obtusa imbricata. Petala majora coriacea, nunc basi connata, arcte imbricata. Androcæum (?) sterile cupulare disciforme, 3-6-dentatum, 3-fidum v. subintegrum. Germen ovoideum, 3-loculare; styli brevissimi ramis stigmatosis 3, subulatis v. lanceolatis, recurvis v. revolutis. Ovulum in loculo unico fertili 1, subhorizontale. Fructus² sphæricus v. oblongus, glaber v. setulosus, stylo coronatus; pericarpio mucilaginoso, intus fibroso; putamine crasso ad medium 3-poroso. Semen sphæricum v. 3-sulcum lateraliter affixum; rapheos ramis reticulatis; albumine æquabili duro; embryone ad pororum unum laterali. — Elatæ armatæ; caudice simplici dense aculeato, sæpe ad medium ventricosus annulato. Folia pinnatisecta; segmentis lineari-lanceolatis, oblique longe acuminatis; marginibus recurvis; petiolo, rhachi costaque longe, ut caudex, denseque aculeatis; vagina aperta brevi. Spadices pedunculati aculeati; ramis effusis; floribus³ fœmineis inferioribus remotis; masculis in ramo eodem superioribus; spathis aculeatis 2; superiore lignosa; bracteis masculis confluentibus; fœmineis membranaceis; flore masculo nunc ad fœmineum utrinque laterali. (*America trop. et extratrop.*⁴)

V. PHYTELEPHASIEÆ.

149. **Phytelephas** R. et Pav. — *Vid. p. 273.*

1. *Hist. nat. Palm.*, II, 66, t. 56, 57; III, 285, 322. — ENDL., *Gen.*, n. 1768. — K., *Enum.*, III, 270. — B. H., *Gen.*, III, 943, n. 123. — DR., *Pflanzensfam.*, 83.

2. Fuscus v. niger.

3. Ochroleucis, minutis.

4. Spec. ad T. GÆRTN., *Fruct.*, I, 22, t. 9, fig. 1 (*Bactris*). — AUBL., *Pl. guian.*, 98 (*Macoya*). — W., *Spec.*, IV, 401 (*Cocos*). — JACQ.,

Amer., t. 169; ed. pict., t. 154 (*Cocos*). — SW., *Fl. ind. occid.*, I, 616 (*Cocos*). — SPRENG., *Syst.*, II, 19; *Gen.*, I, 250. — SPACH, *Suit. à Buff.*, XII, 116. — GRISEB., *Fl. brit. W.-Ind.*, 521. — ÆRST., *Palm. centr.-amer.*, in *Vid. Medd. Nat. For. Kjob.*, 47. — DR., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 388, t. 84. — HENSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 414. — BARB.-RODR., *Velloz.*, I, 107. — WALP., *Ann.*, I, 1007; V, 822.

CXXXV

PANDANACÉES

Les fleurs des Vaquois (*Pandanus*¹), qui sont dioïques et nues, présentent dans leur organisation d'assez grandes variations. Si l'on

Pandanus utilis.

Fig. 243. Port ($\frac{1}{11}$).

examine, par exemple, les espèces les plus anciennement connues,

¹ L. F., *Suppl.*, 64, n. 1430. — J., *Gen.*, 140. — ENOL., *Gen.*, n. 1711. — K., *Enum.*, 444. — LAMÉ, *Ill.*, t. 798. — R. BR., *Prodr.*, III, 94, 583. — SOLMS-LAUB., *Monogr. Pandanac.*, in *Linnaea* (1878), XLII, 1; in *Bot. Zeit.*

telles que le *Pandanus utilis* (fig. 243-246), on voit que ses fleurs mâles consistent en un petit bouquet d'étamines, représentant une sorte d'ombelle irrégulière et divergeant entre elles. Chacune d'elles a un filet grêle et une anthère étroite, allongée, basifixe, dont les deux loges sont partagées en deux logettes. Elles sont introrsées, s'ouvrent par une fente longitudinale; un prolongement arqué du connectif les

Pandanus utilis.




Fig. 244. Inflorescence femelle, coupe longitudinale ($\frac{2}{3}$).

Fig. 245. Fleur femelle.



Fig. 246. Fleur femelle, coupe longitudinale.

surmonte, et elles se tordent plus ou moins lors de l'évacuation du pollen¹. La fleur femelle est formée de plusieurs carpelles, dont le nombre est variable, et qui sont connés autour d'un centre commun, en une sorte de verticille. Leur ovaire est uniloculaire, et il est surmonté d'une épaisse colonne qu'on peut, à la rigueur, considérer

(1878), 321, 352, t. 10; in *Engl. u. Prantl Pflanzenfam.*, II, 1, p. 186, fig. 145, 146; 147, A-E; 148, 149, A-H — WALP. F., *Obs. on the gen.*

Pandanus, in *Journ. Linn. Soc.*, XVII, 33. — B. H., *Gen.*, III, 949, n. 1.

1. *Pollen ovuleum, 3- vittatum* (SOLMS).

comme un style. Au sommet de celle-ci répond un arc un peu saillant, stigmatifère, à convexité dorsale. Dans la loge ovarienne peu élevée s'insère un seul ovule basilaire, supporté par un pied épais¹; dressé et anatrope, avec le micropyle inférieur et extérieur². Le fruit est formé de drupes³ anguleuses, rapprochées autour du centre commun, à péricarpe peu charnu et fibreux, souvent creusé de lacunes irrégulières dans sa portion supérieure que couronnent les restes des stigmates. La portion séminifère est creusée d'une ou de quelques loges dans chacune desquelles se voit une graine dressée, à tégument mince⁴, à albumen charnu et huileux abondant, avec un petit embryon voisin de l'ombilic. On a fait une section *Marquartia*⁵ des espèces analogues à celle qui précède, et dont les fleurs mâles, sur la disposition desquelles nous reviendrons bientôt, sont pourvues d'un pédicelle ordinairement assez court.

GAUDICHAUD⁶ n'avait conservé comme véritables *Pandanus* que ceux qui sont organisés comme les *P. fascicularis* LAMK, de l'Inde, *pedunculatus* R. BR., d'Australie, etc. On en a fait des genres particuliers *Keura*⁷ et *Athrodactylis*⁸. Ils ont les fleurs femelles disposées comme celles des *Marquartia*, et leurs fleurs mâles stipitées sont en épis et subverticillées.

Les Vaquois, qu'on a génériquement distingués sous le nom de *Barrotia*⁹ et de *Rykia*¹⁰, ont des fleurs mâles stipitées, avec des étamines ombellées. Leur fleur mâle est formée d'un seul carpelle qui se dirige en sens inverse de celui des *Marquartia*. A ce sous-genre se rapportent les *P. furcatus* SPRENG., *ceylanicus* SOLMS, *Lais* KURZ, *nitidus* KURZ, *minor* HAM., etc. Ce groupe a malheureusement été confondu par AD. BRONGNIART¹¹ avec celui que nous nommerons *Neobarrotia* et qui a pour type des espèces de la Nouvelle-Calédonie, telles que les *P. altissimus*, *Pancheri*, *aragoensis*, *decumbens*, *macrocarpus*, *Balansæ*

1. Il n'est pas libre et se distingue par sa consistance du tissu mou ambiant.

2. Le tégument est double.

3. Expression un peu forcée pour des fruits finalement secs, ligneux et bruns quand ils ont perdu leur coloration verte primitive.

4. Membraneux ou parfois subcrustacé. — B.-MIRB., in *Ann. Mus.*, XVI, t. 17.

5. HASSK., in *Flora* (1848), Beibl., II, 14; *Cat. H. bogor.*, 61. — *Vinsonia* GAUDICH., loc. cit., t. 17, 23, 31. — *Hasskarlia* (part.) WALP., *Ann.*, I, 753 (non H. BN). — *Keura* (part.) KURZ, in *Journ. As. Soc. beng.* (1869), 147 (non FORSK.).

6. Loc. cit., t. 22.

7. FORSK., *Fl. æg. arab.*, 95, 122, 172 (1775). Ce nom a donc en réalité l'antériorité sur celui de LINNÉ fils, puisque celui de *Pandanus* RUMPH. (*Herb. amboin.*, IV, 139, t. 74. — O. K., *Revis.*, 737) n'est pas acceptable comme strictement générique. On comprendra néanmoins pourquoi nous ne faisons pas ici de tous les Vaquois des *Keura*.

8. FORST., *Char. gen.*, 149, t. 75 (1776). — SCOP., *Introd.*, 69.

9. GAUDICH., loc. cit., t. 13, fig. 15-24.

10. DE VRIESE, in *Verh. K. Akad. Wetensk.* (1854); in *Tuinb. Fl.*, I, 161; in *Hook. Kew Journ.*, VI, 268.

11. In *Ann. sc. nat.*, sér. 6, I, 277, t. 14, 15.

AD. BR., et qui ont des fleurs femelles pluricarpidiées; les carpelles dirigés individuellement comme ceux des vrais *Barroetia*, mais disposés en séries transversales; de façon que l'ensemble est comprimé d'arrière en avant. La région stigmatifère réniforme regarde généralement en haut. Les fleurs mâles, là où elles sont connues, forment, comme les femelles, un ensemble allongé, cylindrique. Leur axe claviforme se termine par un renflement hexagonal au-dessous duquel s'attachent de nombreuses étamines, à anthère oblongue, presque sessile.

On a également fait un genre, sous le nom de *Tuckeya*¹, du *P. Candelabrum* PAL.-BEAUV., de l'Afrique tropicale occidentale, dont les fleurs mâles sont assez longuement stipitées, en assez grand nombre (9-12) et rapprochées en une sorte d'ombelle. Les fleurs femelles sont rassemblées en épi; leur syncarpe ovoïde est formé de drupes 1-3-carpellées, avec un court style chargé de petits aiguillons et une dilatation stigmatifère plate et irrégulièrement cordiforme.

Dans les fleurs mâles du *P. Kurzianus* SOLMS², les étamines, en nombre assez restreint (3-8), sont subombellées, courtes et à anthères tronquées au sommet. Le gynécée est formé d'un seul carpelle, et les carpelles des fleurs voisines convergent supérieurement les uns vers les autres. Leur surface stigmatique est sessile. Le fruit composé est spiciforme, formé de nombreuses drupes à sommet pyramidal et sub-operculé. Ce sommet présente d'ailleurs une lacune centrale, et le péricarpe est osseux à sa maturité. On a fait de cette plante, qui est javanaise, un genre *Jeanneratia*³ et une section *Microstigma*⁴.

Le *P. caricosus* SPRENG.⁵, espèce javanaise bien connue, peu élevée, cespiteuse, a des étamines simples, à filet court et à anthère linéaire, acuminée ou mucronée. Ses fleurs femelles sont aussi formées d'un seul carpelle dirigé en arrière. Les fruits, finalement à peu près secs, sont couronnés d'un opercule et s'atténuent graduellement en un style simple et spiniforme, dont un côté est pourvu d'une surface stigmatifère linéaire. On rapporte aussi les *P. monticola* F. MUELL., *fœtidus* ROXB., *ornatus* GAUDICH. et *Korthalsii* SOLMS à ce sous-genre qui a reçu le nom générique de *Fisquetia*⁶ et celui de section *Acrostigma*⁷.

Un genre *Fouilloya*⁸ a été proposé pour des espèces des îles orien-

1. GAUDICH., loc. cit., t. 26, fig. 10-20. — SOLMS, loc. cit., 27.

2. Loc. cit., 3, 4. — *P. humilis* KURZ.

3. GAUDICH., loc. cit., t. 25.

4. KURZ, in *Seem. Journ.*, V, 104.

5. *Syst.*, III, 897.

6. GAUDICH., loc. cit., t. 4, 5 — SOLMS, loc. cit., 7.

7. KURZ, in *Journ. As. Soc. beng.* (1869), 146; in *Flora* (1869), 450.

8. GAUDICH., loc. cit., t. 26, fig. 1-9; 21-24. — SOLMS, loc. cit., 22.

tales africaines, telles que les *P. racemosus* GAUDICH. et *pygmæus* Hook., dans lesquelles l'unique carpelle de la fleur femelle, dirigé comme celui des *Fisquetia*, a la portion stigmatifère du style dilatée en lame membraneuse profondément partagée en deux lobes tronqués et subémarginés. Une grande lacune surmonte souvent la loge ovarienne. Les fleurs mâles ne sont formées que d'un petit nombre d'étamines dont les filets sont unis seulement à leur base¹.

Conçu dans ces vastes limites, le genre Vaquois comprend une cinquantaine d'espèces² et se trouve répandu dans toutes les régions

1. Nous pouvons considérer comme appartenant probablement aux genre *Pandanus* les types suivants, incomplètement connus et la plupart établis par GAUDICHAUD sur des fragments :

Dorystigma GAUDICH., *Voy. Bonite*, t. 13; 31, fig. 12, 13. — KURZ, in *Journ. As. Soc. beng.* (1869), 50. — SOLMS, *loc. cit.*, 64. Carpelles obpyramidaux, surmontés d'un chapiteau subhémisphérique, à bord inférieur anguleux-sinueux. Lobes du style 3-5, indépendants, irrégulièrement cordiformes. — Plantes de Maurice et de Madagascar.

Roussinia GAUDICH., *loc. cit.*, t. 21. — SOLMS, *loc. cit.*, 51. Fondé sur le *Perim-Kaida* de RUEDE et rapproché avec doute du *P. Leram* FONTAN. Peu ramifié. Inflorescence ellipsoïde. Loges 4-6, à ovule hémित्रोप. Styles (?) étoilés sur un sommet en plate-forme polygonale.

Hombroia GAUDICH., *loc. cit.*, t. 22; in *Hombr. et Jacquin. Bot. Voy. Astrol., Monoc.*, t. 2, 5. — WALP., *Ann.*, V, 862. — SOLMS, *loc. cit.*, 48. Établi pour le *Folium Bagea maritimum* RUMPH., *Herb. amboin.*, IV, t. 80. Carpidies de *Vinsonia*, épaisses, costées. Sommet stigmatifère irrégulièrement lobé. Loges fertiles 2 dans l'*H. calathiphora* GAUDICH.

Sussea GAUDICH., *loc. cit.*, t. 24, 25, 38. — KURZ, *loc. cit.*, 148, 150. — SOLMS, *loc. cit.*, 66. De Madagascar. Plantes à inflorescence femelle longuement ovoïde. Carpidies à 2 loges, surmontées de 1, 2 lobes stigmatifères horizontaux, réniformes. Ovule largement sessile, hémित्रोप, à sommet micropylaire acuminé. Étamines du *P. microstigma*, à filet longuement subulé et dilaté à sa base. Anthère oblongue, à loges libres à la base. Staminodes dans la fleur femelle.

Heterostigma GAUDICH., *loc. cit.*, t. 25. — KURZ, *loc. cit.*, 150. — SOLMS, *loc. cit.*, 66. De Sénégambie. Carpidies obpyramidales-claviformes, surmontées de 1-3 lobes stylaires dressés, à surface stigmatique hippocrépiforme. Loges 3 (dont 2 parfois stériles), surmontées d'une cavité pourvue d'un cône central plein. Région micropylaire longuement acuminée.

Eydouzia GAUDICH., *loc. cit.*, t. 18. — KURZ,

loc. cit., 150. — SOLMS, *loc. cit.*, 65. Attribué aussi avec doute au *P. Leram*. Carpelles très rapprochés, à styles au centre d'une aréole terminale, aplati-cordés. Ovule hémित्रोप, à région micropylaire longuement atténuée.

Bryantia WEBB, ap. GAUDICH., *loc. cit.*, t. 20 (non AD. BR.). Grosse inflorescence ovoïde, à nombreux carpelles obpyramidaux; le sommet operculiforme, plus court que le pyramidal. Ovule inséré dans la portion supérieure de la loge, hémित्रोप, imparfaitement ascendant; la région micropylaire apiculée et arquée.

Lophostigma AD. BR., in *Ann. sc. nat.*, sér. 6, I, t. 15, fig. 8, 9 (*Bryantia* sect.). Plantes de la Nouvelle-Calédonie, à spadice mâle ramifié, sans bractées; les anthères elliptiques, nombreuses, subsessiles; le fruit composé, elliptique ou allongé, à drupes simples, tronquées au sommet; le stigmate sessile, en forme de crête infléchie, avec dilatation cordiforme tournée vers le sommet du fruit total (*P. viscidus* et *Minda* PANCH.).

Doornia DE VR., in *Tuinb. Fl.* (1855), 174. — SOLMS, *loc. cit.*, 49. Plante des îles orientales d'Afrique, à tronc simple; les feuilles spinescentes; à fleurs femelles pluricarpidiées; le sommet des carpelles plan, avec style sessile, subpelté, pourvu d'un pore latéral. C'est (?) le *P. reflexus* K. KOCH, in *Wochenbl. Gartn.* (1858), I, 31.

Par les feuilles et par l'inflorescence à groupes floraux femelles distiques, courttement ovoïdes, dans l'aisselle de bractées foliiformes, semblable à celle des *Fouilloya* et *Tuckeya*, nous ne pouvons que rapprocher des *Pandanus* le *Souleyetia freycinetioides* GAUDICH., *Voy. Bonit.*, t. 19, dont les carpidies obpyramidales, surmontées d'un dôme qui coiffe une saillie stigmatifère hippocrépiforme, renferment, au-dessous d'une lacune conique, une loge à trois ovules dressés sur un funicule et longuement apiculés. Il peut y avoir double saillie stigmatifère.

2. PAL.-BEAUV., *Fl. owar. et ben.*, t. 21, 22. — ROXB., *Pl. corom.*, t. 94-96. — GRIFF., *lc. pl. asiat.*, t. 174. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 153, t. 37; *Ana. bot.*, II, 40, t. 2. — KURZ, in *Journ. As. Soc. bengal.*, XXXVIII, 145; in

tropicales de l'ancien monde. Ce sont des plantes rarement herbacées et subcaules, ou bien plus souvent frutescentes ou arborescentes, à tige épaisse, dressée, ou grêle et subsarmenteuse, simple ou plus ou moins ramifiée bi- ou trichotomiquement¹, portant généralement des racines adventives aériennes épaisses. Les feuilles, ordinairement rapprochées les unes des autres vers le sommet de la tige ou de ses divisions, trifariées et spiralées, ont une gaine basilaire, et un limbe

Freyinetia insignis.

Fig. 247. Rameau florifère mâle

linéaire, très long ou plus rarement médiocrement allongé, graduellement atténué au sommet, récurvé, caréné, rigide ou coriace; les bords et la carène serrés, rarement inermes, le plus souvent spinescents. Les aiguillons sont souvent récurvés, ou bien les plus élevés sont incurvés; ils sont fréquemment très puissants. Les fleurs² sont

Seem. Journ. Bot., V, 93, 125, t. 62-65; *For. Fl.*, 505. — GAUDICH., *Voy. Bot. Bot.*, t. 22. — PLESS., *Epim.*, 239. — JON., in *As. Res.*, III, 263. — BENTH., *Fl. austral.*, VII, 148. — BALF. F., in *Bak. Fl. maurit.*, 395. — SOLMS., in *Bot. Zeit.* (1878), 324, 352, t. 10, fig. 3-7, 10-12, 28; in *Ann. Jard. Botens.* (1883), t. 16. — HANCE, in *Trim. Journ.* (1875), 67. — RIDL., in *Trans. Linn. Soc.*, ser. II, *Bot.*, III, 393. — SEEM., *Fl. vit.*, 231. — BAK., in *Journ. Linn. Soc.*, XXI, 447; XXII, 527. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, NI, 483. — HILLEBR., *Fl. haw. isl.*, 452. — BL., *Rumphia*, I, 135. — REIC., *Gartenfl.*, t. 43, 297. — *Ill. hort.* (1860), t. 265; (1872), t. 55; (1877),

t. 288. — *Rev. hort.* (1862), 416, fig. 36, 37; (1866), 271, c. ic.; (1868), 210, fig. 23; (1878), 405, fig. 84; (1879), 290, c. ic.; (1881), 174, fig. 40-45. — *Bot. Mag.*, t. 4736, 5014, 6347, 7063. — WALP., *Ann.*, V, 857.

1. Avec cette disposition des axes coïncident naturellement, comme dans tant d'autres Monocotylédones qui sont dans le même cas, des particularités anatomiques qui ont attiré l'attention des auteurs. NAC., *Beitr. z. wiss. Bot.*, III 1 (1858), 30. — V. TIEGH., in *Ann. sc. nat.*, sér. 5, VI, 195. — SOLMS., *Pflanzenfam.*, 187.

2. Blanches ou jaunâtres, souvent à odeur suave, parfois aussi fétide.

disposées en spadices terminaux; les mâles composés ou décomposés, avec souvent des phénomènes d'entraînement particuliers¹. Les inflorescences femelles sont capituliformes ou spiciformes, solitaires ou composées, sessiles ou pédonculées. A la maturité des fruits, le pédoncule épais est souvent pendant, et le plus souvent les carpelles, isolés ou rapprochés du groupe, se détachent de l'axe général de l'inflorescence. Les feuilles florales sont plus ou moins spathiformes, membraneuses, verdâtres ou plus ou moins colorées.

Freycinetia
Rankui.

Les *Freycinetia* (fig. 247, 248), des régions chaudes ou tempérées de l'Asie et de l'Océanie, ont des fleurs dioïques qui se distinguent de celles des Vaquois par la présence de staminodes autour de la base de l'ovaire et par un androcée polyandre. Elles sont pourvues d'un gynécée stérile plus ou moins développé, avec un ovaire fertile à placentas pariétaux et pluriovulés. Sur chacun d'eux, les ovules, pourvus d'un funicule, sont disposés sur deux séries. Le fruit est un syncarpe charnu, à une ou plusieurs cavités gorgées de mucilage dans lequel sont plongées des graines oblongues ou fusiformes, à albumen charnu. Ce sont des arbustes sarmenteux et grimpants, à tige simple ou ramifiée et produisant de nombreuses racines adventives.

Fig. 248. Fruit composé ($\frac{1}{2}$).

Le *Sararanga sinuosa*, océanien, incomplètement connu, est décrit comme ayant des fleurs femelles disposées en un vaste spadice très rameux, avec des réceptacles charnus, sinueux et involuclés, dont les fleurs immergées ont un ovaire uniloculaire et uniovulé.

C'est R. BROWN qui, en 1810, a créé cette petite famille, sous le nom de Pandanées². LINDLEY, en 1836, lui donna le nom de Panda-

1. Dans certaines espèces, comme le *P. caricosus*, où un axe principal porte des axes secondaires florifères alternes, les plus inférieurs de ceux-ci sont légèrement entraînés au niveau de leur bord interne; ce qui simule une courte soudure intérieure, à peu près nulle plus haut. Mais avec de grandes inflorescences mâles décomposées, M. DUTAILLY a fait voir (in Ann. Soc. bot. Lyon (1880), 340) que les gros chatons nés dans l'aisselle des bractées alternes de-

viennent connés, c'est-à-dire soulevés, sur une certaine longueur, avec l'axe principal. Plus on s'élève sur l'axe principal, plus les chatons tendent à fusionner de bas en haut avec celui-ci. Les supérieurs lui sont même unis dans toute leur hauteur.

2. Prodr. Fl. N.-Holl., 1, 340 (*Pandanæ*). — LINDL., Nat. Syst. (1830), Ord. 254. — ENDL., Gen., 242, Ord. 74 (part.). — B. B., Gen., III, 949, Ord. 188.

nacées¹. JUSSIEU avait réuni dans un même groupe naturel les *Pandanus*, *Nipa* et *Phytelephas*²; et longtemps on cita au sujet des Vaquois, « leur affinité avec le *Nipa* qui sert de lien entre les Pandanées et les Palmiers³ ». Le port et le feuillage des Pandanacées est caractéristique, puisque jamais leurs feuilles ne sont composées, pinnatifides ou pinnatiséquées. La torsion des bases foliaires et en même temps les dentelures épineuses des bords ne sont pas moins remarquables. Sinon, il y a une très grande ressemblance entre les *Nipa*, les *Phytelephas* d'une part, et d'autre part les Vaquois. Mais ceux-ci ont les fleurs des deux sexes absolument nues, et leur graine est totalement différente de celle des Palmiers. On ne peut contester les très grandes analogies des *Pandanus* avec les Aracées et les Typhacées. Mais ces dernières, plantes herbacées aquatiques, nous ont paru plutôt représenter la forme amentacée, à carpelles indépendants, des Najadacées. Quant aux Cyclanthacées, souvent unies aux Pandanacées, elles s'en distinguent surtout par leur port et leurs feuilles plissées dans la vernation, non moins que par le rapprochement dans une même inflorescence de leurs fleurs des deux sexes; les mâles entourant les femelles ou se disposant parallèlement à elles.

Les usages⁴ des Pandanacées sont peu nombreux. On cite plusieurs espèces⁵ comme ayant des semences comestibles. Les fleurs du *P. utilis* BORY⁶ (fig. 243-246), odorantes et alimentaires, passent aussi pour aphrodisiaques. Le bois peut servir aux mêmes usages que celui des Palmiers. Aux îles Mascareignes, on fait avec les feuilles des nattes et surtout des enveloppes pour les balles de café et de sucre. Les fruits de plusieurs Vaquois sont astringents, emménagogues, antidiarrhéiques, surtout avant leur maturité. Le péricarpe du *P. edulis* DUP.-TH., de Madagascar, est doux et agréable. On dit que la racine rougeâtre du *Freycinetia strobilifera* BL. sert à Java à colorer les Araks. Aux Moluques, c'est avec les feuilles du *Pandanus repens* RUMPH. qu'on emballait, dit-on, souvent les muscades.

1. *Intr. Nat. Syst.*, ed. II, 361; *Veg. Kingd.*, 130, Ord. 37 (part.). — SOLMS, *Mon. Pandan.*, in *Linnaea* (1878); *Pflanzenfam.*, 186 (Fam.). — *Eupandaneæ* ENDL., loc. cit.

2. In *Dict.*, XXXVII, 322 (1825).

3. In *Ann. Mus.*, V, 302.

4. ROSENTH., *Syn. pl. diaphor.*, 145, 1090.

5. Les plus utiles qu'on cite sont les *P. carinatus* KURZ, *furcatus* ROXB. (Korr), *Lais* KURZ (*Tjang-Koang*), *humilis* JACQ., *Bagea* MIQ.,

sylvestris RUMPH., *latifolius* RUMPH., *ceramicus* RUMPH., *moschatus* RUMPH., *repens* RUMPH., etc.

6. *Voy. il. Afr.*, II, 3, not. — SOLMS, in *Linnaea*, XLII, 29. — *P. odoratissimus* JACQ. — *P. spurius* MIQ. — *P. Candelabrum* HOOK., *Bot. Mag.*, t. 5014 (non P.-BEAUV.). — *Vinsonia utilis* GAUDICH. — *Marquartia globosa* HASSK. Le *P. fascicularis* LAMK (*P. odoratissimus* ROXB.) a, dit-on, les mêmes propriétés.

GENERA

1. **Pandanus** L. f. — Flores diœci nudi; masculorum staminibus paucis v. ∞ , receptaculo convexiusculo nuncve peltatim dilatato insertis; filamentis liberis v. varie connatis; antheris basifixis linearibus v. oblongis, apice obtusis v. apiculatis, introrsum, extrorsum v. lateraliter rimosis, nunc 4-locellatis. Floris fœminei staminodia 0 (v. « nunc minuta »). Gynœcei carpella libera, 1-locularia, v. in phalanges 1- ∞ -loculares connata; vertice attenuato v. varie solido, truncato, tumido, prismatico v. operculiformi, nunc cavo; lobis stigmatosis forma variis, simplicibus subulatis, longitudinaliter linearibus, unguiformibus hincque papillosis, reniformibus, hippocrepicis, furcatis v. 2-lamellatis. Ovulum in loculo quoque 1, adscendens v. basilare; funiculo crasso sæpe haud libero; placenta spurie parietali. Fructus in syncarpium sphæricum, ovoideum, ellipsoideum, oblongum v. cylindraceum, conferti; carpellis drupaceis v. lignosis, inferne connatis v. in phalanges induratas confluentibus, plerumque singulatim v. per greges a receptaculo communi persistente sub maturitate facile deciduis. Semen adscendens oblongo-obovatum v. subfusiforme; hilo sæpe lineari-elongato; apice micropylari inferiore sæpius attenuato recto v. arcuato; testa membranacea v. subcrustacea, sæpe striolata; raphe prominula; albumine carnosio denso; embryone parvo prope ad hilum basilari. — Arbores v. frutices erecti, rarius subsarmentosi, v. herbæ caule brevissimo v. prostrato radicante; trunco simplici v. 2, 3-chotome patentim ramoso; ramis radices adventivas aereas nunc crebras emittentibus. Folia in summo caudice v. in summis ramis conferta, spiraliter 3-fariam disposita, basi vaginantia, longissime v. brevius linearia, subulata v. sensim acuminata recurva concavo-carinata, coriacea v. rigida, demum tota

decidua; marginibus carinaque serratis spinescentibus v. raro integris; aculeis recurvis, v. superioribus incurvis. Flores in spadices terminales dispositi: masculi solitarii v. fasciculati simplices v. plus minus compositi, sessiles v. stipitati; ramis amentiformibus liberis intusve basi v. plus minus alte supremisve fere omnino cum axi primario elevato-connatis; flore quoque sessili v. nunc breviter pedicellato. Inflorescentiæ fœmineæ variæ solitariae v. compositæ; pedunculo sæpius fructifero pendulo; receptaculo forma vario; foliis floralibus spathaceo-bracteiformibus, viridulis v. coloratis. (*Orb. vet. reg. trop. et subtrop.*) — *Vid. p. 405.*

2. **Freycinetia** GAUDICH.¹ — Flores diœci nudi: masculi ∞ -andri; filamentis brevibus subulatis v. gracilibus flexuosis; antheris basifixis lineari-oblongis, apice obtusis v. varie apiculatis; loculis longitudinaliter rimosis. Gynæcei rudimentum varium v. 0. Floris fœminei staminodia ∞ , hypogyna breviter linearia imo gynæceo adnata. Germina ∞ , libera v. varie in phalanges connata, 1-locularia, vertice truncato incrassata, nunc crenulata; crenis depresso stigmatiferis. Ovula pauca v. ∞ , placentis parietalibus 3- ∞ affixa, 2-seriata, nunc filis immixta, anatropa; funiculo longo adscendente. Syncarpium baccatum, 1- ∞ -loculare; septis nunc evanidis; loculis completis v. incompletis, mucilagine repletis. Semina oblonga, ellipsoidea v. fusiformia; integumento extimo crustaceo v. membranaceo striato; raphe prominula; albumine carnosio; embryo axili brevi v. longo. — Frutices v. fruticuli scandentes; caudice simplici v. ramoso annulato radicante. Folia elongata carinata, integra v. serrata, basi vaginantia. Spadices terminales fasciculati v. spurie umbellati simplices²; foliis floralibus involucrentibus spathaceis coloratis v. carnosulis; fœmineis post anthesin diu persistentibus v. citius deciduis. (*Asia trop. or., Oceania trop. et subtrop.*³)

1. In *Freycin. Voy. Bot.*, 431, t. 41-43; *Bot. Voy. Bonite*, t. 27, 35-38, 52, 60. — K., *Enum.*, III, 101. — ENDL., *Gen.*, n. 1712. — SOLMS, in *Linnaea*, XLII, 81; in *Bot. Zeit.* (1878), t. 10, fig. 1, 2, 8, 9, 13. — DR., *Pflanzenfam.*, 190. — B. H., *Gen.*, III, 951, n. 2. — JEZABEL BANKS, ex SALISB., *Gen. pl. Fragm.*, 5. — *Victoriperrea* GAUDICH., in *Hombr. et Jacquin. Voy. Astrol. Bot., Monoc.*, t. 1.

2. Flores dicuntur a *Pteropo eduli* fecundati.

3. Spec. ad 30. SCHOTT, *Melet.*, 16. — ENDL.,

Prodr. Fl. norfolk., 24. — BL., *Rumphia*, 156, t. 40-43. — BENN., *Pl. jav. rar.*, t. 9. — A. RICH., *Voy. Astrol. Bot.*, t. 2. — HOWER, et JACQUIN., *loc. cit.*, t. 2. — HOOK. F., *Fl. N. Zel.*, t. 54, 55; *Fl. brit. Ind.*, VI, 487. — SEEM., *Fl. vit.*, 282, t. 83-86. — MIQ., *Fl. ind. bal.*, III, 167. — KURZ, in *Journ. As. Soc. bengal.*, XX, XVIII, 133; *For. Fl.*, II, 508. — BENTH., *Fl. austral.*, VII, 150. — HILLEBR., *Fl. haw. isl.*, 453. — *Rev. hort.* (1872), t. 193. — *Bot. Mag.*, t. 6028. — WALP., *Ann.*, III, 494; V, 858.

3? *Sararanga* HEMSL.¹ — « Flores diœci: masculi...? Fœmineorum spadix paniculato-ramosissimus. Ramuli ultimi incrassati sphæroidei receptacula florifera carnosâ sinuosa involucrata formantes; involucro brevi sinuoso. Flores fœminei² immersi flexuoso-2-seriati, mamillis³ superficialibus 2-seriatis conjuncti; staminodiis 0; germine 1-loculari, 1-ovulato; ovuli hemitropi micropyle infera. — Arbor excelsa; foliis lineari-lanceolatis coriaceis, apicem versus aculeolatis; spadice amplo⁴. (*Ins. Salomon, N. Guinea*⁵.) »

1. In *Journ. Linn. Soc.*, XXX, 216, t. 11.

2. Perjuveniles.

3. « Stigmatisis? »

4. « 4, 5-pedali, albo. »

5. Spec. 1. *S. sinuosa* HEMSL., e quo character hic omnino desumptus.

CXXXVI

CYCLANTHACÉES

I. SÉRIE DES CYCLANTHUS.

Les *Cyclanthus*¹ ont des fleurs monoïques et tirent leur nom de ce que ces fleurs, sont, dans l'espèce prototype du genre (fig. 249-252), régulièrement groupées en cercles superposés, alternativement mâles

Cyclanthus bipartitus.



Fig. 252. Portion d'inflorescence, coupe longitudinale.



Fig. 250. Inflorescence jeune.

Fig. 249. Feuille.

Fig. 251. Inflorescence épanouie.

et femelles. La fleur mâle est nue, primitivement incluse dans une cavité de l'inflorescence, plus tard soulevée au dehors, plus haut que les fleurs femelles. Les étamines, en nombre indéfini, libres ou

1. POIT., in *Mém. Mus.*, IX, 35, t. 2, 3. — K., *Enum.*, III, 107, 589. — TORP., in *Dict. sc. nat.*, Atl., t. 134, 135. — ENDL., *Gen.*, n. 1711. — B. H., *Gen.*, III, 959, n. 4. — DA.,

in *Engl. u. Prantl Pflanzenfam.*, II, 3, p. 101, fig. 68, 71. — *Cyclosanthes* POEPP., in *Forst. Notiz.*, XXXI, 312. — *Duncanthus* SPRUCE, in *Journ. Linn. Soc.*, III, 196.

unies inférieurement en un ou deux faisceaux, ont un filet court et linéaire, et une anthère linéaire-oblongue, basifixe, à quatre logettes longitudinales, déhiscente vers les bords par deux fentes longitudinales. Elle finit souvent par se tordre suivant sa longueur. Les fleurs femelles ont un ovaire infère, plongé dans le tissu de l'axe de l'inflorescence, uniloculaire et surmonté d'un long col. Son sommet se dilate en lames qu'on considère ordinairement comme les folioles d'un périanthe et qui forment des séries circulaires doubles de dentelures tournées les unes vers la base, les autres vers le sommet de l'inflorescence. En dedans de ces dentelures se trouvent de nombreux staminodes à anthère imparfaite. Les cavités ovariennes confluentes sont surmontées d'un style épais, à lobes stigmatifères émarginés ; et leurs placentas pariétaux, au nombre de deux, portent de nombreux ovules anatropes, adscendants, à longs funicules inégaux. Le fruit composé est chargé de bourrelets transversaux, saillants et pourvus d'un sillon dans le milieu de leur épaisseur. Les graines, en nombre indéfini, sont ovoïdes, supportées par un long funicule. Leur tégument extérieur est translucide, et l'intérieur est sillonné en dedans. L'albumen est abondant, charnu, et l'embryon axile est cylindrique, rectiligne.

On distingue trois ou quatre¹ *Cyclanthus*. Ce sont des herbes vivaces, lactescentes, des localités aquatiques de l'Amérique tropicale. De leur rhizome court, plongé dans la vase, partent des racines adventives et des feuilles aériennes rapprochées, à long pétiole dressé ; le limbe bifurqué, à deux divisions lancéolées, symétriques l'une de l'autre, totalement indépendantes ou unies inférieurement, plissées, pourvues chacune d'une côte et de nervures parallèles, reliées par de fines veines transversales. Du rhizome s'élève aussi un long pédoncule dressé, cylindrique, nu ou portant des bractées, terminé par un renflement spadiceforme, dont la base donne insertion à plusieurs feuilles modifiées², spathiformes, imbriquées, enveloppant d'abord toutes les fleurs³. Il y a des espèces dans lesquelles celles-ci sont dites confluentes en spire.

1. SPRENG, *Syst.*, III, 772; *Gen.*, II, 682.
— POEPP. et ENDL., *Nov. gen. et spec.*, II, 38,
t. 152, 154. — DR., in *Mart. Fl. bras.*, III, II,
243, t. 60, fig. 2.

2. Ce sont des gaines foliaires, et les plus extérieures peuvent même supporter un rudiment de limbe. Les intérieures sont jaunes.

3. Blanches ou jaunâtres, peu visibles.

II. SÉRIE DES CARLUDOVICA.

Les fleurs des *Carludovica*¹ (fig. 253-262) sont aussi monoïques ; chaque femelle entourée de quatre mâles. Celles-ci ont un périanthe

Carludovica fumifera.

Fig. 257. Fleur femelle.

Fig. 256. Fleur mâle.

Fig. 258. Fleur mâle, coupe longitudinale.

Fig. 254. Glomérule, coupe longitudinale.

Fig. 259. Fruit composé, jeune.

court, régulier ou oblique, charnu, découpé sur ses bords en une rangée simple ou double de petits lobes en nombre variable sur chaque

1. R. et PAV., *Fl. per. et chil. Prodr.*, 146, t. 31. — K., *Enum.*, III, 104, 568; *Syn.*, I, 128. — ENOL., *Gen.*, n. 1713. — B. H., *Gen.*, III, 953, n. 2. — DR., *Pflanzenfam.*, 99, fig. 66-70;

in *Bot. Zeit.* (1877), 591. — *Ludovic* PERS., *Syn.*, II, 156. — POIT., in *Mem. Mus.*, IX, 27, t. 1. — *Salmia* W., in *Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.*, V, 399.

rangée¹. Plus intérieurement se voient de nombreuses étamines pluri-sériées. Leur filet, court et subulé, s'épaissit à sa base en un corps qui, inférieurement, s'unit au périanthe et à la portion correspondante des étamines voisines. L'anthère, basifix ou dorsifix, oblongue ou didyme, s'ouvre par deux fentes longitudinales en dedans ou vers les bords. Les fleurs femelles, plus ou moins plongées dans l'axe de l'inflorescence, ont un périanthe de quatre folioles, dont deux latérales, une supérieure et une inférieure. Elles sont libres ou plus ou moins unies inférieurement, plus ou moins développées d'abord et ensuite accrescentes, plus ou moins épaisses, parfois émarginées ou bilobées. A chacune d'elles se superpose un grand staminode filiforme, qui lui est adné par la base, d'abord plus ou moins replié sur lui-même, à sommet atténué ou portant un rudiment d'anthère. Il finit par se détacher, soit à sa base, soit un peu au-dessus. L'ovaire, en grande partie infère et adné, est uniloculaire, surmonté de quatre lobes stigmatifères radiants, épais, sessiles, parcourus d'un sillon médian. Quatre placentas pariétaux épais alternent avec eux, latéraux ou plus ou moins rapprochés du plafond de l'ovaire. Chacun d'eux porte un nombre indéfini d'ovules descendants, anatropes, pourvus d'un court funicule². Le fruit composé est un syncarpe cylindrique ou presque sphérique, charnu ou pulpeux, tout chargé des restes du calice et des lobes stylaires. Dans la pulpe sont plongées de nombreuses graines ellipsoïdes, comprimées, à tégument extérieur charnu; l'intérieur coriace, entourant un albumen charnu ou corné dans l'axe duquel se trouve un petit embryon cylindrique.

Il y a des *Carludovica* à ovaire presque entièrement libre³. Dans le *C. lanceifolia*, dont on a fait un genre *Ludovia*⁴, les sépales de la fleur femelle sont épais et très courts, réduits à des bourrelets obtus. C'est une liane à tige radicante, à feuilles distiques et lancéolées; tandis que dans les *Carludovica* vrais, la tige est souvent courte et épaisse, avec des feuilles palmatiséquées, dont les segments multicostés sont entiers ou dentés. Cependant les feuilles peuvent aussi s'y

1. Les intérieurs ont été parfois considérés comme les lobes d'une corolle. Il y a des espèces où leur forme semble indiquer des staminodes.

2. Le tégument ovulaire est double, et le micropyle est supérieur et intérieur. Les ovules se développent de bas en haut sur le placenta.

3. Tels les *Evodianthus* OERST., in *Vid. Medd. Nat. Foren Kjob.* (1875), 194; *Amer. centr.*,

t. 1, et *Sarcinanthus* OERST., in *Vid. Medd. Nat. Foren Kjob.* (1875), 196; *Amer. centr.*, t. 2 (DR., *Pflanzensam.*, 100, 101), qui ne constituent que des sections mal délinées.

4. AD. BR., in *Ann. sc. nat.*, sér. 4, XV, 360, t. 1; in *Fl. serres*, XV, 33, t. 1515, 1516 (non PERS.). — B. H., *Gen.*, III, 953, n. 3. — DR., *Pflanzensam.*, 101, n. 5; in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 242, t. 60, fig. 1.

montrer distiques et entières. Leur pétiole, long ou court, se dilate en gaine à sa base. Le fruit composé s'élève de terre sur un pédoncule long ou court, ou bien il se détache de l'aisselle des feuilles. Il

Carludovica palmata.



Fig. 260-262. Fleurs mâles.

est d'abord enveloppé par des spathes en nombre variable, souvent deux, imbriquées, et représentant des gaines foliaires¹. Le genre comprend une trentaine d'espèces², toutes originaires de l'Amérique tropicale.

On a distingué génériquement le *Stelestylis coriacea* DR., du Brésil oriental, qui a, dit-on, comme les *Cyclanthus*, de grandes feuilles bifides et des fleurs femelles à quatre sépales dissemblables, avec un style pyramidal à quatre cornes divergentes.

Cette petite famille a souvent été annexée soit aux Aracées, soit aux Pandanacées. POITEAU lui avait donné le nom de Cyclanthées³ en 1822, mais pour le seul genre *Cyclanthus*. REICHENBACH⁴, tout en en faisant une division des Palmiers, y réunissait les *Cyclanthus* et les *Carludovica*. Plus tard⁵, il en fit une subdivision des Pandanées. SCHOTT⁶ y joignit les *Phytelephas*; et MEISSNER⁷, les *Nipa*. En somme, la famille ne se distingue absolument des Pandanacées et des Aracées que par le port et par des feuilles presque toujours plissées dans la vernation. Ce caractère n'est cependant pas plus constant que la situation plus ou moins infère de l'ovaire. Les Palmiers, dont la feuille peut être celle des Cyclanthacées⁸, n'ont pas le fruit composé charnu de celles-ci et se distinguent par des stipes cloisonnés, ordinairement ligneux⁹. Les Aracées ont rarement les fleurs tétramères ou disposées

1. Avec, assez souvent, un limbe apical rudimentaire.

2. HOOK., *Journ. Bot.* (1840), t. 3, 4. — POEPP. et ENDL., *Nov. gen. et spec.*, t. 151, 154. — WENDL. F., *Ind. Palm.* (1854), 43. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 1068. — OERST., *loc. cit.*, 196. — DR., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 231, t. 54-59. — SCHOTT et ENDL., *Melet.*, I, 15. — KL., in *Linnaea*, XX, 469. — REG., *Gartenfl.*, t. 992, 1046. — *Gardn. Chron.* (1877), II, 715, fig. 136; (1879), II, 278, fig. 46. — *Rev. hort.* (1861), t. 10, 11; (1869), fig. 71. — *Ill. hort.*, t. 165. — HEMSLE., *Bot. centr.-amer.*, III, 416. — GRISEB., *Fl. brit. W.-Ind.*, 513. — *Bot.*

Mag., t. 2950, 2951, 6418, 7083, 7118, 7263. — WALP., *Ann.*, I, 753; V, 859; 860 (*Evodianthus*); 861 (*Sarcinanthus*).

3. In *Mém. Mus.*, IX, 34 « (*Ludoviacæ*, nov. fam. inter *Aroideas* et *Pandaneas* collocanda) ».

4. *Consp.* (1828), 71; *Handb.* (1837), 158.

5. *Nom.* (1841), 43.

6. *Melet.* (1832), 15 (Ord.).

7. *Gen.* (1842), 358 (268) (Trib.).

8. Mais celles-ci ne les ont pas toujours plissées, comme l'on dit.

9. Sur les caractères anatomiques, comparés à ceux des Palmiers, et sur les organes végétatifs, DR., *Pflanzenfam.*, 94.

sur l'axe de la même façon que celle des Cyclanthacées¹. A la base de leur spadice, il n'y a qu'une seule spathe unilatérale. On s'accorde généralement aujourd'hui à partager la famille en deux séries :

I. CYCLANTHÉES². — Fleurs monoïques : les mâles et les femelles disposées en séries alternantes verticillées ou spiralées. Fleurs femelles nues. — Herbes vivaces, à suc laiteux et à feuilles bipartites ; les deux segments symétriques l'un de l'autre et costés. — 1 genre.

II. CARLUDOVICÉES³. — Fleurs monoïques, disposées en glomérules : une femelle centrale, entourée de quatre mâles. Périclanthe mâle à dents nombreuses. Périclanthe femelle 4-mère. Staminodes 4, oppositisépales, très longuement filiformes. Style à 4 lobes alternisépales. — Herbes vivaces, à suc aqueux. — 2 genres.

Toutes les Cyclanthacées appartiennent à l'Amérique tropicale⁴.

USAGES⁵. — C'est avec les feuilles du *Carludovica palmata*⁶ qu'on fabriquait exclusivement autrefois, disait-on, les pailles de Panama, notamment les chapeaux fins dont le prix pouvait être si élevé. Aujourd'hui, plusieurs autres espèces du genre servent aux mêmes usages ; et le *Chidra* de Costa-Rica, dont on fait aussi de beaux chapeaux, des étuis à cigares et bien d'autres objets de fine vannerie, serait le *C. rotundifolia* WENDL. F. On emploie dans un but analogue les *C. latifolia* R. et PAV., *atrovirens* WENDL. F. et d'autres espèces. Ces plantes, avec le *Cyclanthus bipartitus* POIT., se cultivent comme ornementales dans nos serres chaudes. Les feuilles du *Carludovica palmæfolia*⁷ servent aux mêmes usages que celles des Palmiers ; et les espèces sarmenteuses s'emploient, au Brésil, comme cordages.

1. LINDL., *Introd. Nat. Syst.*, ed. II, 362. — GARDN., in *Hook. Journ. Bot.*, II, 27.

2. B. H., *Gen.*, III, 952, 953, Trib. 2. — DR., *Pflanzensam.*, 101, II.

3. B. H., *Gen.*, III, 952, Trib. 1. — DR., *Pflanzensam.*, 98, I.

4. Sur leur distribution géographique : DR., *Pflanzensam.*, 98 (*Geogr. Verbreit.*) ; in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 247 (*Ration. geogr.*).

5. ROSENTH., *Syn. pl. diaphor.*, 146, 1091. — H. BN, in *Dict. enc. sc. méd.*, sér. 1, XII, 595.

6. R. et PAV., *Fl. per. et chil. Syst.*, 291. — H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, t. 79. — K., *Enum.*, III, 105. — *Ludovica palmata* PERS. — *Salmia*

palmata W. Les feuilles sont d'abord découpées en fines lanières, puis nattées, ordinairement à la main. A la Nouvelle-Grenade, les plus fins chapeaux, qui doivent être appelés de Murrapa, rivalisent avec ceux de Guayaquil. D'après TRIANA, les principaux centres de fabrication en Colombie se trouvent dans les provinces d'Antioquia, de Neiva et de Socorro. Avec des lanières extraites du pétiole (*nacumas*), on fait aussi des *petacos*, corbeilles ordinairement tressées avec des pailles de diverses couleurs.

7. *C. Plumieri* K., *Enum.*, III, 105. — *Salmia palmæfolia* W. (1811). — *Arum hederaceum foliis bisectis*. PLUM.

GENERA

I. CYCLANTHÆ.

1. **Cyclanthus** POIT. — Flores monœci inflorescentiæ rhachi immersi: masculi nudi, ∞ -andri; filamentis brevibus, basi liberis v. 1, 2-adelphis; antheris basifixis lineari-oblongis, 4-locellatis, ad margines 2-rimosis, nunc demum tortis. Floris fœminei germen 1-loculare; tubo apice in foliola perianthii (?) dilatata; foliolis in seriem ∞ -dentatam connatis, basin aliis, aliis autem apicem inflorescentiæ spectantibus. Staminodia ∞ , nunc inter se et cum foliolis confluentia; antheris imperfectis v. 0. Germina inter se confluentia; styli crassi lobis stigmatosis emarginatis. Ovula ∞ , placentis parietalibus 2 affixa anatropa; funiculis adscendentibus inæqualibus. Fructus compositus discis transversis tumidis sulcatis opertus. Semina ∞ , ellipsoidea funiculata; integumento extimo pellucido; intimo autem testaceo, intus sulcato; raphe lineari; albumine carnosio; embryone recto cylindræo. — Herbæ perennes (lactescentes); rhizomate crasso in limo radicante. Folia conferta petiolata; limbi segmentis 2, asymmetricis, liberis v. basi connatis, lanceolatis plicatis, 1-costatis; nervis parallelis ∞ ; venis transversis; petiolo longo, basi vaginante. Pedunculus longus, bracteatus v. nudus; spica cylindræa flores in annulos alternatim masculos fœmineosque v. nunc in spiram dispositos confluentes gerente; masculis primum immersis demumque ultra fœmineos elevatis. (*America trop.*) — *Vid. p. 416.*

II. CARLUDOVICÆ.

2. **Carludovica** R. et PAV. — Flores dicæci; masculorum perianthio brevi, regulari v. obliquo carnosulo; dentibus variis ∞ , 2-seriatis.

Stamina ∞ ; filamentis inter se et cum perianthio basi dilatata connatis, apice subulatis; antheris dorsifixis v. subbasifixis, oblongis v. 2-dymis; loculis intus v. ad margines rimosis. Floris fœminei subliberi v. rhachi plus minus immersi perianthium superum, 4-gonum, 4-fidum v. 4-partitum; foliolis nunc emarginato-2-lobis v. raro brevissimis crassis; lateralibus 2; circa fructum sæpius accrescentibus v. induratis. Staminodia 4, sepalis opposita eorumque basi adnata, longissime filiformia, primum corrugata, decidua, apice nunc antheram imperfectam gerentia. Germen plus minus inferum; styli lobis sessilibus crassis stellato-patentibus cum sepalis alternantibus, longitudinaliter sulcatis. Placentæ parietales v. sub apicales 4, oppositisepalæ crassæ; ovulis ∞ , descendentibus anatropis; micropyle supera; funiculis varie elongatis. Fructus compositus (syncarpium) carnosus v. pulposus, sepalis stylisque tumidis stipantibus opertus; carne sæpe ab axi soluta. Semina ∞ , ellipsoidea; integumento extimo carnoso; intimo autem coriaceo; albumine copioso v. nunc tenui, carnoso v. corneo; embryone cylindraceo minuto. — Herbæ perennes v. suffrutescentes; caudice brevi v. rarius elongato sarmentoso scandente annulato radicante. Folia alterna, disticha v. fasciculata, integra, 2-fida v. palmatisecta; segmentis integris v. dentatis flabellatis, ∞ -costatis; petiolo longo v. brevi, basi varie vaginante. Spadices basiliares v. axillares, cylindracei, oblongi, obovoidei v. subsphærici, simplices, longe v. breviter pedunculati; floribus glomerulatis; glomerulis in spiras dense dispositis; flore glomeruli centrali fœmineo; exterioribus 4, masculis, sepalis fœmineorum antepositis. Spathæ 2 v. plures imbricatæ, caducæ; vagina membranacea nunc limbo rudimentario superata. (*America trop.*, *Antillæ*.) — *Vid. p. 418.*

3? **Stelestyliis** DR.¹ — Flores (fere *Carludovicæ*) dicæci, dense spicati; fœmineorum sepalis 4, inæqualibus; majoribus 2, subquadrato-ovatis; minoribus autem 2, lineari-oblongis apiceque 2-fidis. Styli lobi 4, corniformes, stellatim patentes. Fructus compositus oblongus. — Herba perennis; foliis (amplis) 2-fidis; segmentis fissis; nervis pinnatis; petiolo brevi canaliculato; spadice gracili; involucri spathis 3; cæteris *Carludovicæ*. (*Brasilia or.*²)

1. In *Mart. Fl. bras.*, III, II, 229, t. 53; *Pflanzensam.*, 100. — B. II., *Gen.*, III, 952, n. 1.

2. Spec. 1. *S. coriacea* DR. « *Habitus plantæ totius ignotus* » (DR.). Nomen e stylo exserto.

CXXXVII

A R A C É É S

I. SÉRIE DES GOUETS.

La plus commune des Aroïdées de notre pays est l'*Arum*¹ *maculatum* L. (fig. 263-270). Ses fleurs sont disposées, dans une spathe commune, en un spadice, sorte d'épi dont l'axe porte des fleurs femelles à sa base; au-dessus d'elles des fleurs femelles avortées; puis des fleurs mâles, et, encore plus haut, des fleurs neutres. Son sommet est terminé par une massue glabre, elle-même assez souvent considérée comme formée de fleurs mâles imparfaitement développées. Les fleurs sont nues : les mâles représentées chacune par une ou quelques étamines² dressées, à filet épais et très court, à anthère basifixe, obtusément tétragone³, dont les deux loges s'ouvrent par des fentes latérales⁴. Les fleurs femelles consistent en un ovaire sessile, uniloculaire, surmonté d'un petit bouquet sessile de papilles stigmatiques. Dans la loge se voit inférieurement un placenta pariétal qui supporte quelques séries d'ovules peu nombreux, orthotropes, obliquement ascendants, à funicule court et à micropyle supérieur⁵. Les fleurs stériles qui se trouvent au-dessus et au-dessous des mâles consistent en corps piriformes, pleins, surmontés d'une baguette ténue⁶. Le fruit est composé, formé de nombreuses baies à peu près sphériques, rapprochées en épi et renfermant chacune une seule ou

1. T., *Inst.*, 158, t. 69. — L., *Gen.*, ed. 1, n. 698; ed. VI, n. 1028 (part.). — J., *Gen.*, 24. — TURP., in *Dict. sc. nat.*, Atl., t. 132. — L.-C. RICH., in *Guillem. Arch. bot.*, I, t. 1. — NEES, *Gen. Fl. germ., Monoc.*, III, n. 39. — ENDL., *Gen.*, n. 1676. — SCHOTT, *Syn. Aroid.*, 9; *Gen. Ar.*, t. 13; *Prodr. Ar.*, 73; *Melet.*, I, 17. — B. H., *Gen.*, III, 967, n. 10. — ENGL., *Arac.*, in *DC. Mon. Phaner.*, II (1879), 580; *Pflanzenfam.*, II, 3, p. 147, fig. 94, A-C. — *Gymnomesium* SCHOTT, in *Est. Bot. Wochenbl.* (1855), 17; *Syn. Ar.*, 8; *Gen. Ar.*, t. 12; *Prodr. Ar.*, 73.

2. Ordinairement 3, 4.

3. Ce qui répond primitivement à quatre logettes distinctes.

4. Le pollen est généralement sphéroïde ou ellipsoïde et à surface lisse.

5. Il y a deux enveloppes. Parfois dans cette espèce et dans quelques autres du même genre, le sommet du nucelle sort assez longuement de l'exostome.

6. Souvent obliques : ceux qui sont au-dessus des fleurs mâles, d'ordinaire ascendants; ceux qui sont au-dessous, descendants. Leur renflement est rarement un peu creux.

quelques graines ascendantes. Celles-ci sont, comme les ovules,

Arum maculatum.

Fig. 264. Germination.

Fig. 263. Feuille et inflorescence.

Fig. 265. Spadice.



Fig. 266.
Stamine.



Fig. 267. Fleur femelle,
coupe longitudinale.



Fig. 268. Fruit.



Fig. 269. Graine,
coupe longitudinale.

Fig. 270.
Embryon.

entourées d'un suc gommeux ou mucilagineux. Sous leurs téguments¹

1. A triple couche : l'intérieure membraneuse, entourée d'une enveloppe testacée, résistante, plus ou moins foncée, ordinairement

rugueuse en dehors dans sa portion inférieure. Le tégument superficiel, mince, membraneux, à peu près translucide, s'épaissit plus ou moins

elles contiennent un épais albumen charnu dans lequel se loge un embryon allongé, presque axile ou plus ou moins excentrique.

On distingue une quinzaine¹ d'*Arum*, de l'Europe, de la région Méditerranéenne et de l'Asie occidentale. Ce sont des herbes vivaces, en général peu élevées. Leur portion souterraine consiste en un tuber-

Arum italicum (byzantinum).

cule charnu, puis riche en fécule, arrondi et portant vers son sommet quelques feuilles et une inflorescence ou deux; ou ovoïde et latéralement foliifère. Les feuilles, en réalité alternes, sont complètes, c'est-à-dire composées d'une gaine, d'un pétiole et d'un limbe sagitté ou hasté, à côte penninerve et à nervures pennées, lâchement réticulées. L'inflorescence est un spadice pédonculé, enveloppé d'abord d'une spathe à tube ovoïde ou oblong, un peu resserré à la gorge, et à limbe lancéolé ou oblong, finalement étalé, réfléchi ou infléchi, membraneux, veiné et marcescent. Plus court que la spathe, le spadice a ses fleurs femelles tout contre elle.

Fig. 271 Port (').

Dans les espèces de la section *Gymnomesium*, les fleurs mâles sont sépa-

rées des femelles par un court intervalle nu, et il n'y a de fleurs rudimentaires qu'au-dessus des mâles. Le type de cette section, originaire des îles de la région Méditerranéenne, est l'*A. pictum* L. f. L'*A. flavum* SCHOTT a été aussi génériquement distingué sous le nom de *Dochafa*².

Plusieurs genres voisins des Gouets ont, comme eux, un spadice libre de toute adhérence avec sa spathe; des fleurs mâles composées

en arille. Le point de la graine opposé à son hile est ordinairement apiculé, quelquefois très proéminent. La base des ovules des Aracées est souvent entourée de poils mous, nés du placenta et quelquefois très développés.

1. L., *Spec* (1753), II, 964. — SCOP., *Fl. carn.*, II, 209. — GRAY, *Brit. pl.*, II, 38. — MICX., *Fl. bor.-amer.*, II, 188. — PERS., *Syn.*, II, 574. — SIBTH. et SM., *Prodr. Fl. grec.*, II,

245. — BENTOL., *Fl. ital.*, X, 245. — REICH., *ic. Fl. germ.*, VII, t. 8-10, 12. — BOISS., *Fl. or.*, V, 35. — HOOK. f., *Fl. brit. Ind.*, VI, 509. — DUR. et SCHUM., *Consp. Fl. afric.*, V, 481. — REG., *Gartenfl.*, t. 742. — GREN. et GODR., *Fl. de Fr.*, III, 329. — H. BN., *Iconogr. Fl. fr.*, n° 214; *Herbor. par*, 87, c. xyl. — *Bot. Mag.*, t. 2432, 5509.

2. SCHOTT, *Syn. Ar.*, 24; *Gen. Ar.*, App.

d'étamines à filet très court ou nul, pressées les unes contre les autres. Presque toujours les feuilles se montrent au dehors un peu avant les inflorescences. Ce sont les Arées proprement dites (*Euarées*). Comme les Gouets, elles ont le tube de la spathe enroulé sur lui-même, de telle façon qu'un de ses bords enveloppe étroitement l'autre. C'est ce qu'on observe chez les *Dracunculus*, anciens *Arum* d'Europe et des îles du nord-ouest de la côte africaine; les *Helicodieros*, des Baléares et des îles voisines; les *Eminium*, de l'Orient; les *Typhonium*, d'Asie et d'Océanie; les *Theriophonum*, de l'Inde. Ailleurs, avec la même organisation générale, les bords du tube de la

Arisarum vulgare.



Fig. 274. Fleur mâle.



Fig. 272. Inflorescence.



Fig. 275. Fleur femelle.

Fig. 276. Gynécée, coupe longitudinale

Fig. 273. Spadice, sans la spathe.

spathe demeurent unis, comme dans les *Biarum*, de la région Méditerranéenne, et les *Sauromatum*, de l'Afrique et de l'Asie tropicales.

Les *Arisarum* (fig. 272-276), de la région Méditerranéenne, donnent leur nom à une petite sous-série (*Arisarées*) dans laquelle la spathe, plus ou moins obliquement insérée, est dite adnée au spadice. Les fleurs sont distantes les unes des autres, et les anthères y sont considérées comme sessiles sur des saillies du spadice. Les feuilles et les fleurs se développent en même temps. Les bords de la spathe peuvent être unis; ou bien ils se recouvrent, comme dans les *Arisæma*, nombreux dans l'Amérique du Nord, dans l'Afrique orientale et surtout dans l'Asie tropicale et tempérée. Les fleurs, monoïques dans les *Arisarum*, sont le plus ordinairement dioïques chez les *Arisæma*.

L'*Ambrosinia*, petite herbe vivace de la région Méditerranéenne, a

un spadice partagé en deux cavités par une cloison longitudinale, d'un côté de laquelle se trouvent les fleurs mâles, tandis que la fleur femelle est seule, plus bas, de l'autre côté (*Ambrosiniées*).

Dans les *Pinellia* et *Lagenandra*, asiatiques, et qui constituent une petite sous-série très voisine de la précédente (*Pinelliées*), il n'y a pas dans la spathe de cloison longitudinale : c'est le spadice qui, en se dilatant, vient fermer l'orifice supérieur du tube de la spathe.

Le genre *Cryptocoryne* forme aussi une petite sous-série (*Cryptocorynées*) dans laquelle les fleurs femelles, situées à une grande distance des mâles, vers la base d'un spadice ordinairement grêle, sont disposées en une sorte de verticille. Leur ovaire, nu et uniloculaire, a une base très large qui prend une direction presque verticale sur la surface convexe du spadice. Son sommet conique se porte en dehors et en haut et là se dilate en un style court et réfléchi. Le placenta, basilaire et chargé d'ovules dressés, orthotropes, se place verticalement par suite de la direction prise par l'ovaire lui-même ; et celui-ci adhère aux ovaires voisins, peu nombreux, de façon à former avec eux une sorte de verticille autour de la base du spadice. Le fruit se trouve, par suite, composé de baies, finalement étalées, qui entourent cette même base. Les loges des anthères sont surmontées d'un petit cône suivant l'axe duquel se produit un canal qui donne issue au pollen par un pore terminal. Ce sont des herbes vivaces, des localités aquatiques de l'Asie et de l'Océanie tropicales, herbes dont les organes végétatifs rappellent beaucoup aussi ceux de nos *Arum*.

Dans les *Zomicarpa*, type d'une autre sous-série (*Zomicarpées*) et originaires du Brésil, les fleurs mâles ont une ou deux anthères poricides ; et leur ovaire n'a qu'une loge dans laquelle se trouvent des ovules basilaires et anatropes, peu nombreux. Leurs fruits charnus se détachent, quand ils sont mûrs, circulairement vers leur base. Les genres très voisins *Zomicarpella*, *Xenophya* et *Scaphispatha* sont le premier et le dernier américains ; le second, de la Nouvelle-Guinée.

Les *Stylochiton* constituent à eux seuls une petite sous-série (*Stylochitonées*) bien distincte. Dans les mâles, des étamines, au nombre de trois à six, entourent la base d'un gynécée rudimentaire, et sont elles-mêmes encadrées d'un très court périanthe annulaire ou gamophylle. L'ovaire n'a qu'une loge ; mais elle peut être incomplètement cloisonnée à sa base. Les fruits charnus ont d'une à quatre loges ; et le nombre des graines qu'elles contiennent est, comme celui des

ovules, très variable. Ce sont des plantes africaines, herbacées et vivaces, à rhizome formé d'articles disciformes.

Dans les *Spathicarpa*, plantes vivaces et tubéreuses du Brésil et du Paraguay, l'inflorescence se comporte, nous le verrons (p. 439), comme celle des *Dieffenbachia*, en ce sens que son axe est tout entier uni à la côte de la spathe. Elle est formée de fleurs mâles représentées par une sorte de clou dont la tête peltée porte en dessous les loges d'anthère. Les fleurs femelles ont des staminodes insérés sous un ovaire qui n'a qu'une loge et un seul ovule orthotrope et dressé. Les fleurs des deux sexes forment, sur la spathe, quelques séries longitudinales. Les femelles sont extérieures aux mâles et finissent par se diriger horizontalement. Ce genre est le type d'une sous-série (*Spathicarpées*), dans laquelle se rangent aussi les genres affines : *Spathanthemum*, de l'Amérique tropicale et (?) de l'Afrique tropicale ; *Gearum*, du Brésil ; *Gorgonidium*, de l'Archipel Indien, et *Synandropadix*, de la République Argentine.

Les *Asterostigma*, de l'Amérique tropicale, peuvent aussi être rangés dans une sous-série à part (*Astérostigmatées*). Ils se rapprochent de même, à certains égards, des *Dieffenbachia*, notamment par l'union de leur spadice avec la côte intérieure de la spathe. Mais leurs fleurs mâles sont unies en une sorte de clou, comme celles des *Spathicarpa*. Sur la tête du clou s'insère souvent au centre un gynécée rudimentaire. Quant à l'ovaire fertile, il a d'une à cinq loges uniovulées, et le sommet du style est partagé en lobes rayonnants et bifides. Tout à côté de ce genre se placent encore les *Taccarum* et les *Mangonia*, qui sont les uns et les autres brésiliens.

II. SÉRIE DES COLOCASES.

Le genre *Colocasia*¹ est souvent représenté dans nos jardins par le *C. esculenta*² (fig. 277-280), plante alimentaire et ornementale, dont les fleurs sont monoïques et nues. Les mâles sont réunies, au nombre de deux à six, en un corps charnu, qui représente un tronc de

1. SCHOTT, *Melet.*, I, 18; *Gen. Ar.*, t. 37; *Syn. Ar.*, 40; *Prodr. Ar.*, 137. — ENDL., *Gen.*, n. 1683 (part.). — K., *Enum.*, III, 36. — ENGL., *Arac.*, 490; *Bot. Jahrb.*, I, 185; *Pflanzenfam.*, 139. — B. H., *Gen.*, III, 974, n. 30.

— *Leucocasia* SCHOTT, in *Est. Bot. Wochenbl.* (1857), 31; *Gen. Ar.*, t. 38; *Prodr. Ar.*, 140.

2. SCHOTT, *Melet.*, I, 18. — *C. Antiquorum* SCHOTT. — *Arum esculentum* L., *Spec.*, ed. II, 1369. — *Caladium esculentum* VENT.

pyramide renversé, fort irrégulier, creusé de sillons longitudinaux inégaux et coupé droit à son sommet. Les loges linéaires et gémées des anthères inégalement distantes occupent les arêtes mousses du

Colocasia esculenta.

tronc de pyramide et s'étendent dans sa hauteur depuis son sommet jusqu'à sa base ou jusqu'à une distance variable de celle-ci. Chaque anthère s'ouvre tout en haut, sur la plate-forme du sommet, par un petit pore qui répond au point d'union des deux loges¹. Les fleurs femelles ont un ovaire sessile, obovoïde, un peu irrégulier, uniloculaire, surmonté d'un style cylindrique épais et très court, dont le sommet stigmatifère est capité, plus ou moins déprimé. La loge renferme de deux à cinq placentas pariétaux, longitudinaux, peu proéminents, qui portent de nombreux ovules orthotropes, ascendants ou plus ou moins divergents, à micropyle apical². Près de la base de ces ovules ou plus ou moins au-dessus d'elle s'attache latéralement un funicule assez long, sinueux et généralement ascendant. Le fruit composé est formé de baies presque sphériques, oblongues ou obconiques, verdâtres, surmontées d'un reste de

style, uniloculaires et polyspermes. Les graines sont oblongues et supportées par un funicule dont le sommet se continue avec un renflement arillaire, tandis que le reste du tégument superficiel est mince et translucide. Le tégument sous-

Fig. 277. Inflorescence ($\frac{1}{2}$).

Fig. 279. Fleur femelle.

Fig. 280. Fleur femelle, coupe longitudinale.

1. Le pollen blanchâtre en sort sous forme de filaments vermiculés.

2. Le tégument est double, et parfois l'endostome dépasse l'exostome.

est entouré d'un abondant albumen qu'enveloppe un mince tégument interne, opaque ou translucide.

On distingue cinq ou six espèces¹ de *Colocasia*. Ce sont de grandes herbes vivaces, à rhizome tubéreux, charnu, ou à tige aérienne, épaisse dressée et peu résistante, avec de larges feuilles alternes, ovales-cordées ou sagittées, ou peltées; le pétiole long et épais, dilaté inférieurement en une large gaine. Les fleurs s'observent en même temps que les feuilles; et leurs spadices, solitaires, géminés ou fasciculés, ont un épais pédoncule. La spathe² a un tube renflé, ovoïde ou ellipsoïde-oblong, qui persiste et s'épaissit autour des fruits. Son

Alocasia macrorrhiza.



Fig. 281. Base
du spadice.

Fig. 282. Fleurs mâles.

Fig. 283. Fleur femelle.

Fig. 284. Fleur femelle,
coupe longitudinale.

limbe, qui finalement se détache au niveau d'un léger étranglement, est oblong ou lancéolé, atténué ou acuminé au sommet, à bords involutés. Les fleurs femelles, nombreuses, sessiles, presque immédiatement insérées au-dessus de la spathe, sont irrégulièrement entremêlées de fleurs stériles en forme de massue courte et obtuse. Un peu plus haut, il n'y a plus que de ces fleurs stériles, plus nombreuses et plus rapprochées les unes des autres³. Au-dessus d'elles, l'axe porte de nombreuses fleurs mâles, qui se touchent les unes les autres, et sont surmontées d'un appendice (quelquefois absent) formé, dit-on, de

1. LAMK. *Dict.*, III, 13 (*Arum*). — ROXB., *Fl. ind.*, III, 494, 517 (*Calla*). — WIGHT, *lc.*, III, t. 786 (*Arum*), 808 (*Calla*). — LOUR., *Fl. cochinch.*, 688 (*Arum*). — SCHOTT, in *Est. Bot. Wochenbl.* (1854), 410 (*Alocasia*). — FR. et SAV., *En. pl. jap.*, 8. — ENGL., in *Becc. Males.*, I, 291. — BENTH., *Fl. austral.*, VII, 155. — SEEM., *Fl. vit.*, 284. — HOOK. F., *Fl.*

brit. ind., VI, 523. — DUR. et SCHINZ, *Consp. Fl. afric.*, V, 478. — *Fl. Mag.* (1874), t. 107. — *Bot. Mag.*, t. 7364. — WALP., *Ann.*, V, 870.

2. Parfois très odorante.

3. Elles ont la forme de sphérules stipitées ou bien de pyramides renversées et déprimées, tronquées au sommet, parfois un peu comprimées latéralement.

fleurs mâles à peine distinctes ; si bien que l'ensemble figure un cône étroit et à peu près lisse.

Les Colocases sont des plantes de l'Asie tropicale, introduites et cultivées dans tous les pays chauds, principalement en Océanie.

Autrefois confondus avec les Colocases, les *Alocasia* (fig. 284-284) en ont presque les caractères. Leur spadice est appendiculé. Leurs fleurs femelles ont un ovaire uniloculaire, à moins que le sommet de sa cavité ne présente des rudiments descendants de cloisons ; et les ovules, moins nombreux, sont supportés par des funicules rectilignes, plus courts et plus épais, dressés sur le plancher de la loge. Des fleurs imparfaites, étroitement pressées les unes contre les autres, séparent les fleurs femelles des mâles ; et les plus inférieures d'entre elles consistent en un ovaire stérile et plus ou moins béant. Quant aux fleurs mâles, le tronc de pyramide renversé qu'elles représentent est plus régulier que celui des Colocases et porte sur ses arêtes latérales de trois à huit anthères, qui en occupent

Caladium bicolor.



Fig. 285. Inflorescence. Fig. 286. Fleur mâle.

Fig. 287. Fleur femelle. Fig. 288. Fleur femelle, coupe longitudinale.

toute la hauteur et s'ouvrent par des pores apicaux quant aux loges, mais situés au-dessous du bord de la plaque terminale du connectif. Ce sont des plantes vivaces de l'Asie et de l'Océanie tropicales, à tige épaisse et peu résistante, à grandes feuilles sagittées ou cordées, quelquefois en partie peltées ; à inflorescences pédonculées, disposées comme celles du genre précédent.

Il n'y a que des différences considérées dans cette famille comme tout à fait secondaires, entre les genres précédents et les *Schizocasia*, de l'Océanie tropicale ; les *Gonatanthus*, des montagnes de l'Inde ; les *Remusatia*, qui habitent les montagnes de l'Inde et de Java ; les *Staudnera*, qui sont aussi de l'Asie tropicale ; les *Caladium* (fig. 285-

288), si souvent introduits de l'Amérique tropicale dans nos cultures ; les *Xanthosoma* et *Chlorospatha*, qui sont également américains ; l'*Hapaline*, petite herbe vivace et tubéreuse des montagnes de l'Inde et de la Cochinchine.

L'*Ariopsis peltata*, des montagnes de l'Inde, représente à lui seul une sous-série (*Ariopsidées*). C'est aussi une petite herbe tubéreuse. Ses fleurs mâles sont formées de trois étamines unies en une petite masse peltée ; et la fleur femelle, relativement grande, a un ovaire uniloculaire, à plusieurs placentas pariétaux, pluriovulés, surmonté d'un style à branches stigmatifères subulées et incurvées, puis étalées.

On constitue également avec les *Syngonium* et les *Porphyrospatha*, qui sont de l'Amérique tropicale, une sous-série (*Syngoniées*), à fleurs mâles, tri- ou tétrandres et à loges ovariennes uni- ou biovulées. Ce sont des lianes, dont le spadice est dépourvu d'appendice, et dont les ovules anatropes sont ascendants, à micropyle inférieur.

III. SÉRIE DES AMORPHOPHALLUS.

Nues et monoïques, les fleurs des *Amorphophallus*¹ (fig. 289, 290) ont, sur un petit réceptacle, une ou de deux à quatre étamines dans les mâles, et dans les femelles, un gynécée libre, dont l'ovaire a de deux à quatre loges. Les étamines sont réduites à une anthère sessile, dont la loge unique ou les deux loges contiguës, oblongues ou obconiques, s'ouvrent à leur sommet obtus par un pore qui laisse échapper un ruban vermiciforme formé de grains polliniques. Le connectif ne se prolonge pas ou se prolonge à peine au delà des loges. L'ovaire, à peu près sphérique, libre, est surmonté d'un style court ou long, dont le sommet stigmatifère plus ou moins dilaté est entier ou partagé en deux, trois ou quatre lobes courts ou très longs. Dans chaque loge s'insère, à la base de l'angle interne, un ovule ascendant, complètement ou incomplètement anatrope², dont le micropyle est dirigé en dehors et en bas. Son funicule est nul ou court, parfois dilaté en un faux-arille autour de la base de l'ovule. Les fruits composés sont

1. BL., in *Diar. balav.* (1825); *Rumphia*, I, 138, t. 32-35, 37. — ENDL., *Gen.*, n. 1681. — K., *Enum.*, III, 31. — SCHOTT, *Syn. Ar.*, 37; *Gen. Ar.*, t. 29; *Prodr. Ar.*, 127. — ENGL.,

Arac., 308; *Pflanzensam.*, 126, fig. 81. — B. H., *Gen.*, III, 970, n. 19. — Pythion MART., in *Bot. Zeit.* (1831), 459.

2. A double tégument.

formés de baies à une ou quelques graines. Celles-ci sont ascendantes, ovoïdes, obovoïdes, ellipsoïdes ou comprimées, dépourvues d'albumen, et leur embryon charnu est macropode.

Les *Amorphophallus* sont des herbes vivaces, de taille moyenne, parfois gigantesque. Leur portion souterraine est un tubercule, souvent très gros, aplati, produisant de nombreuses racines adventives, ordinairement détruites à l'époque de la floraison. Celle-ci a lieu avant le développement des feuilles qui sont grandes ou très grandes,

Amorphophallus Rivieri.




Fig. 289. Groupe de fleurs mâles.

Fig. 290. Fleur femelle, coupe longitudinale.

basilaires, triséquées, à divisions plus ou moins découpées, bi- ou tripinnatifides; les pinnules oblongues et presque toujours aiguës. Le pétiole, souvent grand, épais, tacheté, peut porter des bulbilles vers son sommet; sa base s'élargit souvent et laisse sur le tubercule des cicatrices arquées ou presque circulaires. Le pédoncule du spadice, long ou court, dressé, se termine par un axe florifère dressé, épais, souvent plus long que la spathe qui est dressée, campanulée, presque régulière, largement infundibuli-

forme, ou forniquée, colorée souvent en pourpre livide, souvent fétide, marcescente. Les fleurs, femelles en bas, mâles plus haut, pressées les unes contre les autres dans l'ordre spiral, sont surmontées d'un appendice du spadice, sphérique ou conique, fungiforme, parfois très long et fusiforme.

L'*A. leonensis*, dont on a fait un genre *Corynophallus*¹, a une spathe obliquement campanulée, à tube dilaté; un appendice du spadice épais et fongueux. Le sommet de son style est dilaté et disciforme.

Les *A. maximus*, *gratus*, *angolensis*, etc., ont constitué un genre *Hydrosme*² que nous ne pouvons que ramener au rang de section. Leur spathe a un tube involuté et un limbe étalé, ondulé sur les bords. Leur appendice est en forme de massue, de cylindre ou de cône étiré.

1. SCHOTT, in *Est. Bot. Wochenbl.* (1857), 389; *Gen. Ar.*, t. 32; *Prodr. Ar.*, 132. — ENGL., *Arac.*, 325.

2. SCHOTT, in *Est. Bot. Wochenbl.* (1857), 389; *Gen. Ar.*, t. 33; *Prodr. Ar.*, 132. — ENGL., *Arac.*, 321; *Pflanzenfam.*, 128 (part.).

— HANSALIA SCHOTT, in *Est. Bot. Zeitschr.*, (1858), 82; *Gen. Ar.*, App.; *Syn. Ar.*, 133. — *Proteinophallus* Hook. f., in *Bot. Mag.*, t. 6195 (sphalm. *Tapeinophallus* H. Bk., in *Dict. Bot.*, Atl.). Funiculum dicitur (Engl.) in *A. Rivieri* « tota longitudine ovulo accretum ».

L'*A. Hohenackeri*, de l'Inde, type d'un genre *Rhaphiophallus*¹, a des fleurs femelles à style très court; mais se distingue, en somme, fort peu des *Hydrosme* comme section. Il présente parfois des fleurs stériles interposées aux femelles et aux mâles. Le sommet de son style est discoïde, chargé de papilles. La spathe a un limbe lancéolé, et l'appendice du spadice est longuement subulé.

L'*A. campanulatus*, de l'Asie et l'Océanie tropicales, a, pour certains auteurs, formé avec quelques espèces voisines un genre *Candarum*². Ses fleurs femelles ont un long style grêle, et son spadice a un très court pédoncule, avec une spathe campanulée et involutée. Son appendice, irrégulièrement conique, est à peu près aussi épais que long. Le style est, au contraire, court dans les *Brachyspatha*³, qui ont un long pédoncule et une spathe bien plus courte que l'appendice du spadice, qui est long et fortement atténué vers son sommet; tandis que les espèces de la section *Conophallus*⁴, à style presque nul, le sommet stigmatifère disciforme et à deux ou trois crénelures, ont une assez grande spathe à tube involuté, se continuant insensiblement avec un limbe concave, cependant que l'appendice du spadice, un peu plus long que ce limbe, est épais et conoïde.

Ainsi conçu, le genre renferme près de trente espèces⁵.

Les *Synantherias*, de l'Inde, sont très voisins des *Amorphophallus*; et dans la même série (*Amorphophallées*) se placent aussi quatre genres assez peu différents : les *Anchomanes*, de l'Afrique tropicale occidentale; le *Pseudohydrosma*, de la même région; les *Thomsonia*, de l'Inde; les *Pseudodracontium*, tous cachinchinois; les *Plesmonium*, herbes indiennes.

Les *Lasia*, de l'Asie et de l'Océanie tropicales, appartiennent à une sous-série particulière (*Lasiées*) dans laquelle le spadice, non appendiculé et chargé de fleurs qui s'épanouissent ordinairement de haut

1. SCHOTT, *Gen. Ar.*, t. 27; *Syn. Ar.*, 125. — ENGL., *Arac.*, 320. — B. H., *Gen.*, III, 972, n. 23.

2. REICHB. — SCHOTT, *Melet.*, I, 17. — BL., *Rumphia*, I, 139.

3. SCHOTT, *Syn. Ar.*, 34; *Gen. Ar.*, t. 29; *Prodr. Ar.*, 127.

4. SCHOTT, *Syn. Ar.*, 34; *Gen. Ar.*, t. 30; *Prodr. Ar.*, 127.

5. RUMPH., *Herb. amboin.*, V, 326, t. 113 (*Tacca*). — RHEED., *H. malab.*, XI, 37, t. 19 (*Mulenschena*). — FORST., *Pl. esc.*, n. 29 (*Dracontium*). — GAUDICH., in *Freycin. Voy. Bot.*, t. 34 (*Arum*). — ROXB., *Pl. corom.*, III, t. 272

(*Arum*). — WIGHT, *lc.*, t. 782, 785 (*Arum*). — SCHOTT, in *Pet. Moss. Bot.*, t. 56; in *Bomplandia* (1859), 28. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 201; in *Ann. Mus. lugd.-bat.*, I, 285. — TEYSM. et BINN., in *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.* (1862), 329. — REG., *Gartenfl.*, t. 845; *Animadvers.* (1873), 307. — ENGL., *Bot. Jahrb.*, I, 87; in *Becc. Males.*, I, 279, t. 24, fig. 7-20. — *Fl. serres* (1846), t. 161. — *Gardn. Chron.* (1872), fig. 343; (1873), 610, c. ic.; (1876), II, fig. 129, 130; (1878), II, fig. 127. — FR. et SAV., *En. pl. jap.*, II, 7 (*Conophallus*). — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 513. — *Bot. Mag.*, t. 2072, 2182, 2508 (*Arum*). 6978, 7327.

en bas, est pourvu d'une spathe souvent allongée et tordue, plus rarement assez courte, et longtemps persistante. L'ovaire a une ou de deux à cinq loges uniovulées, et l'ovule est complètement ou incomplètement anatrope. Les genres qui ne peuvent quitter les *Lasia* sont : le *Podolasia*, de Bornéo; l'*Anaphyllum*, de l'Inde; les *Cyrtosperma*, qui croissent à la fois en Asie, en Afrique et en Amérique; les *Dracontium*, qui habitent tous l'Amérique tropicale; les *Urospatha* et *Ophione*, qui sont également américains.

Le genre *Montrichardia*, de l'Amérique tropicale, constitue à lui seul une sous-série (*Montrichardiées*) qu'on a parfois aussi rapprochée des Aglaonémées. Il a des étamines indépendantes, des fleurs des deux sexes contiguës; les femelles à ovaire uniloculaire, déprimé et tétragone au sommet, avec un ou deux ovules descendants et incomplètement anatropes.

On peut placer les *Nephtytis*, de l'Afrique tropicale, à la tête d'une autre sous-série (*Nephtytidées*) dans laquelle l'ovule, toujours solitaire, est ascendant et plus ou moins complètement anatrope. Dans le genre type, la fleur mâle n'est pas connue. Mais dans les *Oligogynium*, également africains et peu différents, il y a une ou de deux à quatre étamines comprimées ou presque cubiques. Dans le *Rhektophyllum mirabile*, il y en a de trois à cinq, trigones et tronquées. Dans le *Cecrestis*, on en compte quatre, prismatiques et contiguës. Dans l'*Allocasium*, il y en a deux ou trois, inégalement prismatiques. Tous ces genres affinis sont également d'ailleurs de l'Afrique tropicale et presque toujours de ses régions occidentales.

IV. SÉRIE DES PHILODENDRON.

Les fleurs nues des *Philodendron*¹ (fig. 291-292) sont situées dans un même spadice. Les mâles ont de deux à six étamines rapprochées et unies en un corps épais, qui a la forme d'un tronc de pyramide renversé. La base supérieure est tronquée ou un peu déprimée; et les angles longitudinaux de la surface convexe portent les anthères, à

1. SCHOTT, *Melet.*, I, 19; *Gen. Ar.*, t. 53; *lc. Ar.*, t. 1-10; *Syn. Ar.*, 72; *Prodr. Ar.*, 219. — MART., in *Flora* (1831), II, 456. — ENDL., *Gen.*, n. 1690. — ENGL., *Arac.*, 355; *Pflanzenfam.*,

132, fig. 84, A-F; 86, 87. — B. R., *Gen.*, III, 978, n. 41. — *Elopium* SCHOTT, in *Est. Bot. Zeit.* (1865), 35. — *Canniphyllum* SCHOTT, *Syn. Ar.*, 76.

loges linéaires ou oblongues, plus courtes que leur support, et à déhiscence apicale qui se fait par des pores ou des fentes courtes d'où sort le pollen en masse vermiculée. Les fleurs femelles ont parfois quelques staminodes hypogynes et claviformes. Leur ovaire ovoïde, obconique, oblong ou obovoïde, est surmonté d'un cône stylaire plus ou moins surbaissé, dont le sommet obtus, hémisphérique ou presque sphérique, est entier ou crénelé, chargé de papilles stigmatiques¹. Le nombre des loges ovariennes varie de deux à une dizaine. Chacune d'elles renferme des ovules nombreux ou en nombre très réduit, orthotropes ou plus ou moins complètement anatropes², plongés dans une glu mucilagineuse. Leurs funicules allongés et ascendants sont insérés sur deux séries à des placentas adnés à la cloison ou à l'angle interne de la loge. Le fruit, inclus dans le tube de la spathe, est formé de baies étroitement rapprochées les unes des autres, et dont la loge ou les loges contiennent un nombre variable de graines supportées par un funicule de longueur variable, et dont les téguments épais³ entourent un albumen abondant, enveloppant un embryon axile.

Il y a plus de cent espèces⁴ dans ce genre, toutes des régions chaudes de l'Amérique. Ce sont des arbustes ou des arbrisseaux sarmenteux, grimpants, rarement des herbes vivaces et subcaules. Au niveau des nœuds se développent souvent des racines adventives, ordinairement aériennes. Les feuilles sont opposées aux gaines, ovales, oblongues, cordées, sagittées ou hastées, entières, lobées, pinnatifides ou une ou deux fois pinnatiséquées, coriaces, nervées et nervulées, à pétiole cylindrique ou canaliculé en dessus, quelquefois

Philodendron Fenzlii.

Fig. 291. Fleur femelle.

Fig. 292. Fleur femelle, coupe longitudinale.

1. Le style peut être plus ou moins creux.

2. A double enveloppe.

3. A triple couche : la moyenne épaisse, dure, lisse ou costée ; l'intérieure membraneuse ; l'extérieure plus ou moins charnue, souvent translucide, parfois partiellement épaissie en arille.

4. SCHOTT, in *Öst. Bot. Wochenbl.* (1857), 237 ; in *Öst. Bot. Zeitschr.* (1859), 98. — K., *Enum.*, III, 49. — LIEBM., in *Vid. Medd. Kjob.* (1850), 16. — PÖEPP. et ENDL., *Nov. gen. et spec.*, III, 86. — III. hort. (1871), 172, t. 76.

MART., in *Flora* (1831), 551. — GRISEB., *Cat. pl. cub.*, 220. — K. KOCH, *Ind. sem. H.*

berol. (1854), App., 7 ; (1855), App., 4. — JACQ., *St. amer.*, t. 152 (*Arum*) ; *H. schenbr.*, t. 187, 189, 190, 468 (*Arum*). — RUDGE, *Pl. Guian.*, t. 33 (*Pothos*). — HOOK., *Exot. Fl.*, t. 206 (*Caladium*). — VELL., *Fl. flum.*, Atl., IX, t. 110-112, 114, 116, 120 (*Arum*). — PEYR., *Ar. Mazim.*, t. 34-42. — LEME, *Ill. hort.*, 76, 79, 149, 150, 262. — ENGL., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, t. 28-37. — WARM., in *Engl. Jahrb.* (1883), 328. — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 419. — REG., *Gartenfl.*, t. 159, 621, 789. — *Bot. Reg.*, t. 1958. — *Bot. Mag.*, t. 2314, 2643, 3345, 3521, 5071, 5899, 5948, 6021, 6375, 6779, 6813. — WALP., *Ann.*, V, 883.

géniculé vers son sommet, avec un long renflement à ce niveau. Les gaines sont persistantes. Les spadices sont pédonculés, non appendiculés, terminaux ou axillaires, solitaires ou fasciculés. Leur axe porte, contre les fleurs inférieures ou un peu au-dessous d'elles, une spathe épaisse, persistante, dont le tube est involuté et accrescent, se rompant finalement. Le limbe cymbiforme se referme après l'anthèse et finit souvent par devenir charnu. Les fleurs sont étroitement pressées en spirale les unes contre les autres : les inférieures femelles, moins nombreuses ; les mâles supérieures et séparées des femelles par des fleurs mâles imparfaites, ordinairement assez rapprochées.

Très voisins des *Philodendron* sont les trois genres *Adelonema*, *Philonotion*, *Thaumatophyllum*, qui habitent les mêmes régions.

Les *Homalonema*, également de l'Amérique tropicale, ont des étamines indépendantes ; un ovaire pluriloculaire, entouré de quelques staminodes hypogynes ; des ovules anatropes ; des fruits inclus dans une spathe qui persiste entière autour d'eux. Près d'eux se rangent : les *Schismatoglottis*, d'Amérique, dont les fruits sont enveloppés par le seul tube de la spathe, car son limbe se détache transversalement ; les *Chamæcladon*, de l'Asie tropicale, dont la spathe persiste entière, comme celle des *Homalonema*, avec des ovules en nombre indéfini, insérés sur un placenta axile ; les *Gamogyne*, de Bornéo, dont les ovules sont orthotropes, dans des ovaires unis entre eux, et dont les anthères ont le sommet tronqué ; les *Piptospatha*, dont les ovaires sont indépendants, en même temps que leur anthère est surmontée d'un long prolongement du connectif ; les *Rhynchopyle*, qui ont, avec des anthères tronquées, des ovules de *Schismatoglottis* ; les *Bucephalandra*, à ovules anatropes et à anthères pourvues d'une double corne ; le *Microcasia*, de Bornéo, comme les trois genres précédents, petite plante à anthères bi-aristées et à ovaires libres, peu nombreux, avec un appendice à peu près sphérique au sommet du spadice.

Les *Zantedeschia* forment avec les *Typhonodorum* une petite sous-série (*Zantedeschiées*), qui appartient à l'Afrique continentale et insulaire. Les premiers n'ont que des fleurs fertiles, soit femelles, soit mâles, dans leur spadice non appendiculé. Les étamines libres sont au nombre de deux ou trois, avec un long filet et une anthère à deux loges poricides. Elles sont représentées par des staminodes dans la fleur femelle, dont l'ovaire a un nombre variable de loges pluri-ovulées. Leur spathe est colorée en blanc ou en jaune, et leurs feuilles sont sagittées. Dans les derniers, dont l'appendice est rudimentaire,

les fleurs mâles ont de quatre à huit étamines, et l'unique loge ovarienne renferme un ou deux ovules ascendants. Les feuilles sont hastées ou triangulaires, et il y a des rudiments aplatis de fleurs mâles entre les fleurs parfaites des deux sexes.

Les *Dieffenbachia* (fig. 293-296), type d'une sous-série particulière (*Dieffenbachieés*), ont des fleurs monoïques, réunies dans un même spadice. Celui-ci possède un axe adné d'un côté à la spathe dans sa portion inférieure. De l'autre côté s'insèrent les fleurs femelles, au-dessus desquelles se trouve une portion occupée par quelques fleurs

Dieffenbachia Segnine.



Fig. 293.
Spadice ($\frac{1}{2}$).

Fig. 294. Spadice,
portion
inférieure.

Fig. 296. Fleur
femelle.

Fig. 295. Spadice,
portion
supérieure.

mâles stériles. Quant aux fleurs mâles fertiles, elles occupent, serrées les unes contre les autres, toute la portion supérieure et cylindrique ou légèrement claviforme de cet axe. Chacune d'elles est formée d'un clou à tige épaisse et courte; à tête plane, polygonale. Sous cette tête s'insèrent de quatre à six anthères sessiles, descendantes, à deux loges qui s'ouvrent au sommet par une sorte de pore ou de fente courte. Les fleurs mâles stériles, clairsemées sur le réceptacle, ont aussi la forme de têtes de clou, lobées, sessiles et sans anthère à la face inférieure. Quant aux femelles, elles sont également sessiles et nues, formées d'un gynécée sous lequel s'insèrent quelques staminodes claviformes, d'un blanc mat, incurvés, un peu renflés au sommet. L'ovaire, à deux ou trois loges, est surmonté d'un court et épais style partagé en un même nombre de lobes papilleux; et chacune des loges

renferme, inséré dans son angle interne, un ovule fertile, plus ou moins obliquement ascendant, anatrophe, à micropyle généralement inférieur et extérieur. Un ovule stérile et rudimentaire accompagne parfois le précédent. Le fruit est composé de baies incluses dans le tube de la spathe, finalement séparé de son limbe. Ce sont des plantes herbacées, vivaces ou suffrutescentes, de l'Amérique tropicale.

Les *Aglaonema* (fig. 297-300), dont les fleurs mâles sont à deux, trois ou quatre étamines, ont souvent des staminodes au pied de l'ovaire, dont la loge unique contient un ovule oblique ou horizontal, plus ou moins complètement anatrophe. Les feuilles sont ovales ou lancéolées; et les fleurs mâles sont nombreuses et pressées jusqu'en haut du spadice, tandis que les femelles, à sommet styloïde très dilaté, sont peu nombreuses et éloignées les unes des autres au niveau de la base du spadice. Ils sont de l'Asie et de l'Océanie tropicales, de même que l'*Aglaodorum*, Aracée aquatique, à feuilles oblongues ou lancéolées,

Aglaonema marantifolium.



Fig. 297. Spadice.



Fig. 298. Fleur mâle.



Fig. 299. Fleur femelle.

Fig. 300. Fleur femelle, coupe longitudinale.

lées, un peu charnues, dont la fleur mâle a trois ou quatre étamines, et dont l'ovaire est creusé d'une ou de deux loges uniovulées; la dilatation apicale du style court, quadrilobée, creusée au centre.

On pourra aussi cantonner les *Peltandra* et les *Anubias* dans deux petites sous-séries distinctes (*Peltandrées* et *Anubiées*). Les uns, de l'Amérique du Nord, ont quelques étamines connées en une masse prismatique, et un seul ou quelques ovules basilaires sur un placenta central déprimé. Ces ovules sont presque complètement orthotropes, à micropyle supérieur. Les autres, de l'Afrique tropicale occidentale, ont le même androcée; mais leurs ovules, presque orthotropes ou imparfaitement anatropes, sont en nombre indéfini sur le large placenta basilaire. Le tube du spadice n'existe pas dans le dernier de ces genres; il est ou nul, ou court et ovoïde dans le premier.

V. SÉRIE DES MONSTERA.

Les *Monstera*¹ (fig. 301-303) ont des fleurs hermaphrodites et nues. Leurs étamines, au nombre de quatre, plus rarement cinq ou six, sont hypogynes, à filet assez large et un peu aplati, atténué tout d'un coup en un connectif étroit sur les côtés duquel s'insèrent deux loges d'anthère² qui le dépassent et s'ouvrent par une fente longitudinale, extrorse ou sublatérale, ne s'étendant pas en général jusqu'en bas. L'ovaire, sessile, a la forme d'un tronc de pyramide renversé. Son sommet, polygonal et tronqué, présente une saillie centrale oblongue, parcourue par un sillon médian horizontal dont les lèvres sont stigmatifères. Les deux loges renferment chacune deux ovules ascendants, supportés par un court funicule, incomplètement anatropes, avec le micro-pyle dirigé en bas et en dehors³. Le fruit est composé de baies nombreuses, dont la portion supérieure se détache finalement de la basilaire. Celle-ci présente alors, sous une mince membrane enveloppante, une ou quelques graines ellipsoïdes ou subcordées, à funicule peu visible, à enveloppe extérieure membraneuse qui se sépare finalement d'un épais tégument testacé. Celui-ci enveloppe un embryon macropode, charnu et dépourvu d'albumen.

On distingue dans ce genre une douzaine d'espèces⁴, toutes amé-

Monstera deliciosa.

Fig. 302. Fleur hermaphrodite.

Fig. 301. Spadice ($\frac{1}{2}$).

Fig. 303. Fleur, coupe longitudinale.

1. ADAMS, *Fam. des pl.*, II, 470 — SCHOTT, in *Wien. Zeitschr.* (1830), 1028; *Melet.*, I, 21; *Gen. Ar.*, t. 75; *Prodr. Ar.*, 358. — ENDL., *Gen.*, n. 1698. — K., *Enum.*, III, 60. — B. H., *Gen.*, III, 991, n. 77. — ENGL., in *N. Act. nat. cur.*, XXXIX, 177 (ramif.); *Arac.*, 255; *Pflanzenfam.*, 120, fig. 77. — *Tornelia* GUTTIER, ex *Linnaea*, XXVI, 382. — SCHOTT, *Prodr. Ar.*, 354; *Gen. Ar.*, t. 74. — *Heteropsis* Miq., in *Linnaea*, XVIII, 70 (non K.). — *Serangium* WOOD. — SALISB., *Gen. pl. Fragm.*, 5 (ex B. H.).

2. A logettes souvent distinctes.

3. A double enveloppe.

4. JACQ., *H. schœnbr.*, t. 184, 185 (*Dracontium*). — VELL., *Fl. Rum.*, ALI., IX, t. 117 (*Dracontium*). — SCHOTT, *Gen. Ar.*, t. 74 (*Tornelia*); in *Est. Bot. Wochenbl.* (1854), 65. — ENGL., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, t. 19-21. — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 426. — K. KOCH, in *Ind. sem. H. berol.* (1855), App., 5. — DE VRIES, *H. Spearn. Ber. gens.* (1839). — GRISEB., *Fl. brit. W.-Ind.*, 509. — LIEBM., in *Vid. Medd. f. Nat. For. Kjob.* (1840), 19. — K. et BOUCH., in *Ind. sem. H. berol.* (1848) (*Philodendron*). — *Bot. Mag.*, t. 5098. — WALP., *Ann.*, III, 499; V, 895.

ricaines, frutescentes et grimpantes, parfois très ramifiées et à branches très développées. Elles portent des feuilles alternes, distiques, oblongues ou lancéolées, insymétriques, entières ou pinnatifides, ou criblées de trous¹. Leur pétiole se dilate en une gaine qui persiste et s'accroît ou tombe. Les spadices terminaux sont solitaires ou groupés en cyme, pédonculés, pourvus d'une spathe ovoïde ou

Spathiphyllum lanceæfolium.




Fig. 305. Fleur.




Fig. 304. Spadice.

Fig. 306. Fleur, coupe longitudinale.

oblongue, plus ou moins longuement apiculée, involutée². Elle s'étale hors de l'anthèse, se referme autour du fruit, puis se détache de l'axe. Elle est plus longue que le spadice, qui est cylindrique, sessile, et qui est couvert de fleurs disposées dans l'ordre spiral et étroitement comprimées entre elles. Les fleurs tout à fait inférieures sont seules stériles, plus ou moins coniques et à ovaire dépourvu d'ovules, à étamines souvent avortées.

Très voisins des *Monstera* sont : les *Alloschemone*, du Brésil ; les *Epipremnum*, de l'Océanie tropicale ; les *Scindapsus*, des régions les plus chaudes de l'Asie et de

l'Océanie ; le *Cuscuaria*, de l'Océanie tropicale ; les *Rhodospatha*, de l'Amérique tropicale ; l'*Anepsias*, du Venezuela ; les *Rhaphidophora*, à la fois océaniques, asiatiques et africains ; les *Stenospermantium*, qui croissent au pied des Andes dans l'Amérique tropicale.

1. Au sujet de ces singulières solutions de continuité, voy. surtout : A. TRÉCUL, *Note sur la formation des perforations que présentent les feuilles de quelques Aroïdées* (in *Ann. sc. nat.*, sér. 4, 1, 37).

2. Souvent épaisse ou coriace, blanche ou jaunâtre, parfois presque charnue et très odorante. Sa base peut se prolonger en une raillie décurrenle de forme variable, à insertion plus ou moins oblique : une sorte de talon.

Les *Spathiphyllum* (fig. 304-306) forment, avec les *Holochlamys*, une petite sous-série (*Spathiphyllées*). Les premiers sont à la fois américains et malais. Leurs fleurs ont un périanthe de quatre à huit folioles bisériées, des étamines hypogynes en même nombre, et un ovaire libre, à deux, trois ou quatre loges, souvent développé en cône allongé ou surbaissé dans sa portion supérieure. Chaque loge ovarienne contient deux ou un plus grand nombre d'ovules ascendants et bisériés. Le spadice est entièrement couvert de fleurs pressées, et sa base est adnée à celle de la spathe. Dans l'*Holochlamys*, herbe de Bornéo, le périanthe a quatre folioles connées inférieurement; l'androcée est formé de quatre étamines hypogynes; et l'ovaire, lobé au sommet, renferme de nombreux ovules ascendants et anatropes. Le port de ces plantes est semblable à celui des *Spathiphyllum*.

VI. SÉRIE DES CALLA.

Les fleurs hermaphrodites des *Calla*¹ (fig. 307-309) sont nues. Leur androcée hypogyne se compose d'étamines, au nombre de six ou plus, dont les filets sont libres, linéaires, comprimés, et dont l'anthère courte a deux loges latérales et ellipsoïdes, déhiscentes vers les bords par une fente longitudinale. Le gynécée libre a un ovaire sessile et uniloculaire, surmonté d'un style très court, à sommet stigmatifère déprimé. Sur le placenta basilaire s'insèrent des ovules, au nombre de quatre ou plus, dressés, anatropes, à micropyle extérieur et inférieur². Le fruit est composé de baies³ rapprochées, à mince

Calla palustris.

Fig. 308. Fleur.



Fig. 307. Spadice.

Fig. 309. Fleur, coupe longitudinale.

1. L., *Gen.*, ed. I, n. 697; ed. VI, n. 1030; *Phil. bot.*, 27 (*Piperistæ*). — J., *Gen.*, 24. — GERTN., *Fruct.*, II, t. 84. — NEES, *Gen. Fl. germ., Monoc.*, III, n. 38. — L.-C. RICH., in *Gusslém. Arch. bot.*, I, t. 2. — K., *Enum.*, III, 58. — SCHOTT, *Melet.*, I; *Gen. Ar.*, t. 69;

Prodr. Ar., 345. — SCHUMM., *Handb.*, t. 278. — ENDL., *Gen.*, n. 1697. — ENGL., *Arac.*, 213; *Pflanzenfam.*, 123. — B. H., *Gen.*, III, 989, n. 72.

2. A double enveloppe.

3. Rouges, pileuses ou un peu anguleuses.

péricarpe, à graines dressées, en nombre variable, à raphé et chalaze turgides, à embryon axile et entouré d'un abondant albumen charnu.

C'est une herbe aquatique, vivace¹, dont le rhizome cylindrique rampe dans la vase ou à sa surface et porte des feuilles alternes, distiques, à pétiole dilaté inférieurement en gaine, à limbe cordé-ovale

ou lancéolé, avec des nervures arquées. Les spadices ont un pédoncule vaginé à la base, pourvu d'une spathe² acuminée et étalée, décurrente à sa base. Les fleurs, pressées les unes contre les autres, sont insérées dans l'ordre spiral au-dessus d'une portion basilaire nue. Elles occupent jusqu'au sommet du spadice. La seule espèce de *Calla* connue³ habite l'Europe tempérée et boréale, l'Asie et l'Amérique septentrionales.

L'*Aronia* (fig. 310-312), herbe aquatique de l'Amérique du Nord, a des fleurs hermaphrodites, plus parfaites en réalité que celles des *Calla*, puisqu'elles sont pourvues d'un périanthe de quatre ou six folioles. Les étamines hypogynes sont en même nombre; et l'ovaire uniloculaire, plongé en partie dans l'axe du spadice,




Fig. 310. Spadice.

Fig. 311. Fleur.

Fig. 312. Gynécée, coupe longitudinale.

renferme un ovule horizontal et incomplètement anatrope. La spathe est étroite et n'enveloppe pas le spadice, porté au-dessus d'elle sur

1. Sur le mode de végétation, A. BRAUN, in *Verh. bot. Ver. Prov. Brandenb.* (1853), I, 84. — ENGL., in *N. Act. nat. cur.*, XXXIX, 916, t. 3, fig. 2.

2. Branche, verdissant autour des fruits.

3. *C. palustris* L., *Spec.*, ed. II, 1373. — LAMK., III., t. 739, fig. 1. — GRÉN. et GODR., *Fl. de Fr.*, III, 332. — H. BN., *Iconogr. Fl. fr.*, n. 235. — *Bot. Mag.*, t. 1831. — *C. aethiopica* GÄRTN., loc. cit. (non L.).

un long pied nu qui simule un pédoncule. C'est le type d'une sous-série (*Aroniées*), à laquelle on a encore rapporté les *Spathyema* et les *Lysichiton*. Les premiers, américains et asiatiques, ont une large spathe fornicuée et longtemps persistante; un spadice court, à peu près sphérique, et un ovaire à une ou deux loges dans lesquelles se trouve un seul ovule descendant. Les derniers, qui croissent également dans l'Asie du Nord-Est et dans l'Amérique du Nord, sont aquatiques comme l'*Aronia*, ont comme lui une spathe étroite, un long spadice stipité; mais leur ovaire a deux loges incomplètes, et, dans chacune d'elles, un ou deux ovules descendants et orthotropes.

VII. SÉRIE DES ACORES.

Les fleurs des Acores¹ (fig. 313-316) sont hermaphrodites et régulières. Leur petit réceptacle convexe porte trois sépales et trois pétales

Acorus Calamus.

Fig. 315. Fleur.

Fig. 313. Portion du rhizome.

Fig. 314. Spadice.

Fig. 316. Ovules.

alternes, à peu près tous semblables entre eux, herbacés, allongés, à

1. *Acorus* L., *Gen.*, ed. 1, n. 296; ed. VI, n. 434; *H. Cliff.*, 137. — J., *Gen.*, 25. — GÆRTN., *Fruct.*, II, t. 84. — LAMX, III, t. 252. — SCHUMER, *Handb.*, I, t. 97. — NEES, *Gen. Fl. germ., Monoc.*, III, n. 37. — L.-C. RICH, in *Guillem. Arch.*, I, t. 3. — SCHOTT, *Gen. Ar.*, t. 9; *Prodr. Ar.*, 577; *Melet.*, I, 22. — K.,

Enum., III, 86. — ENOL., *Gen.*, n. 1708. — ENOL., in *N. Act. nat. cur.*, XXXIX, 170, t. 3, fig. 11 (ramif.); *Arac.*, 215; *Pflanzenfam.*, 118, fig. 78. — B. H., *Gen.*, III, 999, n. 97. — *Calamus* POUF.-DUP., *Lettres à un médecin* (1710), 49, c. tab. — L., *Gen.*, ed. 1, 104. — RIDL., in *Trim. Journ.* (1883), 349.

sommets forniqués et connivents. L'androcée est formé de six étamines hypogynes, superposées chacune à une foliole du périanthe. Leur filet est allongé, aplati, atténué à son sommet en un connectif qui supporte une anthère courte, à deux loges à peu près elliptiques, dépassant le connectif, divergentes en bas et déhiscentes en dedans par une fente longitudinale¹. L'ovaire supère, allongé-obconique, est surmonté d'un cône qui porte à son sommet les papilles stigmatiques. Dans chacune de ses trois loges superposées aux sépales, il y a un placenta qui en occupe la partie supérieure et qui porte plusieurs ovules descendants, orthotropes, à micropyle inférieur², noyés dans

une glu gommeuse qui remplit la loge. Le fruit composé est formé de baies plus ou moins incluses dans le périanthe persistant, et dont les deux ou trois loges renferment quelques graines. Celles-ci sont descendantes, pourvues d'un court funicule, et renferment sous leurs téguments³ un albumen charnu, qui entoure un embryon de même longueur que lui, cylindrique et axile.

On distingue deux espèces⁴ dans ce genre, habitantes des régions tempérées de l'hémisphère boréal. Elles sont herbacées, vivaces, aquatiques ou plus rarement terrestres, aromatiques, et possèdent un rhizome ramifié qui rampe



Fig. 317.
Inflorescence.

Gymnostachys anceps.

Fig. 318. Fleur
hémaphrodite.

sous terre ou dans la vase. Il porte en dessous des racines adventives et en dessus des feuilles distiques, ensiformes, à base équitante. Leur limbe est dressé, étroit ou aplati, à nervures longitudinales. Leur inflorescence a un long pédoncule foliiforme, allongé, terminé par une spathe aiguë, ensiforme, parfois peu développée. Le spadi-

ce est cylindro-conique, supportant un grand nombre de fleurs comprimées, qui s'épanouissent ordinairement de haut en bas.

1. Ses bords se révoquent ensuite.

2. Le tégument interne est souvent prolongé au delà de l'exostome en un tube à bords entiers ou frangés. La base des ovules est accompagnée de poils cloisonnés.

3. L'intérieur charnu, à exostome frangé.

4. L., *Spec.*, 463. — AIT., *H. kew.*, I, 474. — SCHOTT, in *Est. Bot. Zeitschr.* (1859), 101, 357; in *Ann. Mus. lugd.-bat.*, I, 284. — SM.,

Spicil., t. 17. — SIEB., in *Verh. Bot. Gen.*, XII, 2. — MIQ., in *Ann. Mus. lugd.-bat.*, II, 203; III, 192. — GRIF., *lc. pl. as.*, t. 162. — BERTOL., *Pl. nuov. asiat. mem.*, II (1865), 8. — FR. et SAV., *En. pl. jap.*, II, 10. — BOISS., *Fl. or.*, V, 44. — HOOK. f., *Fl. brit. Ind.*, VI, 556. — DUN. et SCHINZ, *Consp. Fl. afric.*, V, 472. — CHAPM., *Fl. S. Un.-St.*, 442. — GRÜN et GODR., *Fl. de Fr.*, III, 332.

Le *Gymnostachys anceps* (fig. 317, 318), herbe vivace de l'Australie, a des fleurs d'Acore, tétrandres et à périanthe tétramère. Leur ovaire n'a qu'une loge uniovulée, et l'ovule orthotrope pend du sommet de la loge. Les feuilles sont étroites, et la portion souterraine de la plante est tubéreuse.

Avec l'inflorescence des Acores, les *Anthurium* (fig. 319-322) ont des fleurs tétramères et tétrandres, et leur ovaire a deux loges latérales, avec dans chacune d'elles un ou deux ovules orthotropes, anatropes ou campylotropes.

Mais ce sont des herbes vivaces ou frutescentes, terrestres, et à tige courte ou longue et grimpante, radicante, avec des feuilles entières, lobées ou partites, et une spathe coriace, ovale ou lancéolée, libre, sessile ou continue avec le pédoncule du spadice. Tels sont les principaux caractères différentiels d'une sous-série (*Anthurées*) qui est formée de ce seul genre de l'Amérique tropicale.

Les *Pothos*, des régions chaudes de l'ancien monde, en sont extrêmement voisins. Leur spathe est persistante, accrescente, comme celle des *Anthurium*. Leur spadice s'épanouit de haut en bas,

Fig. 319. Spadice.

comme celui des Acores; et leur ovaire a une ou trois loges uniovulées. Leur graine renferme un embryon charnu, macropode, sans albumen. Ce sont des lianes. Dans la même sous-série qu'eux (*Pothées*) se rangent les trois genres *Amydrium*, *Heteropsis* et *Anadendron*.

Auprès d'eux, le genre *Zamioculcas* constitue aussi une petite sous-série (*Zamioculcasées*). Il est formé d'herbes vivaces de l'Afrique tropicale orientale, qui ont des feuilles basilaires pinnatiséquées et des fleurs unisexuées, à périanthe tétramère : les inférieures

Anthurium coriaceum.

Fig. 320. Bouton.



Fig. 321. Fleur.



Fig. 322. Fleur, coupe longitudinale.

femelles, à anthères stériles; les supérieures mâles, à gynécée non fertile, plus ou moins rudimentaire.

Dans une autre sous-série, les *Culcasia*, qui sont africains, se caractérisent par des fleurs mâles obpyramidales, à trois ou quatre étamines. L'ovaire de la fleur femelle est à une ou deux loges, avec un sommet stylaire dilaté-pelté. Il n'y a dans chaque loge qu'un ovule ascendant et imparfaitement anatrope. Ce sont des arbustes sarmenteux et grimpants, à feuilles oblongues ou assez souvent cordées. Leurs spadices, solitaires ou fastigiés, sont dépourvus d'appendice; et leur spathe, petite, d'abord dressée, est plus ou moins involutée et se détache bientôt de la base de l'inflorescence. Les graines ont un abondant albumen (*Culcusiées*).

VIII. SÉRIE DES PISTIA.

Souvent rapportés à une famille particulière, les *Pistia*¹ (fig. 323-327) ont des fleurs monoïques et nues. Les mâles sont formées de deux étamines unies en une masse sessile, épaisse, courtement obconique, plus ou moins comprimée et obtusément quadrilobée. Chaque anthère a deux loges courtes, opposées l'une à l'autre et déhiscentes vers leur sommet par une fente courte, finalement allongée, extrorse. Le connectif obtus ne dépasse pas les loges. La fleur femelle est formée d'un ovaire uniloculaire, à base oblique ou presque verticale, qui s'atténue supérieurement en un style plus ou moins arqué, dont le sommet obtus est garni de tissu stigmatique. Le placenta basilaire, large et surbaissé, tend à devenir, vu le mode d'insertion du gynécée, à peu près vertical. Sa surface supérieure porte de nombreux ovules dressés, orthotropes, subcylindriques², à court funicule, à micropyle supérieur³. Le fruit est uniloculaire, indéhiscant⁴, à paroi mince⁵,

1. L., *Fl. zeyl.*, 152; *Gen.*, ed. I, n. 694; ed. VI, n. 1023. — J., *Gen.*, 69 (Hydrocharidées). — LAMK., *Ill.*, t. 733. — TURP., in *Dict. sc. nat.*, Atl., t. 136, 137. — ENDL., *Gen.*, n. 1669. — K., *Enum.*, III, 7. — HEGELM., in *Bot. Zeit.* (1874), n. 39. — ENGL., in *N. Act. nat. cur.*, XXXIX, III, 154; IV, 194, t. 5; *Arac.*, 631; *Pflanzenfam.*, 152, fig. 100. — B. H., *Gen.*, III, 964, n. 5. — ZARA LOUR., *Fl. cochinch.*, 405. — *Apiospermum* KL., in *Abh. Akad. Wiss. Berl.*

(1853), 351. — *Limnonesis* KL., *loc. cit.*, 352, t. 1-3. — KODDA-PAIL REED., *Arac.*, 631; *H. malab.*, XI, 63, t. 32. — *Kiambam-Kitsii* RUMPH., *Herb. amboin.*, VI, 177.

2. Souvent un peu étranglés vers le milieu de leur hauteur.

3. A double tégument. Les ovules apparaissent de bas en haut sur le placenta.

4. Ou se détruisant par putréfaction.

5. Parsemée en dehors de poils courts.

et renferme un nombre très variable de semences oblongues, rugueuses-punctuées, à sommet umboné, et dont les téguments¹ recouvrent un abondant albumen farineux, enveloppant lui-même un embryon axile, bien plus court, obovoïde-allongé.

La seule espèce² du genre est une singulière petite herbe vivace, très variable, qui flotte à la surface des eaux douces, et dont la tige très courte, stolonifère, porte aussi de nombreuses et longues racines

Potamo Stratiotes.

Fig. 326. Graine.

Fig. 323. Spadice, entr'ouvert latéralement.

Fig. 324. Spadice, coupe longitudinale.

Fig. 325. Fruit adné à la spathe.

Fig. 327. Graine, coupe longitudinale.

adventives. Les feuilles, rapprochées en rosette, sont sessiles, obovales-cunéiformes, à nervures flabellées, plus ou moins saillantes à la face inférieure. Les fleurs des deux sexes sont réunies dans un même petit spadice axillaire qu'enveloppe une petite spathe pubérulente et blanchâtre. En bas se voit la portion femelle de l'axe florifère, adnée à la spathe sur la ligne médiane de sa côte. Au delà

1. Ils sont triples : un barillet épais et crustacé, rugueux, doublé en dedans comme en dehors d'une enveloppe membraneuse; l'extérieure brune et molle. En haut, le testa est creusé d'une sorte d'entonnoir, dont le fond aboutit à la saillie brune qui surmonte l'albumen. B-MINDEL a figuré assez nettement les caractères de cette semence (in *Ann. Mus.*, XVI, t. 17).

2. *P. Stratiotes* L. — ENGL., *Arac.*, 634; *Fl. bras.*, III, 11, 212, t. 52. — K., *Enum.*, III, 8. — SCHLEID., in *Bot. Zeit.* (1838), n. 3, p. 19. — H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, I, 66. — HENSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 417 — HOOK.

r., *Pl. brit. Ind.*, VI, 496. — DUR. et SCHIMZ, *Consp. Fl. afr.*, V, 483. — *Bot. Mag.*, t. 4364. — *P. spathulata* MICX. — SCHLEID. — *P. minor* BL. — *P. crispata* BL. — *P. occidentalis* BL. — *P. Weigeltiana* PRESL. — *P. amazonica* PRESL. — *P. africana* PRESL. — *P. Leprieuri* SCHLEID. — *P. ægyptiaca* SCHLEID. — *P. obcordata* SCHLEID. — *P. commutata* SCHLEID. — *P. linguiformis* SCHLEID. — *P. natalensis* KL. — *P. Cumingii* KL. — *P. brasiliensis* KL. — *P. Schleideniana* KL. — *P. lezeensis* KL. — *P. Turpini* K. KOCH. — *Apiospermum obcordatum* KL. — *Limnonesis commutata* KL. — *L. Friedrichshalliana* KL.

de l'ovaire de l'unique fleur femelle, l'axe demeure assez longuement adné; après quoi il devient libre dans une courte portion qui se termine par un verticille de quelques fleurs mâles, latéralement insérées. La spathe est plissée de chaque côté, et la base du spadice porte des organes neutres dilatés et une écaille plus ou moins développée qui se détache bientôt. Toutes les régions tropicales des deux mondes possèdent les formes si variables de cette petite plante, sauf, croit-on, les îles de l'Océan Pacifique et la Nouvelle-Hollande.

Cette famille est indiquée dans la liste des plantes du Jardin de Trianon par B. DE JUSSIEU, sous le nom d'*Aroideæ*¹. Il y comprenait les *Lemna* et, malheureusement, les *Potamogeton*, *Ruppia*, *Saururus* et *Menyanthes*. ADANSON², moins heureux encore dans la délimitation du groupe, y plaça des Cryptogames aquatiques. NECKER, qui adopta la dénomination d'*Araceæ*³ en 1770, adjoignit à la famille les Butomées et les *Sparganium*. Elle fut mieux délimitée par BLUME⁴, puis surtout par SCHOTT, qui en fit l'objet de travaux spéciaux, très nombreux et très remarquables⁵. Ils ont servi de point de départ à M. ENGLER, dont on ne saurait trop louer les recherches persévérantes⁶. Celles-ci devaient inévitablement nous guider; elles ont abouti à la division suivante de la famille en huit séries :

I. ARÉES⁷. — Fleurs monoïques, rarement disposées sur toute la surface du spadice, bien plus souvent surmontées d'un appendice parfois très allongé. Fleurs nues ou très rarement périnthées; les mâles formées d'une ou quelques étamines libres ou unies; les femelles à ovaire uniloculaire, pluriovulé, rarement pluriloculaire. Graines

1. In A.-L. Juss. *Gen.*, lxiv. — J., *Gen.*, 23, Ord. 1. — VENT., *Tabl.*, II, 83. — K., *Enum.*, III, 1. — ENDL., *Gen.*, 232, Ord. 72. — B. H., *Gen.*, III, 955, Ord. 191.

2. *Fam. des pl.*, II (1763), 461, Fam. 56 (*Ara*).

3. In *Act. Acad. theod.-palat.*, II, 462. — LINDL., *Nat. Syst.*, ed. II, 363; *Veg. Kingd.*, 127, Ord. 36.

4. *Rumphia*, I, 75 (1835).

5. *Araceen* Betreff. (1854); *Synops. Aroidearum* (1856); *Icon. Aroid.* (1857); *Gen. Aroid.* (1858); *Prodr. Syst. Aroid.* (1860).

6. *Vergl. Unters. morph. Werhältn. Arac.*, in *N. Act. Acad. Leop.-Car. nat. cur.*, XXXIX (1876); *Morph. Arac.*, in *Bot. Zeit.* (1876); in *Mart. Fl. bras.*, III, II (1878), 23; in *DC.*

Monogr. Phaner., II (1879); *Beitr. z. Kenntn. Arac.*, in *Bot. Jahrb.*, I, 179, 480; IV, 59, 341; V, 141, 287; XV, 447; *Pflanzenfam.*, II, 3 (Lief. 9), p. 102. A Kew, M.-N.-E. BROWNE a également fait de très nombreuses et intéressantes recherches sur les Aracées.

7. *Aroideæ* ENGL., in *N. Act. nat. cur.*, XXXIX, 150 (18); *Arac.*, 73, Subfam. 8. — *Arineæ* B. H., *Gen.*, III, 957, Trib. 1 (part.). — *Staurostigmoidææ* ENGL., *Arac.*, 72, Subfam. 7. — *Zomicarpeæ* ENGL. — B. H., *Gen.*, III, 958, Trib. 3. — *Stilochitonææ* SCHOTT. — ENGL. — B. H., loc. cit., 958, Trib. 2. — *Arisareææ* SCHOTT, *Melef.*, I, 16 (Subtrib.). — *Allechuchieææ* SCHOTT, *Syn. Ar.*, I, 1 (Trib.). — *Pinellinææ* SCHOTT. — *Ambrosiniææ* SCHOTT. — *Cryptocorinææ* SCHOTT.

droites ou arquées, albuminées. — Plantes vivaces, terrestres ou de marais, souvent tubéreuses, ordinairement lactescentes, à feuilles diverses; les nervures réticulées. — 27 genres.

II. COLOCASIÉES¹. — Fleurs monoïques dans un spadice ordinairement inappendiculé, à périanthe nul ou rarement court, cupuliforme. Étamines connées en une seule masse prismatique ou obpyramidale, sessile ou peltée. Ovaire 1-pluriloculaire. — Herbes vivaces, tubéreuses ou à tige aérienne épaisse, rarement frutescentes et grimpantes. — 13 genres.

III. — AMORPHOPHALLÉES². — Fleurs hermaphrodites ou monoïques, nues ou périanthées, souvent dimères. Embryon macropode, sans albumen. — Herbes vivaces, tubéreuses ou à sympode rampant; plus rarement arbustes grimpants ou arborescents. Feuilles alternes, sagittées, pédalées ou triséquées, à nervures réticulées. — 20 genres.

IV. PHILODENDRÉES³. — Fleurs monoïques, nues; les étamines souvent unies en groupes prismatiques ou obpyramidaux. Staminodes souvent sous le gynécée. Ovaire à plusieurs (2-8) loges; les ovules orthotropes ou anatropes. Graines albuminées, à embryon axile. — Plantes frutescentes, grimpantes, ou suffrutescentes, à entre-nœuds courts. Feuilles alternes, à nervures latérales subparallèles. Spadice souvent (mais non constamment) inappendiculé. — 19 genres.

V. MONSTÉRÉES⁴. — Fleurs hermaphrodites, nues ou rarement périanthées, le plus souvent dimères. Ovules anatropes ou amphitropes. — Plantes ordinairement frutescentes et grimpantes, à feuilles distiques, le plus souvent antidromes, à nervures latérales plus ou moins richement réticulées. — 11 genres.

VI. CALLÉES⁵. — Fleurs hermaphrodites, nues ou souvent périanthées, à étamines hypogynes 4 ou ∞ . Ovaire à une ou deux loges uni- ou pluriovulées. Ovules orthotropes ou plus ou moins complètement

1. *Colocasieæ* SCHOTT, *Melet.*, I, 18 (Subtrib.). — ENGL., in *N. Act. nat. cur.*, XXXIX, 148 (66); *Arac.*, 71 (Subfam. 6). — B. H., *Gen.*, III, 958, Trib. 5. — *Caladieæ* SCHOTT, *Melet.*, I, 18 (part.). — *Syngoninæ* SCHOTT (Subtrib.). — *Colocasioidæ* ENGL., *Pflanzenfam.*, 113, 137.

2. *Amorphophalleæ* ENGL., *Pflanzenfam.*, 112, IV, 11. — *Lasioideæ* ENGL., in *N. Act. nat. cur.*, XXXIX, 144 (42) (Subfam.); *Pflanzenfam.*, 112, IV. — *Lasieæ* B. H., *Gen.*, III, 962 (Subtrib.).

3. *Philodendreaæ* SCHOTT, *Melet.*, I, 19 (Subtrib.); *Syn. Ar.*, I, 71 (Trib.). — B. H., *Gen.*, III, 959, Trib. 6. — *Philodendroidæ*

ENGL., in *N. Act. nat. cur.*, XXXIX, 146 (114) (Subfam. 4); *Pflanzenfam.*, 112, V. — *Richardieæ* SCHOTT, *Melet.*, I, 20 (Subtrib.); *Syn. Ar.*, I, 131 (Trib.). — *Pellandrinæ* SCHOTT, *Syn. Ar.*, I, 50 (Subtrib.).

4. *Monsterinæ* SCHOTT, *Prodr. Ar.*, 346 (Subtrib.). — *Monsteroideæ* ENGL., in *N. Act. nat. cur.*, XXXIX; *Arac.*, 64 (Subfam. 2); *Pflanzenfam.*, 112, II.

5. *Calleeæ* REICHB., *Consp.*, 44. — ENDL., *Gen.*, 239 (Trib.). — B. H., *Gen.*, III, 961, Trib. 9 (part.). — *Calloideæ* ENGL., *Pflanzenfam.*, 112, III. — *Callaceæ* REICHB. — ENDL. (part.). — *Orontiacæ* R. BR., *Prodr.*, 337. — *Orontieæ* SCHOTT, *Melet.*, I, 22.

anatropes. Embryon axile ou macropode et sans albumen. — Herbes vivaces, à rhizome rampant ou à tubercule souterrain. Feuilles basilaires, distiques au moins au jeune âge, à nervures latérales nombreuses. — 4 genres.

VII. ACORÉES¹. — Fleurs hermaphrodites, périnthées ou rarement nues. Étamines hypogynes 4-6. Ovaire à une ou plusieurs loges 1-pluriovulées. Ovules descendants orthotropes, ou incomplètement anatropes, ventrifixes, à micropyle inférieur. — Herbes vivaces ou arbustes grimpants, à feuilles basilaires ou alternes sur la tige; les nervures latérales réticulées. — 9 genres.

VIII. PISTIÉES². — Fleurs nues; la femelle solitaire verticalement insérée vers la base du spadice, adnée à la spathe; les mâles peu nombreuses autour du sommet libre de l'axe du spadice. Ovules nombreux, basilaires et orthotropes. — Herbe vivace et stolonifère, aquatique, à feuilles sessiles, disposées en rosette. — 1 genre.

Ainsi constituée, cette famille très naturelle comprend 104 genres³ et environ 950 espèces, qui habitent toutes les régions tropicales et sous-tropicales des deux mondes⁴. En Europe, elle est représentée par les seuls genres *Acore*, *Gouet*, *Dracunculus*, *Arisarum*, *Calla*, *Biarum*, *Helicodiceros*, *Ambrosinia*. Les cinq premiers seuls appartiennent à notre pays.

On ne peut méconnaître les étroites affinités de cette famille avec les Typhacées, qui la relie aux Alismacées et aux Najadacées par l'intermédiaire des *Sparganium*; ni avec les Lemnacées, que plusieurs auteurs y ont fait rentrer. D'ailleurs, les Aracées constituent un groupe tout à fait à part par leur spadice, qui n'a rien de commun avec celui des Palmiers, non plus que leur spathe⁵. Celle-ci, alors qu'elle donne insertion sur la face interne de sa côte aux groupes floraux, rappelle assez bien celle des *Spathanthus* parmi les Rapatéacées; mais la fleur de ces dernières, par son périnthe, son androcée et

1. *Acoreæ* LINDL., *Veg. Kingd.*, 194 (Trib.). — B. H., *Gen.*, III, 963 (Subtrib.). — *Acorinæ* LINK, *Enum.*, I, 304 (*Juncinearum* Subord.). — *Acoraceæ* LINDL., *Nat. Syst.*, ed. II, 365. — *Zamioculcaseæ* ENGL., *Pflanzenfam.*, 116, 4.

2. *Pistieæ* REICHB., *Nom.*, 32 (Subdiv.). — *Pistiaceæ* H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, I, 81 (Sect.). — AGH, *Aphor.*, 130 (Ord.). — LINDL., *Nix. pl.*, 35 (Ord.). — A. JUSS., in *Dict. d'Orb.*, XII, 416 (Fam.). — SPACH, *Suit. à Buff.*, XII, 36 (*Callacearum* Trib.). — *Pistioideæ* ENGL., *Arac.*, 77 (Subfam. 9); *Pflanzenfam.*, 152, VIII.

3. Sans compter l'*Arisacontis* SCHOTT, *Prodr. Ar.*, 415, genre douteux, de Radack, dont on ne connaît que la feuille.

4. Pour les tableaux détaillés de la distribution géographique des Aracées, voy. ENGL., *Arac.*, 36; in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 219, 221; *Pflanzenfam.*, 110.

5. Celle-ci est remarquable par l'élévation plus ou moins considérable de température qui se produit dans son intérieur lors de la floraison; phénomène étudié par un grand nombre d'auteurs, tous cités par M. ARCANGELI (in *N. Giorn. bot. ital.*, XV, 92, not.).

son gynécée, appartient au type pluricarpellé des Liliacées. Les Aracées sont en même temps très spéciales au point de vue histologique¹, qui a occupé beaucoup d'observateurs². Leurs tissus, riches en cristaux, peuvent aussi être caractérisés par des réservoirs à latex³; mais ce trait d'organisation est loin d'être constant. On a aussi remarqué dans ces plantes des cellules particulières, plus ou moins ramifiées, auxquelles on a attribué des rôles variables⁴. A ces particularités des tissus répondront naturellement quelques-unes des propriétés dont nous allons actuellement nous occuper.

USAGES⁵. — Les Aracées sont, avant tout, remarquables par l'abondance de la fécule que renferment leurs renflements souterrains; mais cette substance ne peut devenir alimentaire que quand elle a été débarrassée des principes âcres et volatils que la dessiccation et la coction dans l'eau font en général disparaître. Frais, leur suc propre est souvent d'une saveur brûlante, irrite énergiquement la peau et les muqueuses et peut produire chez l'homme et les animaux les accidents les plus terribles. Les Colocases et les *Alocasia* sont, à ce point de vue, avec raison redoutés, et beaucoup d'autres Aracées moins connues ont les mêmes propriétés délétères. Elles s'observent

1. Et aussi par leurs organes végétatifs: ENGL., *Vergl. Unters. ueb. d. morphol. Verhältn. d. Arac.*, in *Nov. Act. K. leop.-carol. Akad.*, XXXIX, (1877), n. 3, 4; *Arac.*, 15; in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 29; *Pflanzenfam.*, 102.

2. V. TIEGH., in *Ann. sc. nat.*, sér. 5, VI, 72 (1866). — ENGL., *Arac.*, 2; in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 31, t. 2-5; *Pflanzenfam.*, 105, fig. 73.

3. M. ENGLER a appliqué ce caractère à la classification, distinguant des sous-familles des *Pothoideæ* et *Monsteroideæ* dans lesquelles les faisceaux fibro-vasculaires ne renferment pas de laticifères, tandis que les *Lasioideæ* en contiennent de simples, rarement anastomosés. Ceux des *Philodendroideæ* et *Aglaonemoideæ* sont simples. Ceux des *Colocasiodeæ* sont dits « *fusione nata, anastomose hinc inde inter se conjuncta* ». Dans les *Staurostigmioideæ*, les cellules à latex ne sont pas anastomosées. Elles sont disposées en séries rectilignes de chaque côté du phloème, de même que dans les *Aroideæ*; et les *Pistioideæ* n'ont pas de laticifères. Son mode de classification anatomique a été jugé (B. H., *Gen.*, III, 956) de la sorte: « *Nobis judicibus infelicitèr pro syste-*

mate Schottiano novum proposuit ad characteres histologicos axis incrementi conditum, quod nobis videtur mancum quoad explanationem affinitatum naturalium, ut et modum generum determinandorum. » Certaines feuilles d'Aracées laissent sortir de grandes quantités d'eau par leurs stomates (voy. RAMEY, in *C. rend. Ass. fr.*, IV, 731; in *Bull. Soc. Linn. Par.*, 29). Les phénomènes de floraison et d'impollinisation par les insectes de plusieurs Aracées ont été l'objet de recherches et de discussions intéressantes (voy. ARCANJ., in *N. Giorn. bot. ital.* (1879), 24; (1883), 72. — DELP., *Ull. obs. Dichog.* (1875), 223).

4. On les a souvent nommées des poils intercellulaires. H. SUEUR (in *Adansonia*, VII, 292) les a le premier considérées comme des « cellules consolidantes ». Les cavités ovariennes des Aracées sont encore remarquables par l'abondant mucus gommeux ou gélatineux qui enduit les ovules et par les poils particuliers qui entourent la base des ovules.

5. ENDL., *Enchirid.*, 130. — LINDL., *Veg. Kingd.*, 128. — ROSENTH., *Syn. plant. diaphor.*, 138, 1087. — ENGL., *Arac.*, 110; in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 224.

aussi, quoique avec moins d'intensité, chez nos Gouets communs, notamment l'*Arum maculatum*¹ (fig. 263-270) et l'*A. italicum*² (fig. 271), dont les tubercules sont drastiques, caustiques, mais deviennent émollients après une cuisson prolongée. Mais alors aussi ces tubercules sont comestibles et ont souvent nourri l'homme dans les temps de disette. Leur fécule, débarrassée de tout suc irritant, a pu servir non seulement d'aliment, mais a été employée en grand à la préparation des dextrines et des alcools³. Pour un grand nombre de populations des régions tropicales, les tubercules des *Colocasia*, principalement du *C. esculenta*⁴ (fig. 277-280) constituent un aliment analogue à la Pomme de terre et aux *Tacca*. Aussi ces plantes ont-elles été cultivées de toute antiquité en Égypte, dans l'Inde, et le sont-elles aujourd'hui dans la Polynésie, en Afrique et dans l'Amérique tropicale. Les autres Aracées comestibles des tropiques sont surtout

1. L., *Spec.*, 1370. — BLACKW., *Herb.*, t. 228. — HAYNE, *Arzneigew.*, 13, t. 32. — BRANDT, *Giftgew.*, t. 7. — REICHB., *Ic. Fl. germ.*, VII, t. 8. — GREN. et GODR., *Fl. de Fr.*, III, 330. — H. BN, *Iconogr. Fl. fr.*, n. 214; *Tr. Bot. méd. phanér.*, fig. 3474-3478; *Herbor. par.*, 87, c. xyl. — A. vulgare LAMK, *Fl. fr.*, III, 357. — A. pyrenæum DUF. — A. gracile UNVERR. — A. Zelebori SCHOTT. — A. Malyi SCHOTT. — A. intermedium SCHUR. — SCHOTT, *Prodr.*, 91. — A. Besserianum SCHOTT, in *Est. Bot. Zeitschr.* (1858), 349. — A. alpinum SCHOTT et KOTSCH., in *Linnæa* (1851), 15 (*Gouet commun*, Aron, *Vaquette*, Baratte, Chevalet, Cheval-bayard, *Pied-de-nez*, Giron, *Giraude de moine*, Cornet, *Claujit*, *Marquette*, Pilon, *Religieuse*, *Thourenx*, *Fuseau*, *Manteau de la Vierge*, *Chou-potvre*, *Contre-feu*, *Langue de bœuf*, *Herbe-à-pain*, *Mourride*, *Pain de crapaud*, *P. de lièvre*, *Picotin*, *Epiteste*, etc.).

2. MILL., *Dict.*, I, n. 2. — LAMK, *Dict.*, III, 9. — W., *Spec.*, IV, 484. — REICHB., *Ic. Fl. germ.*, VII, t. 12. — GREN. et GODR., *Fl. de Fr.*, III, 330. — ENGL., *Arac.*, 591, n. 10. — A. numidicum SCHOTT. — A. albispalum hort. — A. maculatum ALL. (non L.). — A. byzantinum SCHOTT, *Ic. Ar.*, t. 34, 35. — A. ponticum SCHOTT. — A. trapezuntinum SCHOTT. — A. concinnum SCHOTT. — A. marmoratum SCHOTT. — A. Nickeli SCHOTT. — A. canariense WEBB et BERTHEL., *Hist. Canar.*, III, 293.

3. L'A. *Dioscoridis* SIBTH. et SM., *Prodr. Fl. græc.*, II, 245; *Fl. græc.*, t. 947, cultivé en Orient, est emménagogue, abortif, employé au traitement des angines. En Abyssinie, on mange les tubercules de l'A. *abyssinicum* A. RICH., *Tent. Fl. abyss.*, 332 (*Ambalche*), qui est probablement le *Sauromatum abyssinicum* SCHOTT, *Syn. Ar.*, I, 25. — ENGL., *Arac.*, 569, n. 2.

4. SCHOTT, *Syn. Ar.*, 41; *Melet.*, I, 18. — K., *Enum.*, III, 37. — C. *Antiquorum* SCHOTT, *Melet.*, I, 18; *Syn. Ar.*, 40; *Prodr. Ar.*, 138. — ENGL., *Arac.*, 491. — *Bot. Mag.*, t. 7364. — C. *Fontanesii* SCHOTT. — C. *acris* SCHOTT. — C. *euchlora* K. KOCH. — C. *nymphæifolia* K. — *Arum esculentum* L. — A. *Colocasia* L., *Spec.*, ed II, 1368. — WIGHT, *Ic.*, III, t. 786. — A. *pellatum* LAMK. — A. *colocasioides* DESF. — A. *nymphæifolium* ROXB. — WIGHT, *Ic.*, III, t. 786. — *Caladium colocasioides* AD. BR. — C. *esculentum* VENT., *H. Cels.*, 30. — C. *nymphæifolium* VENT. — *Alocasia illustris* BULL., ex *Fl. Mag.*, t. 107 (*Chou caraïbe*, *Songe*, *Grand Arum*, *Gingembre d'Égypte*, *Eddoas-Kalo*, *Taro* des Polynésiens). Son suc est d'une acreté extrême et sert de médicament. Les *Alocasia* sont souvent aussi alimentaires et se cultivent comme tels dans les régions tropicales des deux mondes. Tel l'A. *macrorrhiza* SCHOTT, in *Est. Bot. Wochenbl.* (1854), 409. — ENGL., *Arac.*, 502, n. 6; in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 202, t. 46, 47 (fig. 281-284). — *Arum macrorrhizum* L., *Fl. zeyl.*, 327. — A. *mucronatum* LAMK. — A. *peregrinum* L. — *Colocasia macrorrhiza* SCHOTT. — C. *odora* AD. BR. (part.). — *Caladium odoratum* LODD., *Bot. Cab.*, t. 416. — C. *odorum* LINDL., *Bot. Reg.*, t. 641. — C. *glycyrrhizum* FRAS. — *Arum indicum sativum* RUMPH., *Herb. amboin.*, V, t. 106 (*Tara*, *Kopeh*). On confond assez souvent avec cette espèce l'A. *odora* K. KOCH, *Ind. sem. H. berol.* (1854), App., 5. — ENGL., *Arac.*, 503, n. 7. — A. *commutata* SCHOTT. — *Arum odorum* ROXB. — WIGHT, *Icon.*, III, t. 797, qui a les mêmes propriétés et dont le suc frais est d'une acreté extrême. Ces plantes sont d'ailleurs fréquemment prises, dans les cultures ornementales, pour de vraies *Colocases*.

des *Caladium*¹ et des *Xanthosoma*². On mange non seulement leurs tubercules, mais parfois aussi leurs bourgeons et leurs feuilles. Le *Peltandra virginica*³ est alimentaire, non seulement par son tubercule, mais aussi par son spadice. Du *Monstera deliciosa*⁴ (fig. 301-303), ce qu'on consomme, c'est le fruit composé, sucré et parfumé, un peu fade, dont la saveur a été souvent comparée à celle de l'Ananas. Il y a peu d'autres Aracées à péricarpes comestibles. Le *Dracunculus vulgaris*⁵, belle espèce de l'Europe méridionale, a toutes les propriétés de nos *Arum*; on a prétendu, vraisemblablement à cause des taches de ses pétioles et de sa hampe, qu'il guérissait les morsures des serpents venimeux. Une autre espèce indigène, l'*Arisarum vulgare*⁶ (fig. 272-276), a un tubercule comestible quand il est cuit. Le *Calla palustris*⁷ (fig. 307-309), herbe de nos marais, était vanté par les anciens comme diaphorétique et alexipharmaque. Dans le nord de l'Europe, on fait, dit-on, du pain avec son rhizome en cas de disette. En Amérique, le *Spathyema fœtidum*⁸ passe pour un bon

1. Notamment le *C. bicolor* VENT., *J. Cels*, t. 30. — ENGL., *Arac.*, 457, qui donne tous les jours à la culture de si nombreuses variétés ornementales, parmi lesquelles figure le *C. Pæcile* SCHOTT, à tubercule comestible et à sève médicinale.

2. Surtout le *X. sagittifolium* SCHOTT, *Melet.*, I, 19. — *X. utile* KOCH et BOUCH., *Ind. sem. H. berol.* (1854). — ENGL., *Arac.*, 469, n. 1. — *Caladium xanthorrhizon* W., des Antilles et du Brésil, qui est comestible par sa portion souterraine; de même que le *X. edule* SCHOTT, *Melet.*, I, 19, de la Guyane.

3. RAFIN., in *Journ. phys.* (1819), 102. — SCHOTT, *Gen. Ar.*, t. 41, fig. 16-25. — ENGL., *Arac.*, 330. — *Arum virginicum* L. — PURSH, *Fl. Am. sept.*, II, 399. — *Calla virginica* MICHX. — *Lecontea virginica* TORR., *Comp.*, 358. — *Peltandra virginica* SCHOTT. — *Besselaeria virginica* BECK.

4. LIEBM., in *Vid. Medd. f. Nat. For. Kjob.* (1849), 19. — ENGL., *Arac.*, 265; *Fl. bras.*, III, II, 112. — *M. Lennea* K. KOCH. — *Tornelia fragrans* GUTT., ex *Linnaea*, XXVI, 382. — SCHOTT, *Gen. Ar.*, t. 74. — *Philodendron pertusum* K. et BOUCH., in *Ind. sem. H. berol.* (1848) (*Pina anona* des Mexicains). Ses feuilles sont également employées en médecine. Le *M. Adansonii* SCHOTT est usité comme irritant et rubéfiant. On cultive fréquemment ces espèces dans nos serres.

5. SCHOTT, *Melet.*, I, 17; *Gen.*, *Ar.*, t. 22. — K., *Enum.*, III, 29. — PARLAT., *Fl. ital.*, II, 250. — ENGL., *Arac.*, 602. — *D. creticus* SCHOTT. — *Arum Dracunculus* L., *Spec.*, 1367. — LAMK., *Ill.*, t. 740, fig. 2. — SIBTH. et SM., *Fl. græc.*, t. 946. — GREN. et GODR., *Fl. de Fr.*,

III, 329 (*Serpentaire*). Le *D. canariensis* K. a les mêmes propriétés. On cite des cas de migraine intense et de vomissements produits par les émanations de leurs spadices.

6. TARG.-TOZ., in *Ann. Mus. Flor.*, II, 266. — REICHB., *Jc. Fl. germ.*, VII, t. 7. — PARLAT., *Fl. ital.*, II, 235. — MOGGR., *Contr. Fl. Ment.*, t. 47. — ENGL., *Arac.*, 561. — *A. Libani* SCHOTT. — *A. Forbesii* SCHOTT. — *A. Jacquini* SCHOTT. — *A. Clusii* SCHOTT. — *A. tingitanum* SCHOTT. — *A. subersertum* WEBB. — *A. Vestlingii* SCHOTT. — *A. Balansanum* SCHOTT. — *A. subalpinum* KOTSCH. — *A. crassifolium* SCHOTT. — *Arum Arisarum* L. — JACQ., *H. schænbr.*, II, t. 192. — GREN. et GODR., *Fl. de Fr.*, III, 331. — *A. incurvatum* LAMK (*Capuchon*).

7. L., *Spec.*, ed. II, 1373. — SCHUHR, *Handb.*, t. 278. — SCHOTT, *Gen. Ar.*, t. 69. — HAYN., *Arzneigew.*, IV, t. 5. — NEES, *Gen. Fl. germ.*, *Monoc.*, II, t. 4. — GREN. et GODR., *Fl. de Fr.*, III, 332. — H. BN., *Iconogr. Fl. fr.*, n. 235. — ENGL., *Arac.*, 214. — *Calla æthiopica* GÆRTN., *Fruct.*, II, 20, t. 84, fig. 2 (non L.). — *Prouvençalia palustris* POURF.-DUPET., *Lett. à un médecin* (1710), 45, c. tab. — *Dracunculus aqualilis* J. BAUH. — DOD. (*Chou-calle*).

8. *Symplocarpus fœtidus* SALISB. — NUTT., *Gen.*, 105. — TORR., *Fl.*, I, 181. — SCHOTT, *Gen. Ar.*, t. 90. — ENGL., *Arac.*, 213. — *Bot. Mag.*, t. 3224. — *Dracontium fœtidum* L. — *Ictodes fœtidus* BIGEL., *Med. Bot.*, II, 41, t. 24. — *Pothos fœtidus* MICHX., *Fl. bor.-amer.*, II, 186. — PURSH, *Fl. Am. sept.*, II, 398. — *Bot. Mag.*, t. 836. — *P. Putorii* BAST. (*Skunk-Cabbage*). C'est probablement à cause de sa fétidité qu'on l'a prescrit comme antispasmodique.

remède de la bronchite chronique et de l'asthme. Mais le plus célèbre dans l'antiquité des médicaments empruntés à cette famille est l'Acore vrai¹ (fig. 313-316). Son parfum le rend stimulant, stomachique; il est aussi sudorifique et odontalgique. Il y a longtemps qu'on a proposé de le substituer à un certain nombre de végétaux odoriférants d'origine exotique et d'un prix élevé. Le parfum est plus suave encore dans la belle spathe blanche du *Zantedeschia æthiopica*², qu'on cultive si souvent comme plante ornementale et dont le rhizome s'emploie dans son pays natal aux mêmes usages médicaux que celui des Gouets. Il en est de même pour les tubercules des *Homaidia Bovei*³, *Russelliana*⁴ et *tenuifolia*⁵, plus ou moins usités en Orient. Le *Pistia Stratiotes*⁶ (fig. 323-327) a longtemps joui d'une réputation, peut-être exagérée, comme dépuratif, antisiphilitique; on le prescrit dans l'Inde et en Égypte contre les blessures, les abcès, les affections du poumon et du rein. Dans l'Inde, le *Lagenandra toxicaria*⁷, dont le nom spécifique indique assez les propriétés dangereuses, est employé dans les usines pour hâter la cristallisation des sucres granulés. Un grand nombre d'*Arisæma* sont utiles: l'*A. atrorubens*⁸, de l'Amérique du Nord, préconité comme tonique, stimulant, antirhumatismal. Son rhizome pulvérisé s'emploie aussi comme cosmétique, et sa fécule constitue une sorte inférieure d'Arrow-root. Les *A. Dracontium*⁹ et *pentaphyllum*¹⁰ servent aux

1. *Acorus Calamus* L., *Spec.*, 462. — LAMK., *Ill.*, t. 252. — SCHUHR, *Handb.*, I, t. 97. — HAYN., *Arzneigew.*, VI, t. 31. — TORR., *Fl.*, 359. — NEES, *Gen. Fl. germ.*, *Monoc.*, II, t. 3. — SCHOTT, *Gen. Ar.*, t. 98, fig. 1-13. — GUIB., *Drog. simpl.*, éd. 7, II, 89, fig. 330. — BERG et SCHM., *Darst. off. Gew.*, t. 8, C. — GREN. et GODR., *Fl. de Fr.*, III, 332. — H. BN, *Tr. Bot. méd. phanér.*, fig. 3484-3487; *Herbor. par.*, 88. — *A. Commersonii* SCHOTT. — *A. triqueter* TURCZ. — *A. commutatus* SCHOTT. — *A. angustifolius* SCHOTT. — *A. Griffithii* SCHOTT. — *A. Tatarinowii* SCHOTT. — *A. Casia* BERTOL. — *A. nilaghiensis* SCHOTT. — *A. spurius* SCHOTT. — *A. Belengeri* SCHOTT. — *Calamus aromaticus* auct. vet. — POURF.-DUPET., *Lett. à un médecin* (1710), 49, c. tab. (Roseau odorant, *R. aromatique*, *Galanga des marais*).

2. SPRENG. — H. BN, in *Bull. Soc. Linn. Par.*, 254. — ENGL., *Pflanzenfam.*, 136. — *Calla æthiopica* L., *Spec.*, 1373. — *Bot. Mag.*, t. 832. — *Richardia africana* K., in *Ann. Mus.*, IV, t. 20. — ENGL., *Pflanzenfam.*, 327. — *Colocasia æthiopica* SPRENG. — LINK, *Handb.*, I, 267. — *Arodes æthiopica* O. K. (*Arum d'Afrique*).

3. O. K., *Revis.*, 742. — *Biarum Bovei* BL., *Rumphia*, I, t. 29. — ENGL., *Arac.*, 577. — *Ischarum Bovei* SCHOTT. — *I. dispar* SCHOTT. — *I. Haenseleri* SCHOTT.

4. *Biarum Russellianum* SCHOTT. — ENGL., *Arac.*, 579. — ? *B. Homaid* BL.

5. *Biarum tenuifolium* SCHOTT. Var. (?) du précédent.

6. Voy. p. 449, not. 2.

7. DALZ., in *Hook. Journ. Bot.*, IV, 289; V, t. 4. — ENGL., *Arac.*, 621. — *L. ovata* THW. — *Arum ovatum* L. — *Caladium ovatum* VENT. — *Cryptocoryne ovata* SCHOTT. — *Karin-pola* RHEED, *H. malab.*, XI, t. 23.

8. BL., *Rumphia*, I, 97. — ENGL., *Arac.*, 535, n. 2. — *Arum atrorubens* AIT. — BECK, *Bot.*, 381. — *A. triphyllum* L. (part.). — MICHX., *Fl. bor.-amer.*, II, 188. — PURSH, *Fl. Amer. sept.*, II, 399.

9. SCHOTT, *Melet.*, I, 17. — ENGL., *Arac.*, 547, n. 20. — *Arum Dracontium* L., *Spec.*, 1368. — *Arisæma Boscii* BL. — *A. Plukenetii* BL.

10. SCHOTT, *Melet.*, I, 17. — ENGL., *Arac.*, 560. — *Arum pentaphyllum* L., *Spec.*, 964. — LOUR., *Fl. cochinch.*, 533 (*Tien nan sin*).

mêmes usages que nos Gouets¹. Au Brésil, le *Zomicarpa Pythonium*² est recherché par les Indiens comme remède de la morsure des Crotales. Le *Typhonium divaricatum*³ est prescrit dans l'Inde comme antidiarrhéique, et le *T. trilobatum*⁴ a les qualités de nos *Arum*. Le *T. cuspidatum*⁵ et le *Theriophonum minutum*⁶, de l'Asie et l'Océanie tropicales, sont astringents et antidiarrhéiques, antientéralgiques. Les *Amorphophallus* sont presque tous cités comme remèdes de la morsure des serpents venimeux et comme emménagogues⁷. Plusieurs d'entre eux ont une portion souterraine riche en fécule, et par suite alimentaire. Le *Remusatia vivipara*⁸ est aussi une plante alexipharmaque. Les *Alocasia indica*⁹ et *cuprea*¹⁰ sont des herbes très âcres, qui sont cependant employées au traitement des plaies et de diverses maladies. Avec des propriétés analogues, l'*A. montana*¹¹ fournit une teinture rouge¹². Sa souche est usitée, aux Moluques, comme poison d'épreuve judiciaire. Il en est de même de l'*A. longiloba*¹³. Dans l'Asie et l'Océanie tropicales, l'*Homalonema album*¹⁴ sert d'appât pour la pêche; on emploie des fragments de son rhizome. Celui de l'*H. rubescens*¹⁵ s'applique au traitement des plaies par armes à feu et

1. Les *A. Koujak* et *gracilis* K. sont aussi indiqués comme remèdes de la morsure des reptiles venimeux.

2. SCHOTT, *Syn. Ar.*, 33; *Gen. Ar.*, t. 23, fig. 1-17. — ENGL., *Arac.*, 524; in *Fl. bras.*, III, II, 208. — *Arum Pythonium* MART. — *Arisæma Pythonium* BL., *Rumphia*, I, 108.

3. DCNE, *Herb. timor.*, 39. — ENGL., *Arac.*, 611, n. 4. — *Arum divaricatum* L. — *A. trilobatum* Bot. Mag., t. 339, 2324. — *T. Roxburghii* SAUND., *Ref. bot.*, t. 283.

4. SCHOTT, in *Wien. Zeitschr.*, III, 72. — *Arum trilobatum* L. — *A. orixense* ROXB. — *Bot. Reg.*, t. 450. — WIGHT, *lc.*, III, t. 801.

5. DCNE, *Herb. timor.*, 39. — ENGL., *Arac.*, 616. — *Arum cuspidatum* BL. — *A. flagelliforme* LODD., *Bot. Cab.*, t. 396.

6. *T. crenatum* BL., *Rumphia*, I, 128. — *Arum minutum* W., *Spec.*, IV, 484.

7. Les plus célèbres sont l'*A. campanulatus* BL., *Rumphia*, I, t. 32, 33. — SCHOTT, *Gen. Ar.*, t. 31. — ENGL., *Arac.*, 309, qui est l'*Arum Rumphii* GAUDICH. et le *Tacca phallifera* RUMPH., *Herb. amboin.*, V, 326, t. 113, fig. 2; l'*A. giganteus* BL., *Rumphia*, I, t. 34, le *Mulenschena* de RHEEDE (*H. malab.*, XI, t. 19); l'*A. bulbifer* BL., *Rumphia*, I, 148, parfois cultivé (REG., *Gartenfl.* (1871), t. 688); l'*A. Gigas* TEYSM. et BINN. — ENGL., *Arac.*, 316, n. 10, dont les pétioles et les hampes ont deux ou trois mètres de long; l'*A. Rivieri* DUR. (fig. 289, 290). — ENGL., *Arac.*, 312. — *Proteinophallus Rivieri* HOOK. F., *Bot.*

Mag., t. 6195, cultivé aujourd'hui dans nos parterres. Il y a un *A. sativus* BL. (*Tacca sativa* RUMPH., *Herb. amboin.*, V, t. 112), dont la souche serait comestible.

8. SCHOTT, *Melet.*, I, 18; *Gen. Ar.*, t. 36; in *Ann. Gand.*, t. 6 (1846). — ENGL., *Arac.*, 496. — *Arum viviparum* ROXB. — *Caladium viviparum* LODD., *Bot. Cab.*, t. 281.

9. SCHOTT, in *Est. Bot. Wochenbl.* (1854), 410. — ENGL., *Arac.*, 501; in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 201. C'est l'*Arum sylvestre* RUMPH., *Herb. amboin.*, V, t. 107; et l'*A. metallica* SCHOTT en est une variété. Il est cultivé dans l'Amérique tropicale (*Manguri*).

10. K. KOCH, in *Berl. Woch.* (1861), 141. — *A. metallica* HOOK. F., in *Bot. Mag.*, t. 5190.

11. SCHOTT, in *Est. Bot. Wochenbl.* (1854), 410. — ENGL., *Arac.*, 499. — *Arum montanum* ROXB. — WIGHT, *lc.*, III, 796. D'après ROYLE, le suc de son *Colocasia himalaïensis* est usité comme médicament dans les montagnes de l'Inde; et il y a dans ce pays, un *C. virosa* K., *Enum.*, III, 41. — *Calla virosa* ROXB. — WIGHT, *lc.*, III, t. 808, vanté comme alimentaire, sudorifique et expectorant.

12. « Cassomba. »

13. MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 207.

14. HASSE, *Cat. H. bogor.* (1844), 57. — *H. cordata* ZOLL. — *Zantedeschia alba* K. KOCH. — *Dracunculus amboinicus* RUMPH., *Herb. amboin.*, V, 322.

15. K., *Enum.*, III, 57 — ENGL., *Arac.*, 336.

passé pour faire aboutir les abcès et les panaris ; tandis que l'*H. aromatica*¹ jouit, dans l'Inde, d'une certaine réputation comme stimulant et aphrodisiaque. Le *Dieffenbachia Seguine*² (fig. 293-296) passe, au Brésil, pour être la plus vénéneuse de toutes les Aracées. Son suc laiteux constitue une encre indélébile pour marquer le linge. Sa sève est employée dans la fabrication de certains sucres. Elle s'applique comme caustique sur les plaies et les ulcères. Plusieurs *Philodendron* ont un suc âcre et irritant, parfois recommandé comme sudorifique et antirhumatismal. Les plus usités sont les *P. pinnatifidum*³, *grandifolium*⁴, *hederaceum*⁵, *oblongum*⁶, de même que le *Montrichardia arborescens*⁷, des Antilles et du Brésil. Au Bengale, on vante comme anthelminthique le *Scindapsus officinalis*⁸. Le *Schismatoglottis calyptrata*⁹ est âcre ; mais sa souche devient comestible quand elle est cuite. Le *Dracontium polyphyllum*¹⁰ est réputé, dans les Guyanes, un bon remède des affections pulmonaires et des morsures des animaux venimeux. A Java, les feuilles de l'*Aglaonema simplex*¹¹ servent à envelopper le tabac et lui communiquent une odeur particulière. Les rebouteurs indiens prétendent guérir les affections des membres avec les feuilles de l'*A. marantifolium*¹² (fig. 297-300). Dans l'Amérique du

— *H. rubra* HASSK. — REG., *Gartenfl.*, t. 634.
— *Calla rubens* ROXB. — *Zantedeschia rubens* K. KOCH.

1. SCHOTT, *Melet.*, I, 20. — *H. cordata* SCHOTT. — *Calla aromatica* ROXB. — *Bot. Mag.*, t. 2279.

2. SCHOTT, *Melet.*, I, 20. — K., *Enum.*, III, 53. — ENGL., *Arac.*, 445 ; in *Fl. bras.*, III, II, 173, 224, t. 39. — *D. Ventenatiana* SCHOTT. — *D. consobrina* SCHOTT. — *D. neglecta* SCHOTT. — *D. Barraquiniana* VERSCH. et LEME, in *Ill. hort.* (1864), t. 387. — *D. Wallisii* LIND., in *Ill. hort.* (1870), t. 11. — *D. gigantea* VERSCH., in *Ill. hort.* (1866), t. 470, 471. — *D. robusta* K. KOCH. — *D. lingulata* SCHOTT. — *D. cognata* SCHOTT. — *D. liturata* SCHOTT. — *D. Plumieri* SCHOTT. — *D. conspurcata* SCHOTT. — *D. irrorata* SCHOTT. — *Arum Seguine* JACQ., *Amer.*, t. 151. — *Arum Seguine* L. — *Caladium Seguine* VENT. — HOOK., *Exot. Fl.*, t. 1.

3. K., *Enum.*, III, 50. — ENGL., *Arac.*, 421. — *Arum pinnatifidum* JACQ., *H. schænbr.*, II, t. 87. — *Caladium pinnatifidum* W. Le *P. rubropunctatum* HOOK. F., in *Bot. Mag.*, t. 5948, en est une simple variété.

4. SCHOTT, *Melet.*, I, 19. — ENGL., *Arac.*, 393. — *Arum grandifolium* JACQ., *H. schænbr.*, t. 189. — PERS., *Syn.*, II, 575.

5. SCHOTT, *Melet.*, I, 19. — *Arum hederaceum* W. — *Colocasia hederacea* PLUM., *Descr. pl. Amer.* (1693), t. 51, d ; 55.

6. K., *Enum.*, III, 78. — SCHOTT, *Syn. Ar.*, 78 ; *Prodr. Ar.*, 235. — ENGL., *Arac.*, 365. — *Arum oblongum* VELL., *Fl. flum.*, Atl., IX, t. 115.

7. SCHOTT, *Arac. Betr.*, 4 ; *Syn. Ar.*, 71. — ENGL., *Arac.*, 288 ; in *Fl. bras.*, III, II, 127, t. 25. — *Arum arborescens* PLUM. — VELL., *Fl. flum.*, Atl., IX, 109. — *Philodendron arbo-reum* K., *Enum.*, II, 48.

8. SCHOTT, *Melet.*, I, 21. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 182. — ENGL., *Arac.*, 254. — *Pothos officinalis* ROXB. — WIGHT, *lc.*, III, t. 778.

9. ZOLL. et MOR., *Syst. Verz. Jav.*, 83. — ENGL., *Arac.*, 352. — *S. longipes* MIQ. — SCHOTT, *Gen. Ar.*, t. 55. — *Homalonema calyptratum* K. — *Arisarum esculentum* RUMPH., *Herb. amboin.*, V, t. 111.

10. L., *Spec.*, I, 967. — ENGL., *Arac.*, 283. — *Bot. Reg.*, t. 700. Cultivé aux Antilles.

11. BL., *Rumphia*, I, 152, t. 36, D ; 65. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 216. — ENGL., *Arac.*, 439. — *A. fallax* SCHOTT. — *A. princeps* K. — *Caladium simplex* BL., *Cat. H. Buitenz.*, 103.

12. K., *Enum.*, III, 55. — SCHOTT, *Syn. Ar.*, 21. — *A. marantifolium* BL., *Rumphia*, I, t. 66. — *Calla oblongifolia* ROXB. — WIGHT, *lc.*, III, t. 806. — *Scindapsus erectus* PRESL. — *Appendix erecta* RUMPH., *Herb. amboin.*, V, t. 182, fig. 2. Le suc de cette plante passe pour tuer les Ascarides. Dans la République Argentine, on traite les affections vermineuses par le *Synandropadix vermiloxicus* ENGL. (p. 472, not. 9).

Nord, on a, dit-on, recours, dans les cas de disette, aux graines et au rhizome de l'*Aronia aquatica*¹ (fig. 310-312) comme aliment. Le *Pothos scandens*², si commun dans l'Inde et ailleurs, passe pour astringent, stomachique et même fébrifuge; on emploie ses feuilles. Celles du *P. tener*³ s'administrent contre l'asthme. Dans l'Amérique tropicale, celles du *Spathiphyllum cannæforme*⁴ ont une odeur vanillée qui les fait mélanger au tabac. Dans beaucoup d'Aracées, surtout les *Amorphophallus*, *Dracunculus* et même certains *Arum*, l'odeur de la spathe est d'une fétidité extrême au moment de la floraison. Cette odeur cadavérique appelle les insectes qui doivent assurer la fécondation de ces plantes. Nous savons que l'odeur est, au contraire, suave dans les *Zantedeschia* et quelques autres plantes de la famille. Un grand nombre de celles-ci sont ornementales, cultivées surtout dans les serres pour leur port singulier, la beauté de leur feuillage ou la couleur éclatante de la spathe de certaines espèces ou variétés aujourd'hui très multipliées. Quelques espèces gigantesques, telles que l'*Amorphophallus giganteus* BL., l'*A. Gigas* TEYSM., l'*A. Titanum* BECC., le *Dracontium Gigas* ENGL., etc., ont attiré par leurs dimensions exceptionnelles l'attention des voyageurs et des curieux.

1. *Orontium aquaticum* L., *Amæn.*, III, 17, t. 1, fig. 3; *Spec.*, 463. — BARTON, *Fl.*, II, t. 27. — TORR., *Fl.*, I, 358. — PURSH, *Fl. Am. sept.*, I, 235. — HOOK., *Exot. Fl.*, t. 19. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 402. — SCHOTT, *Gen. Ar.*, t. 92. — ENGL., *Arac.*, 213. — *Pothos ovata* WALT., *Fl. carol.*, 224.

2. L., *Spec.*, 1374. — SCHOTT, *Aroid.*, I, 22, t. 33. — HOOK., *lc.*, t. 175. — ENGL., *Arac.*, 84. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 551. — *P. decipiens* SCHOTT. — *P. fallax* SCHOTT. — *P. exiguiflorus* SCHOTT. — *P. Hookeri* SCHOTT. — *P. cognatus* SCHOTT. — *P. Roxburghii* DE VR.

3. SCHOTT, *Prodr. Ar.*, 572. — ENGL., *Arac.*, 94. — *Adpendix arborum prima* RUMPH., *Herb. amboin.*, V, t. 181, fig. 1.

4. ENGL., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 103, t. 16, fig. 2; *Arac.*, 229, n. 17. — *S. candicans* PÖEPP., *Nov. gen. et spec.*, III, t. 285. — *Pothos cannæformis* CURT., in *Bot. Mag.*, t. 603. — *P. leucophæus* PÖEPP. — *P. odorata* ANDERS. — LODD., *Bot. Cab.*, 471. — *Monstera cannæfolia* K. — *Leucochlamys callacea* PÖEPP. — *Massonia cannæfolia* K. KOCH, in *Bot. Zeit.* (1852), 278. — *M. cannæformis* K. KOCH, ex END., *Ind. Ar.*, 52.

GENERA

I. AREÆ.

1. **Arum** T. — Flores monœci nudi : masculi 2-4-andri; antheris brevibus sessilibus; loculis oppositis obovoideis obtusis, apice rimulosis; connectivo haud v. vix producto. Floris fœminei germen oblongum obtusum, 1-loculare; stylo subnullo, apice subsessili pulvinari stigmatoso. Ovula pauca v. ∞ , orthotropa adscendentia; micropyle supera; funiculis brevibus placentæ parietali v. hinc subbasilari affixis. Fructus compositi baccae ∞ , subsphæricæ v. obovoideæ. Semina pauca v. ∞ , subsphærica, apice producta v. apiculata; arillo tumido; albumine copioso; embryo axili v. excentrico subobliquo. — Herbæ perennes; rhizomate varie tuberoso. Folia proteranthia v. cum floribus coetanea basilaria sagittata v. hastata; petiolo basi vaginante. Spadices solitarii v. pauci pedunculati appendiculati; spathæ marcescentis v. evanidæ tubo brevi involuto; limbo ovato v. lanceolato, spadice longiore; appendice stipitata clavata v. cylindracea; floribus fœmineis inferioribus spathæ contiguis; masculis ab iis remotis v. nunc contiguis; neutris interjectis et supra masculos ∞ , subulatis basique plus minus tumidis. (*Europa, Reg. Medit., Oriens.*) — *Vid. p. 424.*

2. **Dracunculus** SCHOTT¹. — Flores (fere *Ari*) monœci nudi: masculi 3, 4-andri; filamentis brevibus; antheris reniformibus sub-4-gonis, 2-ocularibus; loculis obovoideis v. subellipsoideis contiguis², apice poris v. rimulis dehiscentibus³; connectivo tenui, nunc

1. *Melet.*, I, 17; *Syn. Ar.*, 23; *Gen. Ar.*, t. 22; *Prodr. Ar.*, 119. — BL., *Rumphia*, I, 124. — ENDL., *Gen.*, n. 1679. — K., *Enum.*, III, 29. — ENGL., *Arac.*, 601; *Pflanzenfam.*, 92, fig. 94,

D. — B. H., *Gen.*, III, 969, n. 15. — *Anarmodium* SCHOTT, in *Bonplandia*, IX, 368.

2. Nunc omnino oppositis.

3. Pollen vermiforme farciminulosum.

demum loculos superante, simplici v. 2-fido. Floris fœminei germen ovoideo-oblongum, in stylum longe conicum attenuatum, apice dilatato stigmatosum. Ovula pauca orthotropa, aut adscendentia, aut descendentia omnia, nunc pendula alia, alia autem suberecta; funiculo brevi. Fructus baccati obovoidei. Semina pauca, sphærica, ovoidea, obovoidea v. plano-convexa, rugosa; albumine copioso, basi intruso; embryone axili. — Herbæ perennes tuberosæ; foliis alternis pedatisectis; segmentis lanceolatis convolutis demumque arrectis; petiolo longo longeque vaginante. Pedunculus cum foliis coetaneus eaque superans; spatha ampla marcescente persistente ovato-lanceolata aperta recurva; tubo recto involuto. Spadix spatha brevior sessilis; appendice longe stipitata elongata conoidea erecta, demum fungosa; floribus fœmineis inferioribus cum masculis arcte contiguis v. remotiusculis; floribus neutris supra masculos paucis conicis. (*Europa austr., Ins. Canar.*¹⁾

3. **Helicodiceros** SCHOTT². — Flores (fere *Dracunculi*) monœci nudi: masculi 2, 3-andri; antherarum subsessilium subsphæricorum loculis contiguis confluenti-rimosis; connectivo haud producto. Floris fœminei germen obovoideum, 1-loculare, apice sub-3-lobum, apice stigmatoso pulvinatum; ovulis orthotropis 4-6, adscendentibus v. descendentibus; funiculo brevi crasso. Fructus baccati. — Herba perennis tuberosa; foliis basilaribus petiolatis pedatisectis; segmentis circa costam spiraliter dispositis lanceolatis; lateralibus pinnatifidis. Spadix cum foliis coetaneus crassus stipitatus, longe crasseque pedunculatus; spathæ crassæ involutæ tubo tessellato; fauce constricta; limbo ovato-oblongo v. lanceolato retroverso; disco setoso; appendice stipitata spathæ limbo incumbente vermiformi et usque ad apicem attenuatum crinita; floribus sexus utriusque remotis; interjectis supraque fœmineos insertis floribus neutris ∞ , subulatis magnis³ porrectis incurvis; superioribus gradatim ad setos reductis. (*Mediterr. ins. occident.*⁴⁾

1. Spec. 2. L., *Spec.*, 1367 (Arum). — GÆRTN., *Fruct.*, t. 84 (Arum). — LAMK., *Ill.*, t. 740, fig. 2 (Arum). — SIBTH., *Fl. græc.*, t. 946 (Arum). — SCHOTT, *Aroid.*, t. 25. — WEBB, *Phyt. canar.*, t. 219. — BOISS., *Fl. or.*, V, 42. — REICHB., *Jc. Fl. germ.*, VII, t. 11. — *Bot. Reg.*, t. 831. — PARL., *Fl. ital.*, II, 250. — WILLK. et LGE, *Prodr. Fl. hisp.*, I, 31 (Arum). — DUR. et SCHINZ, *Consp. Fl. afric.*, V, 482.

2. In *Est. Bot. Wochenbl.* (1853), 369; *Syn.*

Ar., 22; *Prodr. Ar.*, 119; *Gen. Ar.*, t. 21; *Aroid.*, t. 26, 27. — ENGL., *Arac.*, 604; *Pflanzenfam.*, 148. — B. H., *Gen.*, III, 968, n. 14.

3. Nunc subpollicaribus.

4. Spec. 1. *H. muscivorus* ENGL. — *H. crinitus* SCHOTT. — *Arum muscivorum* L. f., *Suppl.*, 410. — GREN. et GODR., *Fl. de Fr.*, III, 329. — *Arum crinitum* AIT. — *Dracunculus crinitus* SCHOTT. — *D. muscivorus* PARL. — *D. minor* BL. (part.).

4. **Eminium** BL.¹ — Flores (fere *Dracunculi*) monœci nudi; masculi 2-andri; antheris subsessilibus brevibus compressiusculis; loculis contiguis oblongis, rimulis (nunc brevibus hiantibus) apicalibus v. extrorsum lateraliter dehiscentibus; connectivo haud producto. Floris fœminei germen sphæricum v. obovoideum, 1-loculare, vertice truncatum; stylo brevissimo, apice stigmatoso pulvinari v. capitato. Ovula 2, basilaria orthotropa; micropyle supera. Fructus baccatus; seminibus 1, 2, erectis, mucilagine gummoso immersis, depresso-sphæricis apiculatis; albumine copioso, basi intruso; embryone axili verticali. — Herbæ tuberosæ; foliis basilaribus longe petiolatis, hastatis, sagittatis v. pedatisectis, coriaceis; segmentis demum (basi confluentibus sæpeque spiraliter convolutis. Spadices cum foliis coetanei pedunculati; spathæ marcescentis tubo ventricoso persistente; limbo erecto oblongo. Spadix spatha brevior; appendice varia, aut conoidea brevi, aut longiore clavata rugosa v. tenuiter cylindracea; floribus fœmineis inferioribus et fœmineis remotis; interpositis neutris sparsis subulatis arcuatis; inferioribus basi germiniformi dilatatis. (*Asia occid.*²)

5. **Typhonium** SCHOTT³. — Flores (fere *Ari*) monœci nudi : masculi 1-3-andri; antherarum subsessilium subovoidearum loculis contiguis, apice rimulosis v. poricidis; connectivo apice nunc leviter producto. Floris fœminei germen 1-loculare, apice stigmatoso pulvinatum v. hemisphæricum. Ovula basilaria orthotropa 1, 2; funiculo brevi erecto; micropyle apicali. Fructus baccati; seminibus 1, 2, erectis rugulosis; arillo basilari cum funiculo confluyente; albumine copioso; embryone axili. — Herbæ perennes tuberosæ; foliis basilaribus sagittatis, hastatis, 3-6-lobis, partitis v. pedatisectis; petiolo longo. Spadices e tubere erecti pedunculati inappendiculati; floribus fœmineis inferioribus axi sub eis sessili v. stipitato insertis; masculis superioribus remotis; neutris interpositis ∞ , longe clavatis v. subu-

1. *Rumphia*, I, 121 (*Ari* sect.). — SCHOTT, *Syn. Ar.*, 16; *Gen. Ar.*, t. 19; *Prodr. Ar.*, 111. — O. K., *Revis.*, 741. — *Helicophyllum* SCHOTT, *Aroid.*, I, 20; *Gen. Ar.*, t. 20; *Syn. Ar.*, 22; *Prodr. Ar.*, 112. — ENGL., *Arac.*, 597; *Pflanzenfam.*, 149, fig. 95.

2. Spec. 3, 4. K., *Enum.*, III, 25 (*Arum*). — LEDEB., *Fl. ross.*, IV, 10 (*Typhonium*). — BOISS., *Fl. or.*, V, 41. — *Bot. Mag.*, t. 6969 (pleraque sub *Helicophyllo*).

3. In *Wien. Zeitschr.*, III, 72; *Aroid.*, I, 11 (part.); *Syn. Ar.*, 18 (part.); *Gen. Ar.*, t. 17; *Prodr. Ar.*, 105. — ENDL., *Gen.*, n. 1677. — MART., in *Flora* (1831), II, 455. — SPACH, *Suit. à Buff.*, XII, 38. — K., *Enum.*, III, 26 (part.). — ENGL., *Arac.*, 609; *Pflanzenfam.*, 148; *Jahrb. Bot.* (1883), 66. — B. H., *Gen.*, III, 967, n. 11. — *Heterostalis* SCHOTT, in *Estér. Bot. Wochenbl.* (1857), 261; *Gen. Ar.*, t. 18; *Prodr. Ar.*, 109.

latis, v. nunc sub masculis subulatis; appendice forma varia, nunc stipitata. (*Asia et Oceania calid.*¹)

6. **Theriophenum** BL.² — Flores (fere *Typhonii*) monœci nudi : masculi 1, 2-andri; antherarum sessilium didymarum oculis contiguus, sub apice poricidis v. rimulosis; connectivo brevi emarginato v. varie producto. Floris fœminei germen 1-loculare, vertice stigmatoso pulvinatum. Ovula pauca v. ∞ , orthotropa, alia adscendentia, descendente alia; funiculis brevibus. Fructus e baccis oligospermis ∞ ; seminum ovoideorum funiculo brevi in arillum abeunte; embryone axili dite albuminoso. — Herbæ perennes tuberosæ; foliis basilaribus cordatis, sagittatis v. hastatis; spadice cum foliis coetaneo breviter sæpius pedunculato; spathæ marcescentis demumque evanidæ tubo involuto; fauce constricta; limbo oblongo v. lanceolato acuminato erecto; spadice brevioris appendice erecta clavata gracilive; floribus sexus utriusque remotis; imperfectis interpositis ∞ nonnullisque nunc supra masculos insertis. (*India*³.)

7. **Homaida** ADANS.⁴ — Flores (fere *Ari*) monœci nudi : masculi 1, 2-andri; filamentis brevissimis crassis; antheræ oculis extrorsum v. ad margines rimosis; rimis distinctis v. vertice nunc apiculato confluentibus. Floris fœminei germen sessile, 1-loculare; stylo plus minus elongato, apice stigmatoso plus minus dilatato. Ovulum 1, basilar erectum orthotropum; micropyle supera. Fructus baccæ obovoideæ; seminis erecti arilloque conoideo instructi albumine copioso; embryonis axilis radícula supera. — Herbæ tuberosæ, sæpe annis alternis foliiferæ v. floriferæ; foliis basilaribus oblongis v.

1. Spec. 12, 13. WIGHT, *Jc.*, t. 790, 791, 793, 801, 803. — BL., *Rumphia*, II, t. 30 (*Typhonium*), 36. — MIQ., in *Ann. Mus. lugd.-bat.*, III, t. 3, B. — GRIFF., *Jc. pl. as.*, t. 50 (*Arum*). — LODD., *Bot. Cab.*, t. 396, 422, 516 (*Arum*). — ANDR., *Bot. Rep.*, t. 356 (*Arum*). — SAUND., *Ref. bot.*, t. 283. — FR. et SAV., *En. pl. jap.*, II, 6. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 497. — ENGL., in *Becc. Males.*, I, 295. — BENTH., *Fl. austral.*, VII, 153. — *Bot. Reg.*, t. 450 (*Arum*). — *Bot. Mag.*, t. 339, 2324 (*Arum*), 6180.

2. *Rumphia*, I, 127. — ENDL., *Gen.*, Suppl., 1370. — K., *Enum.*, III, 27. — SCHOTT, *Aroid.*, 15; *Gen. Ar.*, t. 14; *Syn. Ar.*, 21; *Prodr. Ar.*, 101. — ENGL., *Arac.*, 605; *Pflanzenfam.*, 148. — B. H., *Gen.*, III, 967, n. 12. — *Calyptrocoryne* SCHOTT, *Gen. Ar.*, t. 16. — *Tapinocarpus* BALZ.,

in *Hook. Kew Journ.*, III, 345. — SCHOTT, *Gen. Ar.*, t. 15.

3. Spec. ad 5. SCHOTT, *Melet.*, I, 17 (*Typhonium*); in *Est. Bot. Zeit.* (1858), 3. — WIGHT, in *Hook. Misc.*, II, 100; Suppl., t. 3 (*Arum*). — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 196. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 512.

4. *Fam. des pl.*, II, 461, 470 (*Homaid*). — O. K., *Revis.*, 742. — *Biarum* SCHOTT, *Melet.*, I, 17; *Gen. Ar.*, t. 7. — ENDL., *Gen.*, n. 1675. — K., *Enum.*, III, 21. — ENGL., *Arac.*, 571; *Pflanzenfam.*, 149. — *Cyllenium* SCHOTT, *Gen. Ar.*, t. 9; *Prodr. Ar.*, 64. — *Ischarum* BL., *Rumphia*, I, 144, t. 29. — SCHOTT, *Syn. Ar.*, 6; *Gen. Ar.*, t. 10; *Prodr. Ar.*, 65. — *Leptopetion* SCHOTT, *Gen. Ar.*, t. 8; *Prodr. Ar.*, 64. — *Stenurus* SALISB., *Gen. pl. Fragm.*, t. 5.

linearibus petiolatis; spathæ tubo cylindræco v. dilatato; limbo longe angustato aperto, sæpius marcescente; spadice sessili gracili; appendice sæpius valde elongata vermiformi exserta; floribus masculis fœmineisque remotis; interjectis nuncque supra masculos insertis sterilibus conicis, subulatis v. furcatis. (*Reg. Medit., Oriens*¹.)

8. **Sauromatum** SCHOTT².—Flores (fere *Homaidæ*) monœci nudi; masculorum antheris sessilibus subcompressis, 4-lobis; loculis obovato-oblongis oppositis contiguis, apice extus poricidis; connectivo demum prominulo. Floris fœminei germen 1-loculare; stylo brevi, demum in summo germine refracto, pulvinari-stigmatoso. Ovula erecta orthotropa 1-2, placentæ basilari papillosæ affixa; funiculo brevissimo; micropyle supera. Fructus baccati obpyramidati substipitati, vertice rugosi. Semen 1, sphæricum læve arillatum; embryone axili dite albuminoso. — Herbæ perennes tuberosæ, annis alternis foliiferæ v. floriferæ; folio basilari 1, pedatipartito, longe petiolato. Spadix sessilis longe appendiculatus; appendice teretiuscula; spathæ tubo ventricoso; marginibus plus minus connatis; fauce aperta; limbo longe lanceolato, hinc aperto; floribus masculis fœmineisque remotis; interpositis neutris clavatis stipitatis crassis ∞ . (*Asia et Africa trop.*³)

9. **Arisarum** T.⁴ — Flores (fere *Ari*) monœci nudi : masculi 1-andri; filamento erecto brevi; anthera reniformi subpeltata; loculis rimis confluenti-hippocrepiformibus lateraliter v. demum subextrorsum dehiscens. Floris fœminei germen obovoideum v. depressum, 1-loculare; stylo terminali erecto, tenui v. crasso, apice stigmatoso pulvinari v. depresso capitato. Ovula ∞ , placentæ basilari inserta erecta; micropyle supera; funiculis brevibus v. 0. Fructus

1. Spec. 10-12. L., *Spec.*, 13, 70 (*Arum*). — REICHB., *Ic. Fl. germ.*, VII, t. 6. — BOISS., *Fl. or.*, V, 31. — DUR. et SCHINZ., *Consp. Fl. afric.*, V, 481. — *Bot. Reg.*, t. 512 (*Arum*). — *Bot. Mag.*, t. 5324, 6355 (omnia sub *Biato* v. *Ischaro*).

2. *Melet.*, I, 17; *Syn. Ar.*, 24; *Gen. Ar.*, t. 11; *Prodr. Ar.*, 70. — ENDL., *Gen.*, n. 1678. — K., *Enum.*, III, 28. — ENGL., *Arac.*, 568; *Pflanzenfam.*, 148. — B. H., *Gen.*, III, 966, n. 9.

3. Spec. ad 5. WALL., *Pl. as. rar.*, II, t. 115 (*Arum*). — A. RICH., *Tent. Fl. abyss.*, 332 (*Arum?*). — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 196. —

WIGHT, *Ic.*, t. 800 (*Arum*). — LINK et OTT., *Ic. pl. rar.*, I, t. 8 (*Arum*). — REG., *Gartenfl.*, t. 495. — *Fl. serres*, t. 1334. — LEME, *Jard. fl.*, I, t. 12. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 508. — DUR. et SCHINZ., *Consp. Fl. afric.*, V, 480. — *Bot. Mag.*, t. 4465.

4. *Inst.*, 161, t. 70, B. — ADANS., *Fam. des pl.*, II, 470 (*Arisaron*). — TARG.-TOZZ., in *Ann. Mus. Flor.*, II, 617 (1810). — K., in *Mém. Mus.*, IV, 438; *Enum.*, III, 14. — ENDL., *Gen.*, n. 1673. — BL., *Rumphia*, I, 89. — SCHOTT, *Melet.*, I, 16; *Syn. Ar.*, 4; *Prodr. Ar.*, 20; *Gen. Ar.*, t. 5. — ENGL., *Arac.*, 560; *Pflanzenfam.*, 149, fig. 96. — B. H., *Gen.*, III, 965, n. 6.

compositi baccae paucae v. ∞ , angulatae v. costatae. Semina pauca; integumento crustaceo striato v. rugoso; arillo funiculo crassiore stipata; albumine carnosio, basi intruso; embryone axili. — Herbæ perennes tuberosæ; foliis basilaribus sagittatis v. rotundato-hastatis, tenuiter nervatis; petiolo longo, basi breviter vaginante. Spadix cum foliis coetaneus pedunculatus; spatha inferne tubuloso-ventricosa clausa, ad faucem subconstricta et ad limbum breviter fornicatum procurva hincque concavitate aperta; spadice basi hinc breviter spathæ adnato; appendice stipitata decurva, apice clavata v. attenuata; floribus foemineis contra spatham hinc paucis; masculis numerosioribus sparsis; infimis cum foemineis contiguis. (*Reg. Medit.*¹⁾)

10. **Arisæma** MART.² — Flores (fere *Arisari*) monœci v. multo sæpius diœci nudi: masculi 2-5-andri; antheris subsessilibus v. stipiti parvo affixis; loculis 2, contiguis, subovoideis v. didymis, nunc confluentibus, aut poricidis, aut extrorsum breviter rimosis. Floris foeminei germen sphæricum v. sæpius ovoideum oblongumve, 1-loculare; stylo brevi v. brevissimo, mox pulvinari-dilatato stigmatoso. Ovula 1- ∞ e placenta basilari depressa v. plus minus prominente erecta orthotropa; funiculo brevi v. 0; micropyle supera apicali. Fructus baccatus, sphæricus v. subturbinatus, 1- ∞ -spermus. Semina sphærica v. oblonga 1- ∞ , erecta; albumine carnosio; embryone axili. — Herbæ perennes tuberosæ; foliis paucis (1-3), varie sectis v. pedatim verticillatimve 5- ∞ -sectis; segmentis variis integris v. crenatis; petiolo basi vaginante. Spadices coetanei inclusi v. exserti sæpe conoidei appendiculati; appendice varia, aut e basi dilatata angustatave brevi obtusa acutave, raro acutiuscula, aut in filum longissime exsertum sub vernatione involutum v. demum ad terram protrusum producta; floribus confertis foemineis v. remote sparsis masculis; organis neutris subulatis simplicibus v. parce ramosis nunc supra

1. Spec. 2, 3. L., *Spec.*, ed. II, 1370 (*Arum*). — JACQ., *H. schænbr.*, II, t. 192 (*Arum*). — L.-C. RICH., in *Guillem. Arch. bot.*, I, t. 2. — SIBTH., *Fl. græc.*, t. 948. — DUN., *Bouq. médit.*, t. 5. — DUR., *Fl. alger.*, t. 44. — PARLAT., in *Bull. Soc. bot. Fr.* (1856), 341; *Fl. ital.*, II, 234. — MOGGR., *Contr. Fl. Ment.*, t. 47. — REICH., *lc. Fl. germ.*, VII, t. 7. — CAR., in *N. Giorn. bot. ital.*, XI, t. 1. — GREN. et GODR., *Fl. de Fr.*, III, 331 (*Arum*). — N.-E. BR., in *Journ.*

Linn. Soc., XVIII, 246. — BOISS., *Fl. or.*, V, 44. — DUR. et SCHINZ, *Consp. Fl. afric.*, V, 479. — *Gardn. Chron.* (1871), 301 (*Arum*). — *Bot. Mag.*, t. 6023, 6634. De A. vulgari, ARCANG., in *N. Giorn. bot. ital.* (1891), 545.

2. In *Flora* (1831), II, 459. — ENDL., *Gen.*, n. 1674. — SCHOTT, *Melet.*, I, 17; *Syn. Ar.*, 25; *Gen. Ar.*, t. 6; *Prodr. Ar.*, 24. — ENGL., *Arac.*, 533; *Pflanzenfam.*, 150, fig. 97. — B. H., *Gen.*, III, 965, n. 7.

flores sexus utriusque insertis. Spathæ tubus oblongus v. inflatus convolutus, sæpe ∞ -costatus; fauce contracta v. aperta; limbo deciduo plerumque amplo fornicato v. breviusculo, acuminato v. caudato. (*Asia, Africa et America calid. et temp.*¹⁾)

11. **Ambrosinia** BASSI². — Flores nudi, in loculis distinctis spathæ ejusdem monœci: masculi in loculo spathæ dorsali 6-10, 2-andri sessiles, 2-seriatim superpositi. Anthera sessilis; loculis transversis contiguus oblongis, rima continua dehiscentibus. Flos fœmineus in loculo spathæ ventrali solitarius. Germen floribus masculis demissius in septo sessile subovoideum; basi lata subverticali; 1-loculare; stylo terminali arcuato, apice stigmatoso adscendente capitato suborbiculari v. nunc breviter elliptico. Ovula ∞ , orthotropa cylindrica e placenta basilari erecta; micropyle supera³; funiculo plus minus elongato. Fructus baccatus sphaericus, stylo coronatus; seminibus subsphaericis apiculatis arillatis striatis albuminosis. — Herba perennis parva tuberosa; foliis basilaribus paucis; petiolo longo, basi vaginante; limbo ovato-oblongo obtuso membranaceo; nervis utrinque paucis arcuatis. Flores cum foliis coetanei; spadice in summo pedunculo hypogæo e tubere orto reflexo. Spatha⁴ navi-
cularis terræque oblique accumbens delitescens, apice in rostrum tenue procurvum producta; septo verticali minute apiculato cavitatemque in loculos sic dictos ventralem dorsalemque dividente, post anthesin accreto; pedunculo fructifero mox elongato. (*Italia, Africa bor.*⁵⁾)

1. L., *Spec.*, 1368 (Arum). — W., *Spec.*, IV, 478 (Arum). — BL., *Rumphia*, I, t. 27, 28; 37, E. — WALL., *Tent. Fl. nepal.*, t. 18-20 (Arum); *Pl. as. rar.*, II, t. 135, 136. — GRIFF., *lc. pl. as.*, III, 163 (Pythonium). — DCKE, in *Jacquem. Voy. Bot.*, t. 168. — WIGHT, *lc.*, t. 784; 788 (Arum). — MIQ., in *Ann. Mus. lugd.-bat.*, III, t. 3. — MORR., in *Ann. Gand* (1846), t. 58. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 320 (Arum). — REG., *Gartenfl.* (1861), t. 313. — *Fl. serres*, t. 1269, 1270, 1322. — BAR., in *Bull. Soc. bot. ital.* (1893), n. 10. — FR. et SAV., *En. pl. jap.*, II, 4. — ENGL., in *Becc. Males.*, I, 295. — BOISS., *Fl. or.*, V, 43. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 497. — O. K., *Revis.*, 739. — DUR. et SCHINZ, *Consp. Fl. afric.*, V, 479. — CHAPM., *Fl. S. Un.-St.*, 439. — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 417. — *Bot. Mag.*, t. 950 (Arum), 4388, 5267, 5496, 5507, 5914, 5931, 5964, 6146, 6457, 6474, 6491, 6634, 6964, 7105, 7150, 7211.

2. In *Comm. bonon.*, V, I, 83 (1763). — L.,

Gen., ed. VI, n. 1238. — J., *Gen.*, 24. — LAMK., *Ill.*, t. 737. — ENDL., *Gen.*, n. 1670. — SCHOTT, *Gen. Ar.*, t. 3; *Aroid.*, t. 11. — ENGL., *Arac.*, 618; *Pflanzenfam.*, 151, fig. 98. — B. H., *Gen.*, III, 964, n. 4.

3. Integumento duplici.

4. Viridis purpureo-maculata.

5. *Spec.* 1. *A. proboscidea* DUR. et SCHINZ, *Consp. Fl. afr.*, V, 482. — *A. Bassii* L., *Gen.*, ed. VI (1764); *Syst.*, 689. — TARG.-TOZZ., in *Ann. Mus. Flor.* (1809), II, 62. — BL., *Rumphia*, I, 81, t. 36. — CESAT., in *Linnaea*, XI, 281, t. 5. — K., *Enum.*, III, 10. — GUSS., *Syn. Fl. sic.*, II, II, 594. — BIV., *St. rar. sic.*, III, 9. — UCR., *Il. panorm.*, 390. — BERTOL., *Fl. ital.*, X, 252. — PARL., *Fl. ital.*, II, 230. — *Bot. Mag.*, t. 6360. — *A. nervosa* LAMK., *Dict.*, I, 128. — *A. maculata* UCR. — *A. reticulata* Guss. — *Arum proboscideum* L., *Spec.*, 1370 (part.). — W., *Spec.*, IV, 485. — *Dracunculus Potamogeti foliis* Bocc., *lc. rar. pl. Sic.*, t. 26.

12. **Pinellia** TEN.¹ — Flores (fere *Arisari*) monœci nudi : masculi 1-andri; antheræ sessilis quadratæ loculis contiguïs truncatis, extrorsum rimosis². Floris fœminei germen sessile, 1-loculare; stylo terminali, apice stigmatoso truncato v. capitellato. Ovulum 1, basilare erectum orthotropum; funiculo brevissimo; micropyle apicali supera. Fructus compositi baccati ovoidei v. oblongi; semine erecto apiculato ruguloso dite albuminoso; embryo axili. — Herbæ tuberosæ; foliis basilaribus, 3-sectis v. pedatisectis membranaceis; segmentis ellipticis v. oblongo-lanceolatis acutis; petiolo longo, nunc varie gemmifero. Spadices pedunculati appendiculati cum foliis coetanei; floribus fœmineis inferioribus hinc axi spathæ adnato insertis; masculis superioribus parum remotis in cylindrum confertis; appendice longe subulata vermiformi exserta; spathæ marcescentis tubo convoluto fructusque involvente; fauce dilatatione laterali clausa; limbo oblongo concavo. (*China, Japonia*³.)

13. **Lagenandra** DALZ.⁴ — Flores (fere *Pinellia*) monœci nudi : masculi 1, 2-andri; antheris concavo-truncatis, 2-dymis; loculis oppositis contiguïs cornubusque perforatis apertis. Floris fœminei germen liberum v. cum germine florum vicinorum connatum, 1-loculare; stylo in peltam stigmatiferam dilatato. Ovula in loculo 1-∞, orthotropa erecta; funiculis brevibus placentæ basilari insertis; micropyle supera. Fructus baccati liberi v. connati, stylo coronati; seminibus 1-∞, rugoso-costatis albuminosis; embryo axili. — Herbæ perennes paludosæ; rhizomate stolonifero; caudice epigæo haud simplici; foliis ovatis v. lanceolatis costatis tenuiterque nervatis; petiolo brevi v. longo. Spadix longe pedunculatus, breviter appendiculatus; axi tenui flores fœmineos inferiores, masculos superiores longe distantes neutrosque paucos tuberculiformes fœmineis superpositos gerente. Spatha lanceolata subulatave, torta v. convo-

1. In *Att. Real. Acad. sc. Nap.*, IV, 57; *Cat. O. bot. nap.*, 91; in *Att. Riun. sc. Ital.*, III, 522. — SCHOTT, *Syn. Ar.*, 5; *Gen. Ar.*, t. 4; *Prodr. Ar.*, 20. — ENDL., *Gen.*, Suppl., I, 1370. — ENGL., *Arac.*, 565; *Pflanzenfam.*, 151. — B. H., *Gen.*, III, 964, n. 3. — *Hemicarpurus* NEES, *Del. sem. H. vrat.* (1839), 4; in *Linnaea*, XIV, *Litt.-Ber.*, 167. — *Atherurus* BL., *Rumphia*, I, 136, t. 31, 37. — ENDL., *Gen.*, n. 1693.

2. Polline « amorpho ».

3. Spec. 3. K., *Enum.*, III, 54 (*Atherurus*). — HOUTT., *Nat. Hist.*, II, 184 (*Arum*). — THUNB., *Fl. jap.*, 233 (*Arum*). — ROTH, *Pl.*

ind. or., 362 (*Arum*). — DESF., *Cat. H. par.*, ed. II, 7, 385. — LOUR., *Fl. cochinch.*, 652 (*Arum*). — MIQ., in *Ann. Mus. lugd.-bat.*, I, 123. — FR. et SAV., *En. pl. jap.*, II, 3. — SCHOTT, *Melet.*, I, 17 (*Arisæma*). — BL., *Rumphia*, I, 108 (*Arisæma*). — Hook. *Icon.*, t. 1875. Cf. BREITENB., *Die Blutheneinr. v. Arum ternatum*, in *Bot. Zeit.* (1879), 687.

4. In Hook. *Kew Journ.*, IV, 289. — SCHOTT, *Syn. Ar.*, 3; *Gen. Ar.*, t. 2; *Aroid.*, 9; *Prodr. Ar.*, 19. — ENGL., *Arac.*, 620; *Pflanzenfam.*, 151; in *N. Act. nat. cur.*, XXXIX, t. 6, fig. 22 (ramif.). — B. H., *Gen.*, III, 963, n. 2.

luta; tubi marginibus connatis; fauce plica reflexa apiceque dilatata accreta mox clausa. (*India or.*¹)

14. **Cryptocoryne** FISCH.² — Flores (fere *Arisari*) monœci nudi: masculi 1, 2-andri; antheris subsessilibus truncatis; loculis contiguis parallelis erectis, apice cupulatis ibique processu conico perforato apertis³. Flores fœminei sessiles; germinis oblique conici loculo 1, apice in stylum liberum brevem recurvum plus minus dilatatum retrorsumque stigmatosum producto. Ovula ∞ , orthotropa, placentæ basilari subverticali inserta erecta, 2-4-seriata; micropyle apicali. Fructus baccati in syncarpium pluriloculare connati, valvatim dehiscentes; valvis polyspermis stellatim expansis. Semina oblonga v. obovoidea orthotropa rugosa; embryo dite albuminoso axili⁴. — Herbæ perennes paludosæ; rhizomate in limo repente stolonifero; foliis in caudice epigæo basilaribus petiolatis, ovatis, oblongis, linearibus, lanceolatis v. cordatis, valide costatis, tenuiter nervatis. Spadix longe v. breviter pedunculatus, nunc subsessilis, supra spatham sessilis ibique flores fœmineos monocyclos⁵ gerens, ultra eos gracilis v. crassiusculus longe nudus⁶ floribusque masculis cylindraceo-spicatis crebris terminatus. Spatha basi breviter v. nunc longe tubulosa; marginibus connatis; fauce plica reflexa spadicis apice varie dilatati clausa; limbo recto angusto plicato v. contorto. (*Asia et Oceania trop.*⁷)

15. **Zomicarpa** SCHOTT⁸. — Flores monœci nudi: masculi 1, 2-andri; antheris subsessilibus erectis, 2-dymis; loculis parallelis contiguis, apice rimulosis v. poricidis; connectivo loculos haud supe-

1. Spec. 5. L., *Spec.*, 1371 (*Arum*). — VENT., in *Rœm. Arch.*, II, 357 (*Caladium*). — SCHOTT, *Melet.*, I, 16; *Gen. Ar.*, t. 1 (*Cryptocoryne*). — BL., *Rumph.*, I, 86 (*Cryptocoryne*). — THW., *En. pl. Zeyl.*, 334. — TRIM., *Cat. pl. Ceyl.*, 97. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 495.

2. Ex REICHE., *Consp.*, 44. — WYDL., in *Linnaea*, V, 428. — SCHOTT, *Melet.*, I, 16; in *Bonplandia* (1857), 221; *Syn. Ar.*, 1; *Gen. Ar.*, t. 1; *Prodr. Ar.*, 13 (part.) — BL., *Rumphia*, I, t. 84. — ENDL., *Gen.*, n. 1671. — K., *Enum.*, III, 12. — ENGL., *Arac.*, 623; *Pflanzenfam.*, 152, fig. 99; in *N. Act. nat. cur.*, XXXIX, 193 (ramif.). — B. H., *Gen.*, III, 963, n. 1. — *Myrioblastus* WALL., herb.

3. Polline vermiformi e poro emisso farcinuloso.

4. In fructu germinante; gemmula nunc ∞ -phylla.

5. Cyclo altero nunc superposito sterili.

6. V. nunc flores masculos 1-paucos supra fœmineos gerens.

7. Spec. ad 25. L., *Spec.*, 1371 (*Arum*). — RETZ., *Obs.*, I, 28 (*Arum*). — ROXB., *H. beng.* (1814), 65; *Fl. ind.*, III, 491; *Pl. corom.*, III, 90, t. 294 (*Ambrosinia*). — GRIFF., in *Trans. Linn. Soc.*, XX, t. 10-12; *lc. pl. as.*, t. 170-172. — WIGHT, *lc.*, t. 773. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 525 (*Arum*). — ENGL., in *Becc. Males.*, I, 296, t. 27, 28. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 492. — *Bot. Mag.*, t. 2220 (*Arum*).

8. *Syn. Ar.*, I, 33; *Gen. Ar.*, t. 23; *Prodr. Ar.*, 121. — ENGL., *Arac.*, 524; *Pflanzenfam.*, 146. — B. H., *Gen.*, III, 970, n. 17.

rante. Floris fœminei germen sessile ovoideum v. oblongum, 1-loculare; stylo brevissimo mox discoideo-dilatato-stigmatoso. Ovula pauca placentæ basilari inserta erecta anatropa; micropyle infera. Fructus baccatus, demum basi circumcissus. Semina pauca erecta; integumento chartaceo, hinc conico-arillato; embryone albuminoso axili. — Herbæ tuberosæ; foliis basilaribus reniformibus, 3-pedatisectis; segmentis ovatis v. oblongis; lateralibus minoribus; petiolo longo, basi vaginante. Spadices post folia orti pedunculati, appendiculati, basi spathæ adnati; floribus fœmineis inferioribus 1-lateralibus cum masculis superioribus numerosioribus contiguis; floribus neutris supra masculos paucis conicis (v. 0). Spatha spadice longior lanceolato-acuminata reticulato-venosa persistens; tubo convoluto arcte clauso, basi cucullato. (*Brasilia*¹.)

16. **Zomicarpella** N.-E. BR.² — Flores (fere *Zomicarpæ*) monœci nudi; antherarum loculis subsphærico-2-dymis, apice poricidis. Floris fœminei germen ovoideo-oblongum, apice discoideo-stigmatosum; ovulo solitario erecto brevi anatropo; funiculo basilari brevissimo; micropyle infera. — Herba perennis parvula gracilis tuberosa; foliis cum floribus coetaneis late sagittatis v. cordato-ovatis acutis (maculatis); lobis posticis deltoideo-ovatis obtusis; nervis digitatis v. subpedatis; petiolo crassiusculo, basi vaginante. Spadix longiuscule pedunculatus, dorso basi spathæ adnatus, graciliter appendiculatus; spatha lanceolata membranacea ad basin aperta; floribus sexus utriusque subremotis. (*Columbia*³.)

17. **Xenophya** SCHOTT⁴. — Flores monœci nudi: « masculi 2-andri; staminum filamento dilatato; antheræ brevis loculis in apice connectivi oppositis, poris apicalibus dehiscentibus. Floris fœminei germen⁵ sessile, 1-loculare; stigmatate sessili sub-4-lobo. Ovula ad 6; funiculis brevibus basi loculi medio affixis erectis, brevibus anatropis; micropyle infera. — Herba tuberosa; foliis ovatis pinnatipartitis; segmentis lanceolato-acuminatis; infimis ex pedato 2-fidis. Spadices

1. Spec. ad 3. MART., *Amæn. monac.*, 18, part. (*Arum*). — K., *Enum.*, III, 20 (*Arisæma*). — BL., *Rumphia*, I, 108, part. (*Arisæma*). — SCHOTT, in *Bonplandia*, X, 86; in *Saund. Ref. bot.*, t. 15. — ENGL., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 119, t. 50.

2. In *Gardn. Chron.* (1881), II, 266; in *III.*

hort., XXVIII, 144. — B. H., *Gen.*, III, 970, n. 18. — ENGL., *Pflanzenfam.*, 146.

3. Spec. 1. *Z. maculata* N.-E. BR.

4. In *Ann. Mus. lugd.-bat.*, I, 124. — ENGL., *Arac.*, 526; *Pflanzenfam.*, 145. — B. H., *Gen.*, III, 972, n. 24.

5. « 4-gynum? » (ENGL.).

plures coetanei; spatha convoluta; floribus in spadice inappendiculato stipitato masculis fœmineisque remotis; interjectis neutris gibbosis. (*Nova Guinea*^{1.})

18. **Scaphispatha** AD. BR.² — Flores monœci nudi : masculi 4-andri; staminibus in corpus breviter obpyramidatum, 4-gonum apiceque truncato planum connatis; antherarum loculis breviusculis contiguis ad summos angulos prominulis, apice extrorsum hiantirimulosis. Floris fœminei germen sessile obovoideum, apice in stylum breviter cylindraceum attenuatum; summo stylo stigmatoso breviter conico³. Ovula in loculo germinis unico erecta anatropa 4, 5; micropyle extrorsum infera. Fructus....? — Herba....? Folia....? Spadix inappendiculatus; pedunculo longo gracilique; spathæ tubo limbo evato-lanceolato acuminato paulo brevior; spadice imæ spathæ hinc breviter adnato; floribus fœmineis paucioribus masculisque contiguis. (*Bolivia*^{4.})

19. **Stylochiton** LEPR.⁵ — Flores monœci; perianthio brevissimo annulari v. urceolato, integro v. denticulato. Stamina 3-6, sub gynœcei rudimento hypogyna; filamentis liberis gracilibus; antheris basifixis, apice truncatis; loculis ad margines rimosis. Floris fœminei calyx gamophyllus, cupularis v. saccatus. Germen inclusum oblongo-ovoideum, 1-loculare v. inferne imperfecte septatum; stylo crasso, apice stigmatoso pulvinari v. capitato. Ovula in loculis 2-∞, mucogummoso immersa, adscendentia; micropyle extrorsum infera; funiculo brevi v. longo placentæ adnato. Fructus e baccis liberis v. coalitis; pericarpis stylo apiculatis, 1-4-locularibus. Semina in loculo quoque 1-∞, ovoidea v. compressiuscula, extus striata; micropyle prominula; embryo axili dite albuminoso. — Herbæ perennes; rhizomate articulato; articulis disciformibus (annotinis). Folia sagittato-hastata v. cordata; petiolo longe vaginante. Spadices breviter pedunculati inappendiculati; spathæ tubo longo; marginibus connatis; fauce aperta; limbo ovato v. oblongo-lanceolato acuminato

1. Spec. 1. *X. bracteifolia* SCHOTT.

2. Ex SCHOTT, *Prodr. Ar.*, 214. — ENGL., *Arac.*, 526; *Pflanzenfam.*, 145. — B. H., *Gen.*, III, 978, n. 39.

3. Pulposo, albido.

4. Spec. 1. *S. gracilis* AD. BR. — SCHOTT. Folia forte haud coetanea hucusque ignota.

5. In *Ann. sc. nat.*, sér. 2, II, 184, t. 5 (*Stylochiton*). — ENDL., *Gen.*, n. 1672. — BL., *Rumphia*, I, 88. — K., *Enum.*, III, 13. — SCHOTT, *Syn. Ar.*, 132; *Aroid.*, I, 10, t. 14; *Gen. Ar.*, t. 68, *Prodr. Ar.*, 344. — ENGL., *Arac.*, 521; *Pflanzenfam.*, 142, fig. 91. — B. H., *Gen.*, III, 969, n. 16. — *Gueinzia* SOND. herb.

hiante; floribus masculis densis a fœmineis remotis; fœmineis quoque densis spiraliter dispositis v. sub-1-cyclis paucis; inferioribus nunc inter se et cum spadice confluentibus. (*Africa trop. et austr.*⁴)

20. **Spathicarpa** Hook.² — Flores monœci nudi; masculi 3-6-andri; staminibus sub corpore peltato graciliterque stipitato appensis; loculis distinctis parallelis ovoideis v. subsphæricis, nunc obtuse angulatis, extus sub apice poro dorsali apertis. Gynœcei rudimentum (nunc minimum v. 0) peltæ impositum. Floris fœminei staminodia pauca hypogyna inæqualia, subsphærica v. peltata stipitata. Germen ovoideum v. lageniforme, 1-loculare, apice cum stylo continuum; stylo summo capitato stigmatoso integro v. obtuse lobulato. Ovulum basilare sessile orthotropum; micropyle supra. Fructus baccatus staminodiis cinctus styloque coronatus. Semen erectum ovoideum, extus gummosum, dite albuminosum; embryone axili supero cylindraceo. — Herbæ perennes tuberosæ; foliis basilaribus lanceolatis, hastatis, sagittatis v. hastato-trisectis membranaceis; petiolo longo vaginante. Spadices cum foliis coetanei pedunculati, omnino intus spathæ costæ adnati eaque breviores, 2-sexuales; floribus longitudinaliter pauciseriatis; exterioribus fœmineis demum subhorizontalibus. (*Brasilia, Argentina, Paraguya*³.)

21. **Spathanthium** SCHOTT⁴. — Flores (fere *Spathicarpæ*) monœci nudi: masculi 4-8-andri; loculis contiguis apice rimulis v. extrorsum fere a basi ad apicem hiantibus. Floris fœminei staminodia 3-∞, hypogyna inæqualia. Germen lageniforme, 3-∞-loculare; stylo 3-∞-lobato cæterisque *Spathicarpæ*. Ovula in loculis solitaria, anguli interni basi funiculo longiusculo inserta anatropa; micropyle extrorsum infera. — Herbæ tuberosæ; foliis cordatis, sagittatis, integris v. pinnatifido-lobatis; spatha inflorescentiaque ejus costæ adnata (*Spathicarpæ*). (*America trop., ? Africa trop.*⁵)

1. Spec. 3. KOTSCH. et PEYR., *Pl. Tinn.*, n. 60, t. 20. — DUR. et SCHINZ, *Consp. Fl. afric.*, V, 478.

2. *Bot. Misc.*, II, 147, t. 77. — SCHOTT, *Gen. Ar.*, t. 67; *Syn. Ar.*, 124; in *Bonplandia* (1858), 124; (1862), 87. — ENDL., *Gen.*, n. 1691. — K., *Enum.*, III, 52. — ENGL., *Arac.*, 530; *Pflanzenfam.*, 144, fig. 92, A-H. — B. H., *Gen.*, III, 989, n. 70.

3. Spec. 4, 5. PEYR., *Ar. Maxim.*, t. 12-15.

— ENGL., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 230, t. 51.

— GRISEB., *Symb. Fl. argent.*, 283.

4. In *Bonplandia* (1859), 165; *Prodr. Ar.*, 343. — ENGL., *Arac.*, 529; *Pflanzenfam.*, 144. — B. H., *Gen.*, III, 989, n. 71. — *Gamochlamys* BAK., in *Gardn. Chron.* (1876), 164. — ENGL., *Arac.*, 512.

5. Spec. 2. *S. Orbignyanum* SCHOTT et *S. heterandrum* (*Gamochlamys heterandra* BAK.), africanum sic dictum.

22. **Gearum** N.-E. BR.¹ — Flores (fere *Spathicarpæ*) monœci nudi : masculi 4-andri; staminibus in massam 6-gonam vertice tumentem connatis; antheræ loculis remotis, subtus peltæ margini insertis, elliptico-oblongis, apice rimulosis. Floris fœminei staminodia compressa. Germen sphærico-3-gonum, 3, 4-loculare, apice stigmatoso 3, 4-lobum; ovulo in loculis 1, erecto orthotropo. — Herba perennis; rhizomate tuberoso; foliis basilaribus hysternanthiis petiolatis pedatis; segmento intermedio sessili; lateralibus pinnatifidis. Spadix inappendiculatus elongatus cylindraceus spatha longa erecta infra medium constricta superneque acuta cymbiformi paulo brevior sessilis; floribus densis utriusque sexus contiguis; staminodiis interpositis. (*Brasilia* ².)

23? **Gorgonidium** SCHOTT³. — « Flores 1-sexuales : masculi 6-8-andri; staminibus florum inferiorum liberis, sæpissime irregulariter dispositis; superiorum plus minus alte connatis; filamentis longis; connectivo prominente truncato; antheræ loculis stipitatis sphæroides infra apicem connectivi oppositis, vertice poricidis. Floris fœminei staminodia filiformia 6-8, apicem versus incrassata circaque germen irregulariter disposita. Germen ovoideum, 4-loculare; ovulo in loculis 1, erecto orthotropo; stylo filiformi elongato, apice stigmatoso depresso, 4-lobo. — Herba; foliis...? Pedunculus brevis. Spatha navicularis persistens, fere ad basin hians. Spadix brevior conico-cylindraceus stipitatus (inappendiculatus?); floribus masculis et fœmineis nudis arcte contiguis. (*Archip. Ind.* ⁴)

24. **Synandrospadix** ENGL.⁵ — Flores (fere *Spathanthæi* v. *Geari*) monœci; staminibus liberis 4, 5. Germina 2-5-locularia; stylo æquilongo conoideo; lobis stigmatosis radiatim usque ad basin decurrentibus. Fructus compositi baccæ⁶ ∞; loculis 1-spermis; funiculo brevi; cæteris *Asterostigmatis*. — Herba perennis; tubere maximo⁷; foliis longe petiolatis; limbo profunde 2-pinnatifido; spatha⁸ quam spadice 2-plo brevior. (*Argentina* ⁹.)

1. In *Trim. Journ.* (1882), 196, t. 231, fig. 1. — B. H., *Gen.*, III, 987, n. 66. — ENGL., *Pflanzenfam.*, 144.

2. Spec. 1. *G. brasiliense* N.-E. BR.

3. In *Ann. Mus. lugd.-bat.*, I, 283. — ENGL., *Arac.*, 529; *Pflanzenfam.*, 144. — B. H., *Gen.*, III, 988, n. 69.

4. Spec. 1. *G. mirabile* SCHOTT, inter *Stau-*

rostigma et *Gearum* ex ENGL. (e quo char. desumpt.) collocandum, v. *Pseudodracontio* affine (N.-E. BR.).

5. *Pflanzenfam.*, 141, fig. 92, K-N.

6. *Purpureæ*.

7. « Ponderis usque ad libr. 4. » !

8. *Pallente*.

9. Spec. 1. *S. vermitoxicus* ENGL. — *Bot.*

25. **Asterostigma** FISCH. et MEY.¹ — Flores (*Geari*) monœci nudi : masculi 3, 4-andri ; staminibus in corpus peltatum crasse stipitatum verticeque umbonato sub-6-gonum connatis ; antherarum loculis sub peltæ margine appensis contiguis sacciformibus, apice poricidis v. rimulosis ; rimula nunc demum extensa subtransversa². Gynœcei rudimentum plus minus evolutum nunc summæ peltæ impositum. Floris fœminei staminodia 3-5, crassiuscula brevia cuneata truncata, sublibera, connata v. in cupulam lobatam confluentia. Germen sphæricum v. pyriforme, 1-5-loculare ; stylo conoideo v. brevissimo, apice stigmatoso 2-5-lobo ; lobis clavatis v. 3-gonis, 2-fidis, stellatopatentibus. Ovulum in loculis 1, funiculo adscendenti brevi appensum ; micropyle introrsum infera. Fructus baccati subsphærici, 2-5-sulcati, 2-5-loculares. Semen oblongum, obtuse 3-gonum, extus læve v. granulatum³ ; arillo oblongo-conoideo ; embryone axili dite albuminoso. — Herbæ perennes tuberosæ stoloniferæ ; foliis basilariibus proteranthiis v. cum floribus coetaneis, longe petiolatis, cordato-hastatis, pinnatisectis v. 1, 2-pinnatipartitis ; pinnis sessilibus acuminatis. Spadices pedunculati plures v. 1, cylindracei inappendiculati ; spatha erecta lanceolata, basi involuta imoque spadici hinc adnata, superne aperta v. hiantes ; floribus sexus utriusque perfectis omnibus contiguisque. (*America trop.*⁴)

26. **Taccarum** AD. BR.⁵ — Flores monœci nudi : masculi 4-∞-andri ; antheris circa massam stipitam peltatam v. capitatam verticillatis, peltæ dorsifixis sessilibus v. appensis, oblongis parallelis contiguis ; facie extrorsa longitudinaliter sulcata ibique rimosa v. apicem versus rimulosa. Floris fœminei staminodia (?) hypogyna numero varia, crassa, libera v. in cupulam lobatam dentatamve perianthii-

Mag., t. 7242. — *Asterostigma vermitoxicum* GRISEB., *Pl. Lorentz.*, 199 ; *Symb. Fl. argent.*, 282. — *Staurostigma vermitoxicum* ENGL., *Arac.*, 517, n. 5. Spatha dicitur pallens pedunculusque nunc sæpe ultrapedalis.

1. In *Bull. Acad. Pétersb.*, III (1845), 148. — SCHOTT, in *Est. Bot. Wochenbl.* (1852), 67 ; *Syn. Ar.*, 124 ; *Gen. Ar.*, t. 66 ; *Prodr. Ar.*, 337. — O. K., *Revis.*, 740. — *Staurostigma* SCHEIDW., in *Ott. et Dietr. Allg. Gartenz.*, XVI, 129 (1848) ; in *Bot. Zeit.* (1849), 141. — ENGL., *Arac.*, 513 ; *Pflanzenfam.*, 144, fig. 92, J. — B. H., *Gen.*, III, 987, n. 65. — *Rhopalostigma* SCHOTT, in *Est. Bot. Zeit.* (1859), 39 ; *Prodr. Ar.*, 340.

2. Polline vermiformi.

3. Epidermide diaphana.

4. Spec. ad G. VELL., *Fl. flum.*, Atl., IX, t. 103 (*Arum*). — LODD., *Bot. Cab.*, t. 1590 (*Caladium*). — K., *Enum.*, III, 50 (*Philodendron*). — SCHOTT, in *Bonplandia* (1862), 86. — SCHWEIDL., in *Ott. et Dietr. Allg. Gartenzeit.* (1848), 129 (*Staurostigma*). — ENGL., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 202, t. 48 (*Staurostigma*). — K. KOCH, in *Ind. sem. Hort. berol.* (1854), App., 8 ; in *End. Ind. Ar.*, 77 (*Staurostigma*), 78. — *Bot. Mag.*, t. 5972.

5. Ex SCHOTT, *Gen. Ar.*, t. 65 ; *Prodr. Ar.*, 336. — ENGL., *Arac.*, 519, 645 ; *Pflanzenfam.*, 144. — B. H., *Gen.*, III, 986, n. 63. — *Lysistigma* SCHOTT, in *Bonplandia*, X, 222. — *Endera* REG., *Gartenfl.* (1872), 226, t. 732.

formem connata. Germen sessile teres v. 3-6-lobum, 3-6-loculare; stylo columnari recto v. arcuato, apice crasse capitato lobato. Ovula in loculis 1, 2, loculorum ad basin angulo interno inserta anatropa; funiculo brevi; micropyle extrorsum infera. Fructus...? — *Herbæ* elatæ perennes; rhizomate tuberoso; foliis basilaribus longe petiolatis hastato-ovatis, 2-pinnatifidis; pinnis undulatis; spadicebus pedunculatis inappendiculatis; floribus fœmineis inferioribus masculisque superioribus numerosioribus contiguis; spatha erecta oblongo-acuta, explanata v. hiantē; tubo brevi convoluto. (*Brasilia*¹.)

27. **Mangonia** SCHOTT². — Flores monœci nudi: masculi 3-5-andri; staminibus in corpus peltatum stipitatumque connatis; antheris in stipite summo verticillatis, 2-dymis; loculis sphæricis contiguis, apice poricidis. Floris fœminei staminodia circa germen 3, linearia apiceque dilatata. Germen ovoideum, 3-loculare; stylo columnari, apice stigmatoso-3-lobo, inter lobos obtusos recurvosque depresso. Ovula in loculis 2-na anatropa; micropyle supera; funiculo brevi imæ placentæ adnato. — *Herba* perennis (tuberosa?); foliis basilaribus proteranthiis sagittatis arcuato-nervatis. Spadix longe pedunculatus inappendiculatus; spatha oblongo-lanceolata, basi convoluta; limbo reclinato; spadice multo longiore; floribus masculis inferioribus dissitis laxis; imperfectis autem densis; fœmineis majoribus densis; supremis imperfectis. (*Argentina, Brasilia austr.*³)

II. COLOCASIEÆ.

28. **Colocasia** LUDW. — Flores monœci nudi: masculi oligandri; staminibus in massam inæqui-obpyramidatam vertice dilatato deplanatam ambituque longitudinaliter sulcato-angulatam connatis; antherarum loculis linearibus fere ad imum connectivum extensis, apice omnino poricidis. Flores fœminei germen oblongum v. obovoideum, 1-loculare; stylo brevissimo crasso v. subnullo, apice stigmatoso depresso capitato. Ovula ∞ , placentis parietalibus 2-5 inserta,

1. Spec. ad 4. ENGL., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, t. 49. — ARCANG., in *N. Giorn. bot. ital.*, XI, 312, 48. — N.-E. BR., in *Gardn. Chron.* (1881), 654, fig. 134.

2. In *Estr. Bot. Wochenbl.* (1857), 77; *Gen.*

Ar., t. 64. — ENGL., *Arac.*, 518; *Pflanzenfam.*, 143. — B. H., *Gen.*, III, 988, n. 67.

3. Spec. 1. *M. Tweedieana* SCHOTT. — ENGL., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 206. Spatha palide viridis circ. 1/2 decim. longa.

2-seriata, orthotropa v. suborthotropa; funiculis longis hinc supra basin ovulo lateraliter affixis. Fructus compositi baccae obconicae v. oblongae spathae tubo inclusae. Semina ∞ , oblonga; testa sulcata epidermide diaphana induta; arillo cum funiculo confluyente; embryone axili dite albuminoso. — Herbæ perennes elatae; caudice tuberoso v. aerio crasso; foliis cordato-ovatis v. sagittatis peltatis; petiolo longo nunc basi vaginante. Spadices cum foliis coetanei solitarii v. plures pedunculati; spathae tubo ovoideo v. oblongo accrescente persistente, demum rupto; fauce constricta; limbo lanceolato v. oblongo, demum soluto; appendice spadiceis erecta conoidea v. fusiformi (nunc 0); floribus masculis numerosioribus a foemineis remotis; interjectis masculis imperfectis sphaericis stipitatis v. deplanatis ∞ . (*Asia et Oceania trop.*) — *Vid. p. 429.*

29. **Alocasia** SCHOTT¹. — Flores (fere *Colocasiae*) in spadice eodem monœci nudi. Stamina, 3-8 in corpus obpyramidatum vertice deplanatum polygonoideum connata; antherarum loculis linearibus, fere imum connectivum attengentibus, apice sub pelta disciformi poriformi-rimosis. Floris foemineae germen 1-loculare; septis valde incompletis, apice magis evolutis 2-6; stylo brevi crasso v. elongato, apice pulvinato stigmatoso subintegro v. lobato. Ovula pauca basilaria erecta inaequalia suborthotropa²; micropyle supera³; funiculis brevibus crassis rectis. Baccae tubo spathae inclusae ellipsoideae v. obovoideae. Semina pauca subsphaerica laevia; funiculo brevi; albumine copioso carnosio, basi intruso; embryone axili. — Herbæ elatae; caudice crasso cicatrisato; foliis ex parte peltatis; majoribus sagittato-cordatis; vagina longa. Pedunculi cymosi plures; spathae tubo ovoideo v. oblongo convoluto, persistente accrescente, demum inaequi-lacero; limbo oblongo v. cucullato, demum soluto. Spadix crassus erectus, spatha brevior; appendice cylindracea v. conoidea crasse sinuata, basi rugosa; floribus foemineis inferioribus masculisque superioribus remotis; interjectis masculis imperfectis compactis deplanatis. (*Asia trop., Arch. Malayan.*⁴)

1. In *Estr. Bot. Wochenbl.* (1852), 59; *Gen. Ar.*, t. 60; *Syn. Ar.*, 44; *Prodr. Ar.*, 144. — ENDL., *Gen.*, n. 1683, b. — ENGL., *Arac.*, 497; *Bot. Jahrb.*, XV, 524; *Pflanzenfam.*, 137, fig. 88. — B. H., *Gen.*, III, 975, n. 31. — *Eusolenanthe* SCHOTT, in *Bonplandia*, IX, 368.

2. Funiculo excentrice affixo.

3. Integumento duplici.

4. Spec. 18-20. SCHOTT, *Melet.*, I, 18 (*Colocasia*). — WIGHT, *lc.*, t. 787, 789, 792, 794, 796, 797 (*Arum*). — AD. BR., in *N. Ann. Mus.*, III, 145, t. 7 (*Colocasia*). — LODD., *Bot. Cab.*, t. 416 (*Caladium*). — GRIFF., *lc. pl. as.*, t. 167 (*Arum*). — N.-E. BR., in *Gardn. Chron.* (1879), 296. — LEMZ, in *Ill. hort.*, t. 283. — *Fl. serres*, t. 2204, 2206, 2208, 2209. — FR. et SAV., *En.*

30. **Schizocasia** SCHOTT¹. — Flores (fere *Colocasia*) monœci nudi: masculi 4-7-andri; staminibus in massam sulcatam apiceque deplanatam leviterve in centro excavatam connatis; loculis cylindraceis apiceque poricidis². Floris fœminei germen depresso-sphæricum, 1-loculare, apice depresso et sub-3, 4-lobo stigmatosum; ovulis ∞ , anatropis; funiculis brevibus placentæ basilari insertis. Fructus compositi baccæ subsphæricæ, 2-6-spermæ; seminum obtuse 3-gonorum funiculo brevi; albumine duro copioso; embryone subaxili. — Herbæ perennes; caudice crasso, nunc valde elato. Folia cordato-ovata v. sa gittata pinnatipartita, longe petiolata. Spadix breviter pedunculatus; spathæ tubo involuto; limbo 3-plo longiore, ad faucem constricto, lineari-oblongo obtuso; appendice sursum attenuata; floribus masculis multo numerosioribus a fœmineis remotis; interjectis masculis imperfectis longis, depressis v. compressis. (*Nova Guinea, Ins. Philipin.*³)

31. **Gonatanthus** KL.⁴ — Flores monœci nudi: masculi 2-4-andri; antheris in massam crasse pyramidatam verticeque depressam v. truncatam connatis; loculis sub apice massæ lateraliter poricidis; connectivis crassis. Floris fœminei germen sessile, 1-loculare, v. sub apice imperfecte 2, 3-septatum; stylo brevissimo crasso, mox peltato-capitato stigmatoso. Ovula ∞ , placentæ basilari inserta orthotropa, in summo funiculo erecto moxque arcuato horizontalia v. obliqua; micropyle apicali. Fructus baccatus subsphæricus; seminibus mucogummoso immersis oblongis verruculosus albuminosis. — Herbæ perennes tuberosæ; foliis e tubere⁵ ortis longe petiolatis peltatis cordato-ovatis v. sublanceolatis acuminatis. Spadices coetanei breviter pedunculati. Spatha⁶ basi inflata tubulosa convoluta, mox constricta geniculata, superne longissime acutata involuta. Spadix fructusque tubo spathæ inclusi; floribus inferioribus fœmineis (supra masculos steriles paucos) spicatis; masculis perfectis in spadiceis parte supe-

pl. jap., II, 8. — SEEM., *Fl. vit.*, 285. — ENGL., in *Becc. Males.*, I, 292, t. 26, fig. 1-4; in *Mart. Fl. bras.*, III, II, t. 47. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 524. — RIDL., in *Trans. Linn. Soc.*, ser. II, Bot., III, 394. — DUR. et SCHINZ, *Consp. Fl. afric.*, V, 478. — *Bot. Reg.*, t. 641 (*Caladium*). — *Bot. Mag.*, t. 3935 (*Colocasia*), 5190, 5376, 5497.

1. In *Bonplandia*, X, 148. — ENGL., *Arac.*, 495, 645; *Pflanzenfam.*, 139. — B. H., *Gen.*, III, 978, n. 40.

2. Polline vermiformi.

3. Spec. 2. ENGL., *Bot. Jahrb.*, I, 185; in *Becc. Males.*, I, 293, t. 26, fig. 5-13.

4. KL., in *Link, Kl. et Ott. Ic. pl. rar.*, I, 33, t. 14. — ENDL., *Gen.*, Suppl., II, 23. — K., *Enum.*, III, 36. — SCHOTT, *Syn. Ar.*, 44; *Gen. Ar.*, t. 39; *Prodr.*, 142. — ENGL., *Arac.*, 510; *Pflanzenfam.*, 137. — B. H., *Gen.*, III, 974, 29.

5. Turiones gemmiferas ramosas vaginatas emittente.

6. Flava.

riore breviter claviformi confertis summumque tubum haud æquantibus. (*India mont.*¹)

32. *Remusatia* SCHOTT². — Flores (fere *Colocasie*) monœci nudi: masculi 2, 3-andri; staminibus in massam obcuneatam verticeque depressam connatis; antherarum loculis oblongis adnatis extrorsis, apice rimulosis. Floris fœminei germen 1-loculare, nunc superne 2-4-loculare, vertice pulvinari-stigmatosum. Ovula ∞ , orthotropa; funiculis brevibus 2-seriatis, placentis parietalibus 2-4 affixis; micropyle supera. Fructus compositi spathæque tubo inclusi baccæ ∞ , parvæ, sphaericæ v. obovoideæ. Semina ∞ , ovoidea, apice retusa; integumento extimo succulento; interiore autem crasso duro; embryone axili dite albuminoso. — Herbæ perennes tuberosæ, annis alternis folium plerumque 1 spadiceumve proferentes; tubere quoque turiones longas vaginatas gemmiferasque emittente. Folia longe petiolata peltata cordato-ovata v. lanceolata. Spadix breviter pedunculatus sessilis inappendiculatus; spathæ tubo convoluto persistente accrescente; fauce constricta; limbo patente v. refracto demumque disrupto deciduo; floribus masculis a fœmineis remotis; masculis sterilibus deplanatis interjectis et spadicis sub floribus masculis stipiti insertis. (*India et Java mont.*³)

33. *Stendnera* K. KOCH⁴. — Flores monœci nudi; masculorum staminibus 3-6 in corpus prismaticum acute v. obtuse 3-6-gonum connatis; vertice corporis depresso; antherarum thecis oblongis usque ad basin haud productis, superne dilatatis contiguis ibique apice poriformi-cymosis. Floris fœminei staminodia hypogyna pauca (v. 0). Germen 1-loculare, apice stigmatoso stellatim 3-6-lobum. Placentæ parietales 3-6; ovulis in quaque ∞ , 2-seriatim confertis suborthotropis; micropyle supera; funiculo adscendente supra basin hinc affixo. Baccæ ovoideæ; seminibus ∞ , ovoideis, ad latus funiculi arillatis, sub epidermide diaphana sulcatis; embryone axili dite albu-

1. Spec. typ. 1. *G. sarmentosus* KL. — REG., *Gartenfl.* (1868), 227, t. 588. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 522. — *Bot. Mag.*, t. 5275. — *Colocasia*? *pumila* K., *Enum.*, III, 40. — *Caladium pumilum* DON, *Prodr. Fl. nepal.*, 21. *G. ornatus* SCHOTT, in *Est. Bot. Zeitschr.* (1858), 121, dubitanter ad genus refertur.

2. *Melet.*, I, 18; *Syn. Ar.*, 43; *Gen. Ar.*, t. 36; *Prodr. Ar.*, 136. — ENDL., *Gen.*, n. 1682. — K., *Enum.*, III, 35. — ENGL., *Arac.*, 495;

Pflanzenfam., 139. — B. H., *Gen.*, III, 974, n. 28.

3. Spec. 2. REEED., *H. malab.*, XII, t. 9. — ROXB., *Fl. ind.*, III, 496 (*Arum*). — LODD., *Bot. Cab.*, t. 281 (*Caladium*). — WIGHT, *lc.*, III, t. 798 (*Arum*). — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 521.

4. In *Wochenschr. Gartn.* (1862), 114. — ENGL., *Arac.*, 451; *Pflanzenfam.*, 137. — B. H., *Gen.*, III, 988, n. 68.

minoso. — Herbæ perennes; caudice crasso ascendente vaginifero; foliis longe petiolatis ovato-oblongis peltatis. Spadix breviter pedunculatus inappendiculatus; spatha ovata marcescente, mox supra medium reflexa, spadici breviori inferne adnata; floribus masculis in massam clavatam cum fœmineis contiguam confertis. (*India or., Burmania*^{1.})

34. Caladium VENT.² — Flores monœci nudi: masculi 3-9-andri; staminibus in massam breviter obconicam vertice deplanatam ambituque 6-gonam connatis; antherarum lateralium loculis contiguis linearibus, apice extus rimulosis. Floris fœminei germen sessile plus minus longe obconicum, plerumque 2-loculare; vertice truncato, hemisphærico v. depresso nunc sulcato v. 2-lobulato dense papilloso cumque germinibus cæteris nunc cohærente. Ovula in loculis ∞ , complete v. incomplete anatropa; funiculis brevibus e septo adscendentibus v. subtransversis; micropyle extrorsum infera. Fructus baccati clavati, obovoidei v. pyriformes, stylo coronati; pericarpio tenui; seminibus pulpa involutis; embryo albuminoso axili. — Herbæ perennes lactescentes; rhizomate tuberoso; foliis³ basilaribus longe petiolatis, oblongis v. sagittatis, sæpe peltatis, reticulato-venosis. Spadix pedunculatus cum foliis coetaneus, spatha brevior cumque ea basi adnatus, ultra eam nunc stipitatus, inappendiculatus; floribus fœmineis inferioribus; masculis perfectis numerosioribus a fœmineis remotis; masculis imperfectis forma variis nunc crassis interjectis. (*America trop.*⁴)

35. Xanthosoma SCHOTT⁵. — Flores (fere *Caladii*) monœci nudi; masculorum staminibus 4-6, in corpus obpyramidatum verticeque

1. Spec. 3, 4. GRIFF., *Ic. pl. as.*, t. 164, fig. 1 (*Arum*). — REG., *Gartenfl.*, t. 633. — *Fl. serres*, t. 2201. — N.-E. BR., in *Gardn. Chron.* (1875), II, 708. — *Ill. hort.*, XIX, t. 90. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 519. — *Bot. Mag.*, t. 6076, 6762.

2. In *Rœm. Arch.*, II, 347 (1799); *Jard. Cels*, t. 30. — SCHOTT, *Syn. Ar.*, 50; *Gen. Ar.*, 45; *Prodr. Ar.*, 162. — ENDL., *Gen.*, n. 1684. — K., *Enum.*, III, 42. — ENGL., *Arac.*, 452; *Pflanzenfam.*, 139. — B. H., *Gen.*, III, 976, n. 34. — *Cyrtospadix* K. KOCH, *Ind. sem. H. berol.* (1853), App., 3.

3. In varietatibus cult. varie discoloribus.

4. Spec. 8, 9. JACQ., *H. schænbr.*, II, t. 186 (*Arum*). — AIT., *H. kew.*, III, 316 (*Arum*). —

K. KOCH, in *Wochenschr. Gartn.* (1861, 62); in *Belg. hort.*, X, 165. — PEYR., *Ar. Maxim.*, t. 28. — SCHOTT, in *Æst. Bot. Zeitschr.* (1858), 122; (1859), 38. — K. KOCH et BODCH., in *Ind. sem. H. berol.* (1853), App., 3. — ENGL., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, t. 40-42. — *Bot. Mag.*, t. 2543, 5199, 5255, 5263.

5. *Melet.*, I, 19; *Gen. Ar.*, t. 46; *Syn. Ar.*, 56; *Prodr. Ar.*, 179. — ENDL., *Gen.*, n. 1686. — K., *Enum.*, III, 44. — ENGL., *Arac.*, 468; *Pflanzenfam.*, 140. — B. H., *Gen.*, III, 976, n. 35. — *Acontias* SCHOTT, *Melet.*, I, 19; *Syn. Ar.*, 64; *Gen. Ar.*, 47; *Prodr. Ar.*, 191. — *Andromycia* A. RICH., in *R.-Sagr. Fl. cub.*, II, 982, t. 89. — *Phyllotænium* ANDRÉ, in *Ill. hort.* (1872), t. 88.

deplanato 4-6-gonum connatis. Antheræ laterales; loculis linearibus v. cuneatis connectivo æquilongis contiguïs, apice sub vertice connectivi breviter rimulosis. Floris fœminei germina oblongo-obovoidea, 2, 3-locularia, vertice supra collum brevem disciformi-dilatata, ibi inter se cohærentia, at basi distincta, apice hemisphærico v. pulvinato stigmatosa. Ovula in loculis ∞ , complete v. incomplete anatropa; micropyle plerumque infera; funiculis transversis longis, basi septo adnatis. Fructus compositi baccati spatha inclusi cylindraceuti, superne dilatati cohærentes; loculis 3, ∞ -spermis. Semina ovoidea; funiculo brevi; integumento extimo diaphano; intimo sulcato; raphe incrassata; embryone axili dite albuminoso. — Herbæ perennes lactescentes; rhizomate tuberoso v. in caudicem crassum producto. Folia sagittata, hastata v. pedatisecta, longe petiolata. Spadices 1- ∞ , pedunculati; spathæ tubo ovoideo v. oblongo convoluto persistente accreto, demum inæqui-rupto; fauce constricta; limbo cymbiformi. Spadix ima basi spathæ longiori adnatus, inappendiculatus; floribus fœmineis a masculis remotis; masculis imperfectis deplanatis compactis interjectis. (*America trop.*¹)

36. **Chlorospatha** ENGL.² — Flores (fere *Xanthosomatis*) monœci nudi: masculi 3-5-andri; staminibus in massam obpyramidatam truncatam angulatamque connatis; loculis adnatis oblongis sub apice rimulosis. Floris fœminei germen sæpius asymmetricum breve, 2, 3-loculare, vertice discoideo-stigmatosum. Ovula in loculis plura anatropa, 2-seriata; funiculis placentæ subcentrali affixis. — Herba perennis lactescens; rhizomate tuberoso. Folia basilaria petiolata pedatisecta, ad margines crispato-undulata; costis in sinu denudatis. Spadices plures pedunculati inappendiculati; spatha basi longe tubulosa; fauce haud constricta sensimque in limbum lanceolatum apicem versus compressum desinente; floribus masculis a fœmineis laxè dispositis remotis; germinibus irregulariter 4, 5-verticillatis; floribus masculis interjectis paucis, 3, 4-lobis. (*Columbia*³.)

1. Spec. ad 23. L., *Spec.*, 1369 (*Arum*). — JACQ., *H. vindob.*, II, t. 157 (*Arum*). — SPRENG., *Syst.*, III, 771 (*Caladium*). — SCHOTT, *Ar. Betr.*, II, 5; in *Blonplandia*, X, 322. — GRISEB., *Fl. brit. W.-Ind.*, 511. — ENGL., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 188, t. 43-45. — CHAPM., *Fl. S. Un.-St.*, 440. — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 418. — REG., *Ind. sem. H. petrop.* (1868), 81. — K. KOCH, *Ind. sem. H. berol.* (1855), App., 2;

Blonplandia (1856), 4. — LIEBM., in *Vid. Medd. Kjob.* (1850), 15. — DUR. et SCHINZ, *Consp. Fl. afric.*, V, 478. — MAST., in *Gardn. Chron.* (1874), 258, fig. 53. — *Bot. Mag.*, t. 4989.

2. In *Gartenfl.* (1878), 97, t. 933; *Arac.*, 487; *Pflanzenfam.*, 140. — B. H., *Gen.*, III, 977, n. 37.

3. Spec. 1. *C. Kolbii* ENGL.

37. **Hapaline** SCHOTT¹. — Flores monœci nudi: masculi oligandri. Stamina corpori peltato breviter stipitato tenuiter oblongo-6-gono inserta; loculis antherarum minutis margini peltæ subtus remote affixis, demum subtus poro orbiculari-obovato dehiscentibus indeque cupulatis². Floris fœminei germen sessile, 1-loculare; stylo mox late pulvinari-dilatato stigmatoso. Ovulum 1, suberectum anatropum; micropyle infera. Fructus ovoidei pauci baccati; semine conformi; albumine copioso duro. — Herba perennis parva tuberosa; foliis paucis v. 1, hysteroanthiis cordato-sagittatis acutis membranaceis; petiolo gracili, basi vaginante; exterioribus 1-paucis ad vaginas tenues reductis. Spadix pedunculatus e tubere ortus gracilis inappendiculatus, spatham subæquans eique inferne hinc adnatus; floribus fœmineis inferioribus paucis spadiceis basi adnatæ hinc insertis; masculorum autem peltis spiraliter imbricatis. Spatha cylindracea convoluta lanceolata, ad faucem vix v. haud constricta, acuta v. acuminata, demum fructus involvens. (*India et Cochinchina mont.*³)

38. **Arlopsis** GRAH.⁴ — Flores monœci nudi: masculi 3-andri; antheris in massulam peltatam connatis; connectivis florum omnium in stratum summi spadiceis clavati superficiale foveolatumque connatis; antherarum loculis sphæricis immersis et poro foveolis respondente dehiscentibus⁵. Floris fœminei masculo multo majoris germen subconicum, 1-loculare, styli ramis subulatis 3-6, oblique incurvis, demum patentibus, coronatum. Ovula ∞ , placentis parietalibus 3-6 inserta, muco gummoso immersa, orthotropa obliqua; micropyle apicali; funiculo longiusculo. Fructus baccati, styliorum ope coaliti; seminibus ∞ , descendentes orthotropis sulcatis; albumine carnosio; embryone axili. — Herba parva tuberosa, anno altero folia, altero autem flores gerens. Folia petiolata peltata cordato-ovata, nunc basi emarginata. Pedunculi graciles. Spatha⁶ erecta cymbiformis, lanceolato-apiculata aperta, basi leviter involuta persistens. Spadix spatha brevior ejusque dorso basi accretus; stipite

1. In (*Estr. Bot. Wochenbl.* (1857), 85; *Prodr. Ar.*, 162. — ENGL., *Arac.*, 489; *Pflanzenfam.*, 139. — B. H., *Gen.*, III, 977, n. 38. — *Apale* SCHOTT, *Gen. Ar.*, t. 44.

2. Flores abortivi nunc remotiusculi pauci apicalesque.

3. Spec. 1. *H. Benthamiana* SCHOTT. — KURZ, in *Journ. As. Soc. beng.* (1873), 109, t. 9. Ad-

ditur nunc *H. Brownei* HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 521; *Bot. Mag.*, t. 7325.

4. *Cat. pl. Bomb.*, Add., 252. — SCHOTT, *Syn. Ar.*, 40; *Gen. Ar.*, t. 35; *Prodr. Ar.*, 135. — ENGL., *Arac.*, 527; *Pflanzenfam.*, 141. — B. H., *Gen.*, III, 973, n. 27.

5. Polline in cavitatem emisso.

6. Violacea, gracilis.

gracili; floribus fœmineis inferioribus sessilibus ∞ , 1-lateralibus; masculis superioribus remotiusculis. (*India mont.*¹)

39. **Syngonium** SCHOTT². — Flores monœci nudi: masculi 3, 4-andri; staminibus in corpus obpyramidatum truncatum connatis; antherarum loculis lateraliter applicitis linearibus contiguis, extus sub apice rimulosis. Floris fœminei germina solitaria, v. lateraliter connata 2, apice convexo integro v. lobato stigmatosa. Ovula in loculis singulis 1, adscendentia anatropa; micropyle extrorsum infera. Fructus baccati inque syncarpium spathæ tubo inclusum mucilaginosum coaliti. Semina lævia (nigra) exalbuminosa, hinc arillata; embryo carnosus macropodo. — Frutices scandentes radicales; foliis alternis sagittatis, adultis pedati- ∞ -sectis; petiolo longo vaginante; vaginis persistentibus sæpiusque accretis. Spadices solitarii v. fasciculati pedunculati, spatha breviores; receptaculi basi fœminea brevior conica; superiore autem mascula clavata; floribus masculis imperfectis in clavæ parte angustata sessilibus. Spathæ limbus cymbiformis, demum deciduus; tubo sub fauce constricta ovoideo accrescente. (*America trop.*³)

40. **Porphyrospatha** ENGL.⁴ — Flores (fere *Syngonii*) monœci nudi; staminibus connatis 4. Floris fœminei germina truncata v. apice 2-loba. Ovula in placentis singulis 2, collateraliter adscendentia; micropyle extrorsum infera. — Frutices scandentes lactiflui; caudicibus elongatis radicanibus. Folia juniora oblongo-ovata, basi rotundata v. 2-auriculata; adulta sagittata v. 3-secta; vagina elongata, apice haud soluta. Spadices inappendiculati crassi spatha breviores; limbo spathæ ovato-acuto; tubo ovoideo. Flores fœminei a masculis remoti; interjectis masculis imperfectis ∞ , obconicis verticeque depressis. Cætera *Syngonii*. (*America centr.*⁵)

1. Spec. 1. *A. peltata* GRAH. — HOOK., in *Bot. Mag.*, t. 4222; *Fl. brit. Ind.*, VI, 519. — *A. protanthera* N.-E. BR., in *Kew Gard. Rep.* (1877), 51. — *Remusatia vivipara* WIGHT, *lc.*, III, t. 900 (non SCHOTT). — *Caladium ? ovatum* HAM., herb.

2. In *Wien. Zeitschr.*, III (1829), 780 (part.); *Melet.*, I, 19; *Syn. Ar.*, 65; *Gen. Ar.*, t. 48; *Prodr. Ar.*, 199. — ENDL., *Gen.*, n. 1688. — K., *Enum.*, III, 45. — ENGL., *Arac.*, 292; *Pflanzenfam.*, 141, fig. 89. — B. H., *Gen.*, III, 979, n. 43.

3. Spec. ad 10. JACQ., *Il. schœnbr.*, II, t. 191

(*Arum*). — VELL., *Fl. flum.*, Atl., IX, t. 113 (*Arum*). — Pœpp. et ENDL., *Nov. gen. et spec.*, III, 89. — MIQ., *Del. sem. H. amstel.* (1853) (*Xanthosoma*). — PEYR., *Ar. Maxim.*, t. 17, 18. — ENGL., in *N. Act. nat. cur.*, XXXIX, 184 (ramif.); in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 129, t. 26, 27.

4. *Arac.*, 289; *Pflanzenfam.*, 140. — B. H., *Gen.*, III, 980, n. 44.

5. Spec. 2. SCHOTT, *Prodr. Ar.*, 200 (*Syngonium*); in *Est. Bot. Zeitschr.* (1858), 178 (*Syngonium*). — OERST., *Aroid. mex.*, 55 (*Syngonium*). — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 423.

III. AMORPHOPHALLEÆ.

41. **Amorphophallus** BL. — Flores monœci nudi: masculi 1-4-andri; antherarum sessilium loculis 1, v. sæpius 2, contiguis, oblongis v. obconicis, apice obtuso poricidis; connectivo haud v. vix producto; polline farciminuloso. Floris fœminei germen subsphæricum, 1-4-loculare; stylo erecto brevi v. longo, apice stigmatoso dilatato integro v. obtuse 2-4-lobo. Ovula in loculis 1, ab imo angulo interno adscendentia, complete v. incomplete anatropa; micropyle extrorsum infera; funiculo brevi v. 0, nunc in arillum spurium circa ovuli basin producto. Fructus baccati; seminibus 1-paucis adscendentibus lævibus ovoideis, ellipsoideis, obovoideis v. nunc compressis exalbuminosis; embryone carnoso macropodo. — Herbæ perennes; tubere vario; foliis basilaribus amplis hysternanthiis, varie 3-sectis; segmentis varie et inæqui-sectis, 1, 2-pinnatifidis; pinnis plus minus elongatis acutis; petiolo valido, nunc apice bulbifero. Spadix breviter v. longe pedunculatus, e tubere haud foliato erumpens, appendiculatus; appendice conica, fusiformi v. subsphærica varie dilatata fungosave; floribus fœmineis inferioribus masculisque contiguis crebris; spatha erecta campanulata v. varie infundibulari fornicatave, subregulari v. hinc valde producta, marcescente. (*Orbis vet. reg. calid.*) — *Vid. p. 433.*

42. **Synantherias** SCHOTT¹. — Flores (fere *Amorphophalli*) monœci nudi: masculi 3-6-andri; antherarum subsessilium circaque receptaculi centrum disciforme insertarum loculis contiguis obovoideis, apice poricidis; poris demum rimuloso-confluentibus²; connectivo vix prominulo. Floris fœminei germen sphæricum v. oblongum, 2-loculare; stylo amplo hemisphærico subsessili stigmatoso-2-4-lobo. Ovulum in loculo adscendens; funiculo brevi septo adnato; micropyle extrorsum infera. — Herba perennis tuberosa; foliis hysternanthiis pedatisectis; segmentorum pinnatifidorum pinnis lineari-lanceolatis. Spadices tenuiter pedunculati³; spatha erecta brevi ventricosa; tubo aperto parum conspicuo; limbo e basi abrupta lato acuto; spadice

¹ 1. *Gen. Ar.*, t. 28; *Prodr. Ar.*, 126. — ENGL., *Arac.*, 319; *Pflanzenfam.*, 126. — B. H., *Gen.*, III, 972, n. 22.

² 2. Polline farciminuloso.

³ 3. Pedunculo post folia 1, 2 e tubere lævigato emisso.

multo longiore erecto gracili substipitato; appendice subulata gracili valde elongata; floribus masculis a fœmineis remotis; interjectis organibus neutris paucis depresso-conoideis et elongato-quadratis. (*India penins.*¹)

43. **Anchomanes** SCHOTT². — Flores (fere *Amorphophalli*) monœci nudi: masculi 2-andri; antherarum sessilium quadratarum loculis contiguis oblongis, vertice connectivo crasso truncato v. depresso separatis, extrorsum rimulosis. Floris fœminei germen lageniforme, 1-loculare; stylo crasse conico tuberculato, recto v. recurvo, apice stigmatoso depresso v. truncato. Ovulum suberectum incomplete anatropum; micropyle extrorsum laterali v. subinfera. Fructus compositi baccæ ovoideæ, stylo coronatæ, decurvæ. Semen ellipsoideum exalbuminosum; embryone carnosio macropodo. — Herbæ perennes tuberosæ; foliis hysternanthiis solitariis; primariis sagittatis; secundariis autem 3-sectis; segmentis subtrapezoideis; tertiariarum segmentis 2-chotomis v. pinnatifidis; petiolo erecto longo aculeato-asperato. Spadix erectus longe conoideus; pedunculo longo aculeato; spatha cymbiformi v. lanceolata acuminata carnosula erecta marcescente; tubo brevi involuto; floribus fœmineis et masculis multo numerosioribus contiguis. (*Africa trop. occid.*³)

44. **Pseudohydrosme** ENGL.⁴ — Flores (fere *Anchomanis*) monœci nudi: « masculi 2-5-andri; staminibus vix stipitatis compressis; loculis suboppositis linearibus connectivo brevioribus, apice confluentibus. Floris fœminei germen 2-loculare; stylo brevi, apice stigmatoso discoideo-2-lobo. Ovulum in loculis 1, erectum, ovoideum v. oblongum, anatropum; funiculo brevissimo placentæ ad basin sublaterali affixo; micropyle infera. Fructus . . . ? — Herbæ perennes tuberosæ; tubere sphærico. Folia hysternanthia . . . ? Spadix breviter pedunculatus, appendicibus bracteiformibus cinctus; spatha (maxima) tota involuta; floribus masculis quam fœmineis multo numerosio-

1. Spec. 1. *S. sylvatica* SCHOTT. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 518. — *Bot. Mag.*, t. 7190. — *Arum sylvaticum* ROXB., *Fl. ind.*, III, 511. — ? *Amorphophallus sylvaticus* K., *Enum.*, III, 34 (ex ENGL.). — *Brachyspatha sylvatica* SCHOTT, *Syn. Ar.*, 35. — *B. zeylanica* SCHOTT.

2. In *Est. Bot. Wochenbl.* (1853), 313; *Gen. Ar.*, t. 34; *Syn. Ar.*, 70; *Prodr. Ar.*, 134. —

ENGL., *Arac.*, 303; *Pflanzenfam.*, 126. — B. H., *Gen.*, III, 973, n. 26.

3. Spec. 1, 2. BL., *Rumphia*, I, 149 (*Amorphophallus*). — K., *Enum.*, III, 31 (*Pythonium*). — SCHOTT, in *Bonplandia* (1852), 314. — *Bot. Mag.*, t. 3728 (*Caladium*), 5394. — DUR. et SCHINZ, *Consp. Fl. afric.*, V, 473.

4. *Bot. Jahrb.*, XV, 455, t. 14, J-P; XV-XVII.

ribus, nunc superioribus sterilibus e staminibus subprismaticis haud confluentibus constantibus. (*Africa trop. occid.*¹⁾)

45. **Thomsonia** WALL.² — Flores (fere *Amorphophalli*) monœci nudi: masculi 3-5-andri; filamentis brevissimis; antheræ quadratæ loculis 2, apice poricidis; poris demum confluentibus; connectivo tenui nunc prominulo. Floris fœminei germen sessile subsphæricum, 1-loculare; stylo longe cylindræo, apice stigmatoso capitato-4-gono. Ovulum 1, basifixum anatropum; funiculo erecto brevi; micropyle infera. Fructus ...? — Herbæ tuberosæ; foliis petiolatis, 3-pedatisectis; segmentis pinnatipartitis; pinnis lanceolatis acuminatis; spadiceis appendiculati pedunculo longo; floribus fœmineis inferioribus masculisque arcte contiguis; spadice³ spatham subæquante; appendice inferne floribus neutris apiceque tuberculis conoideis operata; spatha oblonga cymbiformi coriacea decidua; tubo haud distincto. (*India mont.*⁴⁾)

46. **Pseudodracontium** N.-E. BR.⁵ — Flores monœci nudi: masculi 3-6-andri; staminibus liberis v. plus minus alte 1-adelphis; filamentis crassiusculis v. clavatis; antheræ terminalis sphæricæ v. obcordatæ loculis contiguis, extrorsum poris v. rimulis subapicalibus apertis; connectivo inter loculos haud v. parum producto. Floris fœminei germen obovoideum, sphæricum v. oblongum, 1-loculare; stylo perlongo terminali, apice stigmatoso pulvinari. Ovulum 1, basilare anatropum; funiculo erecto brevi; micropyle infera. Fructus ...? — Herbæ perennes tuberosæ; foliis basilaribus 3-sectis; segmentis fissis v. pinnatis; pinnis lanceolato-acuminatis; superioribus decurrenti-confluentibus; inferioribus sæpius minoribus; petiolo longo, basi vaginante. Spadices cum foliis coetanei pedunculati appendiculati; floribus fœmineis inferioribus dense congestis; masculis autem sparsis longe distantibus; appendice spatha brevior, cylindræo-conica obtusa, floribus neutris stipitatis apicibus corrugatis quasi verrucosis operata; spatha cymbiformi erecta acuta membra-

1. Spec. 2, *P. gabunensis* ENGL. et *P. Buettneri* ENGL. — DUR. et SCHINZ, *Consp. Fl. afric.*, V, 475.

2. *Pl. as. rar.*, I, 83, t. 99. — BL., *Rumphia*, I, 150. — ENGL., *Arac.*, 306; *Pflanzenfam.*, 126. — B. H., *Gen.*, III, 971, n. 20. — *Pythonium* SCHOTT, *Melet.*, 17; *Syn. Ar.*, 36; *Gen. Ar.*, t. 25; *Prodr. Ar.*, 123. — ENDL., *Gen.*,

n. 1680. — K., *Enum.*, III, 30. — *Allopythion* SCHOTT, *Gen. Ar.*, t. 24; *Prodr. Ar.*, 122.

3. Odore putrido deterrimo.

4. Spec. 2. HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 518. — *Bot. Mag.*, t. 7342.

5. In *Trim. Journ.* (1881), 193, t. 231, fig. 2. — B. H., *Gen.*, III, 971, n. 21. — ENGL., *Pflanzenfam.*, 126.

nacea, basi breviter convoluta, circa fructus diu persistente. (*Cochinchina*¹.)

47. **Plesmonium** SCHOTT². — Flores (*Amorphophalli*) monœci nudi; masculorum staminibus distinctis; antheræ oblongulo-quadratæ loculis contiguis breviter obovoideis, transverse confluenti-rimulosis; connectivo prominulo. Floris fœminei germen sphæricum v. ovoideum, 2, 3-loculare; stylo conico, apice stigmatoso majusculè pulvinari. Ovula in loculis solitaria erecta anatropa; micropyle extrorsum infera. Fructus ovoidei baccati, vertice intrusi; loculis 1-spermis 1-3. Semen ellipsoideum plano-convexum obtuseve 3-gonum, extus rugulosum; embryo exalbuminoso macropodo. — Herbæ perennes tubere (maximo) depresso donatæ; foliis proteranthiis, 3-sectis; segmento terminali pinnatipartito; lateralibus pinnatisectis furcatis; pinnis linearibus lanceolatisve. Spadix stipitatus rectus cylindræus; spatha ovata campanulato-involuta, superne aperta, marcescente; floribus crebris; masculis multo numerosioribus a fœmineis remotis; organis neutris crebris pisiformibus crassis margaritaceis interpositis. (*India*³.)

48. **Lasia** LOUR.⁴ — Flores hermaphroditi fertiles; perianthii foliolis 4-6, obovatis, apice fornicato truncatis, imbricatis; lateralibus sæpius extimis. Stamina totidem opposita; filamentis brevibus latis, apice incrassatis; antheræ loculis ellipsoideis parallelis connectivum superantibus, extrorsum rimosis. Floris fœminei germen ovoideum, 1-loculare; stylo apicali tumido depresso capitato stigmatoso; ovulo complete v. incomplete anatropo; funiculo brevi e summo loculo descendente. Fructus e baccis mutua pressione angulatis, vertice dense muricatis, 1-spermis. Semen compressum v. angulatum cuneatum descendens, juxta funiculum verrucosum; albumine demum 0; embryo campylotropo macropodo. — Herbæ paludosæ perennes robustæ lactifluæ; rhizomate repente crasso ramoso spinescente. Folia juniora hastata v. sagittata; adulta pedato-pinnatifida;

1. Spec. 2, 3. LIND. et ANDRÉ, in *Ill. hort.* (1878), 90, t. 316 (*Amorphophallus*). — *Bot. Mag.*, t. 6673.

2. *Syn. Ar.*, 34; *Gen. Ar.*, t. 26; *Prodr. Ar.*, 124. — ENGL., *Arac.*, 302; *Pflanzenfam.*, 126. — B. H., *Gen.*, III, 973, n. 25.

3. Spec. ad 3. ROXB., *Fl. ind.*, III, 512 (*Arum*). — WIGHT, *lc.*, III, t. 795 (*Arum*). —

K., *Enum.*, III, 34 (*Amorphophallus*). — SCHOTT, in *Ann. Mus. lugd.-bat.*, I, 279. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 518.

4. *Fl. cochinch.*, 81 (non PAL.-BEAUV.). — SCHOTT, *Melet.*, I, 21; *Gen. Ar.*, t. 82; *Prodr. Ar.*, 399. — SPACH, *Suit. à Buff.*, XII, 33 (*Orontieæ*). — ENGL., *Gen.*, II, 1701. — K., *Enum.*, III, 66. — ENGL., *Arac.*, 272; *Pflanzenfam.*, 123.

petiolo robusto, basi vaginante ibique (cum nervis subtus) spinoso. Spadices sessiles inappendiculati; pedunculo longo spinescente; spatha longissima angusta carnosae, basi breviter involuta, mox arcte contorta, sub anthesi supra basin aperta deinque reclusa, decidua; spadice breviter cylindraceo; floribus dense spiraliter insertis. (*Asia et Oceania trop.*¹⁾)

49. **Podolasia** N.-E. BR.² — « Flores (fere *Lasiae*) hermaphroditi; perianthii foliolis 4-6, imbricatis. Stamina totidem hypogyna; filamentis oblongo-quadratis, apice incrassatis; anthera terminali brevi didyma; loculis sphaericis connectivum superantibus parallelis, extrorsum rimosis³. Floris foeminei germen 4-6-gonum, vertice tumido pulvinari-stigmatosum; ovulo 1, sessili anatropo basilari v. subbasilari. Fructus ...? — Herba gracilis; caudice erecto brevi; foliis sagittatis v. hastatis, graciliter pedunculatis; lobis longis acuminatis; petiolo aculeato. Spadix stipitatus inappendiculatus; pedunculo gracili inermi v. aculeato; spatha⁴ anguste cymbiformi erecta, dorso infra medium 1-costata, a basi aperta; spadice breviori longiuscule stipitato densifloro cylindraceo obtuso. (*Borneo*⁵.) »

50. **Anaphyllum** SCHOTT⁶. — Flores (fere *Lasiae*) hermaphroditi fertiles omnes; perianthii foliolis 4, obovatis latis, apice truncato fornicatis; praefloratione imbricata. Stamina totidem opposita; filamentis late complanatis, apice abrupte angustatis; antheræ terminalis loculis connectivo longioribus subparallele sacciformibus, apice extrorsum rimulosis. Floris foeminei germen oblongum v. late ovoideum, 1-loculare; stylo disciformi sessili stigmatoso. Ovulum 1, hemitropum; funiculo brevi placentæ adnatum; micropyle infera. Fructus e baccis obovoideis ∞. — Herba elata perennis prorepens; foliis (amplis) membranaceis; junioribus sagittatis; adultis pedatipartitis; segmentis sessilibus remotis, v. inferioribus petiolatis longe lineari-lanceolatis acuminatis integris; petiolo gracili longissimo,

1. Spec. 2. L., *Fl. æyl.*, 328; *Spec.*, 967 (*Dracontium*). — ROXB., *Fl. ind.*, I, 457 (*Pothos*). — HAM., in *Cat. Wall.*, n. 4447 (*Pothos*). — WIGHT, *lc.*, III, t. 777 (*Pothos*). — GRIFF., *It. not.*, III, 155. — MIG., *Fl. ind. bat.*, III, 176. — SCHOTT, in *Bonplandia* (1857), 125; in *Ann. Mus. lugd.-bat.*, I, 127. — ENGL., in *Becc. Males.*, I, 278. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 550. — RIDL., in *Trans. Linn. Soc.*, ser. II, Bot., III, 395.

2. In *Gardn. Chron.* (1882), II, 70. — B. H., *Gen.*, III, 996, n. 88. — ENGL., *Pflanzenfam.*, 124.

3. Polline pulvereo.

4. Purpurea.

5. Spec. 1. *P. stipitata* N.-E. BR. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 550.

6. *Gen. Ar.*, t. 83; *Prodr. Ar.*, 404. — ENGL., *Arac.*, 274; *Pflanzenfam.*, 124. — B. H., *Gen.*, III, 996, n. 90.

basi vaginante. Spadices longe graciliterque pedunculati stipitati inappendiculati; spatha longe lanceolato-acuminata membranacea, basi convoluta, superne torta, decidua, spadice multo longiore ejusque stipiti adnata; floribus spiraliter sessilibus. (*India*¹.)

51. **Cyrtosperma** GRIFF.² — Flores (fere *Lasix*) hermaphroditi; perianthii foliolis 4-8, imbricatis fornicatis. Stamina totidem; filamentis brevibus complanatis; antherarum loculis oblongis, extrorsum rimosis. Germen 1-loculare; stylo pulvinari, superne stigmatoso. Ovula 1- ∞ , hemitropa, placentis parietalibus inserta, 2-seriata; micropyle extrorsum infera; funiculis longis placentæ ad apicem germinis extensis, 2-seriatis. Fructus baccati conferti, 1-oligospermi. Semina reniformia v. arcuata compressa cristata; albumine carnosio parco; embryone semini conformi arcuato. — Herbæ perennes; rhizomate longo v. tuberoso; foliis basilaribus hastatis; petiolo plerumque spinuloso v. verrucoso, basi vaginante. Spadices inappendiculati, sessiles v. stipitati, cylindranei v. subsphærici densiflori, deorsum florentes; petiolo sæpe spinuloso; spatha longiore ovato-oblonga v. lanceolata, recta v. torta, diu tota persistente, basi convoluta demumque aperta. (*America, Asia et Africa trop.*³)

52. **Dracontium** L.⁴ — Flores hermaphroditi; perianthii foliolis 4-8, oblongis, cuneatis v. spathulatis, apice fornicato imbricatis. Stamina 4-12, 2-4-seriata; filamentis lineari-dilatatis; antherarum terminalium loculis connectivo longioribus elliptico-oblongis, apice extrorsum rimulosis⁵. Germen sphæricum v. ovoideum; loculis completis v. incompletis 2-4, 1-ovulatis; stylo brevi longove, apice stigmatoso integro⁶ v. 2-4-lobo. Ovulum campylotropum; funiculo

1. Spec. 1. *A. Wightii* SCHOTT. — WIGHT, *lc.*, t. 777. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 551.

2. *Notul.*, III, 149; *lc. pl. ar.*, t. 169. — SCHOTT, *Gen. Ar.*, t. 84; *Prodr. Ar.*, 402. — ENGL., *Arac.*, 268; *Pflanzenfam.*, 123. — B. H., *Gen.*, III, 997, n. 92. — *Lasimorpha* SCHOTT, in *Bonplandia* (1857), 127; *Gen. Ar.*, t. 85; *Prodr. Ar.*, 405.

3. Spec. 8-10. ENGL., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, t. 22; in *Becc. Males.*, I, 278, t. 24. — HASSE., *Cal. H. bog.*, 59 (*Lasia*). — SEEM., *Fl. vit.*, 287. — SCHOTT, in *Ann. Mus. lugd.-bat.*, I, 284. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 550. — DUR. et SCHINZ, *Consp. Fl. afr.*, V, 472. — *Ill. hort.*, XXVII, t. 395 (*Alocasia*).

4. *H. Cliff.*, 431; *Gen.*, ed. II, n. 841; ed. VI, n. 1029. — J., *Gen.*, 24 (part.). — VENT., *Tabl.*, II, 86 (part.). — SPRENG., *Anl.*, II, 125; *Syst.*, III, 766; *Gen.*, II, 680. — SCHOTT, *Melet.*, 22; *Gen. Ar.*, 87; *Prodr.*, 417. — ENDL., *Gen.*, n. 1704. — K., *Enum.*, III, 83. — ENGL., *Arac.*, 282; *Pflanzenfam.*, 124, fig. A-H. — B. H., *Gen.*, III, 995, n. 86. — *Chersydrium* SCHOTT, in *Est. Bot. Zeit.* (1865), 72. — *Echidnium* SCHOTT, in *Est. Bot. Wochenbl.* (1857), 62; *Gen. Ar.*, t. 88; *Prodr. Ar.*, 418. — ENGL., *Arac.*, 285. — *Godwinia* SEEM., in *Journ. Bot.* (1869), 313, t. 96, 97?

5. Polline conglutinato.

6. E. g. in *Echidnio*.

brevi placentæ ad medium angulum adnato; micropyle extrorsum infera. Fructus baccati, 2-4-lobi, 2-4-loculares; semine in loculis 1, reniformi, cristato v. dorso tuberculato; hilo intruso; embryone exalbuminoso macropodo arcuato. — Herbæ perennes, giganteæ v. magnæ, lactifluæ; tubere hypogæo. Folium 1, synanthium v. hysteranthium, giganteum v. amplum, 3-partitum; segmentis 3-sectis pinatipartitis; petiolo magno v. maximo verrucoso, basi vaginante. Spadix pedunculatus; pedunculo mox elongato; spatha¹ oblonga erecta, basi convoluta, mox aperta fornicata persistente marcescenteque; spadice brevior cylindræo appendiculato breviter stipitato, dense florifero deorsumque florente. (*America trop.*²)

53. **Urospatha** SCHOTT³. — Flores (fere *Dracontii*) hermaphroditi; sepalis 3-6, apice fornicato truncatis v. retusis. Stamina totidem hypogyna; filamentis latis brevibus complanatis; antheris extrorsis; loculis parallelis connectivum superantibus, apice breviter hiantirimos. Germen obpyramidatum, imperfecte 2-loculare; papillis stigmatosis verticem pulvinatum coronantibus. Ovula 2-∞, adscendentia anatropa; funiculo longiusculo ad imum septum inserto. Fructus baccatus scrobiculatus; seminibus 1-paucis muco gummoso immersis adscendentibus meniscoideis scrobiculatis; albumine carnosio; embryone arcuato tereti carnosio. — Herbæ perennes paludosæ; rhizomate crasso; foliis paucis sagittato-hastatis; petiolo longo lævi v. verrucoso vaginante. Spadices longe pedunculati inappendiculati spatha breviores ultraque eam subsessiles; spatha erecta, basi primum clausa deinque aperta, recta, arcuata v. torta persistente. (*America trop.*⁴)

54? **Ophione** SCHOTT⁵. — Flores (fere *Urospathæ*) hermaphroditi

1. Brunneo-violascente v. rubente.

2. Spec. ad 6. L., *Spec.*, 967. — ? HERM., *Parad.*, 93, c. fig. (*Arum*). — W., *Spec.*, II, 288. — K., *Ind. sem. H. berol.* (1844), 9; in *Linnaea* (1844), 498. — ENGL., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 124, t. 24. — SAUND., *Ref. bot.*, IV, t. 282. — LEME, in *Ill. hort.* (1864), t. 124 (*Amorphophallus*); (1866), 14, c. ic. — MAST., in *Gardn. Chron.* (1870), fig. 58. — *Fl. serres*, t. 2244. — K. KOCH, in *End. Ind. Ar.*, 44. — REG., *Gartenfl.*, t. 503 (*Echidnium*). — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 427. — *Bot. Reg.*, t. 700. — *Bot. Mag.*, t. 6048 (*Godwinia*), 6523, 6608.

3. *Ar.*, 3, t. 7-10; *Gen. Ar.*, t. 86; *Prodr.*

Ar., 406; in *Bonplandia* (1857), 128. — ENGL., *Arac.*, 275; *Pflanzenfam.*, 124.

4. Spec. ad 10. RUDGE, *Pl. Guian.*, t. 34 (*Pothos*). — PÆFF. et ENDL., *Nov. gen. et spec.*, III, t. 296 (*Spathiphyllum*). — SCHOTT, *Melet.*, I, 22 (*Spathiphyllum*); in *Est. Bot. Wochenbl.* (1857), 253, 254. — K., *Enum.*, III, 83 (*Spathiphyllum*). — ENGL., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, t. 23. — PEYR., *Ar. Maxim.*, t. 16. — RODSCH., *Obs.*, 30 (*Arum*). — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 427.

5. In *Est. Bot. Wochenbl.* (1857), 101; *Gen. Ar.*, t. 89; *Prodr. Ar.*, 419. — ENGL., *Arac.*, 281; *Pflanzenfam.*, 124.

fertiles; perianthii foliolis 4, 5, apice late dilatato truncatis, dorso tuberculatis, imbricatis. Stamina totidem hypogyna; filamentis linearibus, dorso angulatis, apice abrupte angustatis; antheræ terminalis loculis connectivo longioribus obovoideis erectis, sub apice hianti-rimosis. Germen ovoideum; stylo crasse conico, apice stigmatoso obscure 4, 5-lobato; loculis totidem 1-ovulatis. Ovulum adscendens hemitropum; funiculo brevi placentæ in angulo interno adnato; micropyle extrorsum infera. — Herba tuberosa; foliis ... ? Spadix graciliter pedunculatus, ultra vaginas exsertus subsessilis inappendiculatus; spatha lanceolata, apice convoluta moxque reflexa; spadice multo brevior cylindræo obtuso inappendiculato, deorsum florente. (*Columbia*¹.)

55. **Montrichardia** CRUEG.² — Flores (*Dracontii*) monœci nudi : masculi 3-6-andri. Antheræ sessiles dorso contiguæ, obpyramidato-3-gonæ; loculis oblongis acutatis connectivoque truncato brevioribus, ab apice retrorsum rimosis. Floris fœminei germina connata turbinate-6-gona, apice dilatato rotundata; areola apicali depressa stigmatosa, 4-loba. Ovula 1, 2, subbasilaria, collateraliter adscendentia, plus minus complete anatropa; micropyle infera; funiculo brevissimo. Fructus compositi baccae ∞ , subconnatæ spongiosæ, vertice intruso radiatim sulcatæ. Semen 1, subsphæricum, ovoideum v. compressum; embryone exalbuminoso macropodo. — Frutices, nunc arborescentes lactiflui; caudicibus sympodialibus crassis erectis annulatis, lævibus v. aculeatis, simplicibus v. ramosis. Folia alterna sagittata coriacea; lobis posticis elongatis; petiolo robusto, basi alte vaginante; vagina in ligulam varie producta. Spadices 1, 2; pedunculis folio brevioribus; spatha erecta late ovato-acuta crassa, basi convoluta, fauce aperta, demum tota decidua; spadice brevior sessili erecto crasso obtuso inappendiculato; floribus sæpius crebris densissimisque; fœmineis et masculis multo numerosioribus contiguis; parte fœminea cylindræa (axis totius partem quartam superante). (*America trop.*³)

1. Spec. 1, male nota. *O. Purdieana* SCHOTT.
2. In *Bot. Zeit.* (1854), 25. — SCHOTT, *Syn. Ar.*, 71; *Prodr. Ar.*, 215; *Gen. Ar.*, 49. — ENGL., *Arac.*, 287; *Pflanzenfam.*, 129, fig. 82, 83. — B. H., *Gen.*, III, 982, n. 50.

3. Spec. ad 3. PLUM., *Amer.*, t. 204 (*Arum*). — VELL., *Fl. flum.*, Atl., IX, t. 109 (*Arum*).

— K., *Enum.*, III, 48 (*Philodendron*). — ARRUD., ex NEES et MART., in *N. Act. nat. cur.* (1824) (*Arum*). — ENGL., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 127, t. 25. — PEYR., *Ar. Maxim.*, t. 21, 22. — G.-F.-W. MEY., *Prim. Fl. esseq.*, 274 (*Caladium*). — ? SCHOTT, in *Bonplandia* (1859), 29. — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 424.

56. **Nephtytis** SCHOTT¹. — « Flores monœci nudi: masculi ...? Floris fœminei germen ovoideum, 1-loculare; ovulo 1, anatropo oblongo-ovoido sub apice inserto descendente; micropyle infera; funiculo brevissimo. Fructus compositi baccæ² ellipsoideæ. Semen 1, loculi apici appensum obovoideum; hilo excavato circulari; embryone exalbuminoso macropodo. — Herba perennis prorepens; rhizomate crasso. Folia³ basilaria longe petiolata; limbi sagittati lobis posticis retrorsis acuminatis nervatis et reticulato-venosis. Pedunculus tenuis petiolo 2-plo brevior; spatha ad pedunculum decurrente; spadice stipitato. (*Guinea*⁴.) »

57. **Oligogynium** ENGL.⁵ — Flores (fere *Nephtytidis*) monœci nudi; masculorum 1-4-androrum staminibus subcubicis v. prismaticis compressis; antheræ subsessilis locellis parallelis, apice poricidis. Floris fœminei germen subsphæricum v. lageniforme, 1-loculare; stylo brevi v. longiusculo, apice pulvinari stigmatoso; ovulo subbasilari adscendente anatropo; micropyle infera. Fructus baccæ⁶ ellipsoideæ v. ovoideæ. Semen adscendens; embryone macropodo. — Herbæ perennes; rhizomate vario; foliis basilaribus sagittatis; petiolo basi breviter vaginante. Spadix pedunculatus inappendiculatus; spatha elliptica, ovata v. oblongo-acuminata involuta; axi contra spatham florifero v. plus minus stipitato; floribus fœmineis ∞ masculisque contiguis spiraliter insertis. (*Africa trop.*⁷)

58. **Rhektophyllum** N.-E. BR.⁸ — « Flores monœci nudi. Masculorum stamina 3-5, 3-gona truncata, dorso contigua; antheræ loculis linearibus contiguis, apice poricidis. Floris fœminei germen sphæricum, oblongum v. compressum obliquum, 1-loculare, apice pulvinari-stigmatosum. Ovulum ana-tropum; funiculo brevi placentæ parietali elongatæ affixum; micropyle infera. Fructus...? — Frutex scandens; foliis longe petiolatis (amplis), ambitu cordato-ovatis v.

1. In *Est. Bot. Wochenbl.* (1857), 406; *Gen. Ar.*, t. 51; *Prodr. Ar.*, 218. — ENGL., *Arac.*, 301; *Bot. Jahrb.* (1893), 451; *Pflanzensfam.*, 128. — B. H., *Gen.*, III, 982, n. 51 (part.).

2. Rubræ.

3. *Lasia* v. *Cyrtospermatis* (ENGL.).

4. Spec. 1. *N. Afzelii* SCHOTT. — DUR. et SCHINZ, *Consp. Fl. afric.*, V, 475.

5. *Bot. Jahrb.* (1883), 64; (1893), 452; *Pflanzensfam.*, 129.

6. Rubræ v. aurantiacæ, nunc majusculæ, haud indecoræ, male nunc ab hortulanis pro seminibus nudis sumptæ.

7. Spec. 4, 5. N.-E. BR., in *Gardn. Chron.* (1881), 453, 790 (*Nephtytis*). — B. H., *Gen.*, III, 982 (*Nephtytis*, part.). — DUR. et SCHINZ, *Consp. Fl. afric.*, V, 476.

8. In *Trim. Journ.* (1882), 194, t. 230. — B. H., *Gen.*, III, 981, n. 47. — ENGL., *Pflanzensfam.*, 128.

subhastatis, acutis, pertusis inque lacinias paucas inæquales pinnatisectis; costa nervisque patentibus validis; petiolo longissimo, basi vaginante. Spadices solitarii v. plures, breviter crasseque pedunculati; spatha subcylindrica tota convoluta coriacea crassa obtusa; spadice cylindraceo sessili inappendiculato obtuso; floribus masculis fœmineisque contiguis. (*Africa trop. occid.*¹⁾ »

59. **Cercestia** SCHOTT². — Flores (*Nepthytidis*?) monœci nudi: masculi 4-andri; staminibus sessilibus, dorso contiguis prismatico-3-gonis, vertice deplanatis; antheræ loculis oblongis connectivo crassiore brevioribus sapiu contiguis, apice rimulosis. Floris fœminei germen sphæricum v. obovoideum, 1-loculare, apice orbiculari-dilatato pulvinari stigmatosum, 1-ovulatum; ovulo placentæ suprabasilaris inserto adscendente anatropo; micropyle infera; funiculo brevissimo. « Fructus obovoidei baccati, apice styliiferi; semine pendulo obovoideo ad hilum excavato; embryone exalbuminoso macropodo. » — Frutices scandentes lactiflui; ramis gracilibus ad nodos radicanibus. Folia alterna, hastata v. cordato-sagittata; petiolo tenui; vagina angusta longa. Spadices breviter pedunculati axillares solitarii v. plures inappendiculati; spatha spadice longiore erecta parva convoluta decidua; floribus dense spiraliter insertis; masculis numerosioribus fœmineisque remotis; interpositis masculis imperfectis compactis deplanatis. (*Africa trop. occid.*³⁾

60. **Alocastophyllum** ENGL.⁴ — Flores (fere *Nepthytidis*) masculi 2, 3-andri; staminibus inæqui-prismaticis; loculis linearibus latis, infra connectivum summum extrorsum apertis⁵. Floris fœminei germen valde depressum; 1-loculare, apice late discoideo orbiculari stigmatosum. Ovulum 1, hemitropum; funiculo brevi basifixo. Fructus...? — Scandens adque nodos radicans; caudice post folia pauca bracteas et spadicem emittente. Folia petiolata; petiolo basi vaginante; limbo ovoideo-oblongo; nervis lateralibus subhorizontaliter patentibus, prope marginem nervulis arcuatis connexis; venis

1. Spec. 1. *R. mirabile* N.-E. BR. — DUR. et SCHINZ, *Consp. Fl. afric.*, V, 475.

2. In *(Est. Bot. Wochenbl.)* (1857), 414; *Gen. Ar.*, t. 52; *Prodr. Ar.*, 218. — ENGL., *Arac.*, 300; *Pflanzenfam.*, 128. — B. H., *Gen.*, III, 980, n. 46.

3. Spec. 1. *C. Afzelii* SCHOTT (ex ENGL., potius spec. 3). « Genus *Culcasia* quam maxime affine » (B. H.). — DUR. et SCHINZ, *Consp. Fl. afric.*, V, 475.

4. *Bot. Jahrb.*, XV, 449, t. 19.

5. Polline farciminuloso.

tenuibus parce reticulatis. Spadix pedunculatus; spatha oblonga, inferne leviter involuta; floribus sexus utriusque contiguus. (*Africa trop.*¹⁾)

IV. PHILODENDRÆ.

61. **Philodendron** SCHOTT. — Flores in spadice eodem monœci nudi : masculi 2-6-andri; staminibus in massam obpyramidatam angulatam sulcatam verticeque deplanato dilatamve connatis; antherarum loculis lineari-oblongis parallelis, connectivo brevioribus eique lateraliter affixis, extrorsum ab apice poricidis v. rimulosis. Floris fœminei germen oblongum, obovoideum v. obconicum, 2-12-loculare; stylo brevi crasso, brevissimo v. subnullo, apice stigmatoso pulvinari v. hemisphærico, integro, sinuato v. lobato. Ovula in loculis 1- ∞ , orthotropa v. incomplete anatropa; micropyle sæpius supera; funiculis placentæ 2-seriatim basi adnatis adscendentibus rectis v. sinuosis. Staminodia nunc hypogyna clavata ∞ . Fructus baccæ confertæ, 1-12-loculares, spathæ tubo involutæ. Semina adscendentia lævia v. costata, extus succulenta; funiculo erecto; albumine copioso; embryone axili. — Arbusculæ v. sæpius frutices scandentes radicales, v. raro herbæ perennes subacaules; foliis vaginis oppositis, integris, lobatis, pinnatifidis v. semel bisve pinnatisectis; vagina persistente; limbo coriaceo nervato venosoque. Spadices inappendiculati axillares terminalesque, sæpe fasciculati; spatha oblique inserta convoluta persistente, demum reconvoluta succulenta; tubo sæpe accreto demumque rupto; spadice axi sessili v. breviter ultra spatham stipitato; floribus fœmineis a masculis remotis; masculis nunc sterilibus clavatis v. apice cupulari dilatatis intermixtis. (*America trop.*) — *Vid. p. 436.*

62? **Adelonema** SCHOTT². — « Flores fere *Philodendri*; staminibus in massam obpyramidato-4-gonam coalitis; vertice conico-elevato. Floris fœminei germen oblongum sub-4-gonum; loculis 2, ∞ -ovulatis. Ovula anatropa; micropyle infera; funiculis placentæ medio dissepimento adnatæ 2-seriatim affixis longiusculis. Stigma

1. Spec. 1. *A. Kamerunianum* ENGL. — DUR. et SCHINZ, *Consp. Fl. afric.*, V, 475.

2. *Prodr. Ar.*, 316. — ENGL., *Arac.*, 432; *Pflanzenfam.*, 135.

discoideum orbiculare sessile. — Herba perennis; rhizomate prorepente; caudice densiuscule folioso, post folia spiraliter ordinata pedunculum tenuem proferente; foliorum limbo oblongo-elliptico. Pedunculus tenuis; spatha oblonga acuta, inferne convoluta; fauce leviter constricta. (*Brasilia bor.*¹) »

63. **Philonotium** SCHOTT². — Flores (fere *Philodendri*) monœci nudi: masculi 2-andri. Floris fœminei germen oblongum, 1-loculare, apice stigmatoso minute hemisphærico. Ovulum 1, erectum orthotropum; micropyle supera; funiculo arcuato parieti infra medium affixo. — Herba perennis; rhizomate parvo; foliis basilaribus lanceolatis acuminatis; petiolo vaginante longo, apice geniculato. Spadix longe pedunculatus; spathæ erectæ tubo involuto; limbo cymbiformi erecto; floribus masculis fœmineisque remotis; interpositis neutris paucis conicis. (*Brasilia*³.)

64? **Thaumatophyllum** SCHOTT⁴. — « Flores (fere *Philodendri*) monœci nudi; masculorum staminibus distinctis; filamento stipitiformi; anthera subclavata obtuse 6-gona; loculis contiguïs angustis, apice poricidis? Floris fœminei germen prismaticum v. obpyramdatum, vertice rotundatum, 4-loculare; stigmate hemisphærico sessili. Ovula ∞ , placentis elongatis 2-seriatim affixa orthotropa; funiculo supra basin ovulorum inserto; micropyle supera. Fructus...? — Frutex scandens; caudice lævi ramoso. Folia (ampla) longe petiolata, pinnatim pedatisecta; cruribus cum petiolo articulatis; pinnis sessilibus oblongo-lanceolatis acuminatis; nervis creberrimis tenuibus; petiolo longo, ima basi vaginante. Spadix crassus appendiculatus; pedunculo...; spatha lata crassa; floribus masculis fœmineisque contiguïs. (*Brasilia bor.*⁵) »

65. **Homalonema** SCHOTT⁶. — Flores (fere *Philodendri*) monœci

1. Spec. 1. *A. erythropus* SCHOTT. — ENGL., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 171, t. 38. — *Caladium erythropus* MART., Obs., 3084. — *Philodendron erythropus* SCHOTT, Syn. Ar., 76. « Vix sine dubio *Homalonematis* species » (B. H., Gen., III, 983).

2. Gen. Ar., t. 54; Prodr. Ar., 317. — ENGL., Arac., 431; *Pflanzenfam.*, 135. — B. H., Gen., III, 981, n. 49. — *Nebrownia* O. K., Revis., 742.

3. Spec. 1. *P. Spruceanum* SCHOTT. — ENGL.,

in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 170. — *Nebrownia Spruceana* O. K.

4. In *Bonplandia* (1859), 31. — ENGL., Arac., 636; *Pflanzenfam.*, 135. — B. H., Gen., III, 979, n. 42.

5. Spec. male nota 1. *T. Spruceanum* SCHOTT. — ENGL., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 215.

6. Melet., I, 20; Syn. Ar., 117; Prodr. Ar., 308; Gen. Ar., t. 61. — ENDL., Gen., n. 1695. — K., Enum., III, 56. — ENGL., Arac., 332; *Pflanzenfam.*, 130, fig. 84, H, J. — *Curmeria*

nudi : masculi 3-6-andri; staminibus distinctis breviter prismaticis truncato-3, 4-gonis dorsoque contiguus; antherarum loculis brevibus v. elliptico-oblongis connectivoque crasso brevioribus, extrorsum rimulosis¹. Floris fœminei germen obovoideum v. oblongum, apice vix in stylum vertice stigmatoso integrum lobatumve attenuatum; loculis completis v. incompletis 3, 4. Ovula ∞ , orthotropa v. imperfecte anatropa; funiculis placentis parietalibus v. axilibus affixis, sæpe longis, adscendentibus v. descendentibus, apice imo ovulo v. ejus lateri affixis. Staminodia hypogyna cum germinibus alternantia, capitata v. clavata. Fructus spatha inclusus, e baccis sphæricis, obovoideis v. angulatis ∞ ; loculis 3, 4. Semina ∞ ; integumento extimo succoso; testa² rugosa v. costata; embryo axili dite albuminoso. — Herbæ perennes robustæ; rhizomate crasso v. caudice aërio brevi; foliis ovatis, lanceolatis v. cordato-3-angularibus, nunc pubentibus; petiolo vaginante. Spadices sæpius breviter stipitati inappendiculati; spatha recta cylindræa involuta acuminata, accrescente persistenteque; floribus sexus utriusque contiguus v. remotis, aut perfectis omnibus, aut masculis infimis imperfectis. (*Asia et America trop.*³)

66. **Schismatoglottis** ZOLL. et MOR.⁴ — Flores (fere *Homalomena*) monœci nudi : masculi 2, 3-andri; staminibus cuneatis prismaticis truncatis, apice nunc verrucosis; filamento late lineari loculis ovoideis porisque apicalibus apertis terminato. Floris fœminei staminodia hypogyna clavata pauca v. 0. Germen oblongum, 1-loculare, apice discoideo stigmatosum; placentis parietalis 2-4, ∞ -ovulatis. Ovula anatropa; funiculo longo; micropyle infera. Fructus baccati oblongi, tubo spathæ inclusi; seminibus arrectis ellipsoideis ∞ ⁵; embryo...? — Herbæ perennes; rhizomate stolonifero; caudice brevi; foliis⁶ ovato- v. oblongo-cordatis, nunc hastatis v. lanceolatis; nervis fere ad margines extensis; petiolo basi vaginante. Spadices

LIND. et ANDRÉ, in *Ill. hort.* (1873), 45; XXV, t. 108.

1. Polline vermiformi.

2. Fuscata v. atrata.

3. Spec. ad 20. GRIFF., *Notul.*, III, 152. — REG., *Gartenfl.*, t. 634; 891 (*Curmeria*). — LODD., *Bot. Cab.*, t. 12 (*Calla*). — SCHOTT, in *Ann. Mus. lugd.-bat.*, I, 120, 280; in *Bonplandia* (1859), 30. — HASSK., *Cat. H. bogor.* (1844), 57. — MAST., in *Gardn. Chron.* (1874), fig. 159, 160; (1876), fig. 16 (*Curmeria*); (1877), 273, fig. 45, 46. — WIGHT, *lc.*, t. 805, 807 (*Calla*). — HENSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 424. — ENGL.,

in *Becc. Males.*, I, 280. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 531. — *Bot. Mag.*, t. 2279 (*Calla*), 6571.

4. *Syst. Verz.*, 83 (1846). — SCHOTT, *Syn. Ar.*, 120; *Gen. Ar.*, t. 55; *Prodr. Ar.*, 320. — ENGL., *Arac.*, 349; *Pflanzenfam.*, 131. — B. H.; *Gen.*, III, 984, n. 55. — *Apoballis* SCHOTT, in *Ester. Bot. Zeitschr.* (1858), 317. — *Colobogynium* SCHOTT, in *Ester. Bot. Zeitschr.* (1865), 34.

5. Viridibus; integumento exteriori sæpius diaphaneo.

6. Sæpe maculatis v. marmoratis.

inappendiculati supra spatham sessiles eaque inclusi, ad medium v. infra constricti; floribus fœmineis parte inferiore cylindræa v. conica insertis; masculis autem contiguis v. subcontiguis, parte superiore cylindræa v. clavata insertis¹. Spatha cylindræa apiculata v. acuminata circumcisse decidua; tubo convoluto persistente, vix fauce constricto. (*Arch. Malayan.*²)

67? **Chamæcladon** MIQ.³ — Flores (*Homalonematis*) monœci: masculi 2, 3-andri; fœmineorum staminodiis clavatis 1-3. Germen 2, 3-loculare; ovulis in loculo quoque ∞ , anatropis v. hemitropis; micropyle infera; funiculis longiusculis placentæ angulo loculi interno adnatæ insertis pauciseriatis; cæteris *Homalonematis*. — Herbæ parvæ; caudice brevissimo diviso v. subnullo; foliis ellipticis, ovatis, oblongis, lanceolatis v. 3-angularibus; spadice stipitato; spatha longiore subcylindræa, basi convoluta, superne hiantem demumque circa fructus rursus clausa persistente, spadicem fructusque includente. (*Asia et Oceania trop.*⁴)

68. **Camogyne** N.-E. BR.⁵ — Flores (*Homalonematis*) monœci nudi: masculi 1, 2-andri; staminibus distinctis; filamento brevissimo; antheræ loculis parallelis cylindræis, magna ex parte remotis, superne in verticem truncatum confluentibus ibique confluenti-rimulosis. Floris fœminei germina (parva) connata, 1-locularia; apice pulvinato stigmatoso. Ovula ∞ , orthotropa erecta; funiculis placentæ parietali affixis; micropyle supera. Fructus...? — Herba; foliis lanceolatis coriaceis tenuiter nervatis; petiolo brevioris, basi vaginante. Spadix longe pedunculatus inappendiculatus; spatha inclinata

1. Superiores fere omnes inferioresque nunc pauci imperfecti.

2. Spec. 15-18. K., *Enum.*, III, 57 (*Homalonema*, part.). — ROXB., *Fl. ind.*, III, 514 (*Calla*). — K. KOCH, in *Ind. sem. H. berol.* (1854), App., 8 (*Zantedeschia*). — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 214; in *Bot. Zeit.* (1856), 565. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 537. — SCHOTT, in *Ann. Mus. lugd.-bat.*, I, 125. — ENGL., in *Becc. Males.*, I, 284, t. 22, fig. 1-20; 25, fig. 1. — RIDL., in *Trans. Linn. Soc.*, ser. II, *Bot.*, III, 394. — *Bot. Mag.*, t. 6576.

Apalemone SCHOTT, *Gen. Ar.*, t. 57; *Prodr. Ar.*, 318. — ENGL., *Arac.*, 354, primum generice distinctum, postea ad *Schismatoglottidis* sectionem redactum est (ENGL., *Pflanzenfam.*, 132), loculis apice truncatis poricidis; spadicis appendice tuberculata.

3. In *Bot. Zeit.* (1856), 564; *Fl. ind. bat.*, III, 212, t. 40. — SCHOTT, *Gen. Ar.*, t. 60; *Prodr. Ar.*, 312. — ENGL., *Arac.*, 343; *Pflanzenfam.*, 131; in *N. Act. nat. cur.*, XXXIX, 185, t. 3, fig. 13 (ramif.). — B. H., *Gen.*, III, 983, n. 54.

4. Spec. ad 12. HASSK., *Cat. H. bogor.* (1844), 57 (*Aglaonema*). — JACK, in *Calc. Journ. Nat. Hist.*, IV, n. 13, p. 11 (*Calla*). — SCHOTT, in *Ann. Mus. lugd.-bat.*, I, 126, 280; in *Bonplandia* (1858), 369; (1859), 30. — N.-E. BR., ex HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 531 (*Homalonema*). — ENGL., in *Becc. Males.*, I, 283. — RIDL., in *Trans. Linn. Soc.*, ser. II, *Bot.*, III, 394. Melius forte ad *Homalonematis* sectionem reducendum.

5. In *Trim. Journ.* (1882), 185. — B. H., *Gen.*, III, 985, n. 60. — ENGL., *Pflanzenfam.*, 132.

ovoidea involuta rostrata, apice rimosa; limbo a tubo circumcisse soluto; spadice incluso robuste cylindraceo, apice obtuso; floribus masculis numerosioribus a foemineis remotis; interpositis arcteqe contiguis masculis sterilibus densis, ambitu undulatis. (*Borneo*¹.)

69? **Piptospatha** N.-E. BR.² — Flores (fere *Chamæcladi*) monœci nudi: masculi 1, 2-andri; staminibus compressiusculis; filamento brevissimo; loculis ovoideo-oblongis, apice poricidis v. rimulosis; connectivo ultra loculos in rostrum producto. Floris foeminei germen 1-loculare, apice depresso conico stigmatosum; ovulis ∞ , placentis parietalibus 2, 3 affixis adscendentibus orthotropis; micropyle supera. — Herba perennis caespitosa pusilla; foliis basilaribus lanceolatis coriaceis; petiolo brevi, basi vaginante. Spadix inappendiculatus; pedunculo apice decurvo; spatha ovoidea v. ellipsoidea cuspidata cernua; limbo a tubo obscuro circumcisse deciduo; floribus sexus utriusque contiguis crebris; neutris infra foemineos crebris clavatis v. peltatis. (*Borneo*³.)

70. **Rhynchophyle** ENGL.⁴ — Flores (fere *Piptospathæ*) monœci nudi; masculorum staminibus distinctis 2, 3; antheris connectivo truncato æquilongis; loculis apice poricidis. Floris foeminei germen sub-2, 3-loculare, apice stigmatoso tenuiter suborbiculare; ovulis ∞ , hemitropis v. suborthotropis, placentis parietalibus affixis; funiculis adscendentibus sæpius supra ovuli basin ovuli insertis; micropyle supera. Fructus obovoidei baccati, 2, 3-loculares; seminibus ∞ , fusi-formibus; integumento extimo pellucido ultra micropylum in tubum producto; embryone axili dite albuminoso. — Herbæ perennes, sæpius humiles; caudice brevi; foliis lanceolatis, nunc tubulo apiculatis; petiolo basi vaginante; vagina liguliformi fere a basi soluta. Spadices inappendiculati; pedunculo longo; spatha cernua pluries involuta; limbo apiculato a tubo cupulari circumcisse deciduo; floribus crebris utriusque sexus contiguis; foemineis infimis paucis masculisque summis imperfectis. (*Borneo*⁵.)

1. Spec. 1. *G. Burbidgei* N.-E. BR.

2. In *Gardn. Chron.* (1879), 138, fig. 20. — ENGL., *Arac.*, 644; *Pflanzenfam.*, 132. — B. H., *Gen.*, III, 985, n. 59.

3. Spec. 1. *P. insignis* N.-E. BR. — *Bot. Mag.*, t. 6598.

4. *Bot. Jahrb.*, I, 183; in *Becc. Males.*, I,

288, t. 23; *Pflanzenfam.*, 132. — B. H., *Gen.*, III, 985, n. 58.

5. Spec. 2. ENGL., in *Bull. Soc. tosc. ortic.* (1879), 298 (*Schismatoglottis*). — Hook. f., *Fl. brit. Ind.*, VI, 539, n. 9 (*Schismatoglottis*). — RIDL., in *Trans. Linn. Soc.*, ser. II, *Bot.*, III, 395.

71. **Bucephalandra** SCHOTT¹. — Flores (*Piptospathæ*) monœci : masculi 1, 2-andri; staminibus breviter cuneato-obovoideis v. compressis; filamento crasso; antherarum loculis contiguïs ovoideis suboppositis v. oblique oppositis, cornu tubuloso basi annulo verrucoso cincto dehiscentibus. Floris fœminei germen² sphæricum, imperfecte 2, 3-loculare; stylo disciformi sessili; ovulis ∞ , hemitropis; funiculis longis flexuosis septo affixis. Fructus...? — Herba pusilla subacaulis; foliis basilaribus lineari-lanceolatis apiculatis, subtus punctatis, parallele nervulosis; petiolo tenui, basi vaginante. Spadices pedunculati appendiculati stipitati; spathæ tubo brevi involuto persistente; limbo lanceolato circumcisso; appendice ellipsoidea crassa; organis neutris verrucosis floribus masculis fœmineisque contiguïs multoties majoribus appendicemque inde 6-gono-areolatam vestientibus. (*Borneo*³.)

72? **Microcasia** BECC.⁴ — « Flores (*Piptospathæ*) monœci nudi; masculorum staminibus sessilibus; antherarum globoso-didymarum loculis apice aristatis. Floris fœminei germen sphæricum, 1-loculare; stigmatе sessili pulvinari. Ovula ∞ , placentæ basilari latæ inserta erecta orthotropa; micropyle apicali; funiculo brevi. Fructus baccati spathæ tubo involucrati. — Herbæ perennes pusillæ cæspitosæ; rhizomate repente brevi radicefero. Folia oblonga v. spathulata; petiolo basi vaginante. Spadices solitarii v. pauci pedunculati; spathæ tubo convoluto persistente; limbo ovato-lanceolato acuminato vix hiantе demumque circumcisso. Spadix inclusus clavatus; appendice sphærica nuda; floribus masculis superioribus et inferioribus dilatatis imperfectis, supra fertiles iis multo majoribus tenuibus; floribus fœmineis infimis sterilibus paucis. (*Borneo*⁵.) »

73. **Zantedeschia** SPRENG.⁶ — Flores (fere *Philodendri*) monœci nudi : masculi 2, 3-andri; staminum distinctorum filamentis cras-

1. *Gen. Ar.*, t. 56; *Prodr. Ar.*, 319. — ENGL., *Arac.*, 354; *Pflanzenfam.*, 132. — B. H., *Gen.*, III, 984, n. 57.

2. « Diaphanum. »

3. *Spec. 1. B. Motleyana* SCHOTT.

4. In *Bull. Soc. tosc.ortic.* (1879), 180, c. xyl.; in *N. Giorn. bot. ital.*, XI, 394. — ENGL., in *Bull. Soc. tosc.ortic.* (1879), 299; in *Becc. Males.*, I, 289, t. 22, fig. 21-24; 25, fig. 28; *Pflanzenfam.*, 132, fig. 85. — B. H., *Gen.*, III, 986, n. 61.

5. *Spec. 2.*

6. *Syst.*, III, 765 (part.). — H. BN, in *Bull. Soc. Linn. Par.*, 254. — ENGL., *Pflanzenfam.*, 136. — *Richardia* K., in *Ann. Mus.*, IV, 437, t. 20 (non HOUST.). — SCHOTT, *Syn. Ar.*, 131; *Gen. Ar.*, t. 62; *Prodr. Ar.*, 324. — ENDL., *Gen.*, n. 1696. — ENGL., *Arac.*, 326; in *N. Act. nat. cur.*, XXXIX, 183, t. 6 (ramif.). — B. H., *Gen.*, III, 982, n. 52. — *Aroides* HEIST., ex FABR., *Comm. H. helvet.* (1763), 42. — O. K., *Revis.*, 739 (nom. anter. at vix gener.).

siusculis; loculis connectivo truncato adnatis oblongis, apice poricidis, 2-locellatis¹. Floris fœminei staminodia pauca hypogyna, spathulata, clavata v. apice dilatata. Germen 1-5-loculare; stylo brevi v. subnullo, apice stigmatoso capitato v. pulvinari. Ovula pauca v. ∞ , placentæ septali 2-seriatim affixa; funiculo adscendente²; incomplete anatropa; micropyle extrorsum infera³. Fructus compositi baccæ tubo spathæ inclusæ subsphæricæ v. obovoideæ, 1-5-loculares⁴. Semina ovoidea v. subsphærica; funiculo brevi cum arillo chalazico continuo; albumine copioso; embryone axili carnoso. — Herbæ paludosæ; rhizomate crasso; foliis⁵ basilaribus sagittatis; nervis a costa valida ad margines extensis; petiolo longo, basi vaginante. Spadices cum foliis coetanei inappendiculati valide pedunculati; spathæ erectæ involutæ tubo brevi accrescente persistente; fauce aperta; limbi⁶ oblique explanati, apice cuspidato recurvi, marcescentis, marginibus reversis; floribus masculis numerosioribus et fœmineis contiguïs, spiraliter denseque e spathæ basi dispositis⁷. (*Africa austr.*⁸)

74. Typhonodorum SCHOTT⁹. — Flores (fere *Zantedeschie*) monœci nudi: masculi fertiles 4-8-andri; staminibus in massam obpyramidatam verticeque deplanato dilatato sinuatam v. angulatam connatis; antherarum loculis contiguïs parallelis linearibus connectivo subæquilongis, extrorsum ab apice rimosis. Floris fœminei germen sphæricum v. ovoideum, 1-loculare; apice stigmatoso discoideo-subsessili; lobis marginalibus recurvis 3-6. Ovula in loculo 1, 2, e placenta basilari erecta anatropa; funiculo brevi; micropyle extrorsum infera. Fructus spatha inclusus e baccis (magnis) orbicularibus compressis, basi exsculptis; embryone...? — Herbæ perennes robustæ; caudice crasso vaginis vetustis oblecto. Folia hastata v. subovata acuminata; costa nervisque pinnatis validis; petiolo crasso. Spadices elongati subappendiculati; pedunculo crasso; spatha

1. Polline vermiformi.

2. Nunc rarius descendente.

3. Integumento duplici.

4. Sæpe virentes spongiosæ, nunc demum cum spathæ tubo usque ad terram nutantes.

5. Nunc albido-translucido-fenestratis.

6. Albi v. flavid, raro viridis herbacei, nunc suaveolentis.

7. De spadicebus nunc monstrosis, etc., H. BN, loc. cit.

8. Spec. ad 5. L., Spec., 1373 (*Calla*). — GÆRTN., Fruct., t. 84 (*Calla*). — SPRENG., in Link Handb., 1, 267 (*Colocasias*). — REG., Gar-

ten fl., t. 462 (*Richardia*). — LEME, in Ill. hort. (1860), t. 255 (*Richardia*). — Fl. serres, t. 1167, 2258 (*Richardia*). — SCOTT, in Seem. Journ. (1865), 35 (*Richardia*). — E. WALK., in Bot. Gaz., XIX, n. 6. — Gartenfl. (1894), 12, t. 7. — ENGL., Bot. Jahrb. (1883), 63 (*Zantedeschia*). — DUR. et SCHINZ, Consp. Fl. afric., V, 476 (*Zantedeschia*). — Bot. Mag., t. 832 (*Calla*), 5140, 5176, 5765.

9. In Est. Bot. Wochenbl. (1857), 69; Gen. Ar., t. 43; Prodr. Ar., 161. — ENGL., Arac., 331; Pflanzenfam., 136. — B. H., Gen., III, 977, n. 36.

oblongo-lanceolata acuminata v. caudata aperta; tubo multo brevior accrescente, ad faucem constricto. Flores masculi multo numerosiores a fœmineis remoti; interjectis masculis imperfectis deplanatis ∞ ; spadiceis parte imperfecta inferiore ei florum perfectorum subæquilonga; superiore autem multo longiore et in conum appendiciformem producta. (*Madagascar*¹.)

75. *Dieffenbachia* SCHOTT². — Flores (fere *Philodendri*) monœci nudi: masculi 4-6-andri; staminibus in massam crassam depressam verticeque deplanato-capitatam connatis; antherarum loculis connectivo brevioribus contiguis lineari-oblongis apiceque rimulosis v. subporicidis. Floris fœminei germen sphæricum v. depresso-ellipsoideum, nunc lobatum, 1-3-loculare; stylo brevi subsphærico v. depresso, convexitate stigmatoso, nunc apice umbonato. Ovulum³ in loculis 1; addito nunc altero laterali abortivo; fertili erecto, horizontali v. obliquo; hilo basilari; micropyle infera, laterali v. nunc adscendente; funiculo brevi cupula arilliformi placentaria basi cincto. Staminodia sub germine pauca varie clavata, nunc arcuata. Fructus compositi baccæ spathæ tubo demum rupto inclusæ, sphæricæ v. varie 2, 3-dymæ, 1-3-loculares. Semina sphærica v. ovoidea lævia, spurie arillata; embryone macropodo carnoso exalbuminoso. — Herbæ perennes v. suffrutescentes crassæ; caudicibus erectis v. basi decumbentibus. Folia alterna subterminalia, oblonga v. lanceolata acuta, crasse costata nervataque; petiolo ultra medium vaginante. Spadices plures v. raro solitarii inappendiculati pedunculati; spatha angusta; tubo longo involuto accrescente; limbo paulo longiore anguste cymbiformi v. lanceolato acuminato aperto, apice demum recurvo; spadiceis axi erecto stipitato spatha brevior eique longe hinc adnato; floribus fœmineis 1-lateralibus remotis; masculis autem densis circa summum axin liberum dense spiraliter insertis; imperfectis paucis interpositis sparsis. (*America trop.*⁴)

1. Spec. 2. ENGL., in *Bot. Jahrb.*, I, 188. — DUR. et SCHINZ, *Consp. Fl. afric.*, V, 477.

2. *Melet.*, I, 20; *Gen. Ar.*, t. 63; *lc. Ar.*, t. 21-30; *Syn. Ar.*, 126; *Prodr. Ar.*, 328. — ENDL., *Gen.*, n. 1692. — ENGL., *Arac.*, 444; *Pflanzenfam.*, 136. — B. H., *Gen.*, III, 986, n. 62.

3. H. BN, in *Bull. Soc. Linn. Par.*, 417.

4. Spec. circ. 6, variabiles. JACQ., *St. amer.*, t. 151 (*Arum*). — LODD., *Bot. Cab.*, t. 608 (*Caladium*).

— HOOK., *Exot. Bot.*, t. 1 (*Caladium*). — SCHOTT, in *Est. Bot. Wochenbl.* (1852), 68; in *Est. Bot. Zeitschr.* (1858), 179. — Pœpp., *Nov. gen. et spec.*, III, 90. — SPACH, *Suit. à Buff.*, XII, 49. — REG., *Gartenfl.*, t. 673. — LEME, in *Ill. hort.*, t. 387, 470, 471. — LIND. et ANDRÉ, in *Ill. hort.* (1871), t. 85. — E. BERGM., in *Journ. Soc. centr. hort. Fr.* (1888), 579. — HEMSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 425. — ENGL., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, t. 39.

76. **Aglaonema** SCHOTT¹. — Flores (fere *Dieffenbachiae*) monœci nudi : masculi 2-4-andri ; staminibus distinctis 2-4 ; filamento erecto crasso ovoideo, cuneato v. obpyramidato ; antheræ brevis crassæ loculis parallelis, poro v. rima arcuata brevi dehiscentibus. Floris fœminei germen 1- v. raro 2-loculare, staminodiis 1-3 nunc stipatum ; stylo cylindræo brevi v. subnullo, apice stigmatoso dilatato orbiculari v. plus minus infundibulari. Ovulum in loculis 1, subbasilare plus minus complete anatropum, nunc obliquum v. subhorizontale ; micropyle infera v. laterali² ; funiculo brevi. Fructus baccae paucæ ; seminis exalbuminosi embryone carnoso macropodo. — Herbæ perennes erectæ, prostratæ v. raro subscandentes ; foliis ovatis v. lanceolatis ; petiolo vaginante sæpius limbo subæquilongæ ; spadicebus solitariis v. fasciculatis sympodialibus ; spathæ rectæ convolutæ limbo spadici æquali v. longiore ; floribus axin usque ad apicem obtegentibus ; fœmineis cum masculis contiguis sæpiusque invicem remotiusculis. (*Asia et Oceania trop.*³)

77. **Aglaodorum** SCHOTT⁴. — « Flores (fere *Aglaonematis*) monœci nudi, 3, 4-andri ; staminum brevium loculis oblongis juxtapositis fere ad basin extensis, apice poricidis ; connectivo crasso prismatico. Floris fœminei staminodia hypogyna prismatica 1-3. Germen ovoideum, 1, 2-loculare ; ovulo 1, anatropo ; micropyle infera ; funiculo lateraliter affixo brevissimo ; stigmatate discoideo, 4-lobo, medio excavato. — Herba aquatica ; foliis anguste lanceolatis v. oblongis coriaceis carnosulis costatis ; nervis pinnatis paucis adscendentibus ; petiolo longiore basi vaginato. Pedunculus erectus longissimus crassus ; spatha oblonga convoluta, breviter acuminata, medio leviter contracta ; spadice paulo brevioris parte fœminea mascula 2, 3-plo brevior. (*Oceania trop.*⁵) »

1. Melet., I, 20 ; Gen. Ar., t. 59 ; Syn. Ar., 121 ; Prodr. Ar., 300. — ENDL., Gen., n. 1694. — K., Enum., III, 54. — BL., Rumphia, I, 152, t. 65, 66. — ENGL., Arac., 436 ; in N. Act. nat. cur., XXXIX, 187 (ramif.) ; Pflanzenfam., 135. — B. H., Gen., III, 981, n. 48.

2. Integumento duplici.

3. Spec. ad 10. ROXB., Fl. ind., III, 516 (Calla). — BL., Cat. H. Buitenz., 103 (Caladium). — MIQ., Fl. ind. bat., III, 217. — WIGHT, Ic., t. 804 ; 806 (Calla). — SCHOTT, in Ann. Mus. lugd.-bat., I, 279. — JACK, in Calc. Journ. Nat. Hist., IV, XIII, 12 (Calla). — ROXB., Fl. ind., III, 516 (Calla). — SCHOTT, in Ann.

Mus. lugd.-bat., I, 279. — LINK, En. H. berol., II, 394 (Arum). — ENGL., in Becc. Males., I, 290. — HOOK. F., Fl. brit. Ind., VI, 528. — REG., Gartenfl., t. 470. — Bot. Mag., t. 5500, 5760.

4. Gen. Ar., t. 58 ; Prodr. Ar., 306 ; Pflanzenfam., 135. — ENGL., Arac., 443 ; Pflanzenfam., 135.

5. Spec. 1. A. Griffithii SCHOTT. — ENGL., in Becc. Males., I, 291. — Aglaonema palustre TEYSM. et BINN., in Nat. Tijdschr. Ned. Ind., XXV (1863), 399. — KURZ, in Journ. As. Soc. beng., XLV, II (1876), 153. — A. Griffithii SCHOTT Syn. Ar., 123. — HOOK. F., Fl. brit. Ind., VI, 528.

78. **Peltandra** RAFIN.¹ — Flores monœci nudi : masculi 3-6-andri; staminibus in massam prismaticam 3-6-gonam verticeque deplanatam connatis; antherarum loculis contiguis linearibus, apice poricidis². Floris fœminei germen³ 1-loculare; vertice stigmatoso⁴ subsessili. Ovula 1-4, placentæ basilari inserta erecta suborthotropa; micropyle supera⁵; funiculo brevi supra basin ovuli extus lateraliter inserto. Staminodia hypogyna pauca plus minus alte connata. Fructus baccæ subsphæricæ utriculiformes; seminibus 1-paucis mucogummoso immersis; embryone carnoso macropodo exalbuminoso. — Herbæ perennes paludosæ; rhizomate crasso; foliis basilaribus subpeltatis hastatis valide costatis, dense nervatis; petiolo longo vaginante. Spadix coetaneus appendiculatus; spathæ convolutæ elongato-lanceolatæ deciduæ fauce subconstricta; tubo circa fructus persistente accrescente; spadicis appendice brevi ovoidea v. 0; floribus fœmineis cum masculis numerosioribus contiguis. (*America bor.-occid.*⁶)

79. **Anubias** SCHOTT⁷. — Flores monœci nudi : masculi 3-5-andri; antheris lateraliter massæ obpyramidatæ verticeque dilatato-6-gonæ affixis; loculis oblongis contiguis, extrorsum rimosis. Floris fœminei germen incomplete 2-loculare; stylo brevi, apice stigmatoso pulvinato. Ovula in loculis ∞ , suborthotropa v. incomplete anatropa; micropyle supera; funiculis longis placentæ basilari latæ insertis. Fructus baccati obovoidei umbilicati, 2-loculares. Semina ∞ , longe funiculata, basi ad raphen subarillata albuminosa; embryone axili. — Herbæ perennes; rhizomate brevi; foliis basilaribus, longe petiolatis lanceolatis v. sagittatis tenuiter nervosis nervulosisque. Spadices cum foliis coetanei longe pedunculati inappendiculati, supra spatham stipitati; floribus fœmineis inferioribus a masculis remotis; interjectis neutris deplanatis ∞ . Spatha oblongo-acuta decidua; tubo

1. In *Journ. phys.* (1819), 89 (non WIGHT). — SCHOTT, *Melet.*, I, 19; *Syn. Ar.*, 50; *Gen. Ar.*, t. 41; *Prodr. Ar.*, 157. — ENDL., *Gen.*, n. 1685. — K., *Enum.*, III, 43. — ENGL., *Arac.*, 329; *Pflanzenfam.*, 136. — B. H., *Gen.*, III, 975, n. 33. — *Leontia* TORR., *Comp.*, 358. — *Renssæleria* BECK, *Bot.*, 382; *Darl. Cest.*, 530.

2. Polline farciminuloso.

3. Nunc in flore masculo inter stamina minutum conicum sterile.

4. Papillis longis solutis.

5. Integumento duplici.

6. *Spec. 2. L.*, *Spec.*, 1370 (*Arum*). — MICX, *Fl. bor.-amer.*, II, 187 (*Calla*). — HOOK., *Exot. Fl.*, t. 182 (*Caladium*). — BL., *Rumphia*, I, 120. — W., *Spec.*, IV, 484 (*Arum*). — PUBSB, *Fl. Amer. sept.*, II, 399 (*Arum*). — CHAPM., *Fl. S. Un.-St.*, 440.

7. In *Esterr. Bot. Wochenbl.* (1857), 398; *Gen. Ar.*, t. 42; *Prodr. Ar.*, 159. — ENGL., *Arac.*, 433; *Pflanzenfam.*, 135. — B. H., *Gen.*, III, 975, n. 32.

crasso convoluto fructus includente circaque os accreto. (*Africa trop. occid.*¹⁾)

V. MONSTEREÆ.

80. **Monstera** ADANS. — Flores hermaphroditi nudi, 4-6-andri; filamentis hypogynis latis complanatis, apice abrupte in connectivum tenuiter acuminatum angustatis; antherarum brevium connectivumque superantium loculis oblongis suboppositis, divaricatis v. divergentibus apiculatis, extrorsum breviter rimosis. Floris fœminei germen obconicum, obpyramidatum v. prismaticum, 3-6-gonum, 2-loculare, vertice dilatato deplanato v. depresso stigmatosum. Ovula in loculis 2, anatropa v. hemitropa; micropyle extrorsum infera; funiculo brevi v. brevissimo placentæ tumidæ septorum basi adnatæ affixo. Fructus compositi baccæ cohærentes; parte superiore extimæque sponte solvenda. Semina 1-pauca exalbuminosa; epidermide a testa solubili; embryone carnoso macropodo. — Frutices scandentes ramosi radicantes, dite raphidiati; foliis distichis, oblongis v. lanceolatis asymmetricis, integris, pinnatifidis v. pertusis; petiolo longo, basi vaginante; vagina demum decidua v. accrescente. Spadices pedunculati terminales solitarii v. plures inappendiculati; spatha ovata v. oblonga cymbiformi apiculata imbricata, post anthesin reclusa demumque decidua; spadice subcylindræo densifloro; floribus compressis spiraliter insertis; inferioribus sæpius minoribus sterilibus. (*America trop.*) — *Vid. p. 441.*

81? **Alloschemone** SCHOTT². — « Flores (fere *Monstereæ*) hermaphroditi; staminibus 10-12³; filamentis complanatis germen haud æquantibus; antheris oblongis; loculis oblongis, lateraliter rimosis. Germen 1-loculare (?). Ovulum 1, obovatum erectum⁴. Stylus 0; stigmatate sessili longitudinaliter lineari. — Frutex scandens; foliis (magnis) pinnatipartitis v. pinnatisectis; petiolo teretiusculo, basi breviter incrassata vaginante. Spadix ad apicem ramulorum solitarius

1. Spec. ad 3. *Bot. Jahrb.*, XV (1893), 462. — DUN. et SCHINZ, *Consp. Fl. afric.*, V, 476.

2. *Gen. Ar.*, App.; *Prodr. Ar.*, 358. — ENGL., *Arac.*, 267; *Pflanzenfam.*, 120.

3. « Ex Pœpp., at vix credibile » (ENGL.). Sunt forte antheræ loculi.

4. « Ex Pœpp., at fortasse anatropum? » (ENGL.)

pedunculatus; spatha ovato-cylindriformi coriaceo-carnosa spadici sessili crasso cylindrico obtusissimo æquali. (*Brasilia bor.*¹) »

82. *Epipremnum* SCHOTT². — Flores (fere *Monstera*) hermaproditum v. polygami nudi; masculorum staminibus hypogynis 4; filamentis complanatis; antheris terminalibus; loculis oblongis v. linearibus connectivum superantibus, parallelis v. inferne divergentibus, extrorsum rimosis. Germen prismaticum v. obpyramidatum, vertice deplanatum; stylo brevi v. subnullo lineari-stigmatoso; loculis 1 v. incompletis 2. Ovula adscendentia in loculo quoque 2-∞, septo adnata; micropyle infera. Fructus baccati, liberi v. inter se cohærentes, sponte soluti³, 1-spermi. Semen reniforme compressum; hilo lato; embryone axili arcuato dite albuminoso. — Frutices scandentes raphidiati; caudicibus longis radiciferis; foliis distichis, ovatis, cordatis v. lanceolatis, inæquilateralibus, integris, pinnatifidis v. pertusis; petiolo longo vaginante, apice geniculato. Spadices terminales, solitarii v. plures pedunculati inappendiculati; spatha cymbiformi crassa, convoluta, demum aperta marcescente decidua, apice nunc rostrata; spadice crasso densifloro incluso; floribus inferioribus nunc fœmineis paucis. (*Arch. Malayan., ins. mar. Pacif.*⁴)

83. *Scindapsus* SCHOTT⁵. — Flores (fere *Epipremni*) hermaphroditi fertiles omnes nudi. Stamina 4; filamentis longis v. brevibus hypogynis complanatis, apice sæpe incrassatis; antherarum loculis parallelis, divergentibus v. divaricatis, oblongo-linearibus, ad margines v. extrorsum rimosis. Germen oblongum angulato-prismaticum v. obpyramidatum, vertice dilatatum; stylo terminali brevi v. brevissimo, apice plus minus incrassato stigmatoso. Ovulum 1, anatropum basilare; funiculo brevi; micropyle infera laterali. Fructus angulatus baccatus, intus succosus, vertice soluto dehiscens. Semen rotundato-

1. Spec. 1. *A. occidentalis*. — *A. Poeppigiana* SCHOTT, *Prodr. Ar.*, 358. — ENGL., in *Mart. Fl. bras.*, III, 11, 116. — *Scindapsus occidentalis* Pœpp., *Nov. gen. et spec.*, III, 88. — *Monstera occidentalis* K. Koch. — END., *Ind. Ar.*, 4.

2. In *Bonplandia* (1857), 45; *Gen. Ar.*, t. 79; *Prodr. Ar.*, 388. — ENGL., *Argc.*, 248; *Pflanzenfam.*, 120. — B. H., *Gen.*, III, 993, n. 80 (part.).

3. *Telaia abjicientes* (ENGL.).

4. Spec. ad 5. SCHOTT, in *Ann. Mus. lugd.-bat.*, I, 130. — HASSK., *Cat. H. bogor.* (1844),

58; in *Hæv. et Vr. Tijdsch.* (1842), 168 (*Raphidophora*). — ENGL., *Bot. Jahrb.*, I, 182; in *Bull. Soc. tosc. ort.* (1879), 179. — N.-E. BR., in *Trim. Journ.* (1882), 332. — END., *Ind. Ar.*, 74 (*Monstera*). — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 548. — ENGL., in *Becc. Males.*, I, 272, t. 19, fig. 10-15.

5. *Melet.*, 21; *Gen. Ar.*, t. 81; *Prodr. Ar.*, 393. — K., *Enum.*, III, 61 (part.). — ENGL., *Gen.*, n. 1699. — ENGL., *Arac.*, 252; *Pflanzenfam.*, 120; — B. H., *Gen.*, III, 992, n. 78 (part.).

reniforme; integumento duro lævi v. verrucoso, basi arillato; embryone exalbuminoso hippocrepico carnosio macropodo. — Frutices robusti scandentes radicanter; foliis ovatis, oblongis v. lanceolatis, ∞ -nervibus; petiolo longo, basi late vaginante, apice geniculato. Spadices inappendiculati; pedunculo terminali brevi crasso v. 0. Spatha cymbiformis rostrata crassa involuta, mox decidua; spadice sessilis spathaue brevioris axi crasse cylindraceo brevior. (*Asia et Oceania trop.*¹⁾)

84? **Cuscuaria** RUMPH.² — Flores (fere *Scindapsi*³) « hermaphroditi (infimi steriles?); stylo crassissimo abrupte conice attenuato. — Foliorum petioli geniculati; vagina lata persistente; limbo oblongo-elliptico cuspidato; spadice cylindroideo sessili. (*Oceania trop.*⁴) »

85. **Rhaphidophora** SCHOTT⁵. — Flores (fere *Scindapsi*) hermaphroditi⁶ nudi; staminibus hypogynis 4, 5; filamentis liberis erectis; antherarum basifixium oblongarum oculis connectivo lineari adnatis, extrorsum v. ad margines rimosis. Germen sessile prismaticum v. obpyramidatum sub stylo brevi truncato v. elongato dilatatum; placentis parietalibus 2, nunc in dissepimentum spurium productis. Ovula ∞ , adscendentia anatropa muco gummoso immersa; micropyle infera. Fructus baccæ cohærentes, vertice conglutinato sæpe solvendæ; seminibus dite albuminosis; embryone axili. — Frutices scandentes, sæpe robusti; foliis distichis inæquilateris, integris, pertusis, pinnatifidis v. pinnatipartitis; petiolo longo vaginante ad apicem geniculato. Spadices terminales solitarii v. pauci; spatha crassa sæpe rostrata oblonga convoluta, demum aperta marcescente deciduaque; floribus crebris axin cylindraceum usque ad apicem dense obtentibus; cæteris *Scindapsi*. (*Asia et Oceania calid.*, *Africa trop.*⁷)

1. Spec. ad 10. ENGL., *Bot. Jahrb.*, I, 182; in *Bull. Soc. tosc. ort.* (1879), 270; in *Becc. Males.*, I, 275, t. 21, fig. 6-18. — ROXB., *Fl. ind.*, I, 452 (*Pothos*). — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 541. — RIDL., in *Trans. Linn. Soc.*, ser. II, *Bot.*, III, 395.

2. *Herb. amboin.*, V, 488, t. 183, fig. 1. — SCHOTT, in *Bonplandia* (1857), 45; *Gen. Ar.*, t. 80; *Prodr. Ar.*, 397; in *Ann. Mus. lugd.-bat.*, I, 130. — ENGL., *Arac.*, 251; *Pflanzenfam.*, 121.

3. Ad quem nunc refertur (B. H., *Gen.*, III, 992).

4. Spec. 1. *C. marantifolia* SCHOTT. — SEEM.,

Fl. vit., 287. — *C. latifolia* RUMPH. — *C. spuria* SCHOTT. — *C. Rumphii* SCHOTT. — *Pothos Cuscuaria* Gmel. — *Scindapsus Cuscuaria* Presl. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 542. — *S. marantæfolius* Miq., *Fl. ind. bat.*, III, 187. — *Aglaonema ? Cuscuaria* Miq.

5. *Gen. Ar.*, t. 77; *Prodr. Ar.*, 377 (part.). — HASSK., *Cat. H. bogor.* (1844), 58. — ENGL., *Arac.*, 238; in *N. Act. nat. cur.*, XXXIX, 176 (ramif.); *Pflanzenfam.*, 119. — B. H., *Gen.*, III, 992, n. 79.

6. Vel abortu pauci fœminei.

7. Spec. ad 22. ROXB., *Fl. ind.*, I, 456 (*Pothos*). — SCHOTT, *Melet.*, I, 121 (*Scin-*

86. **Rhodospatha** Pœpp. et Endl.¹ — Flores (fere *Scindapsi*) hermaphroditi, v. inferiores foeminei, nudi; staminibus 4; loculis lateraliter rimosis, parallelis v. divergentibus. Germen 2-loculare. Ovula in loculis ∞ , campylotropa v. hemitropa, 2-seriata; funiculis septo plus minus alte adnatis; micropyle infera. Baccæ ∞ , truncatæ, 4-6-gonæ, 2-loculares. Semina ∞ , reniformia, tuberculato-cristata; albumine parco; embryone carnosio. — Frutices scandentes; ramis radican- tibus; foliis distichis oblongo-acuminatis; nervis crebris arcuatis; petiolo vaginante, apice geniculato. Spadices inappendiculati, supra spatham longe stipitati; pedunculis basi vaginantibus; floribus densis; spatha cymbiformi rostrata decidua. (*America trop.*²)

87. **Stenospermantium** Schott³. — Flores (fere *Monstera*) herma- phroditi nudi; masculorum staminibus 4; filamentis brevibus planis, apice abrupte acuminatis; antherarum connectivo longiorum loculis subovoideis divaricatis, lateraliter hianti-rimulosis⁴. Germen obpyra- midatum, vertice dilatato-4-gonum; loculis 2; ovulis in loculo 4-6, erectis anatropis; funiculo breviusculo, inferne septo adnato; micro- pyle infera. Fructus baccati obovoidei truncati, 2-loculares, vertice operculatim dehiscentes. Semina pauca, ad chalazam tumentia; embryone axili dite albuminoso. — Herbæ v. suffrutices⁵ scandentes; caudice elongato ad nodos radicante. Folia disticha lanceolato-acu- minata coriacea, tenuiter multinervata; petiolo varie v. usque ad apicem vaginante. Spadices terminales vaginati longi stricti. Spatha navicularis convoluta, decidua; spadice multo brevior cylindræo stipitato inappendiculato; floribus spiraliter sessilibus invicem com- pressis. (*America trop. subandin.*⁶)

dapsus). — K., *Enum.*, III, 61 (*Scindapsus*). — BL., in *Flora* (1825), 147 (*Calla*). — HASSK., *Cat. H. bogor.*, 58; *Pl. jav. rar.*, 139 (*Scin- dapsus*). — WALL., *Pl. as. rar.*, II, t. 156, 192 (*Pothos*). — WIGHT, *lc.*, t. 779, 781 (*Scin- dapsus*). — ENGL., in *Becc. Males.*, I, 266, t. 19, fig. 6-9; 20; 21, fig. 1-5. — SEEM., *Fl. vit.*, 286. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 543. — *Gardn. Chron.* (1874), II, fig. 124. — *Bot. Mag.*, t. 7282.

1. *Nov. gen. et spec.*, III, 91, t. 300. — SCHOTT, *Gen. Ar.*, t. 72; *Prodr. Ar.*, 349; in *Coll. icon. Herb. casar. vindob.* (ex ENGL.). — ENGL., *Arac.*, 231; *Pflanzenfam.*, 119. — B. H., *Gen.*, III, 910, n. 74. — *Atimeta* SCHOTT, *Gen. Ar.*, t. 71; *Prodr. Ar.*, 318.

2. Spec. 5, 6. SCHOTT, in *Bonplandia* (1861), 368. — ENGL., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, t. 17. — PEYR., *Aroid. Maxim.*, t. 19, 20 (*Atimeta*), 29, 30.

3. *Gen. Ar.*, 70; *Prodr. Ar.*, 346. — ENGL., *Arac.*, 235; *Pflanzenfam.*, 119. — B. H., *Gen.*, III, 990, n. 73.

4. Polline pulvereo.

5. Raphidibus dite instructi.

6. Spec. 4, 5. SCHOTT, in *Est. Bot. Zeitschr.* (1859), 39. — Pœpp., *Nov. gen. et spec.*, III, 88 (*Monstera*). — BENTH., *Pl. Hartweg.*, 256. — MAST., in *Gardn. Chron.* (1875), 558, fig. 116. — ENGL., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 108, t. 18. — *Bot. Mag.*, t. 6331. — HEMSLEY, *Bot. centr.-amer.*, III, 425.

88? *Ancpsias* SCHOTT¹. — « Flores (fere *Rhodospathæ*) hermaphroditi; germine 2-6-loculari. Ovula in loculis ∞ ; placenta axi centrali affixa. — Fruticulus; ramulis distiche foliatis; petiolo fere usque ad apicem vaginato; spatha² oblonga acuminata cæterisque *Rhodospathæ*. (Venezuela³.) »

89. *Spathiphyllum* SCHOTT⁴. — Flores hermaphroditi; perianthii foliolis 4-8, liberis v. basi connatis varie imbricatis. Stamina totidem opposita; filamentis hypogynis brevibus v. sæpius latis acuminatis; antheris basifixis extrorsis; loculis nunc ex parte liberis, rimosi. Germen 3, 4-loculare, vertice truncatum v. plus minus longe conicum inque stylum longum v. brevem apice stigmatoso 3-6-lobum productum. Ovula in loculis 2- ∞ , adscendentia paulo supra basin inserta; funiculo longiusculo; micropyle extrorsum infera. Fructus baccæ sphaericæ v. conoideo-oblongæ; loculis sæpe 3, 1, 2-spermis. Semina recta v. arcuata, extus striata v. foveolata; embryo axili dite albuminoso. — Herbæ perennes, dite raphidiatæ; caudice brevi; foliis oblongis v. lanceolatis; petiolo longe vaginante, nunc sub apice geniculato. Spadices densiflori inappendiculati; spatha oblonga, acuta v. acuminata persistente accrescente; axi ultra spatham nunc stipitato, hinc inde lateraliter adnato. (*America trop.*, *Malaisia*, *Oceania trop.*⁵)

90. *Holochlamys* ENGL.⁶ — « Flores (fere *Spathiphylli*) hermaphroditi; perianthii foliolis 4, in cyathum connatis, apice fornicatis. Stamina 4; filamentis brevibus; antheræ ovatæ paulo brevioris loculis oblongis, introrsum rimulosis. Germen ovoideum, 1-loculare, apice stigmatoso 3, 4-lobo; ovulis ∞ , anatropis; micropyle fundum spectante; funiculo longo placentæ basi affixo. Baccæ ∞ -spermæ; semi-

1. *Gen. Ar.*, t. 73; *Prodr. Ar.*, 352. — ENGL., *Arac.*, 230; *Pflanzenfam.*, 119.

2. Extus flavicante.

3. Spec. 1. *A. Moritzianus* SCHOTT, nunc (B. H.) ad *Rhodospatham* relata.

4. *Melet.*, I, 22; *Gen. Ar.*, t. 93, *Prodr. Ar.*, 422. — ENDL., *Gen.*, n. 1703. — K., *Enum.*, III, 83 (part.). — ENGL., in *N. Act. nat. cur.*, XXXIX, 180 (ramif.); *Arac.*, 219; *Pflanzenfam.*, 121. — B. H., *Gen.*, III, 997, n. 93. — *Hydnostachyon* LIEBM., in *Act. Soc. hafn.* (1849), 24. — *Massowia* K. KOCH, in *Bot. Zeit.*, X, 277 (part.). — *Spathiphyllopsis* TRYSM. et BINN., in *Ind. sem. H. lugd.-bat.* (1863); *Epim.*, 2. — *Amonophyllum* ENGL., in *Gardn. Chron.* (1877),

139. — *Leucochlamys* PÆPP., herb. (ex B. H., loc. cit.).

5. Spec. ad 20. JACQ., *Coll.*, IV, 118; *Icon. rar.*, III, t. 612 (*Dracontium*). — MIO., in *Ann. Mus. lugd.-bat.*, III, t. 1, 2. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 471 (*Pothos*). — MAST., in *Gardn. Chron.* (1875), I, fig. 109 (*Anthurium*). — PÆPP. et ENDL., *Nov. gen. et spec.*, III, t. 295. — ENGL., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 102, t. 16. — HENSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 428. — REG., *Gartenfl.*, t. 738. — ANDRÉ, in *Ill. hort.*, XXIV, t. 269 (*Anthurium*). — *Ill. hort.* (1877), t. 159 (*Anthurium*). — *Bot. Mag.*, t. 603 (*Pothos*).

6. In *Becc. Males.*, I, 265, t. 19, fig. 1-5; *Pflanzenfam.*, 121.

nibus oblongo-3-gonis (minutis) verrucosis, micropylem versus attenuatis. — Herba¹ brevicaulis; foliorum petiolis longis equitantibus geniculatis; limbo oblongo acuminato; nervis lateralibus parallelis; spadice omnino sessili usque ad apicem florifero; spatha spadicem arcte includente convoluta, demum ab infima tertia parte aperta et lacerata. (*Borneo*².) »

VI. CALLEÆ.

91. **Calla** L. — Flores hermaphroditi nudi; staminibus hypogynis 6 v. pluribus; filamento libero lineari; antheræ subpeltatæ basifixæ loculis ovoideis lateralibus, ab apice ad margines rimulosis. Germen sessile, 1-loculare; stylo brevissimo, apice depresso capitato stigmatoso. Ovula basilaria erecta 4-∞, anatropa; micropyle extrorsum infera; funiculo brevissimo. Fructus compositi baccæ subsphæricæ v. depresso-obconicæ, apice nunc sulcatæ; pericarpio tenui subsicco. Semina ∞, oblonga teretiuscula erecta; chalaza rapheque tumidis turgidis; testa ad apicem striata; embryone axilidite albuminoso. — Herba aquatica perennis; rhizomate repente elongato annulato. Folia alterna disticha cordato-ovata; nervis arcuatis; petiolo basi longe vaginante. Spadices pedunculati, basi vaginati; spatha ovata v. lanceolata acuminata tota aperta, basi decurrente, accrescente persistente; spadice ultra eam longe stipitato cylindræo v. ellipsoideo inappendiculato; floribus crebris spiraliter dispositis; supremis nunc masculis. (*Europa bor. et med.*, *Asia bor.*, *America bor.-or.*) — *Vid. p. 443.*

92. **Aronia** MITCH.³ — Flores (fere *Callæ*) hermaphroditi; perianthii foliolis 6⁴, imbricatis. Stamina totidem opposita; filamentis hypogynis dilatatis, apice repente acuminatis; antheris dorsifixis, extrorsum 2-rimosis. Germen⁵ subliberum, 1-loculare, apice con-

1. *Spathiphylli* habitu.

2. Spec. 1. *H. Beccarii* ENGL. — *Spathiphyllum Beccarii* ENGL., in *Bull. Soc. tosc.ortic.* (1879), 268.

3. In *Act. nat. cur.*, VIII, App. (1748), 206 (non PERS., non MEDIC.). — *Orontium* L., *Amæn.*, III (1751), 17, t. 1, fig. 3; *Gen.*, ed. VI, n. 435. — J., *Gen.*, 25. — SCOP., *Intr.*, 80

(*Liliacæ*). — SCHOTT, *Gen. Ar.*, t. 92; *Prodr. Ar.*, 421. — ENDL., *Gen.*, n. 1706. — K., *Enum.*, III, 85. — ENGL., in *Nov. Act. nat. cur.*, XXXIX, 172, t. 4, fig. 14 (ramif.); *Arac.*, 212; *Pflanzenfam.*, 122, fig. 79, F-K. — B. H., *Gen.*, III, 994, n. 83.

4. Nunc rarius 4.

5. Nunc in floribus summis effœtum.

vexiusculo stigmatosum. Ovulum 1, basilare, valde incomplete anatropum horizontaliter protensum; micropyle laterali¹; funiculo brevi. Fructus baccæ spicatæ; semine albuminoso. — Herba perennis aquatica; foliis rosulatis; petiolo longe vaginato; spatha brevi foliacea; spadice inappendiculato longe stipitato; stipite spatha multo longiore denudato tenuiter conico densifloro. (*America bor.-or.*²)

93. **Spathyema** RAFIN.³ — Flores (fere *Aroniæ*) hermaphroditi; perianthii foliolis 4, apice truncatis, varie imbricatis. Stamina totidem opposita; filamentis hypogynis complanatis, apice angustatis; antherarum extrorsarum loculis parallelis rimosis. Germen magna ex parte spadiceis parenchymate immersum, 1-loculare; stylo longe pyramidato crasso, 4-gono, apice stigmatoso depresso. Ovulum 1, sub apice loculi affixum descendens orthotropum; micropyle infera. Fructus sphaerici compositi baccæ ∞, spadiceis axi spongioso ex parte immersæ; semine descendente irregulari (magno); embryone longo albuminoso axili. — Herba⁴ perennis robusta fœtida; tuberculo crasso; foliis basilaribus (amplis) cordato-ovatis; petiolo longe vaginante. Pedunculus brevis; spatha⁵ ventricosa fornicata rostrata crassa involuta; spadice incluso sphaerico longe ultra spatham stipitato. (*America bor., Asia bor.-or.*⁶)

94. **Lysichitum** SCHOTT⁷. — Flores (fere *Aroniæ*) hermaphroditi; sepalis 4, perigynis, apice fornicato-3-gonis, imbricatis. Stamina 4, sepalis opposita cumque iis inserta; filamentis longis complanatis; antheris brevibus; loculis basi apiceque obtusis liberis, extrorsum rimosis. Germen ex parte inferum, basi rhachi immersum, 2-loculare, apice conico minute capitellato-stigmatosum. Ovula in loculo

1. Integumento duplici.

2. Spec. 1. *A. aquatica*. — *Orontium aquaticum* L. — CATESB., *Carol.*, I, t. 82. — BART., *Fl.*, II, t. 37. — TORR., *Fl.*, I, 358. — PURSH., *Fl.*, I, 235. — HOOK., *Exot. Fl.*, t. 49. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 402. — CHAPM., *Fl. S. Un.-St.*, 441. — *Pothos ovata* WALT., *Fl. carol.*, 224.

3. In *N.-York Med. Rep.* (1808), X, 173; in *Desux Journ. Bot.*, II, 171. — *Symplocarpus* SALISB., in *Nutt. Gen.*, I, 105; in *Hort. Trans.*, I, 267. — SCHOTT, *Gen. Ar.*, t. 90; *Melet.*, I, 22 (part.); *Prodr. Ar.*, 419. — ENDL., *Gen.*, n. 1705. — ENGL., *Arac.*, 211; *Pflanzenfam.*, 122, fig. 70, A-C. — B. H., *Gen.*, III, 995, n. 85. — *Ictodes* BIGEL., *Med. Bot.*, II, 41, t. 24; *Fl. bost.*, ed. II, 59.

4. Fœtida.

5. Atro-rubra, violaceo-lineata.

6. Spec. 1. *S. fœtidum*. — *Symplocarpus fœtidus* SALISB. — TORR., *Fl.*, I, 181. — K., *Enum.*, III, 84. — FR. et SAV., *En. pl. jap.*, II, 9. — *Bot. Mag.*, t. 3224. — *Dracontium fœtidum* L. — *Pothos fœtidus* MICHX., *Fl. bor.-amer.*, II, 183. — *P. Putorii* BAST. — *Ictodes fœtidus* BIGEL. — De plantæ evol., FÆRST., in *Bull. Torr. Bot. Club* (1888), n. 6.

7. In *Æst. Bot. Wochenbl.* (1857), 62; *Gen. Ar.*, t. 94; *Prodr. Ar.*, 420. — ENGL., in *N. nat. cur.*, XXXIX, 173 (ramif.); *Arac.*, 209; *Pflanzenfam.*, 122 (*Lysichiton*). — B. H., *Gen.*, III, 994, n. 84. — *Arctiodracon* A. GRAY, in *Mem. Amer. Acad.*, ser. 2, VI, 408.

quoque 1, 2, e funiculis septalibus dorso cristatis adscendentibus moxque decurvis descendentibus orthotropis, mucro gummoso immersis; micropyle infera. Fructus baccati in rhachide immersi, 2-loculares. Semen in loculo quoque 1, oblongum, convexo-concavum, dorso rotundatum; hilo ventrali intruso; embryone carnosio exalbuminoso macropodo. — Herba (paludosa) robusta; caudice horizontali crasso folioso; foliis (amplis) oblongis v. sublanceolatis acutis, sessilibus v. breviter petiolatis, crasse coriaceis, arcuato-nervatis; costa lata. Spadix oblongo-cylindraceus longissime supra spatham stipitatus dense floriferus inappendiculatus. Spatha foliacea spadicem juniorem includens demumque stipitem elongatum inferne involvens; limbó ovato-cucullato, demum deciduo; pedunculo sub spatha brevi crasso. (*America bor.-occid.*, *Japonia*, *Sibiria occid.*, *Kamtschatka*¹.)

VII. ACORÆ.

95. **Acorus** L. — Flores hermaphroditi regulares fertiles; receptaculo brevi convexiusculo. Sepala 3, quorum postica 2, petalaeque totidem alterna, omnia subæqualia herbacea concava, apice fornicata. Stamina 6, hypogyna perianthii foliolis opposita; filamentis longe linearibus compressis, apice angustatis; antherarum brevium loculis subellipticis connectivum superantibus, basi divergentibus introrsumque confluenti-rimosis. Germen sessile oblongo-conoideum, 2, 3-loculare, apice obtusatum v. truncatum; vertice conoideo summoque apice punctiformi-stigmatosum. Ovula in loculis plura orthotropa elongata e placenta apicali descendente; micropyle infera. Fructus compositi baccæ 2, 3-loculares; seminibus paucis pendulis mucro gummoso nidulantibus; micropyle fimbriato-arillato; albumine carnosio; embryone axili. — Herbæ perennes (paludosæ) aromaticæ; rhizomate ramoso repente; radicibus adventivis inferioribus crebris. Folia basilaria disticha, basi vaginante equitantia, ensiformia v. subgraminea, longitudinaliter nervata. Pedunculi basiales erecti folii-

1. Spec. 1. *L. kamtschalcense* SCHOTT. — *L. japonicum* SCHOTT, in *Ann. Mus. lugd.-bat.*, 1, 93. — FR. et SAV., *En. pl. jap.*, 11, 9. — *Dracontium kamtschalcense* L. — *Pothos kamtschaticus* SPRENG. — *Symplocarpus kamts-*

chaticus SALISB. — BONG., in *Mém. Acad. Pétersb.*, sér. 6, 11, 168. — SCHOTT, *Melet.*, 1, 22. — *Arctiodracon kamtschaticum* A. GRAY. — *A. japonicum* A. GRAY. Spatha dicitur flava v. lutescens.

formi-compressi; spatha obsoleta v. pedunculi margini adnata ultraque spadice ensiformi-producta; floribus in spadice cylindraceo inappendiculato crebris spiraliter dispositis sursumque apertis. (*Hemiph. bor. reg. temp.*) — *Vid. p. 445.*

96. **Gymnostachys** R. BR¹. — Flores (fere *Acori*) hermaphroditi fertiles omnes; perianthii foliolis 4, 2-seriatis; lateralibus extimis. Stamina totidem opposita hypogyna; filamentis latis complanatis; antherarum brevium connectivum superantium loculis ellipsoideis divergentibus, extrorsum rimosis. Germen oblongum, 1-loculare, apice pulvinari-stigmatosum. Ovulum 1, orthotropum, sub apice loculi insertum descendens; micropyle infera. Fructus ellipsoidei apiculati baccati; semine pendulo ovoideo; integumento tenui; albumine copioso duro; embryo axili. — Herba perennis, fusiformi-tuberosa caulem 4-gonum gracilem post folium proferens. Folia basilaria longa angusta (graminea) longitudinaliter nervata; foliis caulinis brevioribus carinatis. Spadices apicem versus 1-pauci graciles inappendiculati; pedunculis paucivaginis; fructiferis nutantibus; floribus² crebris remotis spiraliter insertis. (*Australia or.*³)

97. **Anthurium** SCHOTT⁴. — Flores (fere *Acori*) hermaphroditi; sepalis lateralibus imbricatis 2, apice subtruncato fornicatis. Petala (?) alterna 2, similia imbricata. Stamina hypogyna 4, perianthii foliolis opposita; antheris extrorsis. Germen 2-loculare; loculis lateralibus; stylo brevi v. brevissimo exserto, apice stigmatoso truncato v. plus minus dilatato. Ovula in loculis 1, 2, adscendentia, anatropa v. hemitropa; micropyle extrorsum infera. Fructus baccati⁵, demum e perianthio protrusi⁶. Semina oblonga, sæpe plano-convexa, mucogummoso immersa, rugosa v. verrucosa; albumine carnosio; embryo axili carnosio⁷. — Herbæ perennes v. frutices, erecti v. scandentes; foliis alternis, integris, lobatis v. partitis, coriaceis; petiolo

1. *Prodr.*, 337. — ENDL., *Gen.*, n. 1707. — K., *Enum.*, III, 86. — PAYER, *Organog.*, 688, t. 139, fig. 14-25. — SCHOTT, *Melet.*, I, 22; *Gen. Ar.*, t. 97; *Prodr. Ar.*, 577. — ENGL., in *N. Act. nat. cur.*, XXXIX, 171, t. 1, fig. 3 (ramif.); *Arac.*, 218; *Pflanzensam.*, 118. — B. H., *Gen.*, III, 100, n. 98.

2. Viridulis, parvis.

3. Spec. 1. *G. anceps* R. BR. — BENTH., *Fl. austral.*, VII, 157.

4. In *Wien. Zeitschr.*, III, 828; *lc. Ar.*,

t. 11-20; *Gen. Ar.*, t. 94; *Prodr. Ar.*, 436; *Melet.*, I, 22. — ENDL., *Gen.*, n. 1702. — K., *Enum.*, III, 67. — ENGL., *Arac.*, 103; *Pflanzensam.*, 115, fig. 73, A. — B. H., *Gen.*, III, 998, n. 94. — H. BN, in *Bull. Soc. Linn. Par.*, 1181.

5. Virides, aurantiaci, coccinei v. purpurascetes.

6. Ad fila 2 e petalis soluta sæpe demum appensi.

7. Albo v. nunc ad basin virescente.

vario, sæpe ad apicem geniculato, basi breviter vaginante. Spadices inappendiculati; pedunculo sæpe longo; axi supra spatham sessili v. stipitato, cylindrico v. conico, recto, arcuato v. torto, nunc longissimo, sursum florente et fructifero sæpius aucto. Spatha¹ linearis, lanceolata, elliptica v. ovata, nunc nervosa venosaque, explanata, cucullata v. torta, nunc in pedunculum decurrens, sæpius persistens accrescensve. (*America trop.*²)

98. **Pothos** L.³ — Flores (*Anthurii*) hermaphroditi fertiles omnes; sepalis 3 petalisque totidem alternis similibus imbricatis, apice fornicatis, persistentibus. Stamina 6, hypogyna, perianthii foliolis 2-seriatim opposita; filamentis brevibus v. elongatis exsertis, linearibus v. compresso-dilatatis; antheris terminalibus extrorsis; loculis verticalibus v. obliquis brevibus, connectivum superantibus, longitudinaliter rimosis. Germen superum, depressum, ovoideum, obovoideum v. oblongum, 1-3-loculare; stylo in laminam stigmatiferam planam v. hemisphæricam a basi dilatato peltiformi. Ovula 3, v. rarius (*Pothoidium*⁴) 1, adscendentia v. suberecta anatropa; micropyle extrorsum infera; funiculo brevi. Fructus baccati, 1-3-spermi. Semina ellipsoidea v. ovoidea, teretia v. compressa, exalbuminosa; hilo laterali; embryone macropodo carnosio. — Frutices scandentes ramosi radicales, ramulis summis gracilibus patentibus; gemmis axillaribus vaginam folii perforantibus. Folia disticha, lineari-, ovato- v. 3-angulari-lanceolata; limbo nunc minimo (v. 0); petiolo plus minus elongato, basi vaginante, apice varie truncato v. dilatato, geniculato v. auriculato; spadicebus inappendiculatis brevibus, sphæricis, ovoideis, clavatis v. rarius cylindræis, sursum florentibus; pedunculis

1. Viridis v. varie colorata indeque nunc valde decora.

2. Spec. ad 160. VELL., *Fl. flum.*, Atl., IX, t. 121-126 (*Pothos*). — JACQ., *St. amer.*, t. 153; *lc. rar.*, III, t. 609-611; *Fragm.*, t. 1 (*Pothos*). — HOOK., *Exot. Fl.*, t. 55, 122, 210, 211 (*Pothos*). — H. B. K., *Nov. gen. et spec.*, I, t. 18-20 (*Pothos*). — PÖEPP. et ENDL., *Nov. gen. et spec.*, III, t. 293, 294. — ENGL., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, t. 7-15. — SAUND., *Ref. bot.*, t. 14, 257, 265-281. — LODD., *Bot. Cab.*, t. 567, 632, 1301, 1673 (*Pothos*). — REG., *Gartenfl.*, t. 482, 501, 508, 519, 540, 558, 681, 702, 719, 720, 723, 873. — PEYR., *Ar. Maxim.*, t. 4-11. — LEME, in *Ill. hort.*, t. 283 (*Alocasia*), 314; (1873), t. 128; (1877), t. 271. — MAST., in *Gardn. Chron.* (1876), II, fig. 139, 140; (1879),

II, fig. 47. — O. K., *Revis.*, 738. — HENSL., *Bot. centr.-amer.*, III, 429. — E. BERGM., in *Journ. Soc. centr. hort. Fr.* (1886), 83. — GRISEB., *Symb. Fl. argent.*, 283. — *Bot. Reg.*, t. 1635. — *Bot. Mag.*, t. 2801, 2953, 2987 (*Pothos*), 5319, 5848, 6261, 6339, 6616, 6833, 6968, 7297.

3. *Amœn.*, I (1747); *Gen.*, ed. VI, n. 1031. — J., *Gen.*, 24. — K., *Enum.*, III, 65 (part.). — ENDL., *Gen.*, n. 1700. — SCHOTT, *Ar.*, I, 22, t. 31; *Gen. Ar.*, t. 95; *Prodr. Ar.*, 558. — ENGL., *Arac.*, 78; *Pflanzensfam.*, 113, fig. 71, A-G; in *Nov. Act. nat. cur.*, XXXIX, 162 (ramif.). — B. H., *Gen.*, III, 999, n. 95.

4. SCHOTT, *Ar.*, I, 26, t. 57; *Gen. Ar.*, t. 96; *Prodr. Ar.*, 576. — ENGL., *Arac.*, 94; *Pflanzensfam.*, 114. — B. H., *Gen.*, III, 999, n. 96.

axillaribus v. infra-axillaribus, simplicibus v. ramosis, foliosis, vaginatis; v. nudis sæpe decurvis; spatha¹ parva, conchoidea, ovata v. oblonga decurva; floribus dissitis v. contiguis, nunc raro (*Goniurus*²) ob axin contortum spiraliter dispositis. (*Asia et Oceania calid.*, *Malacassia*³.)

99. **Amydrium** SCHOTT⁴. — Flores (fere *Anthurii*) hermaphroditi nudi : masculi 4-andri; staminibus hypogynis; filamento lineari complanato; antherarum terminalium loculis ovoideis, inferne divergentibus, extrorsum rimosis. Germen obpyramidato-4-gonum, vertice depressum; stylo centrali brevissime conico, apice stigmatoso obtusato. Ovula in loculis 2 solitaria adscendentia; funiculo brevi imæ placentæ adnato; micropyle extrorsum infera. — Herba perennis prorepens parva; rhizomate tenui. Folia alterna ovata v. cordata penninervia dute reticulato-venosa; petiolo apice geniculato. Spadix brevis inappendiculatus; pedunculo erecto petiolo brevior; spatha conchiformi apiculata; floribus crebris spiraliter dispositis. (*Arch. Malayan*.⁵)

100. **Heteropsis** K.⁶ — Flores (fere *Anthurii*) hermaphroditi v. nunc ex parte foeminei, nudi. Stamina 4, v. rarius 1-3; filamentis hypogynis brevibus latis compressis; antheris connectivo acuminato longioribus; loculis brevibus, apice hiantibus. Germen obpyramidatum, vertice lato deplanatum; loculis 2, completis v. incompletis; stylo apicali minute conico lineari stigmatoso; loculis 2, 2-ovulatis; ovulis adscendentibus; funiculo longo; micropyle extrorsum infera. Fructus...? — Frutices scandentes; ramulis flexuosis radicanibus; foliis alternis ellipticis v. lanceolatis acuminatis coriaceis penninerviis; nervis crebris tenuissimis; petiolo brevi v. subnullo, basi vaginante semi-amplexicauli. Spadices axillares breviter pedunculati;

1. Viridi, persistente v. accrescente.

2. PRESL, *Epim.*, 244.

3. Spec. ad 30. ROXB., *Fl. ind.*, I, 430. — WIGHT, *lc.*, t. 775. — DE VR., *Pl. Jungh.*, I, 103. — HOOK. et ARN., *Beech. Voy. Bot.*, 220. — SCHOTT, in *Estr. Bot. Wochenbl.* (1855), 18; in *Bonplandia* (1857), 45; in *Ann. Mus. lugd.-bat.*, I, 131. — ENGL., in *Bull. Soc.ortic. Tosc.* (1879), 266; in *Becc. Males.*, I, 261, t. 16-18; 264 (*Pothoidium*). — HOOK., *lc.*, t. 133, 175. — F. MUELL., *Fragm. phyt. Austral.*, I, 62. — BENTH., *Fl. austral.*, VII,

157. — MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 177, t. 38. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 551. — THW., *En. pl. Zeyl.*, 337. — *Bot. Reg.*, t. 133. — DUR. et SCHINZ, *Conspect. Fl. afric.*, V, 471. — WALP., *Ann.*, III, 501; V, 909.

4. In *Miq. Ann. Mus. lugd.-bat.*, I, 127. — ENGL., *Arac.*, 100; *Pflanzenfam.*, 115.

5. Spec. 1. *A. humile* SCHOTT.

6. *Enum.*, III, 50. — SCHOTT, *Aroid.*, I, 27, t. 60; *Gen. Ar.*, t. 76; *Prodr. Ar.*, 374. — ENGL., *Arac.*, 98; *Pflanzenfam.*, 115. — B. H., *Gen.*, III, 931, n. 75.

spatha brevi rostrata convoluta, cito decidua; spadice incluso brevi recto stipitato inappendiculato; floribus sessilibus spiraliter insertis invicem compressis; infimis fœmineis. (*Brasilia, Guiana*¹.)

101. **Anadendron** SCHOTT². — Flores (fere *Anthurii*) hermaphroditi; perianthio (?) brevissimo urceolari. Stamina hypogyna 3-6; filamentis linearibus v. quadratis brevibus; antheris 2-ocularibus; loculis arcuatis discretis connectivum superantibus, extrorsum rimosis. Germen obpyramidatum, 1-loculare, vertice deplanatum; stylo subnullo depresso stigmatoso. Ovulum 1, basilare anatropum; funiculo adscendente brevi; micropyle infera. Baccæ³ sphaericæ v. turbinatæ remotæ. Semen subsphaericum v. subturbinatum exalbuminosum; embryone carnoso macropodo. — Fruticuli sarmentosi v. repentes radicales; ramis gracilibus; foliis distichis ovato-oblongis v. lanceolatis, integris, pinnatifidis v. pertusis; petiolo brevi v. longo, basi vaginante, apice geniculato; vaginis persistentibus v. deciduis. Spadices inappendiculati terminales 1-plures pedunculati; spatha spadicem cylindraceum longe stipitatum densiflorum includente naviculari ovato-oblonga rostrata decidua. (*Asia et Oceania calid.*⁴)

102. **Zamioculcas** SCHOTT⁵. — Flores (fere *Anthurii*) monœci; sepalis 4, apice truncato incrassatis imbricatis. Stamina 3, sepalis opposita (in flore fœmineo sterilia v. 0⁶); filamentis hypogynis compressis v. subclavatis, plus minus coalitis v. connatis; antheris terminalibus muticis extrorsis; loculis brevibus, apice rimulosis. Germen ovoideum v. oblongum (in flore masculo effœtum), 2-loculare; stylo brevi, apice stigmatoso pulvinari; ovulo in loculis 1, adscendente hemitropo⁷; micropyle extrorsum infera. Fructus...? — Herbæ perennes; rhizomate brevi v. longiore, inferne tuberifero. Folia basilaria petiolata imparipinnata; pinnis alternis deciduis, 6-8-jugis; v. (*Gonatopus*⁸) 2, 3-pinnata; pinnis cum rhachi articulatis; petiolo basi tumente, vix v. brevissime vaginante, supra medium repente

1. Spec. 4, 5. ENGL., in *Mart. Fl. bras.*, III, II, 47, t. 6.

2. In *Bonplandia* (1857), 45; *Gen. Ar.*, t. 78; *Prodr. Ar.*, 389. — ENGL., *Arac.*, 95; *Pflanzenfam.*, 115. — B. H., *Gen.*, III, 901, n. 76.

3. Rubræ, pisiformes.

4. Spec. ad 4. MIQ., *Fl. ind. bat.*, III, 189, t. 39 (*Scindapsus*); Suppl., 596 (*Pothos*). — SCHOTT, in *Ann. Mus. lugd.-bat.*, I, 283. — HOOK. F., *Fl. brit. Ind.*, VI, 539. — ENGL., in

Becc. Males., I, 265. — RIDL., in *Trans. Linn. Soc.*, ser. II, Bot., III, 395.

5. *Syn. Ar.*, 71; *Prodr. Ar.*, 214. — ENGL., *Arac.*, 207; in *N. Act. nat. cur.*, XXXIX, 201, t. 6, fig. 24 (ramif.); *Pflanzenfam.*, 117, fig. 75. — B. H., *Gen.*, III, 993, n. 82.

6. In sectione *Gonatopo*.

7. Muco gummoso involuto.

8. ENGL., *Arac.*, 208; *Pflanzenfam.*, 117. (Genus, e cl. auct., distinctum.)

nodoso-incrassato. Pedunculus brevis v. gracilis basilaris; spatha lanceolata v. cymbiformi, dorso supra apicem cornuta horizontali, recurva v. reflexa; tubo ovoideo involuto. Spadix supra spatham sessilis eaque brevior, inappendiculatus, inter flores fœmineos inferos superioresque masculos contiguos numerosiores constrictus. (*Africa trop. or.*¹⁾)

103. **Culcasia** PAL.-BEAUV.² — Flores monœci nudi : masculi 3, 4-andri; antheris obpyramidatis subsessilibus; connectivo apice crasso truncato; loculis contiguis longitrorsum adnatis, apice rimulosis³. Floris fœminei germen breve sessile, 1, 2-loculare, apice peltato-dilatatum pulvinato-stigmatosum. Ovula in loculis solitaria adscendentia incomplete anatropa; micropyle extrorsum infera. Fructus baccatus sphæricus; semine 1, ovoideo, dite albuminoso; embryone axili parvo. — Frutices scandentes; ramis flexuosis radicanibus; foliis alternis oblongo- v. ovato-lanceolatis acuminatis, nunc basiscordatis, coriaceis, tenuiter nervatis v. reticulatis; petiolo longo, nunc vaginante. Spadices 2-sexuales inappendiculati, axillares, solitarii v. fastigiati; floribus fœmineis inferioribus; masculis autem numerosioribus; spatha parva erecta, plus minus involuta, decidua. (*Africa trop.*⁴⁾)

VIII. PISTIÆ.

104. **Pistia** L. — Flores monœci nudi : masculi 2-andri; staminibus in massam sessilem oblongam compressiusculam sub-4-lobam connatis; loculis invicem oppositis, rimulis brevibus demumque extensis extrorsum dehiscentibus; connectivo haud producto. Floris fœminei germen ovoideo-conicum; basi obliqua subverticali; 1-loculare et in stylum plus minus arcuatum apiceque stigmatosum attenuatum. Ovula ∞ , placentæ basilari depressæ inserta orthotropa

1. Spec. 2. LODD., *Bot. Cab.*, t. 1408 (*Caladium*). — DCNE, in *Bull. Soc. bot. Fr.*, XVII, 320. — HOOK. F., *Bot. Mag.*, t. 5985, 6026. — DUR. et SCHINZ, *Conspect. Fl. afric.*, V, 472.

2. *Fl. owar. et ben.*, 1, 3, t. 3. — ENDL., *Gen.*, n. 1689. — K., *Enum.*, III, 46. — SCHOTT, *Gen. Ar.*, t. 50; *Syn. Ar.*, 115; *Prodr. Ar.*, 218. — ENGL., *Arac.*, 101; *Pflanzenfam.*, 116,

fig. 74, H-O. — B. H., *Gen.*, III, 280, n. 45. — *Denhamia* SCHOTT, *Melet.*, 1, 19.

3. Gynœcei rudimentum nunc tenue.

4. Spec. ad 2. W., *Spec.*, IV, 489 (*Caladium*). — SCHOTT, in *Seem. Journ.* (1865), 35. — HOOK., *Niger Fl.*, 527. — KOTSCA., *Pl. Timn.*, n. 59. — ENGL., *Bot. Jahrb.* (1893), 447. — DUR. et SCHINZ, *Conspect. Fl. afric.*, V, 471.

erecta; funiculo brevi; micropyle apicali. Fructus subbaccatus; pericarpio tenui indehiscente. Semina pauca v. ∞ , erecta; micropyle supera umbonata; integumento 3-plici; intermedio testaceo crasso; albumine copioso farinoso; embryone axili breviusculo apicali. — Herba perennis natans; caule brevi radiceifero stolonifero. Folia rosulata sessilia obovato-cuneata; nervis flabellatis subtus prominulis. Spathæ herbaceæ puberulæ, medio utrinque plicatæ; flore fœmineo inferiore laterali basi spathæ adnato; axi altius adnato apiceque libero brevi staminifero, organis neutris dilatatis squamulaque decidua instructo. (*Orbis utriusque reg. trop. aquæ dulces.*) — *Vul. p. 448.*




TABLE DES GENRES ET SOUS-GENRES

CONTENUS DANS LE TREIZIÈME VOLUME :

Abapus ADANS.	42	Ananas T.	107	Arisacontis SCHOTT.	452
Abolboda H. B.	228	Ananassa LINDL.	107	Arisæma MART.	465
Acanthophoenix WENDL.	346	Ananthopus RAFIN.	204	Arisaron ADANS.	464
Acanthorrhiza WENDL.	311	Anaphyllum SCHOTT.	486	Arisarum T.	464
Acanthostachys LINK.	108	Anarumodum SCHOTT.	460	Aristea SOLAND.	151
Acaste SALISB.	157	Anchomanes SCHOTT.	483	Aroides HEIST.	497
Acidanthera HOCHST.	158	Ancistrophyllum WENDL.	334	Aronia MITCH.	507
Aclisia E. MEY.	207	Androlepis AD. BR.	105	Arum T.	460
Acontias SCHOTT.	478	Andromycia RICH.	478	Arviela SALISB.	41
Acorus L.	509	Androsolen LEME.	149	Assaracus HAW.	44
Acrocomia MART.	404	Androstemma LINDL.	27	Asterogyne WENDL.	387
Acrostigma KURZ.	408	Anellema R. BR.	220	Asterostigma FISCH.	473
Actinorhysis WENDL.	361	Anepias SCHOTT.	506	Astrocaryum MEY.	402
Adeloneura SCHOTT.	492	Anigosia SALISB.	77	Ataccia PRESL.	165
Echmea R. et PAV.	105	Anigozanthos LABILL.	77	Atherurus BL.	467
Agallostachys BEER.	107	Anilema K.	220	Athrodactylis FORST.	407
Agave L.	63	Anisanthus SWEET.	157	Athyrocarpus SCHLCHTL.	223
Aglæa PERS.	160	Anoiganthus BAK.	50	Atimeta SCHOTT.	505
Aglaodorum SCHOTT.	500	Anomatheca KER.	161	Atitara BARR.	401
Aglaonema SCHOTT.	500	Anomaza SALISB.	161	Attalea H. B. K.	397
Agretta ECKL.	159	Anoplophytum BEER.	93	Augea RETZ.	78
Aiphanes W.	403	Antholyza L.	157	Augustinea KARST.	400
Ajax SALISB.	44	Anthurium SCHOTT.	510	Aurelia J. GAY.	44
Alettris L.	81	Anubias SCHOTT.	501		
Alfonsia H. B. K.	399	Apalanthe BAB.	198	Babiana KER.	157
Alibertia MAR.	17	Apale SCHOTT.	480	Bactridopsis DR.	402
Allagoptera NEES.	396	Apatemone SCHOTT.	495	Bactris JACQ.	400
Allardtia DIETR.	93	Aphyllax SALISB.	220	Bacularia F. MUELL.	354
Alloschemone SCHOTT.	502	Apiospermum KL.	448	Bagnisia BECC.	173
Almyra SALISB.	51	Apoballis SCHOTT.	494	Bakeria ANDRÉ.	118
Alocasia SCHOTT.	475	Apodolirion BAK.	41	Balaka BECC.	363
Alocasiophyllum ENGL.	491	Apteria NUTT.	179	Ballosporum SALISB.	131
Aloplia HERB.	142	Arachnites PHIL.	181	Barbacenia VAND.	70
Alstroemeria L.	66	Armococcus AD. BR.	108	Barberetta HARV.	83
Amarylilis L.	46	Araucasia BL.	377	Barbosa BECC.	395
Ambrosinia BASSI.	466	Archontophœnix WENDL.	357	Barcella TRAILL.	400
Amelina CLKE.	220	Arctiodracon GRAY.	508	Barkania EHRB.	197
Amisototype HASSK.	213	Areca L.	337	Barrota GAUDICH.	407
Ammocharis HERB.	48	Arenga LABILL.	375	Bauschia SEUB.	220
Amomophyllum ENGL.	506	Argenope SALISB.	44	Beatonia HERB.	142
Amorphophallus BL.	482	Argolasia J.	78	Beethovenia ENG.	382
Amydrium SCHOTT.	512	Argyropsis ROEM.	41	Beilia ECKL.	160
Anacharis RICH.	198	Arikuryroba BARB.	395	Belemcanda ADANS.	147
Anadendron SCHOTT.	513	Ariopsis GRAH.	480	Belladonna SWEET.	46

1. Pour les genres conservés par nous, cette table renvoie toujours à la caractéristique latine du *Genera*. Là, le lecteur trouvera un autre renvoi à la page où le genre est, s'il y a lieu, analysé et discuté.

Belosynapis HASSK.	214	Catopsis GRISEB.	113	Crocanthus KL.	159
Benitzia KARST.	180	Cepa RUMPH.	56	Crociris SCHUR.	127
Bentinckia BERR.	391	Cephalonavia BAK.	117	Crocisma PL.	159
Bernudiana T.	148	Cephalopitcairnia BAK.	99	Crocus T.	154
Beschorneria K.	65	Cephalostemon SCHOMB.	243	Crossiris SPACH.	125
Biarum SCHOTT.	463	Ceratolobus BL.	328	Crossyne SALISB.	60
Biaslia VAND.	230	Cercestis SCHOTT.	491	Crucksanksia MIERS.	150
Billbergia THUNB.	104	Ceroxylon H. R.	382	Cryosophila BL.	315
Blancoa BL.	376	Chaetocapnia LINK.	66	Cryptanthus OTT.	110
Blyxa DUP.-TH.	195	Chamaeladon MIQ.	495	Cryptocoryne FISCH.	468
Bobartia KER.	147	Chamaedorea W.	378	Cryptonema TURCZ.	171
Bollaea PARLAT.	51	Chamaelum PHIL.	151	Cryptostephanus WELW.	45
Bomarea MIRB.	67	Chamaeriphes DILL.	324	Cucifera DEL.	334
Bonaparteia W.	17	Chamaeriphes PONT.	245	Culcasia P.-BEAUV.	514
Boottia WALL.	193	Chamerops L.	307	Cumingia DON.	79
Borassus L.	322	Chamoletta ADANS.	122	Cunonia MILL.	157
Borderea MIEG.	71	Chersydrium SCHOTT.	487	Curculigo GÆRTN.	69
Botherbe STEUD.	145	Chevaliera GAUDICH.	105	Curmeria LIND.	493
Brachyspatha SCHOTT.	435	Chione SALISB.	44	Cuscuaria RUMPH.	504
Brahea MART.	316	Chlamydostylis BAK.	146	Cyanastrum OLIV.	81
Bravoa LL. et LEX.	66	Chlidanthus HERB.	48	Cyanella L.	80
Broccchinia SCHULT.	118	Chloarum W.	228	Cyanopogon WELW.	214
Bromelia L.	107	Chloraster HAW.	44	Cyanotis DON.	214
Brunsvigia HEIST.	47	Chloropsis HERB.	17	Cyanotis MIERS.	171
Bryantia WEBB.	409	Chlorospatha ENGL.	479	Cyathophora K. KOCH.	93
Bucephalandra SCHOTT.	497	Choretis HERB.	55	Cyclanthus PORT.	422
Buforesstia CLKE.	213	Chrysiphiala KER.	52	Cyclosanthes POEPP.	416
Bulbocodium T.	156	Cipura AUBL.	143	Cydenis SALISB.	44
Buphane HERB.	60	Cladagave TERR.	17	Cylindrostachys KL.	397
Burmannaia L.	178	Cladosperma GRIFF.	338	Cyllenium SCHOTT.	463
		Cleanthe SALISB.	153	Cymbocarpa MIERS.	180
Caladium VENT.	478	Cleophora GÆRTN.	323	Cypelia HERB.	141
Calamosagus GRIFF.	329	Clinanthus HERB.	52	Cyphokentia AD. BR.	341
Calamus L.	258	Clinostigma WENDL.	350	Cyphophœnix WENDL.	339
Calamus POURF.-DUP.	445	Clivia LINDL.	60	Cyrtanthus AIT.	49
Calla L.	507	Coburgia SWEET.	52	Cyrtospadix SCHOTT.	478
Callicore LINK.	46	Cochliostema LEME.	221	Cyrtosperma GRIFF.	487
Calliphuria HERB.	54	Cocos L.	393	Cyrtostachys BL.	365
Callipayche HERB.	59	Cœlococcus WENDL.	330		
Callisia L.	216	Coleophyllum KL.	48	Dachel ADANS.	247
Callithauma HERB.	52	Coleospadix BECC.	363	Dæmonorhops HASSK.	260
Calostemma R. BR.	57	Coleotrype CLKE.	214	Dæmonorophus LEME.	260
Calydorea HERB.	145	Collania HERB.	67	Dæmonorops BL.	260
Calyptrocalyx BL.	353	Colletia VELL.	230	Dalzellia HASSK.	214
Calyptrocoryne SCHOTT.	463	Collinsia LIEBM.	378	Damasonium SCHREB.	194
Calyptrogynne WENDL.	388	Colobogynium SCHOTT.	494	Danbya SALISB.	67
Calyptronoma GRISEB.	389	Colocasia LUDW.	474	Deckenia WENDL.	346
Campderia RICH.	24	Colpothrinax WENDL.	315	Deckeria KARST.	386
Campecarpus WENDL.	339	Commelina L.	219	Denhamia SCHOTT.	514
Campelia RICH.	217	Conanthera R. et PAV.	79	Descantaria SCHLCHTL.	200
Campylosiphon BENTH.	178	Conophallus SCHOTT.	435	Desmoncus MART.	401
Candarum REICHB.	435	Conostachys GRISEB.	93	Deuterocohnia MEZ.	117
Canistrum MORR.	106	Conostylis R. BR.	75	Devillea BERT.	114
Canniphyllum SCHOTT.	436	Cooperia HERB.	40	Diacles SALISB.	59
Caraguata LINDL.	114	Copernicia MART.	318	Diaphane SALISB.	122
Cardiostigma BAK.	144	Corbularia SALISB.	44	Diaphoranthema BEER.	96
Carludovica R. et PAV.	422	Coresanthe ALEF.	122	Diasia DC.	160
Carpentaria BECC.	341	Corsia BECC.	181	Dichæospermum WIGHT.	220
Carpolyza SALISB.	62	Corynophallus SCHOTT.	434	Dichone LAWS.	159
Carregnoa BOISS.	45	Corypha L.	312	Dichorisandra MIK.	212
Cartonema R. BR.	215	Costia WILLK.	122	Dicolus PHIL.	80
Caryota L.	374	Cottendorfia SCHULT.	117	Dicrama KLATT.	158
Catoblastus WENDL.	384	Crinum L.	46	Dictyocaryum KARST.	386

TABLE DES GENRES ET SOUS-GENRES.

519

Dictyosperma WENDL.	359	Eudolon SALISB.	62	Gonyanthes BL.	171
Dictyospermum WIGHT.	220	Eugeissonia GRIFF.	332	Gorgonidium SCHOTT.	472
Dictyostegia MIERS.	179	Eumauritia H. BN.	336	Graminiris SPACH.	125
Didymosperma WENDL.	376	Eurycles SALISB.	56	Gravisia MEZ.	106
Dieffenbachia SCHOTT.	499	Eusipho SALISB.	49	Greigia REG.	109
Dierama K. KOCH.	158	Eusolenanthe SCHOTT.	475	Griffinia KER.	61
Dietes SALISB.	140	Eustephia CAV.	57	Gronophyllum SCHEFF.	357
Dilatris BERG.	83	Eustylis ENGELM.	146	Guenzia SOND.	470
Diodosperma WENDL.	318	Euterpe CÆRTN.	344	Gulielma MART.	400
Dioscorea PLUM.	71	Evansia SALISB.	124	Gulubia BECC.	341
Diplarrhena LABILL.	148	Evodianthus OERST.	419	Guzmania R. et PAV.	114
Diplothemium MART.	396	Exorrhiza BECC.	341	Guzmannia PERS.	114
Discanthus SPRUCE.	416	Eydouxia GAUDICH.	409	Gyaxis SALISB.	59
Disgrega HASSK.	200			Gymnomesium SCHOTT.	424
Dissecocarpus HASSK.	204	Fabricia THUNB.	69	Gymnosiphon BL.	180
Disteganthus LEME.	111	Fernseea BAK.	112	Gymnostachys R. BR.	510
Distiacanthus BAK.	109	Ferraria L.	145	Gynandris PARL.	124
Distrepta MIERS.	79	Fisquetia GAUDICH.	408	Gynestum POIT.	386
Dithyrocarpus K.	212	Floscopa LOUR.	212	Gyrotheca SALISB.	83
Dochafa SCHOTT.	424	Forbesia ECKL.	69		
Doornia DE VR.	409	Forrestia LESS.	213	Habranthus HERB.	41
Doryanthes CORR.	64	Fouilloya GAUDICH.	408	Hæmodorum SM.	82
Dorystigma GAUDICH.	409	Franquevillea ZOLL.	20	Hagenbachia NEES.	85
Douma LAMK.	324	Freesia KLATT.	161	Halloschulzia O. K.	73
Dracontium L.	487	Freuchenia ECKL.	140	Halmyra PARLAT.	51
Dracunculus SCHOTT.	460	Freycinetia GAUDICH.	414	Halophila DUP.-TH.	197
Drymophloeus ZIPP.	365	Fulchironia LESCHEN.	247	Hamanthus T.	59
Dyckia SCHULT.	116	Funiun WILLEM.	64	Hamiatris SALISB.	71
Dypsidium H. BN.	371	Furcraea VENT.	64	Hansalia SCHOTT.	434
Dypsis NOR.	369			Hapaline SCHOTT.	480
		Galanthus L.	42	Haplagave TERR.	17
Echidnium SCHOTT.	487	Galatea HERB.	50	Haplodypsis H. BN.	370
Echthrosea HERB.	149	Galatea SALISB.	154	Haplophloga H. BN.	370
Egeria PL.	198	Galaxia THUNB.	155	Harina HAM.	376
Elæis JACQ.	399	Gamochlamys BAK.	471	Hasskarlia WALP.	407
Elate L.	247	Gamogyne N.-E. BR.	495	Hebea PERS.	131
Elephantodon SALISB.	71	Ganymedes SALISB.	44	Hechtia KL.	117
Elephantusia W.	273	Garciana LOUR.	233	Hedwigia MEDIC.	204
Eleutherine HERB.	154	Garrelia GAUDICH.	116	Helena HAW.	44
Elodea MICHX.	198	Gastroneia HERB.	49	Helicodaea LEME.	87
Eminium BL.	462	Gaussia WENDL.	380	Helicodiceros SCHOTT.	461
Empodium SALISB.	69	Gearum N.-E. BR.	472	Helicophyllum SCHOTT.	462
Enalus RICH.	195	Geissorhiza KER.	163	Helixyra SALISB.	140
Encholirion MART.	117	Gelasine HERB.	144	Helmholtzia F. MUELL.	233
Endera REG.	473	Gembanga BL.	312	Helmia K.	71
Englerophœnix O. K.	398	Gemelleria PIN.	109	Hemicarpurus NEES.	467
Ephemerum T.	200	Gemmaria SALISB.	61	Hepetis SW.	96
Epigynanthus BL.	198	Gemmingia HEIST.	147	Herbertia SWEET.	142
Epipetrum PHIL.	71	Genlisea REICHB.	152	Heritiera GMEL.	83
Epipremnum SCHOTT.	503	Genosiris LABILL.	150	Hermione SALISB.	44
Eremiris SPACH.	125	Geomitra BECC.	173	Hermodactyloides SPACH.	125
Eremospatha M. et WENDL.	335	Geonoma W.	386	Hermodactylus T.	125
Eriphilema HERB.	149	Geosiris H. BN.	152	Hesperantha KER.	164
Erxlebia MEDIC.	204	Gethyllis L.	42	Hesperoxiphon BAK.	141
Erythea WATS.	316	Gigliolia BECC.	354	Hesseea HERB.	61
Erythrotis HOOK. F.	214	Gladliolus T.	156	Hetæria ENDL.	233
Euæchmea BAK.	105	Glaziova MART.	394	Heterachthia KZE.	200
Euagave H. BN.	17	Glumosa HERB.	149	Heterocarpus WIGHT.	264
Eubaracenia H. BN.	23	Godwinia SEEM.	487	Heteropsis K.	512
Eubromelia H. BN.	107	Gomutus SPRENG.	375	Heteropsis MIQ.	441
Eucalliphruria H. BN.	54	Gonatandra SCHLCHTL.	200	Heterospatha SCHEFF.	351
Eucharis PL. et LIND.	54	Gonatanthus KL.	476	Heterostalis SCHOTT.	462
Eucrosia KER.	58	Gonatopus ENGL.	513	Heterostigma GAUDICH.	409

Hexaglottis VENT.	146	Keppleria MEISSN.	345	Loxococcus WENDL.	362
Himantophyllum SPRENG.	60	Keura FORSK.	407	Ludovia AD. BR.	419
Hippeastrum HERB.	53	Klattia BAK.	153	Ludovia PERS.	418
Hohenbergia SCH. F.	105	Klopstockia KARST.	382	Lycoris HERB.	50
Holochlamys ENGL.	506	Knowlesia HASSK.	200	Lysichitum SCHOTT.	508
Homaida ADANS.	483	Kolpakowskia REG.	63	Lysistigma SCHOTT.	473
Homalonema SCHOTT.	493	Korthalsia BL.	329		
Hombronia GAUDICH.	409	Kotsjiletti ADANS.	224	Maburnia DUP.-TH.	170
Homeria VENT.	144	Kunthia H. B.	379	Macrocladus GRIFF.	377
Homoglossum SALISB.	157			Macrocordium DE VR.	106
Hoplophytum BEER.	105	Laccospadix WENDL.	353	Macropidia DRUMM.	77
Howea BECC.	355	Laccosperma M. et WENDL.	335	Madvigia LIEBM.	110
Hyalis SALISB.	162	Lachnanthes ELL.	83	Malortiea WENDL.	382
Hydnostachyon LIEBM.	506	Lagarosiphon HARV.	199	Mandonia HASSK.	200
Hydrastylus SALISB.	148	Lagenandra DALZ.	467	Manfreda SALISB.	17
Hydriastele W. et DR.	342	Lampra BENTH.	219	Mangonia SCHOTT.	474
Hydrilla RICH.	198	Lamprocarpus BL.	207	Manicaria GÆRTN.	390
Hydrocharis L.	191	Lamprococcus BEER.	105	Marara KARST.	403
Hydromystria MEY.	192	Lamproconus LEME.	98	Marica KER.	140
Hydrosme SCHOTT.	434	Lamproditheos HASSK.	220	Marica SCHREB.	143
Hydrospondylus HASSK.	198	Lanaria AIT.	78	Marquartia HASSK.	407
Hydrotenia LINDL.	142	Lansbergia DE VR.	141	Martinezia R. et PAV.	403
Hydrotrophus CLKE.	195	Lapeyrousia POURR.	161	Massangea MORR.	114
Hyline HERB.	51	Lapiedra LAC.	43	Massowia KOCH.	506
Hymenoteron SALISB.	62	Lasia LOUR.	485	Mauritia L. F.	336
Hymenocallis SALISB.	55	Lasimorpha SCHOTT.	487	Maximiliana MART.	398
Hymenostigma HOCHST.	140	Latania COMMERS.	323	Mayaca AUBL.	230
Hyophorbe GÆRTN.	380	Lechea LOUR.	204	Medemia WURT. et BR.	325
Hyospatha MART.	367	Lechleria GRISEB.	151	Melaspheerula KER.	159
Hyphæne GÆRTN.	324	Lecontia TORR.	501	Melicho SALISB.	59
Hypoxis L.	68	Leontochir PHIL.	68	Melinonia AD. BR.	98
Hyptissa SALISB.	131	Leontopetaloides AMM.	165	Meriana TREW.	160
		Leopoldinia MART.	390	Meritostigma DIETR.	161
Ianthe SALISB.	20	Leperiza HERB.	58	Metroxylon ROTTE.	330
Ictodes BIGEL.	508	Lepidocaryum MART.	336	Micranthus PERS.	161
Iguanura BL.	352	Lepidococcus WENDL.	336	Microcasia BECC.	497
Illus HAW.	44	Leptanthus WIGHT.	198	Micrococos PHIL.	396
Imantophyllum Hook.	60	Leptopetion SCHOTT.	463	Microstigma KURZ.	408
Imhofia HEIST.	50	Leptophœnix BECC.	357	Mischophlœus SCHEFF.	339
Imhofia HERB.	61	Leptorhœo HEMS.	218	Mnasia RUDGE.	244
Ioniris SPACH.	125	Leucocasia SCHOTT.	429	Molinaria COLL.	69
Iriarteia R. et PAV.	385	Leucochlamys Pœpp.	506	Monella HERB.	49
Iriartella WENDL.	386	Leucoium L.	43	Monotrema KRNCKE.	243
Iris T.	139	Libertia SPRENG.	146	Monstera ADANS.	502
Ischarum BL.	463	Libonia LEME.	87	Montbretia DC.	159
Ixia L.	162	Licuala RUMPH.	320	Montrichardia CRUEG.	489
Ixiolirion HERB.	63	Lievena REG.	88	Moræa L.	140
		Ligtu ADANS.	18	Morenia R. et PAV.	379
Jalambicea LL. et LEX.	192	Limniris TAUSCH.	125	Morsus-ranæ T.	184
Jeanneratia GAUDICH.	408	Limnobia RICH.	191	Mosenia LINDM.	106
Jessenia KARST.	350	Limnonesis KL.	448	Murdannia ROYL.	220
Jezabel BANKS.	414	Linospadix WENDL.	354	Myostoma MIERS.	173
Jonghea LEME.	87	Liriope HERB.	56	Myrialepis BECC.	328
Jonquilla HAW.	44	Liriopsis REICHE.	56	Myrioblastus WALL.	468
Juania DR.	383	Lithocarpus TARG.	394		
Jubæa H. B. K.	396	Livistona R. BR.	309	Nannorhops WENDL.	310
Juno TRATT.	122	Lodoicea COMMERS.	323	Narcissus T.	44
		Lomenia POURR.	160	Navia R. et SCH.	117
Karatas PLUM.	109	Lontarus GÆRTN.	255	Nepeta SALISB.	52
Keitia REG.	146	Lophiola KER.	78	Nebrownia O. K.	493
Kentia BL.	340	Lophiris TAUSCH.	124	Nechamandra PL.	187
Kentiopsis AD. BR.	367	Lophostigma AD. BR.	409	Nemastylis NUTT.	146
Keppleria MART.	391	Loxanthos SALISB.	50	Nematostigma DIETR.	147

TABLE DES GENRES ET SOUS-GENRES.

521

Nemostylis HERB.	146	Pedilonia PRESL.	84	Polia TEN.	141
Nenga WENDL.	356	Peltandra RAFIN.	501	Polianthes L.	65
Nengella BECC.	357	Pepinia AD. BR.	99	Polia THUNB.	222
Neobarrotia H. BN.	407	Pericyla BL.	320	Polynome SALISB.	71
Neodypsis H. BN.	371	Periphanes SALISB.	61	Polyspatha BENTH.	220
Neoglaziovia MEZ.	112	Petamenes SALISB.	157	Porphyrospatha ENGL.	481
Neophloga H. BN.	372	Petermannia F. MUELL.	74	Portea AD. BR.	111
Nephrocœlium TURCZ.	171	Peyrousia SWEET.	161	Pothoidium SCHOTT.	511
Nephrosperma BALF.	348	Phœdranassa HERB.	58	Pothos L.	511
Nephthytis SCHOTT.	490	Phœiris SPACH.	125	Pothuava GAUDICH.	105
Nerine HERB.	50	Phœospherion HASSK.	223	Pourretia R. et PAV.	116
Nerissa SALISB.	59	Phalocallis HERB.	141	Prantleia MEZ.	106
Neubeckia ALEF.	124	Pharetrella SALISB.	80	Prasiteles SALISB.	44
Neuberia ECKL.	160	Philodendron SCHOTT.	492	Prestoea HOOK. F.	368
Neumania AD. BR.	96	Philogyne SALISB.	44	Prionophyllum K. KOCH.	117
Nidularium LEME.	109	Philonotion SCHOTT.	493	Prionostachys HASSK.	220
Niobeia W.	20	Philotria RAFIN.	198	Pritchardia SEEM.	319
Nipa WURMB.	321	Philydrella CAR.	233	Pritzelia F. MUELL.	233
Nivaria MOENCH.	43	Philydrium BANKS.	232	Prochnyanthes WATS.	66
Nivenia VENT.	152	Phlebocarya R. BR.	76	Proiphys HERB.	56
Normanbya F. MUELL.	364	Phloga NOR.	372	Proteinophallus HOOK. F.	434
Nunnezhara R. et PAV.	379	Phlogella H. BN.	372	Psammiris SPACH.	125
Nymanina O. K.	161	Phlomostachys BEER.	96	Pseudocatopsis BAK.	96
Ochagavia PHIL.	110	Phœnicophorium WENDL.	347	Pseudodracontium N.-E. BR.	484
Odontostomum TORR.	81	Phœnix L.	308	Pseudohydrosme ENGL.	483
Oenocarpus MART.	343	Pholidocarpus BL.	326	Pseudophœnix WENDL.	381
Oileus HAW.	44	Pholidophyllum VIS.	110	Psithyrisma HERB.	150
Oligogynium ENGL.	490	Pholidostachys WENDL.	389	Ptychandra SCHEFF.	343
Omphalotheca HASSK.	204	Phoniphora NECK.	247	Ptychococcus BECC.	364
Oncocalamus M. et WENDL.	334	Phyganthus POEPP.	79	Ptychomeria BENTH.	180
Oncorhiza PERS.	73	Phyllotœnium ANDRÉ.	478	Ptychoraphis BECC.	360
Oncosperma BL.	345	Physcium LOUR.	185	Ptychosperma LABILL.	362
Oncus LOUR.	73	Phytarhiza VIS.	96	Pugionella SALISB.	62
Onocyclus SIEMSS.	125	Phytelephas R. et PAV.	404	Puya MOL.	116
Ophiolyza SALISB.	131	Pigafetta MART.	331	Puyopsis BAK.	99
Ophiomeris MIERS.	173	Piletocarpus HASSK.	220	Pyrenoglyphis KARST.	400
Ophione SCHOTT.	488	Pilophora JACQ.	390	Pyrolirion HERB.	41
Ophiria BECC.	338	Pinanga BL.	338	Pyrrheima HASSK.	202
Oporanthus HERB.	3	Pinellia TEN.	467	Pythion MART.	433
Orania ZIPP.	377	Piptospatha N.-E. BR.	496	Pythonium SCHOTT.	484
Orbignya MART.	398	Pironneava GAUDICH.	105	Queltia SALISB.	44
Oreodoxa W.	356	Pistia L.	514	Quensnelia GAUDICH.	88
Orexia SALISB.	50	Pitcairnia LHER.	115	Radia RICH.	24
Orontium L.	507	Pityrophyllum BEER.	96	Rajania L.	72
Orophoma DR.	336	Placea MIERS.	52	Rapatea AUBL.	242
Ortgiesia REG.	106	Plagiolirion BAK.	55	Raphia P.-BEAUV.	333
Orthrosanthus SWEET.	154	Plantia HERB.	146	Raphiophallus SCHOTT.	435
Ottelia PERS.	193	Plateana SALISB.	44	Rathea KARST.	381
Ovieda SPRENG.	161	Platenia KARST.	394	Ravenea BOUCH.	373
Palinetes SALISB.	48	Platyechmea B. H.	105	Regelia LEME.	109
Palisota REICH.	222	Platystachys BEER.	96	Reineckia KARST.	381
Palmijuncus RUMPH.	258	Plectocomia M. et BL.	327	Reinhardtia LIEBM.	382
Pancratium L.	51	Plectocomiopsis BECC.	328	Remaclea MORR.	141
Pandanus L. F.	413	Plesmonium SCHOTT.	485	Remusatia SCHOTT.	477
Panza SALISB.	44	Poarchon MART.	141	Renealmia PLUM.	93
Papiria THUNB.	42	Podianthus SCHNITZL.	74	Renealmia R. BR.	147
Pardanthus KER.	147	Podococcus MANN.	392	Renisia SALISB.	131
Patersonia R. BR.	150	Podolasia N.-E. BR.	486	Rensselœria BECC.	501
Patrocles SALISB.	44	Poeppigia KZE.	79	Rhaphidophora SCHOTT.	504
Pauridia HARV.	69	Pogiris TAUSCH.	125	Rhapidophyllum WENDL.	311
Pectinaria B. H.	105	Pogoniris SPACH.	125	Rhapis L. F.	312
		Pogoniris TAUSCH.	119		
		Pogospermum AD. BR.	113		

Rhektophyllum N.-E. BR.	490	Sodirola ANDRÉ.	115	Taccarum AD. BR.	473
Rhodospatha POEPP.	505	Solenomelus MIERS.	150	Tænais SALISB.	46
Rhodostachys PHIL.	107	Sommieria BECC.	352	Talbotia BALF.	24
Rhœo HANCE.	217	Sophronia LICHT.	161	Taliera MART.	312
Rhopalephora HASSK.	220	Souleyetia GAUDICH.	409	Tamnus T.	25
Rhopaloblaste SCHEFF.	360	Souza VELL.	148	Tamus L.	71
Rhopalostigma SCHOTT.	473	Sparaxis KER.	158	Tapeinégie HERB.	45
Rhynchopyle ENGL.	496	Spatalanthus SWEET.	156	Tapeinanthus HERB.	45
Rhyticoccus BECC.	395	Spathanthemum SCHOTT.	471	Tapeinia COMMERS.	149
Richardia K.	497	Spathanthus DESVX.	241	Tapeinophallus H. BN.	434
Rigidella LINDL.	143	Spathicarpa Hook.	471	Tapinocarpus DALZ.	463
Rochea SALISB.	163	Spathiphyllopsis TEYSM.	506	Tecophilæa BERT.	79
Rodwaya F. MUELL.	173	Spathiphyllum SCHOTT.	506	Tekel ADANS.	146
Roetzia HORT.	64	Spathodithyros HASSK.	204	Tekelia O. K.	147
Romulea MARATT.	156	Spathula TAUSCH.	125	Testudinaria SALISB.	72
Ronnbergia MORR.	112	Spathyema RAFIN.	508	Tetraptera MIERS.	171
Roscheria WENDL.	349	Sphærine HERB.	67	Teysmannia R. et ZOLL.	314
Rotang L.	326	Sphærospora SWEET.	131	Thalassia SOL.	196
Roterbe KLATT.	145	Sphærothele PRESL.	52	Thaumatophyllum SCHOTT.	493
Roussinea GAUDICH.	409	Spiloxene SALISB.	20	Thelysia SALISB.	125
Ruckia REG.	107	Spiromema LINDL.	216	Therophonum BL.	463
Rugendalia EHRB.	219	Sprekelia HEIST.	53	Thismia GRIFF.	180
Rykia DE VR.	407	Stachyophorbe LIEBM.	378	Thomsonia WALL.	484
		Stachyopogon KL.	81	Thrinax L. F.	317
Sabal ADANS.	313	Staurostigma SCHEIDW.	473	Thurnia Hook. F.	238
Saguerus ADANS.	375	Stegolepis Kl.	243	Tiaranthus HERB.	51
Sagus RUMPH.	330	Stelestylis DR.	423	Tigridia J.	142
Saivala WALL.	195	Stemoptera MIERS.	179	Tillandsia L.	113
Salmia W.	418	Stenomermis PL.	73	Timmia GMEL.	49
Sararanga HENSL.	415	Stenomesson HERB.	52	Tinania SCHEIDW.	212
Sarcinanthus ERST.	419	Stenospermaticum SCHOTT.	505	Tityrus SALISB.	44
Sarcosiphon BL.	173	Stenurus BL.	463	Tonningia NECK.	214
Saribus BL.	309	Sternbergia W. et KIT.	40	Tornelia GUTTIER.	441
Sauromatum SCHOTT.	464	Staudnera KOCH.	477	Toxophœnix SCHOTT.	402
Sauvallea WRIGHT.	217	Stevensonia DUNC.	347	Trachycarpus WENDL.	308
Saxofridericia SCHOMB.	242	Sückmannia NECK.	212	Tradescantia L.	211
Scaphispatha AD. BR.	470	Stratiotes L.	192	Trianea KARST.	192
Sceptranthus GRAH.	40	Strepsia NUTT.	96	Tribonanthes ENDL.	76
Scheelea KARST.	397	Streptanthera SWEET.	163	Trichodopsis H. BN.	370
Schieckia MEISSN.	85	Streptocalyx BEER.	106	Trichonema KER.	156
Schismatoglottis ZOLL.	404	Streptolirion EDGEW.	215	Trichopodium LINDL.	74
Schismaxon STEUD.	224	Stricklandia BAK.	59	Trichopus GERTN.	74
Schizanthus HAW.	44	Strophis SALISB.	71	Trifurcia HERB.	142
Schizocapsa HANCE.	168	Strunnaria JACQ.	62	Trigella SALISB.	80
Schizocasia SCHOTT.	476	Stylago SALISB.	62	Trigone SALISB.	46
Schizostylis BACKH.	163	Stylochiton LEPR.	470	Trimezia SALISB.	141
Schizotheca EHRB.	196	Styloconus H. BN.	75	Tripteranthus WALL.	171
Schlumbergeria MORR.	114	Sublimia COMMERS.	380	Tripterella MICHX.	171
Schnitzleinia STEUD.	24	Susarium PHIL.	150	Trithrinax MART.	318
Schœnocephalum SEUB.	243	Susiana SPACH.	125	Trithyrocarpus HASSK.	204
Schwægrichenia SPRENG.	77	Sussea GAUDICH.	409	Tritonia KER.	159
Schweideleria E. MORR.	90	Syagrus MART.	393	Tritonixia KLATT.	159
Schweiggera MEY.	131	Syena SCHREB.	230	Tros HAW.	44
Scindapsus SCHOTT.	503	Symphiodolon SALISB.	131	Troschelia KL.	85
Sclerosperma MANN.	393	Symphystemon MIERS.	150	Tuckeya GAUDICH.	408
Scorpiris SPACH.	125	Symplocarpus SALISB.	508	Tussacia KL.	96
Serangium WOOD.	441	Synandropadix ENGL.	472	Tussacia W.	113
Serenæa Hook. F.	314	Synantherias SCHOTT.	482	Typhonium SCHOTT.	462
Sismondea DELP.	71	Synechanthus WENDL.	381	Typhonodorum SCHOTT.	498
Sisyrrinchium L.	148	Syngonium SCHOTT.	481		
Skofitzia HASSK.	200	Syrorhynchium HFMG.	148	Udora NUTT.	198
Slackia GRIFF.	352	Syringodea Hook. F.	155	Ungernia BGE.	49
Socratea KARST.	386			Urceolaria HERB.	58

TABLE DES GENRES ET SOUS-GENRES.

523

Urceolina REICHB.	58	Waitzia REICHB.	159	Xerophyta COMMERS.	24
Urospatha SCHOTT.	488	Wallichia ROXB.	376	Xiphidium LOEFL.	84
		Wallisia REG.	93	Xiphion T.	122
Vagaria HERB.	54	Washingtonia WENDL.	319	Xyridion TAUSCH.	125
Vaginarina K.	54	Watsonia MILL.	160	Xyris L.	228
Vallisneria L.	194	Weihea ECKL.	163		
Vallota HERB.	47	Weldenia SCHULT.	219	Zalacca REINW.	331
Veitchia WENDL.	366	Welfia WENDL.	389	Zamioculcas SCHOTT.	513
Vellosia VANDELL.	24	Wettinia POEPP.	384	Zanonia CRAM.	217
Veniera SALISB.	44	Wichuræa ROEM.	67	Zantedeschia SPRENG.	497
Verschaffeltia WENDL.	348	Witsenia THUNB.	152	Zara LOUR.	448
Victoriperrea CAUDICH.	414	Wittmackia MEZ.	106	Zebrina SCHNITZL.	218
Vinsonia CAUDICH.	407	Wredowia ECKL.	151	Zephyra DON.	80
Visnea STEUD.	22	Wrightia ROXB.	376	Zephyranthes HERB.	41
Vitiphœnix BECC.	343	Wuerthea REG.	162	Zomicarpa SCHOTT.	468
Vogelia GMEL.	170			Zomicarpella N.-E. BR.	469
Vriesea LINDL.	93	Xanthocromyom KARST.	141	Zygomenes SALISB.	214
		Xanthosoma SCHOTT.	478		
Wachendorfia BURM.	84	Xenophya SCHOTT.	469		

FIN DE LA TABLE DES GENRES ET SOUS-GENRES DU TREIZIÈME VOLUME

